TABULÆ præsentis AGROSTOGRAPHIÆ SYNOPTICÆ.

GRAMINA SPICATA.

Gramina Spicata MONOSTACHYA,

- Spicâ *Triticeâ* Aristatâ & Mutica. *pag.* 2.
- Spicâ *Triticeâ Spuriâ*. *pag.* 11.
- Spicâ *Hordeaceâ*, quæ sunt
  - tribus folliculis uni axeos denticulo innatis, locustam componentibus, *pag.* 14.
  - duobus folliculis uni axeos denticulo innatis, locustam componentibus, *pag.* 20.
- Spicâ *Hordeaceâ Singulari*. *pag.* 21.
- Spicâ *Secalinâ*. *pag.* 22.
- Spicâ *Secalinæ affini*. *pag.* 23.
- Spicâ *Loliaceâ*, quæ sunt
  - Locustis & glumis muticis, in spicam longam, angustam, disticham dispositis, *pag.* 25.
  - Spicis partialibus, muticis, propè summitatem culmi in Spicam compressam latiùs expansis. *pag.* 29.
  - Spicis partialibus in Spicam longam dispositis, aristatis, quæ sunt
    - Aristis rectis. *pag.* 31.
    - Aristis tortilibus, geniculatis & recurvis. *pag.* 32.
  - Spicis partialibus in Spicam longam dispositis, teretiusculis, aristatis, *Corniculata* dicta. *pag.* 34.
  - Spicis compositis è folliculis brevibus, biglumibus, axi denticulato alternatim affixis, muticis. *pag.* 40.
  - Spicis compositis è Locustis longis, angustissimis, axi denticulato affixis, aristatis. *pag.* 41.
- Spicâ *Loliaceâ Spuriâ*. *pag.* 42.
- *Phalaroidea*, quæ sunt
  - Calyce rotundatum quasi Locustæ ambitum efficiente, glumis folliculi Muticis. *pag.* 52.
  - Calycis glumis ad basin tumidis, sinuosúmque Locustæ ambitum efficientibus, folliculo aristato. *pag.* 55.

* *Alope-*

Alopecuroidea, quæ ſunt
- Locuſtis longis, anguſtis, biglumibus, muticis, in filamentoſa ſericeáque lanugine latentibus. *pag.* 57.
- Locuſtis oblongis, biglumibus, ariſtatis, in ſericea pennatáque lanugine latentibus. *pag.* 58.

Typhina vel *Typhoidea*, quæ ſunt
- Spicâ tereti, Cylindraceâ. *pag.* 60.
- Spicâ foliaceâ, proliferâ. *pag.* 66.

Typho-Phalaroidea. *pag.* 68.

Myoſuroidea, quæ ſunt folliculo vel
- uniglumi ariſtato
  - Locuſtis majoribus, ſeu duas trésquè lineas longis. *pag.* 69.
  - Ariſtâ in calyce quandoque ita reconditâ, ut folliculus & locuſtæ muticæ eſſe videantur, quandoque ultra eundem exporrectâ, Locuſtâ brevi, ſubrotundâ, parvâ. *pag.* 72.
- biglumi, Mutico. *pag.* 73.

Spicâ *Echinatâ* ſeu *Spinoſa*, quæ ſunt
- Locuſtis biglumibus, pluribus unâ in eodem calyce biglumi contentis, glumis ſummo ſui in aliquot proceſſus ſeu lacinias ſpinæformes diviſis. *pag.* 74.
- Spicâ oblongâ, laxâ, Locuſtis compoſitis è pluribus folliculis oblongis, biglumibus, quorum glumæ exteriores craſſæ, & ſpinulis horridæ ſunt. *pag.* 76.
- Spicâ oblongâ, laxâ, Locuſtis compoſitis ex aliquot foliolis laciniatis, calycis vice fungentibus, ſpinulis horridis, in ſinu ſuo continentibus Locuſtas aliquot conglomeratas, compoſitas. *pag.* 77.

Criſtata, quæ ſunt
- Foliolis pennatis, Muticis. *pag.* 79.
- Foliolis pennatis Ariſtatis. *pag.* 80.

Anomala, quæ Spicâ donantur
- Compoſitâ è locuſtis pluribus Muticis uni breviſſimo ramulo inſidentibus, compoſitis è calyce bi-aut triglumi, Mutico, aut veluti breviſſimè ariſtato, in cujus ſinu alternatim ſiti duo tresque folliculi biglumes, Mutici, aut apicibus breviſſimis, ariſtæformibus donati. *pag.* 83.
- Compoſitâ è locuſtellis brevibus, denſiſſimè congeſtis, conſtantibus

* tibus è calyce biglumi, mutico, in cujus sinu folliculus biglumis, muticus, claudens semen oblongum. *pag.* 85.

Compositâ è locustis parvis, brevibus, densissimè congestis, constantibus ex aliquot folliculis aristatis, in calyce biglumi, aristato alternatim sitis. *pag.* 86.

Compositâ è locustis in spicam congestis, pluribus uni brevissimo ramulo insidentibus, compositis è calyce biglumi, claudente folliculum biglumem, cujus utraque gluma Aristam nunc longiorem, nunc breviorem emittit. *pag.* 87.

Angustissimâ, heteromallâ, compositâ è locustis nudis, biglumibus, angustis, uno versu dispositis, aristatis. *pag* 90.

Angustissimâ, longâ, compositâ ex Locustis avenaceis, circumquaque axi adnatis, laxè sitis, nudis, seu calyce biglumi destitutis, biglumibus, utraque glumâ aristatâ. *pag.* 91.

Angustâ, compositâ ex Locustis diversæ structuræ, mixtim axi denticulato aternatim adnatis, aliis nempe Muticis, aristâ autem longissimâ præditis aliis. *pag* 92.

Gramina Spicata partim MONOSTACHYA, partim POLYSTACHYA, PANICEA dicta, quæ sunt

Locustis simplicibus, Muticis, nascentibus in sinu filamentorum, aristis similium, spicâ Simplici. *pag.* 46.

Locustellarum glumâ alterutrâ, nonnunquam & utraque in aristam terminatâ, spicâ multiplici. *pag.* 48.

Locustellarum glumis muticis, Polystachya. *pag.* 50.

Gramina Spicata POLYSTACHYA sunt

Dactyloidea, quorum dantur genera sequentia, donata *Spicis*.

Compositis è Locustis duabus tribúsque uni scapi denticulo insidentibus, quarum una nulli, reliquæ brevi pediculo insident, quarúmve illa, quæ nulli pediculo insidet, aristata est, reliquæ muticæ. *pag* 94.

Constantibus è locustis compositis, aristatis, in spicas heteromallas dispositis. *pag.* 99.

Constantibus è Locustis compositis, muticis, uno versu dispositis, Locustis duabus uni scapi denticulo insidentibus, quarum una nulli altera autem cuidam pediculo insidet. *pag.* 100.

Vel heteromallis, vel non heteromallis, compositis è Locustis simplicibus, Muticis, Locustis duabus uni Scapi denticulo

culo insidentibus, quarum altera nulli aut brevissimo, altera brevi pediculo insidet. *pag.* 101.

Compositis è Locustis simplicibus, brevibus, muticis, uno versu dispositis, glabris. *pag.* 104.

Constantibus è Locustis compositis, spicas heteromallas efficientibus

calyce prorsùs mutico. *pag.* 107.

alterutrâ calycis glumâ in apicem curvatum, aristæformem terminatâ. *pag.* 109.

Loliaceis, seu quarum scapo denticulato alternatim adnascuntur locustæ simplices, breves, muticæ, spicam teretiusculam constituentes & Myosuram. *pag.* 111.

Loliaceis, seu quarum scapo denticulato alternatim adnascuntur Locustæ compositæ in spicam disticham dispositæ. *pag.* 112.

Miliaceis, seu quarum scapo adnascuntur locustæ breves, simplices, subrotundæ, & paulisper ventricosæ, semine Miliaceo, locustis vel muticis, vel aristatis. *pag.* 114.

Dactyloideis affinia.

Spicis heteromallis, Dactyloideis similibus, constantibus è Locustis compositis in spicam heteromallam dispositis. *pag.* 115.

Spicis Loliaceis veluti similibus, seu constantibus è Locustis Compositis, scapo alternatim adnatis. *pag.* 116.

Gramina nec Paniculata nec Spicata, seu ANOMALA.

Cornucopioides. *pag.* 117.

alia, diversæ structuræ locustas producentia. *pag.* 118.

GRAMINUM PANICULATORUM TABULA.

Gramina PANICULATA sunt vel *Locustis* prædita.

Simplicibus, seu unico folliculo donatis, quæ vel Calyce donantur *biglumi*

Mutico, claudente folliculum

biglumem muticum

in pappo delitescentem, plerunque tenuem, membranaceum. *pag.* 122.

1 2 3 4

plerum-

1 2 3 4 plerumque ſplendentem, brevi ad baſin pappo hirſutum. *pag.* 125.

calycis glumis anguſtis, locuſtellam lineam unam circiter longam efficientibus, folliculo tenui, parvo, plerumque membranaceo. *pag.* 127.

calycis glumis exiguis, breviſſimis, folliculo lineam vix longo, locuſtis in ramulis denſiſſimè congeſtis, ut panicula è meris ſpicis compoſita videatur. *pag.* 132.

calycis glumis ampliuſculis, locuſtellam lineam unam circiter longam efficientibus, ſemine miliaceo, ſplendente. *pag.* 133.

calycis glumis parvis, breviſſimis, folliculo lineam circiter longo, mediante glumâ membranaceâ in duo veluti loculamenta diſtincto, in quorum uno floris ſtamina, in altero autem ſemen ſplendens, Miliaceum. *pag.* 135.

Locuſtis in ſericea delicatáque lanugine deliteſcentibus. *pag.* 136.

1 2 3 *biglumem*, aliquando *triglumem, muticum*, brevi ad baſin pappo hirſutum. *pag.* 138.

biglumem Ariſtatum

Ariſtâ unicâ donatum, vel

articulatâ & recurvâ, prodeunte ex alterutrius glumæ dorſo, propè ejusdem baſin. *pag.* 139.

rectâ & vix recurva, prodeunte ex alterutrius glumæ dorſi circiter medio. pag. 143.

rectâ neque recurvâ, prodeunte ex alterutrius glumæ dorſo, pauxillum infra apicem. *pag.* 144.

rectâ prodeunte ex ipſo alterutrius glumæ apice, folliculo longiore villoſo. *pag.* 146.

tortili & aliquantiſper recurvâ, prodeunte ex ipſo alterutrius glumæ apice, folliculo breviſſimo, parvo. *pag.* 148.

1 2 3 4

1 2 3 4 Aristâ duplici donatum, paniculâ heteromallâ. *pag.* 149.

In eadem panicula nunc muticum, nunc aristâ avenaceâ præditum, seu Locustis in eadem panicula partim muticis, partim aristatis. *pag.* 507.

Aristato, claudente folliculum biglumem

utraque calycis glumâ in filamentum aristæforme terminatâ, glumâ folliculi majore, in aristam tortilem longissimam abeunte

nudam, sensimque attenuatam. *pag.* 151.

lanugine sericeâ, veluti distichâ pennatam. *pag.* 153.

utraque calycis glumâ paulò infra apicem membranaceum emittente aristam rectam, locustis parvis, subtilissimis, densissimè congestis.

folliculo mutico. *pag.* 154.

folliculo aristato. *pag.* 155.

In eadem Panicula nunc *Simplicibus*, nunc *Compositis*. *pag.* 156.

Compositis, seu pluribus uno folliculis locustam quamlibet componentibus, quæ sunt

Paniculâ circa culmum quaquaversum sparsâ

Locustis calyce biglumi donatis

Muticis

folliculis in calyce biglumi, mutico, longiore aut ex toto latentibus, aut apicibus suis parùm saltem ultra eundem, aut ultra se mutuò productis, alternatim sitis.

Densâ delicataque lanugine circumdatis

duobus tribusque plerumque locustam componentibus. *pag.* 159.

quinis aut senis locustam componentibus. *p.* 161.

Glabris aut parùm saltem hirsutis, duobus, tribus, quatuorve

paniculâ sparsâ laxâque. *p.* 163.

paniculâ densâ & spicatâ. *p.* 166.

1 2 3 4 5

In

1 2 3 4

- In calyce acuminato glabris, tribus, quatuor & quinque, locustis tumidiusculis. *pag.* 170.
- Locustis tumidiusculis, tribus quatuórve folliculis constantibus, quorum supremus truncatus est, è glumis composit°.
  - folliculis glabris. *pag.* 171.
  - folliculis lanuginosis seu pilosis. *pag.* 174.
- Folliculis in calyce biglumi, breviore alternatim sitis, & apicibus suis suis ultra calycem, squamarum sibi invicem incumbentium more productis, quæ sunt *Folliculis*, vel
  - Paucioribus, duobus nempe, aut duobus tribusque in locustis in eadem panicula sitis. *p.* 176.
  - Plùribus, nempe duobus, duobus & tribus, tribus, quatuor, & quinque, ad octo usque, densiùs alternatim sitis, & in locustam, ratione quantitatis folliculorum, breviusculam dispositis.
    - Panicula sparsa. *pag.* 182.
    - Locustis in densam veluti spicam dispositis. *p.* 187.
  - Tribus, quatuor, quinque & sex, etiam ad novem usque, laxiùs paulò & in Locustam longiusculam, pulchellam, veluti disticham dispositis, æquali spatio uno supra alterum scilicet prominente. *pag.* 189.
  - Biglumibus pluribus, angustis, densissimè sitis, in locustas oblongas, compressiusculas, distichas, & veluti filicinas, pulchras dispositis.

1 2 3 4

Culmo

1 2 3 4

- Culmo rotundo ſeu tereti. *pag.* 194.
- Culmo compreſſo. *p.* 198.

Biglumibus pluribus, laxiùs ſitis, in locuſtas ſpicæformes, teretiuſculas, in ſicca planta frequenter etiam veluti diſtichas, pulchellas diſpoſitis.

- Folliculis brevioribus, obtusè mucronatis. *p.* 199.
- Folliculis longioribus, acuminatis, locuſtis ſpicæformibus, teretiuſculis, in ſicca planta plerumque diſtichis. *pag.* 200.

Pluribus, quorum glumæ exteriores ampliores, & cochlearis inſtar excavatæ, ſe mutuò amplectuntur, & in Locuſtas tumidiuſculas pulchras diſponuntur *Gramina Tremula* dicta. *pag.* 202.

Paucioribus, duobus tribúsque, locuſtas ante *explicationem* anguſtas, acutas, in coni formam convolutas, poſt *evolutionem* autem laxas & facilè deciduas efficientibus, Culmo enodi. *pag.* 207.

Paucioribus in foliola tenuia abeuntibus, ſeu Locuſtis foliaceis, proliferis. *pag.* 211.

Ariſtatis, quæ ſunt

- Ariſtis articulatis, tortilibus & recurvis, Locuſtarum pedibus ſimilibus.
- Omnibus ejusdem Locuſtæ folliculis ariſtatis, quæ ſunt *Folliculis*
  - Duobus
    - eidem veluti baſi inſidentibus. *p.* 215.

1 2 3 4 5 6

alter-

1 2 3 4 5 6 alternatim ſitis, ſeu quorum baſis una alterâ quoad ſitum paulò altior eſt. *pag.* 220.

5 Duobus tribusque in eadem panicula, alternatim ſitis. *pag.* 223.

Duobus, tribus, plerumque tamen quatuor, in eadem panicula, locuſtam unam efficientib⁹. *p.* 225.

Longioribus, anguſtis, alternatim ſitis, Locuſtas majores & longiores efficientibus. *pag.* 226.

4 Non omnibus ejusdem Locuſtæ Folliculis ariſtatis, quæ ſunt *Folliculis*

Duobus { eidem baſi inſidentib⁹. *p.* 233. / alternatim ſitis. *p.* 234.

Tribus eidem veluti baſi inſidentibus, quorum bini extremi, aut extremorum alteruter ariſtatus eſt. *pag.* 236.

Nunc omnibus, nunc aliquibus ejusdem Locuſtæ folliculis ariſtatis, quæ ſunt *Folliculis*

Duobus. *pag.* 237.

Duobus aut tribus, quorum inferiores ariſtati ſunt. *pag.* 239.

3 Ariſtis quidem articulatis, ſed in filamentum apice craſſeſcens, terminatis, Folliculis ariſtatis duobus alternatim ſitis. *pag.* 242.

1 2 Ariſtis rectis, ſeu non articulatis

Omni-

1 2

- Omnibus Locustarum folliculis aristatis
  - Aristis è dorsi glumarum basi exeuntibus, folliculis duobus, alternatim sitis. *pag.* 244.
  - Aristis è dorso paulò infra apicem glumarum folliculorum, exteriorum, aut ex earum apice obtuso, vel ultra aristarum originem bifido, membranaceo prodeuntibus.
    - Locustis brevioribus, complanatis, folliculis angustis, brevibus aristis armatis. *p.* 246.
    - Locustis longioribus, teretiusculis, longiùs aristatis. *pag.* 248.
    - Locustis longioribus, majoribus & amplioribus, ventricosis, spicæformibus, nunc teretiusculis, mucronatis, pleniore autem maturitate & in sicca planta frequenter veluti distichis. *p.* 249.
  - Aristis ex ipso glumarum, in folliculis, exteriorum sensim angustato apice productis.
    - Folliculis longis, angustis, locustas teretiusculas, quandoque

1 2 3 4

1 2 3 4 doque plenâ tamen maturitate diſtichas efficientibus. *pag.* 255.

Folliculis anguſtis, ſe invicem amplectentibus, locuſtas plerumque teretiuſculas efficientibus. *p.* 262.

Non omnibus ejusdem paniculæ Locuſtis, vel ejusdem locuſtæ folliculis non omnibus ariſtatis, ariſtis breviſſimis, ex apice ipſo glumarum, in folliculis, exteriorum prodeuntibus. *p.* 266.

Locuſtis calyce biglumi deſtitutis, compoſitis è folliis aliquot diverſæ ſtructuræ. *pag.* 267.

Panicula Heteromallâ, ſeu verſus alterutrum latus ſpectante, quæ ſunt *Locuſtis*

Muticis ſeu non ariſtatis. *pag.* 271.

Ariſtatis

Calyce manifeſtè biglumi, mutico donatis. *pag.* 279.

Calyce biglumi quidem, ſed alterâ ejus glumâ exiſtente ita exiguâ, ut vix obſervabilis ſit, alterâ muticâ. *pag.* 293.

Calyce biglumi quidem, ſed alterâ glumâ minimâ, vixque obſervabili, alterâ apice ſuo in ariſtam deſinente. *pag.* 297.

GRAMINA RELIQUA & GRAMINIBUS AFFINIA, quibus comprehenduntur Genera ſequentia.

Linagroſtis

Spicâ unicâ, nullo eidem ſubjacente folio, vel etiam glumis calycis vice fungentibus, ſummo culmo inſidente. *pag.* 302.

- Spicis pluribus, partim longioribus, partim brevioribus pediculis insidentibus, in paniculæ modum sparsis, foliolis uno pluribus paniculæ subjectis. *pag.* 306.

Juncoides, quod vel *Foliis* gaudet
- verè gramineis, culmos vestientibus. *pag.* 310.
- crassiusculis & penè junceis, canaliculi in modum excavatis, stylo nudo. *pag.* 322.
- quasi junceis, vel junceis, quandoque tenuissimis. *pag.* 323.
- junceis seu tubularibus, nodulis & quibusdam veluti articulis distinctis. *pag.* 331.

Juncoidi affinis. *pag.* 336.

Juncus.
- Paniculâ prodeunte ex ipsa scirporum summitate, éque sinu vaginarum, quarum duæ extimæ præcipuè conspicuæ, in folia plerumque juncea, nunc longiora, nunc breviora terminatæ. *pag.* 338.
- Paniculâ prodeunte ex quadam veluti Scirporum fissura, aliquanto infra mucronem spatio positâ. *pag.* 341.

Junco affinis. *pag.* 348.

Canna . . *pag.* 352.

Scirpus, qui est vel
- *Paniculatus*, qui vel *Calamo* est.
  - tereti, junceo, è sinu folii stylum prolongatum mentientis, emittente pediculos partim breviores, partim longiores, spicas plures, squamosas, teretes, mucronatas, & imbricatas sustinentes. *pag.* 354.
  - compresso, cujus summo insidet panicula, ex aliquot ramulis, è sinu foliorum duorum, aut plurium, vaginæformium prodeuntibus composita, quibus insident spicæ imbricatæ. *pag.* 359.
- *Spicatus*, cujus stylorum summitas terminatur *Spicâ* vel
  - oblongâ, clavata, teretiusculâ, sensim in mucronem fastigiatâ, compositâ è glumis pluribus, undiquaque axi adnatis, seu imbricatim positis, inter quas latet semen. *pag.* 360.
  - brevissimâ, è squamis paucioribus, eandem non adeò manifestè imbricatam efficientibus compositâ, inter quas squamas latet semen. *pag.* 362.
- *Capitatus*, seu cujus stylorum summitati insident Spicæ plures, veluti in capitulum conglomeratæ, &c. *pag.* 367.

Scirpoides. *pag.* 371.

Pseudo-Cyperus. *pag.* 375.

Cyperus

Cyperus qui eſt vel *Spicis*
- Pulchellis veluti filicinis, planis & compreſſiuſculis, conſtantibus è glumis axi alternatim utrinque adnatis, ſpicámque diſticham aut diſtichæ ſimilem efficientibus, culmo triquetro. *pag.* 378.
- Teretiuſculis, mucronatis, minoribus, lineas duas ſcilicet plus minus longis, è ſquamis imbricatim poſitis, ſeu axi medio circumquaque adnatis conſtantibus.
  - Calamo triangulo. *pag.* 393.
  - Calamo compreſſo, ſeu aliquatenùs complanato, ſubtereti. *p.* 395.
  - Spicis teretibus, longioribus, ſemuncialibus & uncialibus ſcilicet, compoſitis è ſquamis undiquaque axi adnatis, & imbricatim poſitis, culmo triquetro. *pag.* 398.
  - Squamis tenuibus, anguſtis, in capitula globoſa, in ala ſeu ſinu Foliorum aliquot ſeſſilia, densè collectis. *pag.* 401.

Scirpo-Cyperus, qui eſt vel Spicarum *Glumis*
- ſcapo proprio alternatim adnatis, ſpicam diſticham efficientibus. *pag.* 402.
- amplis, alternatim axi adnatis, in quarum ſinu ſemen triquetrum. *p.* 403.
- axi circumquaque adnatis, & imbricatim poſitis, ſpicas teretiuſculas efficientibus. *pag.* 404.

Cyperoides, quod eſt vel
- *Polyſtachyon*, quod vel *Spicis*
  - In eadem planta & Floriferis & Seminiferis
    - Spicâ unicâ caſsâ
      - In ſummitate Culmi poſitâ, quæ vel *Spicis conſtant Seminiferis*
        - Laxis, ſeu è folliculis laxiùs ſitis conſtantibus, tenuibus
          - vel nulli, vel cuidam pedicello, in vagina, unde prodeunt, occultato inſidentibus, in folioli membranacei, vaginæformis ala veluti ſeſſilibus. *pag.* 407.
          - Pediculis longioribus & manifeſtioribus inſidentibus, qui prodeunt è ſinu vaginæ membranaceæ, aut in nullum aut etiam breviſſimum foliolum terminatæ. *pag.* 410.
        - Pediculis manifeſtis inſidentibus, vel etiam ex iisdem pendulis, qui

1 2 3 4 5 6

pro-

1 2 3 4 5 6 prodeunt è ſinu foliorum per inæqualia culmi ſpatia natorum. *pag.* 412.

5 Denſioribus, ſeu è granis glumisque densè & imbricatim axi circumjacentibus compoſitis

6 Nullis pediculis communiter inſidentibus

4 in ala membranarum vaginæformium, in brevia quandoque foliola terminatarum veluti ſeſſilibus. *pag.* 419.

4 in ala foliorum per culmum naſcentium veluti ſeſſilibus. *pag.* 425.

6 Pediculis quibusdam manifeſtis inſidentibus, è foliorum per culmum naſcentium alis prodeuntibus,

Surrectis. *pag.* 428.
pendulis. *pag.* 440.

4 Non in ſummitate culmi, ſed infra ſpicam unam ſeminiferam poſitâ, ſpicis ſeminiferis laxis. *pag.* 448.

3 Spicarum ſupremarum nunc unicâ floriferâ, nunc etiam duabus, vel etiam ſpicâ unâ alteráque è ſupremis, ex parte floriferâ & caſsâ, ex parte ſeminiferâ. *pag.* 452.

3 Spicâ unicâ caſsâ & floriferâ, ſummitati Culmi nunc inſidente, nuna etiam, imò plerumque prorsùs abſente, vel ſpicis floriferis pluribus, aliis culmis inſidentibus, ſpicis nullis pediculis nixis. *pag.* 456.

3 Spicarum ſupremarum unâ pluribus floriferis & caſſis, reliquis ſeminiferis. *pag.* 458.

1 Spicis floriferis & caſſis deſtituta, quæ ſunt vel *Spicis*

propè ſummitatem culmi pediculis inſidentibus. *pag.* 481.

per majora Culmi ſpatia in ala foliorum ſeſſilibus. *p.* 483.

versùs ſummitatem culmi laxiùs diſpoſitis

2 Breviſſimis. *pag.* 485.

2 Longioribus & laxioribus. *pag.* 487.

- brevissimis, in spicam oblongam, interruptam dispositis. *pag.* 488.
- partialibus in spicam veluti disticham dispositis. *pag.* 490.
- in spicam brevem, unicam, velut in capitulum collectis. *pag.* 492.

Monostachyon. *pag.* 496.

Paniculatum, quod vel *Paniculâ*, donatur constante ex
- pluribus ramulis, quibus adnascuntur spicæ è squamis imbricatim positis constantes, in quarum sinu folliculus semen continens. *pag.* 499.
- ramulis diversis dissitisque Culmi locis oriundis, sustinentibus paniculam densam, veluti umbellatam, è locustis aliquot glumis seu squamis constantibus compositam, in quarum sinu singulo semen in sinu aliquot filamentorum sessile. *pag.* 502.

Cyperoidi affine. *pag.* 504.