II. HEMIPTERA.

Os roſtrumque inflexum verſus pectus.

Alae hemelytratae: ſuperioribus ſemicoriaceis (per ſuturam rectam minime conniventibus) ſed margine interiore impoſitis.

219. BLATTA.

Caput inflexum.
Antennae ſetaceae.
Palpi inaequales, filiformes.
Elytra alaeque planae, ſubcoriaceae.
Thorax planiuſculus, orbiculatus, marginatus.
Pedes curſorii.
Cornicula duo ſupra caudam (plurimis)

gigantea. 1. Bl. livida, thoracis clypeo macula quadrata fuſca. *Muſ. Lud. Ulr.* 106. *Gron. zooph.* 633. *t.* 16. *f.* 3.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 341. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 1.
Seb. muſ. 3. *t.* 77. *f.* 1. 2. *et* 4. *t.* 85. *f.* 17. 18.
Drury inſ. 2. *t.* 36. *f.* 2.
Habitat in Aſia *et* America, *diametro ovi gallinacei.*

maderae. 11. Bl. fuſca, thorace elytrisque lividis fuſco variegatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 341. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 2.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 49. *f.* 3.
Habitat in inſula Madera, *ſtatura giganteae, at paulo minor.*

aegyptiaca. 2. Bl. atra, thoracis margine anteriori albo. *Muſ. Lud. Ulr.* 107.* *Gron. zooph.* 637. *t.* 15. *f.* 2.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 342. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 3.
Drury inſ. 2. *t.* 36. *f.* 3.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 49. *f.* 4.
Habitat in Aegypto, Oriente.

occidentalis. 12. Bl. thorace atro: margine omni pallido punctisque duobus baſeos fulvis, elytris olivaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 4.
Habitat in America, *aegyptiaca minor.*

3. Bl.

surinamensis. 3. Bl. livida, thoracis margine anteriori albo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 342. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 225. *n.* 5.
Sulz. inf. t. 8. *f.* 1.
Degeer inf. 3. *t.* 44. *f.* 8.
Habitat in Surinamo.

americana. 4. Bl. ferruginea, thoracis clypeo posterius exalbido. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 342. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 225. *n.* 6.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 381. *n.* 2. Blatta fusco-flavescens.
Degeer inf. 3. *t.* 44. *f.* 1. 2. 3. Blatta ferruginea.
Raj. inf. 623. Blatta molendinaria ab insula Jamaica allata major.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 8. *t.* 49. *f.* 5.
Merian. surin. 1. *t.* 1.
β) Blatta alata. *Herbst apud Fuesili arch. inf.* 8. *t.* 49. *f.* 6.
Habitat in America, *cum saccharo in* Europam *delata.*

australasiae. 13. Bl. ferruginea, thorace atro, annulo albo, elytris basi lineola alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 342. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 225. *n.* 7.
Capta frequens in navi ex oceano *australi reduce.*

erythrocephala. 14. Bl. atra, capite pedibusque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 342. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 225. *n.* 8.
Habitat - - - . *magna.*

capensis. 15. Bl. fusca, capite pedibusque rubris. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 77. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 225. *n.* 9.
Habitat ad caput bonae spei, *statura et magnitudine americanae, glabra.*

indica. 16. Bl. grisea, thorace atro: margine anteriori albo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 343. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 225. *n.* 10.
Habitat in India.

nivea. 5. Bl. alba, antennis flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 343. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 226. *n.* 11.
Degeer inf. 3. *t.* 44. *f.* 10.
Drury inf. 2. *t.* 36. *f.* 1.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 8. *t.* 49. *f.* 8.
Habitat in America *meridionali, magnitudine tabani.*

irrorata. 17. Bl. pallida, thorace elytrisque fusco irroratis, alis disco nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 343. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 226. *n.* 12.

Thunb.

Thunb. nov. inf. ſp. 4. *p.* 76? Blatta pallida thorace elytrisque fuſco-irroratis, alis baſi nigris.
Habitat ad caput bonae ſpei *et in* nova Hollandia, *giganteae fere magnitudine.*

viridis. 18. Bl. viridis, antennis thoracisque linea laterali flavis, alis albis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 343. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 226. *n.* 13.
Habitat in America.

braſilienſis. 19. Bl. pallida, abdomine atro. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 343. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 226. *n.* 14.
Degeer inf. 3. *p.* 538. *n.* 3. *t.* 44. *f.* 5. Blatta abdomen nigrum.
Habitat in Braſilia.

Petiveriana. 20. Bl. nigra, elytris maculis quatuor flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 343. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 226. *n.* 15.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 578. *n.* 28. Caſſida petiveriana.
Pallas ſpic. zool. 9. *p.* 9. *t.* 1. *f.* 5. Blatta heteroclita.
Petiv. gaz. t. 71. *f.* 1. Cimici affinis niger.
Seb. muſ. 4. *t.* 95. *f.* 21.
Schroet. Abh. 1. *t.* 1. *f.* 7. 8.
Sulz. hiſt. inſ. t. 11. *f.* A. B.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 49. *f.* 7.
Habitat in India, *ſtatura caſſidae.*

orientalis. 7. Bl. ferrugineo-fuſca immaculata, elytris abbreviatis: ſulco oblongo impreſſo. *Fn. ſuec.* 862.* *Scop. ent. carn.* 313. *Gron. zooph.* 635. 636. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 380. *t.* 7. *f.* 5. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 343. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 16. *Kalm it.* 2. *p.* 406.
Degeer inſ. 3. *p.* 530. *n.* 1. *t.* 25. *f.* 1. 2. Blatta culinaris.
Friſch inſ. 5. *t.* 3. Blatta lucifuga ſ. molendinaria.
Mouff. inſ. 138. *f.* 2. 3. Blatta molendinaria.
Raj. inſ. 68. *n.* 1. Blatta prima ſ. mollis Mouffeti.
Column. ecphr. 1. *p.* 40. *t.* 36. Scarabaeus alter teſtudinatus minor atque alatus.
Jonſt. inſ. t. 13. *f.* A. Grylli.
Sulz. inſ. t. 7. *f.* 47.
hiſt. inſ. t. 8. *f.* 2.
Schaeff. ic. t. 155. *f.* 6. 7.
Sonner. it. t. 12.
Habitat in America, *hoſpitatur in* Oriente *et* Europa, *a* 200 *inde annis in* Bohemia, *a* 1739 *in* Belgio, *et antea*

in Finlandia, *et* Ruſſia, *frequens in farina, pane, aliis cibariis, calceis &c. quae conſumit, lucifuga, velociſſime currens, a tenthredine magna caerulea infeſtatur.*

Femina *aptera larvae ſimilis parit ovum magnitudine dimidia abdominis ſubcylindricum; carina crenulata.*

cincta. 21. Bl. flaveſcens, thoracis elytrorumque marginibus albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 17.

Habitat in America, *ſtatura et magnitudine orientalis, corpore fuſco, elytris nunc breviore, nunc longiore, pedibus albidis.*

picta. 22. Bl. atra, elytris vitta ſanguinea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 18.

Habitat in Braſilia.

variegata. 23. Bl. thorace flaveſcente, elytris teſtaceis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 344. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 19.

Habitat in nova Hollandia.

lapponica. 8. Bl. flaveſcens elytris nigro maculatis. *Fn. ſuec.* 863.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 344. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 20.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 381. *n.* 3. Blatta flaveſcens &c.

Degeer inſ. 3. *p.* 533. *n.* 2. *t.* 25. *f.* 8. 9. Blatta nigro-fuſca.

Sulz. hiſt. inſ. t. 8. *f.* 3.

Schaeff. elem. t. 26. *f.* 2.

icon. t. 88. *f.* 2. 3.

Habitat in Europa, *cibaria conſumens, in auſtralioris tamen humidis ſilvis minus noxia, thorace interdum toto, frequentius margine tantum flaveſcente.*

germanica. 9. Bl. livida, corpore flaveſcente, thorace lineis duabus parallelis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 344. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 21.

Pontopp. atl. dan. 1. *t.* 29. Blatta transfuga.

Habitat in Europa, Braſilia, *inſulis oceani auſtralis, magnitudine lapponicae.*

ruficollis. 24. Bl. thorace ferrugineo, corpore pallido teſtaceo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 22.

Habitat in India, *ſtatura et magnitudine germanicae.*

25. Bl.

Blattae *lucifugae cum larvis ſuis rodunt cibaria, coria, putridaque varia, celeri cursu ſe ſubtrahentes; fumo lithantracis occid: cum gryllis.* Scopoli. *An n Seba delineatae fuſca muſ.* 4. *t.* 85. *f.* 13. 14. *et cinereo-fuſca f.* 15. 16. *propriae ſpecies?*

maculata. 25. Bl. thorace nigro: margine albido, elytris pallidis: macula magna apicis nigra. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 501. *mant. inf.* 1. *p.* 226. *n.* 23.
Schreber Naturf. 15. *p* 89. *t.* 3. *f.* 17. 18.
Habitat in Germaniae *pinetis et ericetis.*

marginata. 26. Bl. nigra thorace rufo albo marginato, elytris nigris: limbo albo. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 502. *mant. inf.* 1. *p.* 226. *n.* 24.
Schreber Naturf. 15. *p.* 88. *t.* 3. *f.* 16.
Habitat in Italia, *maculata paulo minor.*

oblongata. 10. Bl. oblonga livida, thorace punctis duobus lunulaque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 345. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 226. *n.* 25.
Degeer inf. 3. *p.* 541. *n.* 9. *t.* 44. *f.* 11. Blatta oblonga.
Habitat in Surinamo, *forma cantharidis.*

nitidula. 27. Bl. thorace ferrugineo, elytris cyaneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 345. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 226. *n.* 26.
Habitat in Surinamo, *minuta, nitida.*

fusca. 28. Bl. fusca immaculata capite, antennis, pedibus, thoracis hemelytrorumque marginibus ferrugineis. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. 77.
Habitat ad caput bonae spei, *magnitudine americanae, glabra.*

deusta. 29. Bl. fusca immaculata, capitis hemelytrorumque basibus rufis. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 77.
Habitat ad caput bonae spei, *germanica paulo major.*

chlorotica. 30. Bl. polita ex griseo lutea, elytris subpellucidis virenti-venosis: margine crassiore opaco prasino; margine extimo basique lutescentibus. *Pallas spic. zool.* 9. *p.* 11. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat ad caput bonae spei, *magnitudine et statura fere orientalis.*

latissima. 31. Bl. fusca punctata, thoracis margine anoque flavis, abdomine subtus nigro, tibiis spinulosis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 8. *p.* 184. *n.* 1. *t.* 49. *f.* 2.
Habitat in Surinamo.

aterrima. 32. Bl. nigra immaculata, tarsis albis, geniculis fuscis, tibiis spinosis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 8. *p.* 185. *n.* 8. *t.* 49. *f.* 9.
Habitat in India.

perſpicil- laris. 33. Bl. flaveſcens, thorace medio fulvo: margine hyalino. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 186. *n.* 12 *t.* 49. *f.* 11.
Habitat in Marchia, *an varietas lapponicae, cui perquam affinis?*

aſiatica. 34. Bl. griſea, oblonga elytris alisque abdomine longioribus apice anguſtatis. *Pallas it.* 3. *p.* 263.
Habitat in Aſia *auſtrali, cum mercibus* Sinarum *in* Sibiriam *delata, germanica major.*

Schaeffe- ri. 35. Bl. nigricans, thorace elytrorumque margine flaveſcente, pedibus luteis: femoribus nigris.
Schaeff. ic. t. 158. *f.* 2.

ſylveſtris. 36. Bl. ſubtus nigra, antennis nigris, thoracis margine elytrisque teſtaceis. *Scop. ent. carn. p.* 104. *n.* 314.
Poda muſ. graec. p. 50.
Habitat in Carniolia.

penſylva- nica. 37. Bl. fuſca, thoracis clypeo albido: medio nigro-fuſco, elytris flavo-fuſcis anterius albidis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 537. *n.* 2. *t.* 44. *f.* 4.
Habitat in Penſylvania, *pollicem longa.*

livida. 38. Bl. fuſca, corpore ſubtus pedibusque fulvo-griſeis, alis longitudine abdominis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 538. *n.* 4. *t.* 44. *f.* 6.
Habitat in Surinamo, $8\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

rufa. 39. Bl. oblonga rufa, pedibus teſtaceis, alis abdomine longioribus. *Degeer inſ.* 3. *p.* 539. *n.* 5. *t.* 44. *f.* 7.
Habitat in Surinamo, 9 *lineas longa.*

griſea. 40. Bl. oblonga cinereo-griſea: punctis aliquot fuſcis minutiſſimis. *Degeer inſ* 3. *p.* 540 *n.* 7. *t.* 44. *f.* 9.
Habitat in Surinamo, $10\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

minutiſſi- ma. 41. Bl. ovata nigro-fuſca, antennis brevioribus, thoracis lateribus alisque hyalinis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 542. *n.* 10. *t.* 44. *f.* 13. 14.
Habitat in Surinamo, *cimicis lectularii magnitudine.*

aptera. 42. Bl. aptera fuſca punctata, abdominis ſegmentis margine poſteriori tibiisque lividis, alis ferrugineis, tibiis ſpinoſis. *Muſ. Lesk. p.* 46. *n.* 5.
Habitat extra Europam.

43. Bl.

punctulata. 43. Bl. fusca, thorace punctis elevatis impressisque variegato, alis albis. *Mus. Lesk. p.* 46. *n.* 7.
Habitat extra Europam, *statura et facie orientalis, an varietas?*

ocellata. 44. Bl. brunnea, fronte thoracisque disco macula rubra: posteriori ocellis duobus fuscis varia, abdominis segmentis margine anteriore supra infraque rubris. *Mus. Lesk. p.* 46. *n.* 8.
Habitat extra Europam.

PNEUMORA. *Corpus* ovatum, inflatum, hyalinum.
Caput inflexum, maxillosum.
Thorax convexus, subtus carinatus.
Elytra deflexa, membranacea.
Pedes cursorii.

immaculata. 1. Pn. elytris immaculatis. *Thunb. act. Stockh.* 1775. 3. *p.* 255. *t.* 7. *f.* 1.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 363. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 286. *n.* 12. Gryllus (papillosus) viridis, albo maculatus scutello carinato utrinque dentato, abdomine vesiculoso variegato.
Habitat ad caput bonae spei, *in stoebe cernua, a Septembri ad Novembrem frequens; viridis, elytris aliquando minutissime nigro-punctatis, rarius flavescens aut rubescens, gryllo domestico duplo major.*

maculata. 2. Pn. elytris viridibus: maculis quadratis albis. *Thunb. act. Stockh.* 1775. 3. *p.* 256, *t.* 7. *f.* 2.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 693. *n.* 4. *Mus. Lud. Ulr.* 120.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 363. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 13. Gryllus (varioloſus) viridis calloso-punctatus abdomine vesiculoso albo variegato.
Habitat ad caput bonae spei, *in stoebe annua, Novembri et Decembri conspicua, immaculatae magnitudine, tota viridis, albo-maculata.*

sexguttata. 3. Pn. elytris viridibus: maculis tribus argenteis. *Thunb. act. Stock.* 1775. 3. *p.* 257. *n.* 3. *t.* 7. *f.* 3.
Fabr.

Pneumorae *quasi totae membrana cava constant, pedes dentatos ad corpus fricando, crepusculo et nocte sonum edunt, lucem emicantem petunt.*

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 363. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 236. *n.* 11. Gryllus (inanis) viridis, elytris maculis duabus albis abdomine veſiculoſo: utrinque maculis tribus albis.
Habitat ad caput bonae ſpei, *Decembri conſpicua, maculata quadruplo major, viridis.*

220. MANTIS. *Caput* nutans, maxilloſum, palpis filiformibus inſtructum.
Antennae ſetaceae.
Alae 4 membranaceae, convolutae: inferiores plicatae.
Pedes anteriores compreſſi, ſubtus ſerrato-denticulati, armati ungue ſolitario et digito ſetaceo, laterali, articulato.
poſteriores 4 laeves, greſſorii.
Thorax linearis, elongatus, anguſtatus.

filiformis. 15. M. corpore filiformi aptero. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 1. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 187. *n.* 5. *t.* 51. *f.* 2. 3?
Scop. delic. inſubr. 1. *p.* 60. *t.* 24. *f.* A. 1–3. Plocaria domeſtica?
Habitat in America, India, Italia, *fuſca, pedibus corpore longioribus, antennis nigris.*

Gigas. 1. M. thorace teretiuſculo ſcabro, elytris breviſſimis, pedibus ſpinoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 109.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 345. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 2.
Marcgr. braſ. 251. Arumatia.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 19. *f.* 9. 10.
Bradl. natur. t. 27. *f.* 6.
Petiv. gaz. t. 60. *f.* 2.
Seb. muſ. 4. *t.* 77. *f.* 1. 2.
Habitat in Aſia, *alis maximis.*

cylindrica. 54. M. thorace cylindrico, pedibus anterioribus thoraci anterius annexis, elytris griſeis baſi ſubtusque rufis, alis fuſcis albo guttatis. *Muſ. Lesk. p.* 46. *n.* 12.

Habitat

Habitat extra Europam, *alarum guttis vagis, fenestratis, spina prostrata utrinque ad basin elytrorum abdomen respiciente.*

phthisica. 2. M. thorace teretiusculo muricato, elytris brevissimis, pedibus inermibus. *Mus. Lud. Ulr.* 110.*
Habitat in America *australi et* India.

siccifolia. 3. M. thorace denticulato, femoribus ovatis membranaceis. *Mus. Lud. Ulr.* 111.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 347. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 16.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 17. *f.* 4. 5.
Edw. glean. t. 258.
Merian. surin. t. 66.
Seligm. av. 7. *t.* 48.
Habitat in America *australi et* India.

gongyloides. 4. M. thorace subciliato, femoribus anterioribus spina terminatis; reliquis lobo. *Mus. Lud. Ulr.* 112.* *Gron. zooph.* 639.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 346. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 227. *n.* 10.
Amoen. acad. 1. *p.* 504. Gryllus thorace lineari alarum longitudine: margine denticulis ciliato.
Aldr. inf. t. 13. *f.* 21. Mantis.
Marcgr. bras. 246. Gaayra.
Act. angl. 301. *t.* 20. *f.* 3.
Seb. mus. 4. *t.* 68. *f.* 9–12.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 7.
Sulz. hist. inf. t. 8. *f.* 56.
Aubent. misc. t. 65. *f.* 2.
Drury inf. 1. *t.* 56. *f.* 2.
Habitat in Africa *et* Asia, *capitis vertice subulato bifido, antennis rarius pectinatis.*
Larvae *pedes lobis membranaceis alati.*

paupera- ta. 16. M. thorace lineari spinuloso, femoribus anterioribus spina terminatis; reliquis lobo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 346. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 227. *n.* 11.
Thunb. nov. inf. sp. 3. *p.* 61. Mantis thorace apice dilatato spinuloso, femoribus lobo simplici terminatis.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 8. *t.* 51. *f.* 1.
Habitat in India, *gongyloda minor et angustior.*

mendica. 17. M. thorace marginato dentato, elytris albo viridique variis: margine albo-punctato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 347. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 12.
Habitat Alexandriae.

religiosa. 5. M. thorace laevi subcarinato elytrisque viridibus immaculatis. *Scop. ent. carn.* 315.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 1. 2.
Seb. mus. 4. *t.* 67. *f.* 7. 8.
Sulz. hist. inf. t. 8. *f.* 4.
Schaeff. elem. t. 81.
Seligm. av. t. 4.
Habitat in Sibiria, Austria, Africa, *tota viridis, an mera varietas oratoriae?*

oratoria. 6. M. thorace laevi, elytris viridibus, alis macula nigra anterius rufescentibus. *Mus. Lud. Ulr.* 115.*
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 348. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 21. Mantis thorace laevi, elytris viridibus immaculatis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 399. *n.* 1. *t.* 8. *f.* 4. Mantis.
Mouff. inf. 118. *f.* 3.
Aldr. inf. 4. *t.* 3. *f.* 10.
Seb. mus. 4. *t.* 67. *f.* 9. 10.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 1. 2.
Degeer inf. 3. *t.* 37. *f.* 2.
Habitat in Oriente *et australi* Europa Francofurtum ad Moenum *usque.*

irrorata. 7. M. thorace laevi subcarinato, elytris viridibus: punctis ferrugineis vagis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 397. *n.* 29. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 348. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 20.
Habitat in America *meridionali, precariae similis.*

precaria. 8. M. thorace subciliato, elytris virescentibus: ocello ferrugineo. *Mus. Lud. Ulr.* 114.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 349. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 22.
Merian. surin. t. 66.
Seb. mus. 4. *t.* 67. *f.* 3–6.
Degeer inf. 3. *p.* 406. *n.* 3. *t.* 36. *f.* 4.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 8. *t.* 50. *f.* 1.
Habitat in America *et* Africa, *elytrorum ocello anterius dimidiato albo, aut toto interdum albo.*

sancta. 18. M. viridi - flavescens, thorace serrulato, elytris viridibus immaculatis, alis subhyalinis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 23.
Habitat in Gallia *magis australi, statura oratoriae, at triplo minor.*

19. M.

monacha. 19. M. teſtacea, thorace laevi, elytris alisque viridi-hyalinis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 24.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura precariae, at duplo minor.*

obſcura. 20. M. obſcure griſea, thorace ſerrulato, elytris macula baſeos, alis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 349. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 25.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſtatura precariae, at minor.*

hyalina. 21. M. thorace ciliato, elytris hyalinis: margine viridi, fronte bidentata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 349. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 26.
Degeer inſ. 3. *p.* 410. *n.* 4. *t.* 37. *f.* 1.
Habitat in America.

feneſtrata. 22. M. thorace laevi, alis hyalinis, elytrorum margine exteriori fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 349. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 27.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſtatura hyalinae.*

bidens. 23. M. thorace ſcabro, elytris viridibus: faſciis nigris, alis fuſcis diſco atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 350. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 28.
Habitat in America.

miniſtralis. 24. M. thorace ſcabro crenato longitudine capitis anterius ferrugineo, elytris viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 350. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 29.
Habitat in nova Hollandia.

urbana. 25. M. thorace integro, elytris viridibus: puncto faſciaque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 350. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 30.
Habitat in America *auſtrali et* India.

ruſtica. 26. M. thorace laevi fuſco, elytris ala brevioribus fuſco-hyalinis, antennis piloſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 350. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 31.
Habitat ad Patagoniae *littora, paganae magnitudine.*

An forſan hujus generis inſectum a Queronio fuco adhaerens in mari mediterraneo repertum in act. pariſ. extr. 9. p. 329. ſub nomine puce de mer arpenteuſe deſcriptum et delineatum? repugnat habitatio in mari.

nasuta. 27. M. thorace spinoso ciliatoque, fronte porrecta spinosa emarginata. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 229. *n.* 32.
Habitat ad caput bonae spei, *mediae magnitudinis.*

lobata. 28. M. thorace trilobo, capitis fronte cornu bifido, oculis conico-acuminatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 350. *n.* 28. *mant. inf.* 1. *p.* 229. *n.* 33.
Thunb. nov. inf. sp. 3. *p.* 62. *f.* 73. Mantis virescens, capitis cornu oculisque conico-acuminatis.
Habitat ad caput bonae spei, *parva.*

pulchra. 29. M. viridis, thorace integro, alis fusco-hyalinis basi ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 229. *n.* 34.
Habitat Tranquebariae, *parva.*

fausta. 30. M. linearis cinereo-fusca immaculata. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. *p.* 63. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 229. *n.* 35.
Habitat ad caput bonae spei, *numen tutelare Hottentottorum.*

perspicua. 31. M. obscura, elytris alisque hyalinis, alis macula marginali apiceque fuscis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 230. *n.* 36.
Habitat in Cayenna, *statura minutae, at paulo major.*

pagana. 32. M. alis reticulatis albis: macula laterali ferruginea, manibus chelatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 350. *n.* 29. *mant. inf.* 1. *p.* 230. *n.* 37.
Pall. spic. zool. 9. *p.* 14. *t.* 1. *f.* 8. Mantis Perla.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 916. *n.* 2. Raphidia (mantispa) pedibus anticis thoraci antice annexis, antennis thorace brevioribus.
Scop. ent. carn. 712.
Poda inf. 101. *t.* 1. *f.* 15.
Habitat in Calabria, Gallia, *et* Germania.

minuta. 33. M. thorace cylindrico flavescente, elytris hyalinis: costa virescente. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 350. *n.* 30. *mant. inf.* 1. *p.* 230. *n.* 38.
Habitat in America *meridionali, et circa* Aurelianum.

pusilla. 34. M. thorace cylindrico flavescente, elytris alisque hyalinis immaculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 351. *n.* 31. *mant. inf.* 1. *p.* 230. *n.* 39.
Pall. spic. zool. 9. *p.* 15. *t.* 1. *f.* 9. Mantis pusilla.
Habitat in Africa, *raphidia ophiopsi major.*

9. M.

carolina. 9. M. thorace ſubciliato carinato, elytris albidis fuſco nebuloſis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 396. *n.* 28.*
Habitat in Carolina, *precariae ſimilis, elytris alisque abdomine brevioribus.*

pectinicornis. 10. M. thorace laevi, elytris viridibus, alis oblique ſtriatis, vertice ſubulato, antennis pectinatis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 396. *n.* 27.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 347. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 17.
Drury inſ. 1. *t.* 50. *f.* 1.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 50. *f.* 2.
Habitat in India, *auſtrali* America, Jamaica.

oculata. 35. M. thorace triangulo filiformi, oculis oblongis porrectis acuminato-ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 348. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 18.
Habitat in Africa *aequinoctiali, mediae magnitudinis, capite pallido, thorace teſtaceo, elytris alisque albo-hyalinis, pedibus obſcuris.*

ſuperſtitioſa. 36. M. thorace filiformi triangulo anterius ſerrulato, elytris vireſcentibus, alarum coſta tranſverſe ſtriata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 348. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 19.
Habitat in Africa *aequinoctiali, magna.*

bicornis. 11. M. thorace laevi, capite bipartito ſubulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 116.*
Habitat in America *auſtrali et* India, *pedibus inermibus.*

tricolor. 12. M. thorace lateribus expanſo-lobato, capite cornuto, pedibus anterioribus latiſſimis. *Muſ. Lud. Ulr.* 117.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 347. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 14.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 51. *f.* 4.
Habitat in India, *oculis in cornicula auriformia acuta deſinentibus.*

cancellata. 37. M. thorace utrinque dilatato membranaceo plano. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 347. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 15.
Habitat in America *auſtrali et* India.

ſtrumaria. 13. M. thorace utrinque membranaceo dilatato obcordato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 347. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 13.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 3.
Merian. ſurin. t. 27.
Seb. muſ. 4. *t.* 69. *f.* 7. 8.
Habitat in America *auſtrali et* India.

14. M.

necydaloides. 14. M. thorace ſcabro, elytris ovatis angulatis breviſſimis, alis oblongis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 397. *n.* 3. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 345. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 3.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 19.
Degeer inſ. 3. *t.* 36. *f.* 2.
Habitat in Aſia; *mas anguſtior, femina craſſior, thorace laevi.*

atrophica. 38. M. thorace quadriſpinoſo, elytris breviſſimis baſi ariſtato-mucronatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 345. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 4.
Pall. ſpicil. zool. 9. *t.* 1. *f.* 7.
Habitat in inſula Java, *capite inermi.*

ſpinoſa. 39. M. capite thoraceque ſpinoſis, elytris breviſſimis acutis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 346. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 5.
Habitat in India.

biſpinoſa. 40. M. thorace teretiuſculo anterius biſpinoſo, elytris breviſſimis: margine flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 346. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 6.
Habitat in America.

jamaicenſis. 41. M. linearis viridis, elytris breviſſimis: margine exteriori flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 346. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 7.
Drury inſ. 2. *t.* 49. *f.* 1.
Habitat in Jamaica.

lateralis. 42. M. linearis nigra, elytris breviſſimis gibbis: lateribus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 346. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 8.
Habitat in Braſilia.

linearis. 43. M. linearis fuſca, elytris breviſſimis baſi ſubſpinoſis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 9.
Habitat in India, *antennis filiformibus.*

labiata. 44. M. linearis vireſcens inermis, capitis lateribus viridibus. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 61.
Habitat in India.

45. M.

An huc omnes ſpecies a Seba *in theſauri vol.* IV. *delineatae? tridens t.* 68. *f.* 7. 8. *clavata (an varietas gongylodis?) t.* 68. *f.* 11. 12. *parvula t.* 68. *f.* 13. 16. *tricornis t.* 69. *f.* 1. 2. *cubitata t.* 69. *f.* 3. 4. *octoſetoſa t.* 69. *f.* 5. 6. *aeruginoſa t.* 70. *f.* 7. 8. *rubro-maculata t.* 70. *f.* 9. 10. *plumbea t.* 70. *f.* 13. 14. *nigro-venulata t.* 73. *f.* 6. *paradoxa t.* 73. *f.* 9. 10. *nigro-punctata t.* 75. *f.* 3. 4. *biſubulata t.* 75. *f.* 11. *falcataria t.* 76. *f.* 1-4. *dentata t.* 76. *f.* 5. 6. *pater noſter t.* 76. *f.* 7-12. *ſpuria t.* 76. *f.* 13. 14. *teſſulata t.* 78. *f.* 1-4. *foliata t.* 80. *f.* 13. 14. *Species hujus generis inſecta alia venantur; larva puppaque hexapode agili, illa penitus aptera.*

maculata. 45. M. cinerea, thorace alato ſpinuloſo, pedibus intus nigro-maculatis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 61.
Habitat in Japonia, *bipollicaris.*

capenſis. 46. M. cinerea, thorace inermi, capite conico integro.
Thunb. nov. inſ. ſp. 3. *p.* 62. Mantis naſuta.
Habitat ad caput bonae ſpei *et in* India, *ſeſquipollicaris.*

parva. 47. M. livida laevis, elytris aliſque hyalinis; abdominis ſegmentis nigro-marginatis.
Drury inſ. 2. *p.* 75. *t.* 39. *f.* 5.
Habitat in America, *fere ſeſquipollicaris.*

cingulata. 48. M. thorace ſubfuſco, elytris viridibus atro-reticulatis: maculis quatuor nigricantibus, alis nigricantibus nigro-lineatis: margine ex fuſco flaveſcente.
Drury inſ. 2. *p.* 89. *t.* 49. *f.* 2.
Habitat in Jamaica, *abdomine nigro-cingulato, apice biſpinoſo.*

gigantea. 49. M. fuſceſcens, collo, thorace femoribusque ſerratis.
Drury inſ. 2. *p.* 89. *t.* 50.
Habitat in Italia *ſuperiori*, 8 *fere pollices longa.*

anguſta. 50. M. vireſcens, cauda bifurca, antennis longitudine corporis filiformibus. *Drury inſ.* 1. *p.* 130. *t.* 50. *f.* 3.
Habitat in inſula Antigua.

ſibirica. 51. M. corpore flavo fuſcoque vario, alis hyalinis: nervulis rufeſcentibus. *Lepech. it.* 1. *p.* 271. *t.* 17. *f.* 8.
Habitat in Sibiriae *helianthemo et umbellatis; an puſillae varietas?*

brachyptera. 52. M. cinerea, thorace dentato, alis abdomine dimidio brevioribus. *Pall. it.* 2. *app. n.* 81.
Habitat in deſertis aridiſſimis, etiam ſalſis, ad Irtin *ſitis, rarior in* Uralenſibus, *oratoria major.*

pennicornis. 53. M. verticis ſpina conica, antennis pennatis linearibus, femoribus poſterioribus lobo terminatis. *Pall. it.* 2. *app. n.* 81.
Habitat rarior in deſertis, mari caſpio *finitimis, auſtralibus, forma et colore gongylodis.*

221. GRYLLUS. *Caput* inflexum, maxillosum, palpis filiformibus instructum.
Antennae setaceae vel filiformes.
Alae quatuor, deflexae, convolutae: inferiores plicatae.
Pedes posteriores saltatorii. *Ungues* ubique bini.

* *antennis ensiformibus, capite conico thorace longiori,* Acridae sive Truxalides Fabricii.

nasutus. 1. Gr. corpore viridi. *Mus. Lud. Ulr.* 118.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 352. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 1.
Mouff. inf. 119. Mantis africana.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 4.
Sulz. inf. t. 8. *f.* 57.
hist. inf. t. 8. *f.* 5.
Drury inf. 2. *t.* 40. *f.* 1.
Seb. mus. 4. *t.* 96. *f.* 41.

turritus. β) Gryllus capite conico, antennis ensiformibus, alis hyalinis. *Syst. nat.* X. *p.* 427.
Seb. mus. 4. *t.* 80. *f.* 1. 2.
t. 96. *f.* 46.
Habitat in omni Africa, *in* Sicilia, Calabria, *ad mare* Caspium, *ore ad basin, antennis ad apicem capitis positis, thorace non longioribus.*

conicus. 62. Gr. corpore fusco, elytrorum costa dimidiata viridi, linea punctorum alborum. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 352. *n.* 2. *mant.* 1. *p.* 231. *n.* 2.
Habitat in nova Hollandia, *nasuto nimis affinis.*

vittatus. 63. Gr. testaceus, capite prominulo thorace femoribusque vitta laterali argentea. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 3.
Habitat in Sina, *nasuti magnitudine.*

brevicornis. 2. Gr. viridis, capite prominulo, antennis compressis longitudine thoracis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 398. *n.* 37.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 352. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 4.
Degeer inf. 3. *p.* 499. *n.* 16. *t.* 41. *f.* 7. Acrydium ensicorne.
Habitat in America *meridionali.*

64. Gr.

gigan-teus. 64. Gr. viridis, vittis duabus rubescentibus, antennis ferrugineis, thorace lineis tribus elevatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 8. *p.* 191. *n.* 1. *t.* 52. *f.* 6.
Habitat in America, *nasuto major.*

ungari-cus. 65. Gr. obscure viridis, pedibus spadiceis, thorace lineis tribus elevatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 8. *p.* 192. *n.* 2. *t.* 52. *f.* 7.
Habitat in Ungaria.

oxyce-phalus. 66. Gr. capitis apice spatulato, elytris abdomine longioribus: striga longitudinali fusca, alis flavescentibus margine hyalinis. *Pall. it.* 1. *app. n.* 54.
Habitat in desertis Russiae *australibus, inter glycyrrhizam vagans, Augusto vulgaris, nasuto perquam similis.*

foliaceus. 67. Gr. alis flavescentibus, antennis foliaceis.
Seb. mus. 4. *t.* 74. *f.* 9. 10.
Habitat in Asia.

** *Thorace carinato, antennis filiformibus longiore, palpis aequalibus:* Bullae s. Acrydia Fabricii.

unicolor. 3. Gr. unicolor, thorace brevissimo, antennis scutello brevioribus. *Mus. Lud. Ulr.* 119.*
Habitat in America *australi et* India *flavus aut ruber, varioloso similis, sed thorace non cristato, an hujus tribus?*

afer. 68. Gr. thoracis scutello plano acuminato abdominis longitudine. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 230. *n.* 1.
Habitat in Sierra Leon, *niger, bipunctati magnitudine.*

carinatus. 6. Gr. thorace cymbiformi laevi, vertice depresso. *Mus. Lud. Ulr.* 122.*
Habitat in America *australi et* India; *an hujus tribus?*

bipuncta-tus. 7. Gr. fuscescens, thoracis scutello longitudine abdominis. *Fn. suec.* 864.* *Scop. ent. carn.* 316. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 351. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 230. *n.* 2.

Fn.

An species a Seba *musei vol.* IV. *delineatae, tapetum persicum t.* 74. *f.* 1. *viridimaculatus t.* 74. *f.* 3. *pallidissime virens t.* 74. *f.* 4. *griseo-rubicundus t.* 74. *f.* 5. *nigro-fuscus t.* 74. *f.* 6. *nigricans t.* 79. *f.* 5. 6. *albo-maculatus t.* 80. *f.* 3. 4. *coffeus t.* 83. *f.* 6. *testaceus t.* 83. *f.* 7. *obscure flavus t.* 83. *f.* 8. *rufescens t.* 83. *f.* 10. *cinereus t.* 83. *f.* 11. *nigro-maculatus t.* 84 *f.* 7. *purpurascens t.* 84. *f.* 8. *nigro-striatus t.* 84. *f.* 9. *versicolor t.* 84. *f.* 10. *ad hanc tribum referendae?*

Fn. ſuec. 1. *n.* 623. Gryllus elytris nullis, thorace in elytron longitudinale extenſo: macula utrinque nigra rhombea.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 394. *n.* 5. Acrydium elytris nullis, thorace producto, abdomine aequali.
Degeer inſ. 1. *p.* 483. *n.* 11. *t.* 23. *f.* 15. Acrydium ſcutellatum.
Raj. inſ. 60. Locuſta minor fuſceſcens, cucullo longo rhomboideo.
Sulz. hiſt. inſ. t. 8. *f.* 6.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 52. *f.* 1.

ſtriatus. β) Gryllus linea albida a fronte per medium ſcutellum percurrente. *Lepech. it.* 2. *p.* 211. *t.* 10. *f.* 17.
Habitat in Europae *collibus arenoſis apricis.*

ſubulatus. 8. Gr. thoracis ſcutello abdomine longiore. *Fn. ſuec.* 865.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 351. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 230. *n.* 3.
Degeer inſ. 3. *p.* 484. *n.* 12. *t.* 23. *f.* 17.
Fn. ſuec. 624. Gryllus elytris nullis, thorace producto abdomine longiore.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 395. *n.* 6. Acrydium elytris nullis, thorace producto abdomine longiore.
Sulz. hiſt. inſ. t. 8. *f.* 7.
Schaeff. ic. t. 154. *f.* 9. 10. *t.* 161. *f.* 2. 3.
Habitat in Europa *ad foſſas et aquas ſtagnantes, bipunctato valde affinis, nunc griſeus, nunc fuſcus.*

opacus. 69. Gr. ſpadiceus aut niger, thorace carinato ad latera ſinuato abdominis longitudine. *Herbſt aud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 190. *n.* 3. *t.* 52. *f.* 2.
Habitat Berolini *in foſſis ſabuloſis, ſtatura bipunctati, at minor.*

bifaſciatus. 70. Gr. fuſcus albo-maculatus: faſciis duabus lateralibus ochroleucis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 190. *n.* 4. *t.* 52. *f.* 3.
Habitat Berolini *in arenoſis, ſtatura et magnitudine opaci.*

bimaculatus. 71. Gr. thorace fuſco: utrinque lunula ochroleuca. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 190. *n.* 5. *t.* 52. *f.* 4.
Habitat Berolini, *ſtatura et magnitudine ſubulati.*

granulatus. 72. Gr. ex griſeo viridi nigricanteque varius punctis elevatis aſper ad latera complanatus, thorace ſubovali gibbo. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 198. *n.* 6. *t.* 52. *f.* 5.

219. Gr.

leucostictos. 219. Gr. fuſcus, thoracis ſcutellique dorſo elevato pallido, ſcutello utrinque baſi macula alba. *Muſ. Lesk. p.* 46. *n.* 16. b.
Habitat in Europa.

griſeus. 220. Gr. griſeus ſcutello baſi et pone laminam alarum utrinque puncto nigro. *Muſ. Lesk. p.* 47. *n.* 16. c.
Habitat in Europa.

binotatus. 221. Gr. griſeus, ſcutello verſus apicem laminae alarum macula utrinque ferruginea. *Muſ. Lesk. p.* 47. *n.* 16. d.
Habitat in Europa.

*** *antennis ſetaceis, palpis inaequalibus, thorace rotundato cauda, biſeta:* Achetae.

Gryllotalpa. 10. Gr. alis caudatis elytro longioribus, pedibus anterioribus palmatis tomentoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 123.* *Fn. ſuec.* 866. *Scop. ent. carn.* 317. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 387. *n.* 1. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 353. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 231, *n.* 1.
Degeer inſ. 3. *p.* 517. *n.* 2. Gryllus ſupra fuſcus, ſubtus ferrugineo-flavus &c.
Raj. inſ. 64. *Jonſt. inſ. t.* 12. *f. ult.* Gryllotalpa.
Mouff. inſ. 104.
Aldr. inſ. 571.
Welſch hecaſt. 1. *p.* 39.
Goed. inſ. 1. *t.* 76.
Barthol. act. Hafn. 4. *p.* 5. *f.* 1-6.
Blanck. herb. t. 81. *f.* 10.
Imperat. nat. 921. *f.* 2.
Friſch inſ. 11. *t.* 5.
Seb. muſ. 4. *t.* 89. *f.* 3. 4.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 14. 15.
Cateſb. Carol. 1. *t.* 8.
Sulz. inſ. t. 9. *f.* 59.
Schaeff. ic. t. 37. *f.* 1.
Habitat in Europae, *borealis* Americae *et* Aſiae, *ipſius* Javae (*minor tamen*) *cutis, hortorum peſtis, fimo equino allicienda, porcino pellenda.*

monſtroſus. 73. Gr. elytris aliſque caudato-convolutis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 353. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 231. *n.* 2.
Drury inſ. 2. *t.* 43. *f.* 1.
Habitat in India.

minutus. 11. Gr. flavescens, alis caudatis, tibiis posterioribus trispinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 355. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 14. *Degeer inf.* 3. *p.* 524. *n.* 8. *t.* 43. *f.* 8. Gryllus testaceus.

Habitat in America *meridionali, semipollicaris, statura domestici, subtus fuscus.*

domesticus. 12. Gr. alis caudatis elytro longioribus, pedibus simplicibus, corpore glauco. *Fn. suec.* 868. *Scop. ent. carn.* 318. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 353. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 3. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 389. *n.* 2. Gryllus pedibus anticis simplicibus.

Degeer inf. 3. *p.* 509. *n.* 1. *t.* 24. *f.* 1. 2. Gryllus griseo-fuscus pallidus &c.

Raj. inf. 63. *Mouff. inf.* 135. Gryllus domesticus.

Jonst. inf. t. 12.

Hufn. inf. 11. *f.* 4.

Seb. mus. 4. *t.* 65. *f.* 24.

Roes. inf. 2. *gryll. t.* 12.

Hospitatur hodie in Europae *muris domesticis, in* Guinea *sextuplo major, tota nocte, praesertim pluvia ingruente stridens, caloris fornacum amans, sanie et liquore carnium vescens, blattis, ut fertur, non cohabitans, pilulis ex arsenico et dauci recente radice farinae tritici immistis, aut nympheae radicibus lacti incoctis, ut perhibent, necandus, a campestri, si inquilinum se reddiderit, pellendus.*

assimilis. 74. Gr. alis caudatis elytro longioribus, abdomine stilis duobus apice fissis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 344. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 4.

Habitat in insulis Americae *meridionali oppositis.*

reticulatus. 75. Gr. niger, elytris rufo-reticulatis, antennis albo-annulatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 354. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 5.

Habitat ad caput bonae spei, *antennis corpore duplo longioribus.*

76. Gr.

Grylli, *si primum tribum exceperis, quae aliis insectis victitant, plantis vescuntur, achetae potissimum radicibus, tettigoniae et locustae foliis; larva et puppa omnium hexapus, agilis, imagini simillima, illa aptera; sub terra saepe habitans, haec non raro cum imagine vorans; paucis speciebus elytra aut alae nullae, et tum interdum modo feminis; in paucis ocellus elytrorum vitreus stridoris est instrumentum; japonicae oryzam infestant.*

brasilien- sis. 76. Gr. fuscus, alis caudatis elytris longioribus, dorso pallidiore, cauda adscendente longitudine corporis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 354. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 6.
Habitat in Brasilia.

orientalis. 77. Gr. alis caudatis elytris longioribus albis, corpore atro, capite pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 354. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 7.
Habitat Tranquebariae.

capensis. 78. Gr. niger, alis caudatis elytris longioribus, elytris fuscis basi flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 354. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 8.
Habitat ad caput bonae spei.

Morio. 79. Gr. alis caudatis elytris longioribus albis apice nigris, corpore atro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 354. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 9.
Habitat in Africa *aequinoctiali, statura et magnitudine campestris.*

campe- stris. 13. Gr. alis elytro brevioribus, corpore nigro: stylo lineari. *Mus. Lud. Ulr.* 124. *Scop. ent. carn.* 319. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 355. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 10.
Raj. inf. 63. Gryllus campestris Mouffeti.
Frisch inf. 1. *t.* 1.
Seb. mus. 4. *t.* 65. *f.* 23. *et t.* 96. *f.* 24.
Schaeff. elem. t. 66.
icon. t. 157. *f.* 2-4.
Habitat in Europa *magis australi, a primo Maji die ad aequinoctium usque stridens.*

umbracu- latus. 14. Gr. niger, elytris apice albis, umbraculo frontis deflexo.
Habitat in Mauritania, *facie campestris, at capite magis ferrugineo, et membrana obovata ante caput deflexa distinctus.*

convolu- tus. 15. Gr. corpore nigro nebuloso, elytris convolutis albidis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 399. *n.* 38.*
Habitat in Surinamo.

hospes. 80. Gr. alis caudatis elytro longioribus albis: costa fusca, elytris nigris albo maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 355. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 11.
Habitat in America.

Crucis. 81. Gr. fuſcus, alis caudatis elytro longioribus, elytrorum margine flavo nigro-punctato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 12.
Habitat in inſula S. Crucis, *ſtatura campeſtris.*

Allioni. 82. Gr. capite thoraceque flaveſcentibus, elytris aqueis longitudine alae. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 355. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 13.
Habitat in Italia, *parvus.*

gryllodes. 83. Gr. griſeus, thorace depreſſo, abdomine fuſceſcente elytris paulo breviore, alis elytris longioribus reticulatis griſeo-hyalinis. *Pall. ſpic. zool.* 9. *p.* 16. *t.* 1. *f.* 10.
Habitat in Jamaica, *habitu ferme domeſtici, ſed gracilior et longior; an huc ſpectat?*

binotatus. 84. Gr. niger, elytrorum baſi maculis binis flavis, antennis corpore brevioribus. *Degeer inſ.* 3. *p.* 338. *n.* 4. *t.* 43. *f.* 4. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *t.* 53. *f.* 1. Acheta bimaculatus
Habitat in Europa.

pellucens. 85. Gr. albidus, thorace trapeziformi. *Scop. ent. carn.* 324. *delic. inſubr.* 1. *p.* 65. *t.* 24 *f.* E.
Habitat in Carnioliae *et* Italiae *vineis et hortis ſemipollicaris, aeſtate tota fere nocte ſtridens, habitu domeſtici, at duplo major, capite lucido, thoracis maculis tribus fuſcis, elytris flaveſcentibus diſtinctus.*

Gigas. 86. Gr. badius.
Sulz. hiſt. inſ. p. 83. *t.* 8. *f.* 8.
Habitat in America, *domeſtico dimidio major.*

teſſellatus. 87. Gr. ex fuſco teſtaceus, alis albo nigroque teſſellatis.
Drury inſ. 2. *p.* 80. *t.* 42. *f.* 3.
Habitat in inſula S. Johannae.

membranaceus. 88. Gr. pallide teſtaceus, thorace collari flaveſcente, alis ochraceis caudatis. *Drury inſ.* 2. *p.* 81. *t.* 43. *f.* 2.
Habitat - - -

deſertus. 89. Gr. alis caudatis elytro longioribus, corpore nigro. *Pall. it.* 1. *app. n.* 53.
Habitat terreſtris in deſertis auſtralibus Uralenſibus, *domeſtico affinis.*

90. Gr.

surinamensis. 90. Gr. griseo-fuscus, thorace plano, elytris macula oblonga nigra, pedibus posterioribus corpore duplo longioribus. *Degeer ins.* 3. *p.* 519. *n.* 1. *t.* 43. *f.* 1.
Habitat in Surinamo.

muticus. 91. Gr. capite elytrisque badiis, pedibus testaceis, cauda feminae mutica. *Degeer ins.* 3. *p.* 520. *n.* 2. *t.* 43. *f.* 2.
Habitat in Surinamo.

ater. 92. Gr. ex nigro fuscus, cauda feminae mutica. *Degeer ins.* 3. *p.* 520. *n.* 3. *t.* 43. *f.* 3.
Habitat in Surinamo.

fasciatus. 93. Gr. fuscus, thorace elytrisque lineis longitudinalibus fulvis. *Degeer ins.* 3. *p.* 522. *n.* 5. *t.* 43. *f.* 5.
Habitat in Pensylvania.

niveus. 94. Gr. albidus, elytris alisque niveis, thorace elongato, antennis femoribusque posterioribus longissimis. *Degeer ins.* 3. *p.* 522. *n.* 6. *t.* 43. *f.* 6.
Habitat in Pensylvania.

punctulatus. 95. Gr. ex griseo fuscus, elytris hyalinis: puncto fusco, alis carneis antennisque longissimis, thorace elongato. *Degeer ins.* 3. *p.* 523. *n.* 7. *t.* 43. *f.* 7.
Habitat in Pensylvania.

**** *antennis setaceis, palpis inaequalibus, cauda feminis ensifera*, Tettigoniae, Fabricio Locustae.

citrifolius. 16. Gr. thorace tetragono angulis scabro. *Mus. Lud. Ulr.* 125. *Gron. zooph.* 657.*
Fabr. sp. ins. 1. *p.* 356. *n.* 1. *mant. ins.* 1. *p.* 232. *n.* 1. Locusta thorace tetragono, angulis crenatis.
Degeer ins. 3. *p.* 437. *n.* 7. *t.* 37. *f.* 3. Locusta viridis.
Roes. ins. 2. *gryll. t.* 16. *f.* 1.
Habitat in America *australi et* India.

laurifolius. 17. Gr. thorace subtetragono laevi trilobo, alis lanceolatis elytro obtusiore longioribus. *Mus. Lud. Ulr.* 126.* *Fabr. sp. ins.* 4. *p.* 356. *n.* 2. *mant. ins.* 1. *p.* 232. *n.* 2.
Degeer ins. 3 *p.* 445. *n.* 6. *t.* 38. *f.* 2. Locusta oblongifolia.
Sloan. jam. 2. *p.* 101. *t.* 236. *f.* 1. Locusta maxima viridis, alis latissimis.
Maregr. bras. 246. Tucurubi.
Habitat in America, nova Hollandia.

myrtifolius. 18. Gr. thorace subtetragono laevi, alis deflexis elytro longioribus, tibiis muticis.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 356. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 3. Locusta thorace subtetragono laevi, alis deflexis elytro longioribus, ense brevissimo recurvo.
Degeer inf. 3. *p.* 447. *n.* 8. *t.* 38. *f.* 4. Locusta viridis, pedibus testaceis, thorace tetragono plano, elytris ovatis ala acuminata brevioribus.
Drury inf. 2. *t.* 41. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali*, *laurifolio quadruplo minor.*

camillifolius. 96. Gr. thorace deflexo, elytris concavis apice rotundatis ala longioribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 356. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 4.
Degeer inf. 3. *p.* 438. *n.* 2. *t.* 37. *f.* 5. Locusta siccifolia.
Habitat in America.

thymifolius. 97. Gr. thorace tetragono laevi, elytris sublinearibus fuscopunctatis, alis brevioribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 357. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 5.
Habitat in nova Hollandia, *nunc viridis*, *nunc ferrugineus.*

graminifolius. 98. Gr. thorace tetragono, elytris filiformibus fuscis ala brevioribus, capite acuminato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 357. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 6.
Habitat ad caput bonae spei.

specularis. 99. Gr. thorace deflexo, elytris concavis viridibus: basi ocello dorsali vitreo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 357. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 7.
Habitat in America.

australis. 100. Gr. virescens, thorace rotundato, elytris alis aequalibus, pedibus anterioribus spinosissimis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 8.
Habitat in insula Amsterdam, *spinipedi affinis*, *at major.*

spinipes. 101. Gr. thorace rotundato, elytris viridi-hyalinis ala brevioribus, pedibus anterioribus spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 357. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 9.
Habitat in Brasilia.

maxillosus. 102. Gr. viridis, antennis maxillisque flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 357. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 10.
Habitat in insulis Americae *oppositis.*

19. Gr.

conocephalus. 19. Gr. thorace rotundato laevi, elytris oblongis ala brevioribus, tibiis muticis, capite conico obtuso. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 358. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 18.
Habitat in Africa, *viridis, magnitudine domestici.* Brünniche.

elongatus. 20. Gr. thorace subquadrato laevi, elytris alisque griseis corpore longioribus. *Mus. Lud. Ulr.* 127.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 357. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 11.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 18. *f.* 7.
Habitat in India.

femoratus. 103. Gr. thorace scabro griseo, alis lanceolatis elytro obtusiore longioribus, femoribus subtus membranaceis dentatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 12.
Habitat Tranquebariae, *statura et magnitudine elongati.*

lamellosus. 21. Gr. thorace subquadrato, foliolis ovatis ante femora posteriora. *Mus. Lud. Ulr.* 128.*
Habitat in America *australi et* India, *magnus.*

ocellatus. 22. Gr. thorace rotundato, alis ocello notatis. *Mus. Lud. Ulr.* 129.* *Gron. zooph.* 649.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 357. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 14.
Seb. mus. 4. *t.* 73. *f.* 7. 8.
Habitat in America *australi et* India.

lanceolatus. 104. Gr. thorace rotundato laevi, elytris oblongis alae aequalibus, fronte porrecta lanceolata subtus unidentata. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 357. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 15.
Habitat in Sierra Leon Africae.

pallens. 105. Gr. albidus, thorace laevi, alis lanceolatis elytris longioribus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 16.
Habitat in Cayenna, *parvus, tener.*

acuminatus. 23. Gr. thorace rotundato, vertice subulato, alis virescentibus longitudine corporis. *Mus. Lud. Ulr.* 130.* *Gron. zooph.* 650.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 358. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 17.
Degeer inf. 3. *p.* 443. *n.* 4. *t.* 37. *f.* 8. Locusta acuminata.
Sloan. jam. 2. *p.* 202. *t.* 236. *f.* 3.
Sulz. hist. inf. t. 9. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali.*

triops. 24. Gr. thorace rotundato, vertice acuminato, subtus puncto ocellari nigro, alis viridibus. *Mus. Lud. Ulr.* 131.*

Fabr. sp. inf. 1. *p.* 358. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 19. Locusta vertice acuminato subtus puncto ocellari nigro, elytris alae aequalibus.

Habitat in America *australi et* India, *abdomine brevi, ensem non superante.*

rugosus. 25. Gr. thorace rotundato rugoso cristato, capite acuminato, femoribus posterioribus subtus repandis. *Mus. Lud. Ulr.* 132.*

Habitat in America *australi et* India, *crista compressa crenata versus apicem thoracis.*

coronatus. 26. Gr. thorace spinis erectis coronato, elytris varioloso-concavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 358. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 20.

Degeer inf. 3. *p.* 448. *n.* 9. *t.* 38. *f.* 5. Locusta coronata.

Habitat in America *australi et* India, *antennis corpore triplo longioribus, ense lanceolato longo.*

aquilinus. 27. Gr. thorace rotundato subverrucoso, alis latissimis: nervis quindecim. *Mus. Lud. Ulr.* 133.*

Habitat in America *australi et* India, *magnus, elytris lanceolatis, tibiis quadrifariam spinosis.*

melanopterus. 28. Gr. thorace rotundato laevi, elytris abdomine dimidio brevioribus, alis nigris. *Mus. Lud. Ulr.* 134.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 358. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 21.

Habitat in America *australi et* India, *elytris ovatis.*

fastigiatus. 29. Gr. thorace rotundato laevi, elytris ovatis, alis truncatis, spinis tibiarum filiformibus. *Mus. Lud. Ulr.* 135.*

Habitat in America *australi et* India.

coriaceus. 30. Gr. thorace rotundato laevi, elytris coriaceis, alis pallidis, antennis longissimis. *Mus. Lud. Ulr.* 136.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 358. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 22.

Habitat in America *australi et* India, *magnus, colore flavo corii, femoribus teretibus.*

albifrons. 106. Gr. thorace posterius rotundato laevi, elytris cinereo nigroque variis, capite pallido, ense apice serrato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 359. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 23.

Habitat in insula Madera.

107. Gr.

falx. 107. Gr. fuscus, thorace laevi posterius rotundato, capite pallido, ense falcato atro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 359. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 24.
Habitat in insula Madera.

griseus. 108. Gr. fuscus, thorace posterius carinato rotundato, ense falcato atro basi utrinque pallido. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 359. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 25.
Habitat in Italia, *antennis flavescentibus longitudine corporis, pedibus virescentibus, elytris fusco cinereoque variis.*

viridissimus. 31. Gr. thorace rotundato, alis viridibus immaculatis, antennis longissimis. *Fn. suec.* 869.* *Scop. ent. carn.* 320. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 359. *n.* 23. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 26.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 397. *n.* 2. *t.* 8. *f.* 3. Locusta cauda ensifera recta.
Degeer inf. 3. *p.* 428. Locusta viridis cantatrix.
List. goed. 301. *t.* 121. Agrigoneus.
Goed. inf. 2. *p.* 165. *t.* 40.
Zinann. obs. t. 7. *f.* 7.
Robert. ic. t. 27.
Frisch inf. 12. *t.* 2. *f.* 1. 2.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 10. 11.
Schaeff. elem. t. 79.
icon. t. 139. *f.* 3-5.
Habitat in Europae *arboribus, graminosis, agris hordeaceis, sub canicula noctu stridulus, totus viridis.*

cinerarius. 32. Gr. antennis longissimis, elytris deflexis verticalibus. *Amoen. acad.* 6. *p.* 397. *n.* 31.*
Habitat in Brasilia.

verrucivorus. 34. Gr. thorace subquadrato laevi, alis viridibus fusco-maculatis, antennis setaceis longitudine corporis. *Fn. suec.* 870.* *Scop. ent. carn.* 321.
It. wgoth. 253. Gryllus cauda ensifera recta, corpore subviridi.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 359. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 27. Locusta alis viridibus fusco maculatis, antennis longitudine corporis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 398. *n.* 1. Locusta cauda ensifera curva.
Degeer inf. 3. *p.* 430. *n.* 2. *t.* 21. *f.* 1. 2. Locusta verrucivora.
Raj. inf. 61. Locusta viridis major.
Frisch inf. 12. *t.* 2. *f.* 1. 2. Locusta major viridis.
Mouff. inf. 117. *f.* 5.

Rob. ic. t. 27.
Jonst. inf. t. 11. *f.* 1-3.
Merian. inf. t. 176.
Roef. inf. 2. *gryll. t.* 8.
Sulz. inf. t. 9. *f.* 61.
Schaeff. ic. t. 62. *f.* 5.
Habitat in Europa, *e murino fuscescens, a rusticis Suecis manuum verrucis admotus, quas praemordet, et liquorem in vulnus evomendo, ut contabescat, efficit.*

varius. 109. Gr thorace viridi flavo lineato, fronte acuminata, antennis longissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 360. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 28.
Degeer inf. 3. *p.* 433. *n.* 3. Locusta thalassina.
Goed. inf. 2. *p.* 142. *t.* 40.
Frisch inf. 12. *t.* 2. *f.* 4.
Sulz. hist. inf. t. 8. *f.* 9.
Habitat in Lipsiae *hortis, viridissimo affinis, at quadruplo minor.*

brachypterus. 110. Gr. griseo-fuscus, elytris alisque corpore dimidio brevioribus. *Fn. suec.* 868. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 360. *n.* 26. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 29.
Degeer inf. 3. *p.* 434. *n.* 4. *t.* 22. *f.* 2. 3. Locusta brachyptera.
Habitat in Europae *borealis graminosis, ense elongato recurvo.*

Papus. 34. Gr. apterus, thorace spinoso, femoribus punctatis. *Amoen. acad.* 1. *p.* 322. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 360. *n.* 27. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 30.
Degeer inf. 3. *p.* 453. *n.* 13. *t.* 39. *f.* 5. Locusta Papa spinosa.
Pet. gazoph. t. 13. *f.* 7. Locusta talpa capensis pedibus longis.
Kundm. promtuar. 118. *n.* A. 184.
Roef. inf. 2. *gryll. t.* 6. *f.* 3.
Habitat in Aethiopia, *scutello magno rotundato spinis ciliato, femoribus posterioribus subtus quadridentatis.*

spinulosus. 59. Gr. thorace spinis muricato cinctoque, corpore aptero. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 361. *n.* 28. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 31.
Edw. glean. 2. *p.* 161. *t.* 285. *f.* 3-5.
Habitat in America *australi et* India, *ense recurvo, abdomine nigro: maculis testaceis.*

111. Gr.

Onos. 111. Gr. thorace laevi nigro: lateribus griseis, corpore aptero. *Pall. spic. zool.* 9. *p.* 18. *t.* 2. *f.* 1. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 361. *n.* 29. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 32.
Petiv. gazoph. t. 39. *f.* 9? Locusta echinata impennis e Chusan.
Habitat in Sibiria, *ense longitudine abdominis.*

ephippiger. 112. Gr. thorace posterius elevato, elytris brevissimis fornicatis. *Fiubig Schr. der naturf. berl. Ges.* 5. *t.* 3. *f.* 6-8. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 235. *n.* 33.
Habitat in Europae *magis australis pratis*, *magnus.*

dubius. 113. Gr. thorace laevi posterius rotundato, elytris brevissimis apice capiteque albidis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 235. *n.* 34.
Habitat in Italia, *statura ephippigeri.*

Laxmanni. 114. Gr. thorace posterius marginato dentato, ense recurvo apice deflexo, femina aptera. *Pall. it.* 1. *app. n.* 52. *spic. zool.* 9. *p.* 20. *t.* 2. *f.* 2. 3. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 361. *n.* 30. *mant. inf.* 1. *p.* 235. *n.* 35.
Habitat in Sibiria.

glaber. 115. Gr. fuscus, thorace subdepresso laevissimo, elytris medio viridibus fusco maculatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 8. *p.* 193. *n.* 6.
Schaeff. ic. t. 62. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania *verrucivoro affinis.*

indicus. 116. Gr. viridis, fronte obtuse conica, thorace anterius et posterius elevato, medio excavato, abdomine alisque fuscis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 8. *p.* 193. *n.* 7. *t.* 53. *f.* 2.
Habitat in India, *ephippigero affinis.*

leucostictos. 117. Gr. fusco-testaceus, elytris margine maculisque flavis, femoribus in junctura puncto albissimo notatis.
Roesel inf. 2. *gryll. p.* 128. *t.* 20. *f.* 8-10.
Habitat in Germania, *femina virescens.*

palpatus. 118. Gr. apterus fusco testaceus, palpis anterioribus pedibusque posterioribus longissimis.
Sulz. hist. inf. p. 83. *t.* 9. *f.* 2.
Habitat in Sicilia.

cantans. 119. Gr. thorace rotundato maculato', elytris rotundatis: macula bascos rotunda hyalina antennis longissimis. *Fuessli inf. helv. p.* 23. *n.* 439. *f.* 5. a. 5. b.

Müll.

Müll. zool. dan. prodr. p. 101. *n.* 1144? Locusta viridis.
Habitat in Europa, *viridissimo affinis, at paulo minor, elytris brevioribus.*

falcatus. 120. Gr. elytris viridibus ala brevioribus, antennis longissimis ense inflexo ferrugineo quadruplici. *Scop. ent. carn. p.* 108. *n.* 322.
Fuessli inf. helv. p. 23. *n.* 440.
Lepechin it. 1. *p.* 79. d.
Poda mus. graec. p. 52.
Schaeff. ic. t. 138. *f.* 1-3.
Habitat in Germania, Helvetia, Sibiria.

Pedo. 121. Gr. gracilis mollis, pedibus posterioribus longioribus gracillimis. *Pall. it.* 1. *app. n.* 51.
Habitat in Sibiria.

flavescens. 122. Gr. flavescens, elytris rubescentibus atro reticulatis, ense ex flavo atro.
Schaeff. ic. t. 91. *f.* 6.
Habitat in Germania, *statura verrucivori, oculis caeruleis, ense adscendente.*

bipustulatus. 123. Gr. fuscus, ense thoracisque punctis binis atris, elytris subflavescentibus atro tessulatis ala brevioribus.
Schaeff. ic. t. 138. *f.* 4. 5.
Habitat in Germania.

marginatus. 124. Gr. viridis variegatus, thoracis margine flavo.
Schaeff. ic. t. 236. *f.* 1-4.
Habitat in Germania, *statura verrucivori.*

rubicundus. 125. Gr. capite femoribusque rubicundis atro-squamatis.
Schaeff. ic. t. 242. *f.* 5. 6.
β) Schaeff. ic. t. 249. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania, *statura verrucivori.*

rufipes. 126. Gr. viridis, ense femorumque nodulis fuscis, pedibus rubris.
Schaeff. ic. t. 255. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

luteus. 127. Gr. luteus, alis intime virideſcentibus, ense aterrimo.
Schaeff. ic. t. 258. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

128. Gr.

cinereus. 128. Gr. griseus, capite thoraceque fasciis duabus nigris, femina aptera.
Degeer inf. 3. *p.* 436. *n.* 5. Locusta griseo-aptera.
Habitat in Suecia, *brachyptero major, antennis longissimis.*

cornutus. 129. Gr. viridis, thorace rotundato, capitis vertice cornuto rugoso, femoribus spinosissimis, antennis testaceis elytro brevioribus. *Degeer inf.* 3. *p.* 441. *n.* 3. *t.* 37. *f.* 7.
Habitat in Surinamo, 3 *lineas ultra* 2 *pollices longus.*

tuberculatus. 130. Gr. thorace planiusculo, vertice tuberculato laevi, elytris elongatis angustis, antennis testaceis longitudine elytrorum. *Degeer inf.* 3 *p.* 444. *n.* 5. *t.* 38. *f.* 1.
Habitat in Surinamo, *viridis, acuminato minor.*

curvicaudus. 131. Gr. totus viridis, thorace tetragono plano, elytris elongatis ala brevioribus, pedibus posterioribus longissimis. *Degeer inf.* 3. *p.* 446. *n.* 7. *t.* 38. *f.* 3.
Habitat in Pensylvaniae *pratis, laurifolio paulo minor.*

vulturinus. 132. Gr. thorace angulato laevi, femoribus anterioribus muticis, fronte macula abdomineque subtus fascia nigris, antennis corpore triplo longioribus. *Degeer inf.* 3. *p.* 451. *n.* 11. *t.* 39. *f.* 2.
Habitat in Surinamo, *vix* 2 *pollices longus.*

falconarius. 133. Gr. thorace rotundato, femoribus teretibus longis: intermediis muticis, elytris lanceolatis, antennis longissimis. *Degeer inf.* 3. *p.* 452. *n.* 12. *t.* 39. *f.* 4.
Habitat in Surinamo, *ultra* 2 *pollices longus.*

capitatus. 134. Gr. capite magno, thorace plano laevi: fasciis binis longitudinalibus nigris, elytris longitudine abdominis. *Degeer inf.* 3. *p.* 455. *n.* 14. *t.* 40. *f.* 1.
Habitat - - - - *sesquipollicaris.*

spinifrons. 135. Gr. thorace planiusculo laevi, vertice spinoso, fronte nigra, corpore rufo fusco, elytris viridi-purpureis pallidis. *Degeer inf.* 3. *p.* 456. *n.* 15. *t.* 40. *f.* 2.
Habitat in Surinamo, *pollicem longus.*

agilis. 136. Gr. griseo-viridis, abdomine fusco, thorace planiusculo, pedibus posterioribus antennisque longissimis, alis elytro longioribus. *Degeer inf.* 3. *p.* 457. *n.* 16. *t.* 40. *f.* 3.
Habitat in Pensylvania, *vix pollicem longus.*

137. Gr.

fasciatus. 137. Gr. viridis, abdomine fasciis sulphureis fuscisque, thorace planiusculo, alis elytro longioribus, pedibus posterioribus longissimis. *Degeer ins.* 3. *p.* 458. *n.* 17. *t.* 40. *f.* 4.
Habitat in Pensylvania, 9 *modo lineas longus.* *)

teres. 138. Gr. ex flavo lividus, oculis maximis, alis elytro longioribus, pedibus anterioribus spinosissimis. *Degeer ins.* 3. *p.* 458. *n.* 18. *t.* 40. *f.* 5.
Habitat in Surinamo, 7 *modo lineas longus.*

muticus. 222. Gr. thorace oblongo-quadrato marginato, femoribus tibiisque bifariam spinosis, ense laevi adscendente longitudine fere abdominis. *Mus. Lesk. p.* 47. *n.* 22.
Habitat extra Europam.

macropterus. 223. Gr. thorace rotundato alis albidis fusco lineatis elytra pallide immaculata superantibus, abdomine filis quatuor terminato, femoribus posterioribus subtus tibiisque quatuor anterioribus bifariam spinosis. *Mus. Lesk. p.* 47. *n.* 13. C.
Habitat extra Europam.

nigromaculatus. 224. Gr. thorace rotundato laevi, capite elytrisque pallidis, antennis longissimis, alis caeruleo-virescentibus: macularum nigrarum undulatarum ordinibus septem transversis. *Mus. Lesk. p.* 47. *n.* 24.
Habitat extra Europam, *pedibus pallidis, tibiis anterioribus longis spinis armatis.*

testaceus. 225. Gr. testaceus, abdomine elytris longiore subtus et thoracis margine externo flavo, ense adscendente quadrivalvi. *Mus. Lesk. p.* 47. *n.* 28.
Habitat in Europa.

fulvicornis. 226. Gr. fusco cinereoque varius, antennis flavescentibus longitudine corporis, thorace plano posterius subcarinato, elytris fusco-griseis: punctorum pallidorum ordine obsoleto, ense adscendente. *Mus. Lesk. p.* 48. *n.* 33.
Habitat in Europa.

227. Gr.

*) *An propriae species huc referendae a* Seba *mus. vol.* 4. *delineatae? flavus t.* 70. *f.* 11. 12. *tessulatus t.* 71. *f.* 7. 8. *nigro-notatus t.* 72. *f.* 1. 2. *chloropterus t.* 75. *f.* 5. 6. *duplicatus t.* 75. *f.* 7-10. *subulatus t.* 78. *f.* 6. *bifurcatus t.* 79. *f.* 13-16. *albo-punctatus t.* 80. *f.* 7. 8. *capite et cauda subulatis t.* 83. *f.* 9. *ensiferi consueti t.* 96. *f.* 39. 40.

longicornis. 227. Gr. thorace rotundato supra testaceo, capite viridi: fronte acuminata testacea antennis longissimis, elytris testaceis abdomine dimidio brevioribus, ense adscendente testaceo basi viridi. *Mus. Lesk. p.* 48. *n.* 34.
Habitat in Europa.

***** *antennis filiformibus, palpis simplicibus, cauda simplici*, Locustae, Grylli Fabricii.

reticulatus. 4. Gr. thorace cymbiformi posterius producto acuto, elytris reticulatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 362. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 7.
Habitat in Bengala, *magnitudine fere serrati.*

serripes. 139. Gr. thorace cymbiformi posterius producto, elytris fuscis, femoribus posterioribus serratis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 8.
Habitat in America *australi et* India, *magnitudine fere serrati.*

serratus. 5. Gr. thorace cymbiformi carinato denticulato, capite acuminato, abdomine caeruleo. *Mus. Lud. Ulr.* 121.* *Gron. zooph.* 142.*
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 363. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 9. Gryllus thorace cymbiformi carinato serrato postice producto acuto.
Degeer inf. 3. *p.* 493. *n.* 10. *t.* 41. *f.* 6. Acrydium serratum.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 16. *f.* 2.
Sulz. inf. t. 8. *f.* 58.
Habitat ad caput bonae spei.

turcicus. 140. Gr. cinereus, thorace cymbiformi, elytris basi fasciaque fuscis, alis basi atris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 10.
Habitat in India, *parvus.*

Lunus. 9. Gr. thoracis segmento crista semiorbiculata, elytris nigris: fasciis albis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 397. *n.* 30. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 362. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 6.
Habitat in America *meridionali*, *alis nigris immaculatis.*

Elephas. 35. Gr. thorace carinato integro, corpore aptero. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 361. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 235. *n.* 1.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 6 *f.* 2.
Habitat in Africa, *reliquis hujus tribus major et ponderosior, viridis femoribus muticis, rudimentis alarum duarum.*

36. Gr.

succinctus. 36. Gr. thoracis carina margineque posteriori elytrorumque margine dorsali flavis, gula cornuta. *Amoen. acad.* 6. *p.* 398. *n.* 36. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 362. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 235. *n.* 2.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 8. *t.* 54. *f.* 2.
Habitat in America *australi, et duplo major in* India, *antennis flavis, tibiarum posteriorum spinis luteis apice atris.*

cristatus. 37. Gr. thorace cristato, carina quadrifida, alis apice fuscis. *Mus. Lud. Ulr.* 137.* *Amoen. acad.* 1. *p.* 21. *t.* 17. *f.* 4. *Gron. zooph.* 658. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 362. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 235. *n.* 3.
Hasselq. it. 413. Gryllus arabicus.
Olear. mus. t. 17. *f.* 5. Gryllus ex Aegypto.
Frisch inf. 9. *t.* 1. *f.* 1.
Seb. mus. 4. *t.* 72. *f.* 11. 12.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 5.
Edw. glean. t. 312.
Habitat frequens in Arabia, Aegypto, *Arabibus esculentus.*

Dux. 141. Gr. thorace carinato scabro, elytris viridibus, alis rufis fusco maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 362. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 235. *n.* 4.
Drury inf. 1. *t.* 44.
Habitat in America *meridionali, magnus, virescens, capite flavescente, antennis nigris.*

aegyptiacus. 142. Gr. thorace cristato: carina trifida, alis fascia nigra. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 362. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 235. *n.* 5.
Habitat in Aegypto.

morbillosus. 38. Gr. thorace quadrato rubro verrucoso, elytris fuscis albopunctatis, alis rufis. *Mus. Lud. Ulr.* 141.* *Gron. zooph. p.* 179. *n.* 662. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 364. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 15.
Seb. mus. 4. *t.* 79. *f.* 7. 8.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 18. *f.* 6.
Seligm. av. 1. *t.* 43.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 8. *t.* 54. *f.* 1.
Habitat ad caput bonae spei.

punctatus. 143. Gr. thorace verrucoso, elytris atris flavo punctatis, alis atris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 364. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 16.

Sulz.

Sulz. hist. inf. t. 9. *f.* 3.
Drury inf. 2. *t.* 41. *f.* 4.
Habitat in India.

squamosus. 144. Gr. viridis, thorace subarticulato: articulis utrinque subtricuspidibus, alis rubris nigro punctatis. *Mant. p.* 533.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 364. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 17. Gryllus thorace subtriarticulato, articulis utrinque spinosis, alis rubris nigro punctatis.
Drury inf. 1. *t.* 49. *f.* 1.
Habitat in Africa.

miliaris. 39. Gr. thorace subquadrato dentato verrucoso, elytris punctis callosis albis. *Mus. Lud. Ulr.* 142.*
Degeer inf. 3. *p.* 486. *n.* 1. *t.* 40. *f.* 6. Acrydium verrucosum.
Habitat in America *meridionali*, *morbilloso affinis.*

haematopus. 40. Gr. thorace subcarinato scabro, capite obtuso, femoribus piloso-ciliatis. *Mus. Lud. Ulr.* 143.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 365. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 18.
Degeer inf. 3. *p.* 490. *n.* 6. *t.* 40. *f.* 10. Acrydium rubripes.
Habitat in America *australi et* India, *elytris cinereis*, *alis nigro-venosis.*

flavicornis. 145. Gr. viridis, thorace subcarinato, elytris immaculatis, alis basi rufis, tibiis posterioribus sanguineis flavo-serratis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 19.
Habitat in Sina, *magnus.*

pictus. 146. Gr. elytris viridibus albo punctatis apice rufescentibus, corpore caeruleo flavoque variegato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 365. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 20.
Habitat in Cayenna.

migratorius. 41. Gr. thorace subcarinato: segmento unico capite obtuso, maxillis atris. *Mus. Lud. Ulr.* 140.* *Fn. suec.* 871. *Scop. ent. carn.* 323.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 265. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 22. Gryllus thorace subcarinato, segmento unico, mandibulis caeruleis.
Frisch inf. 9. *t.* 1. *f.* 8. Gryllus migratorius.
Degeer inf. 3. *p.* 466. *n.* 1. *t.* 23. *f.* 1. Acrydium migratorium.
Seb. mus. 4. *t.* 65. *f.* 21.
Roesel inf. 2. *gryll. t.* 24.
Edw. glean. t. 208.
Seligm. av. 6. *t.* 103.

Habitat in Tataria, *variis annis numerosissimis gregibus in* Europam *migrans, et omnia vegetabilia exedens, ab Aegyptiis vivus prunis injectus, rejectis alis pedibusque esitatur.*

tataricus. 42. Gr. thorace subcarinato: segmentis tribus, capite rotundato: maxillis concoloribus. *Mus. Lud. Ulr.* 139.*
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 365. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 21. Gryllus thorace segmentis tribus, fronte impressa, mandibulis concoloribus.
Roes. inf. gryll. t. 18. *f.* 8.
Drury inf. 1. *t.* 49. *f.* 2.
Habitat in Africa, *elytris praesertim cinerascentibus fusco maculatis, migratorio affinis.*

ruficornis. 147. Gr. thoracis dorso nigro: carina flava, antennis tibiisque posterioribus rufis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 23.
Habitat in Sierra Leon Africae, *statura migratorii, at paulo minor.*

Lineola. 148. Gr. thorace subcarinato fusco: linea dorsali rufa, femoribus posterioribus intus sanguineis, tibiis caeruleis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 365. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 24.
Habitat in Italia, *magnitudine migratorii.*

variegatus. 43. Gr. thorace lineato flavo, elytris viridibus, alis caeruleis. *Mus. Lud. Ulr.* 144. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 366. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 25.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 8. *t.* 53. *f.* 3.
Habitat in America, *fronte rubra atro maculata, antennis nigris rubro annulatis.*

vocans. 149. Gr. thorace carinato, elytris pallidis: maculis ocellaribus fuscis, alis basi ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 366. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 26.
Habitat in nova Hollandia.

luridus. 150. Gr. niger, thorace subcarinato, pectoris macula abdominisque cingulis sanguineis, fronte porrecta. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 366. *n.* 23. *mant. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 23.
Habitat in Africa *aequinoctiali, magnitudine striduli.*

musicus. 151. Gr. thorace carinato, elytris anterius nigris fascia alba, posterius griseis nigro variis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 366. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 28.
Habitat in nova Hollandia.

152. Gr.

scaber. 152. Gr. thorace scabro, alis rufis apice cinereis, femoribus posterioribus supra infraque carinatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 366. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 30.
Habitat in Jutlandiae *arenosis.*

cisti. 153. Gr. thorace scabro: crista bifida, alis rubris: fascia nigra: femoribus posterioribus canaliculatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 29.
Habitat in cisto halimifolio, *stridulo paulo major.*

caerulescens. 44. Gr. thorace subcarinato, alis virescenti-caeruleis: fascia nigra. *Mus. Lud. Ulr.* 145.* *Scop. ent. carn.* 325. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 369. *n.* 37. *mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 43.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 392. *n.* 2. Acrydium elytris nebulosis, alis caeruleis extimo nigro.
Degeer inf. 3. *p.* 473. *n.* 3. Acrydium caeruleipenne.
Raj. inf. 60.
Frisch inf. 9. *t.* 1. *f.* 3.
Seb. mus. 4. *t.* 65. *f.* 19.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 21. *f.* 4.
Sulz. inf. t. 9. *f.* 60.
Schaeff. ic. t. 27. *f.* 6. 7.
Habitat in Sibiria *et* Europa *magis australi.*

surinamus. 45. Gr. thorace lineis quatuor flavis, alis caeruleis, elytris viridibus. *Mus. Lud. Ulr.* 146. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 367. *n.* 28. *mant. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 34.
Habitat in America *meridionali, femorum basi sanguinea.*

italicus. 46. Gr. fuscus, thorace carinato, alis rubris, apice hyalinis. *Mus. Lud. Ulr.* 147.* *Scop. ent. carn.* 327. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 367. *n.* 29. *mant. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 35.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 21. *f.* 6.
Schaeff. ic. t. 27. *f.* 8. 9.
Habitat in Europa *magis australi.*

thalassinus. 154. Gr. thorace laevi viridi, alis hyalinis latere tenuiori viridibus, apice fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 367. *n.* 31. *mant. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 37.
Habitat in Italia, *capite thoraceque viridi, ore oculisque fuscis, tibiis sanguineis.*

germanicus. 155. Gr. testaceus, alis sanguineis apice hyalinis, femoribus posterioribus nigro punctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 367. *n.* 30. *mant. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 36.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 21. *f.* 7.
Habitat in Germaniae *agris.*

virginianus. 156. Gr. thorace carinato, elytris costa viridi, alis nigris basi virescentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 368. *n.* 32. *mant. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 38.
Habitat in America *boreali.*

stridulus. 47. Gr. thorace subcarinato, alis rubris extimo nigris. *Fn. suec.* 872.* *Scop. ent. carn.* 326. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 366. *n.* 26. *mant. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 31.
It. oel. 158. Gryllus elytris nebulosis, alis rubris extimo nigris
Uddm. diss. 50.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 393. *n.* 4. Acrydium elytris nebulosis, alis rubris externe nigris.
Degeer inf. 3. *p.* 472. *n.* 2. Acrydium rubripenne.
Frisch inf. 9. *t.* 1. *f.* 2.
Seb. mus. 4. *t.* 65. *f.* 20.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 21. *f.* 1.
Schaeff. elem. t. 15.
icon. t. 27. *f.* 10. 11.
Habitat in Europae *siccis arenosis, tota die in seram noctem stridens, niger, aut nigro flavoque varius.*

ferrugineus. 157. Gr. thorace tuberculato, elytris obscuris immaculatis, alis ferrugineis, capite acuminato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 367. *n.* 27. *mant. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 33.
Habitat in Africa *aequinoctiali.*

morio. 158. Gr. obscurus, thorace subcarinato, alis atris immaculatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 32.
Habitat in Africa, *stridulo affinis, at paulo minor.*

caerulans. 48. Gr. thorace laeviusculo, elytris pallidis nigro maculatis, alis latere tenuiore caerulescentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 368. *n.* 33 *mant. inf. p.* 238. *n.* 39.
Habitat in Europae *magis australis campestribus.*

carolinus. 49. Gr. thorace subcarinato, alis nigris: margine posteriore flavo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 368. *n.* 34. *mant. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 40.
Cateb. carol. 2. *p.* 89. *t.* 89. Locustella carolina, elytris fuscis, alis inferioribus nigris, ad extremitates luteis.
Degeer inf. 3. *p.* 491. *n.* 7. *t.* 41. *f.* 2. 3. Acrydium carolinum.
Habitat in America *boreali, elytris obscuris fusco punctatis.*

50. Gr.

obscurus. 50. Gr. thorace subcarinato, alis disco rubro fascia nigra, apice hyalinis. *Mus. Lud. Ulr.* 144. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 368. *n.* 35. *mant. inf.* 1. *p.* 230. *n.* 41.
Degeer inf. 3. *p.* 492. *n.* 8. *t.* 41. *f.* 4. Acrydium obscurum.
Seb. mus. 4. *t.* 80. *f.* 15. 16.
Drury inf. 2. *t.* 41. *f.* 1.
Habitat in Africa, *femoribus interne basi atris.*

sibiricus. 51. Gr. thorace subcarinato, antennis clavatis, tibiis anterioribus ovato-clavatis crassis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 368. *n.* 36. *mant. inf.* 1. *p* 238. *n.* 42.
Pall. it. 1. *app. n.* 48. *spicil. zool.* 9. *p.* 29. *t.* 1. *f.* 11. Gryllus clavimanus.
Laxmann nov. omm. Petrop. 14. *t.* 25. *f.* 8.
Habitat in Sibiria, *femina tibiis simplicibus.*

cinerascens. 159. Gr. thorace carinato, elytris margine tenuiore viridibus, alis basi flavescentibus apice cinereis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 369. *n.* 38. *mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 44.
Habitat in Italia, *flavo affinis, at duplo major.*

sulphureus. 160. Gr. obscurus thorace carinato, alis flavissimis apice nigricantibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 369. *n.* 39. *mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 45.
Habitat in America *boreali, parvus.*

flavus. 52. Gr. thorace carinato, alis flavis, fascia nigra apice cinereis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 369. *n.* 40. *mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 46.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 702. *n.* 52. Gryllus thorace subcarinato, alis disco flavo, fascia nigra apice hyalinis.
Scop. delic. insubr. 1. *p.* 63. *t.* 24. *f.* C. Gryllus alis semiluteis: fascia fusca, corpore subtus fusco-ferrugineo.
Degeer inf. 3. *p.* 493. *n.* 9. *t.* 41. *f.* 5? Acrydium nigrofasciatum.
Petiv. gazoph. 6. *t.* 3. *f.* 6. Locusta capensis, alis inferioribus luteis.
Habitat in Europa *magis australi, et* Africa, *tibiis posterioribus sanguineis, elytris fuscis: maculis obsoletis albis.*

insubricus. 161. Gr. elytris testaceis, alis basi rubris: fascia fusca. *Scop. delic. insubr.* 1. *p.* 64. *t.* 24. *f.* D.
Habitat in Insubria, *italico minor.*

nitidulus. 162. Gr. viridis, capite lucido luteo. *Scop. delic. insubr.* 1. *p.* 62. *t.* 24. *f.* B.
Habitat circa Mediolanum, *bipollicaris*, *ad tettegonias remittendus.*

cyanipes. 163. Gr. fuscus, linea dorsali flava, tibiis posterioribus flavis apice cyaneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 370. *n.* 41. *mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 47.
Degeer inf. 3. *p.* 489. *n.* 4. *t.* 40. *f.* 3. Acrydium flavofasciatum.
Habitat in insulis, Americae *meridionali oppositis.*

rusticus. 164. Gr. griseus, elytris basi fuscis flavo maculatis apice cinereo fuscoque variis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 370. *n.* 42. *mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 48.
Habitat in Insulis Americae *meridionali oppositis.*

lateralis. 165. Gr. thorace fusco: margine punctoque utrinque tibiisque flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 370. *n.* 43. *mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 49.
Habitat in insulis Americae *meridionali oppositis.*

velox. 166. Gr. fuscus, thoracis plani margine pedibusque virescentibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 50.
Habitat in Sina, *parvus.*

apricarius. 53. Gr. thorace cruciato, antennis longitudine corporis. *Fn. suec.* 873.* *It. oel.* 157.
Habitat in Europae *campis siccissimis.*

viridulus. 54. Gr. thorace cruciato, corpore supra viridi, elytrorum margine albido. *Fn. suec.* 874.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 370. *n.* 44. *mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 51.
It. wgoth. 276. Gryllus capite, thorace elytrisque superne viridibus.
Degeer inf. 3. *p.* 480. *n.* 7. Acrydium albo marginatum.
Frisch inf. 9. *t.* 1. *f.* 7.
Schaeff. ic. t. 141. *f.* 2. 3.
Habitat frequens in Europae *arvis sterilioribus.*

biguttulus. 55. Gr. thorace cruciato, elytris nebulosis: puncto oblongo albo versus apices. *Fn. suec.* 875. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 370. *n.* 45. *mant. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 51.
Degeer inf. 3. *p.* 479. *n.* 6. Acrydium biguttulum.
Schaeff. icon. t. 190. *f.* 1. 2.
Habitat in Europae *magis borealis arvis sterilioribus, frequens.*

56. Gr.

rufus. 56. Gr. thorace cruciato, corpore rufo, elytris griseis, antennis subclavatis acutis. *Fn. suec.* 876.* *Scop. ent. carn.* 329. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 371. *n.* 48. *mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 55. Gryllus fuscus, abdomine rufo, antennis subclavatis. *Schaeff. ic. t.* 136. *f.* 4. 5.
Habitat in Europae *arvis sterilioribus frequens.*

captivus. 167. Gr. fuscus thorace cruciato, femoribus tibiisque posterioribus fascia alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 371. *n.* 47. *mant. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 54.
Habitat in nova Hollandia.

danicus. 57. Gr. thorace subcarinato femoribusque virescentibus, tibiis posterioribus sanguineis.
Habitat in Dania, *verrucivori magnitudine.* Brünniche.

grossus. 58. Gr. femoribus sanguineis, elytris virescenti-subrufis, antennis cylindricis. *Fn. suec.* 877.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 371. *n.* 46. *mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 53.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 393. *t.* 8. *f.* 2. Acrydium femoribus sanguineis, alis subfuscis reticulatis.
Degeer inf. 3. *p.* 477. *n.* 5. *t.* 22. *f.* 4. Acrydium rubripes.
Hollar. inf. t. 10. *f.* 5. 6.
Frisch inf. 9. *p.* 5. *t.* 4.
Habitat in Europae *arvis arenosis frequens.*

pedestris. 60. Gr. corpore incarnato aptero. *Fn. suec.* 878.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 371. *n.* 49. *mant. inf.* 1. *p.* 23. *n.* 56.
Degeer inf. 3. *p.* 474. *n.* 4. *t.* 239. *f.* 8. 9. Acrydium apterum.
Habitat in Europa, *et ad* Sibiriae *montem* Tscheremschan.

perspicillatus. 61. Gr. alarum rudimentis ocello atro, oculis aureis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 398. *n.* 34. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 371. *n.* 50. *mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 57.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 357. *n.* 11? *mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 13? Locusta (specularis) thorace rotundato, elytris griseis basi ocello dorsali vitreo, antennis longissimis.
Habitat in America *australi et* India.

annulatus. 168. Gr. thorace planiusculo, fronte gibbosa, alis caerulescenti-nigris intus caeruleis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 8. *p.* 195. *n.* 5. *t.* 53. *f.* 4.
Habitat in America, *punctis elevatis scaber, ex rubescente griseus, abdominis annulis aliquot virescentibus, antennis flavicantibus nigro annulatis.*

triangularis. 169. Gr. spadiceus, scutello abdominisque segmento primo macula triangulari, elytris margine flavis, alis flavescentibus.
Roesel inf. 2. *gryll. p.* 138. §. 2. *t.* 22. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

versicolor. 170. Gr. viridi rubro flavoque varius, capite cum antennis elytrorumque margine viridi, thorace elytrisque fuscis.
Sulz. hist. inf. p. 84. *t.* 9. *f.* 4.
Habitat in Insubria.

Centurio. 171. Gr. fuscus atro maculatus, alis ruberrimis: basi margine striisque tenerrimis undulatis atris.
Drury inf. 2. *p.* 78. *t.* 41. *f.* 3.

caeruleus. 172. Gr. viridis, alis caeruleis apice cinereis, femoribus viridi-flavis, tibiis nigerrimis.
Drury inf. 2. *p.* 79. *t.* 42. *f.* 1.
Habitat in Africa.

Miles. 173. Gr. viridis, frontis fasciis thoracisque punctis binis flavis, elytris spadiceis, alis alternatim rufescentibus et atris.
Drury inf. 2. *p.* 80. *t.* 42. *f.* 2.
Habitat in America.

lunulatus. 174. Gr. thorace subcucullato: lineis tribus elevatis; lateralibus lunulatis.
Roes. inf. 2. *gryll. p.* 128. §. 5. *t.* 20. *f.* 6. 7.
Scop. ent. carn. p. 110. *n.* 328.
Habitat in Germania.

subcarinatus 175. Gr. thorace subcarinato virideſcente, alis basi luteis: apicis macula nigricante. *Lepech. it.* 1. *p.* 256. c. *t.* 47. *f.* 4.
Habitat in Sibiriae *desertis* Uralensibus.

176. Gr.

An huc referendi, tanquam propriae species, a reliquis distinctae, Gryllus femoratus Lepech. it. 1. *t.* 19. *f.* 1. 2. *t.* 20. *f.* 5. *plurresque a* Seba *Mus. vol.* 4. *delineati, cyaneus t.* 65. *f.* 18. *singularis t.* 65. *f.* 22. *fuscus t.* 67. *f.* 11. *purpurascens t.* 70. *f.* 3. 4. *albo-marginatus t.* 70. *f.* 5 6. *pallide flavus t.* 71. *f.* 1. 2. *taeniolatus t.* 71. *f.* 3. 4. *luteo-fuscus t.* 71. *f.* 5. 6. *hyalinus t.* 71. *f.* 11. 12. *cinereus t.* 72. *f.* 7. 8. *cinereo-fuscus t.* 72. *f.* 9. 10. *capito. t.* 75. *f.* 1. 2. *fusco-maculatus t.* 79. *f.* 1. 2. *viridi-purpurascens t.* 79. *f.* 9. 10. *olivaceus t.* 79. *f.* 11. 22. *Locustella t.* 80. *f.* 5. 6. *cinnabarinus t.* 80. *f.* 9. 10. *capensis t.* 80. *f.* 11. 12. *exiguus t.* 87. *f.* 19. *aliique anonymi t.* 69. *f.* 9-12. *t.* 96. *f.* 34-38. *depilli, minutus et virens* Hermanni?

fuscus. 176. Gr. fuscus, elytris fasciis duabus albis. *Lepechin it.* 1. *p.* 314.
Habitat in desertis Uralensibus.

Lepechini. 177. Gr. thoracis scutello abdominis longitudine: linea albida a fronte per medium scutellum decurrente. *Lepechin it.* 2. *t.* 10 *f.* 17.
Habitat in Sibiria.

fuliginosus. 178. Gr. thoracis dorso triangulo, elytris ex griseo fuscescentibus, alis fuliginosis. *Pallas it.* 2. *app. n.* 77.
Habitat in Sibiriae *campestribus, italici magnitudine.*

muricatus. 179. Gr. thorace pentagono, alis flavescentibus: arcu fusco, femoribus posterioribus exterius muricatis. *Pallas it.* 1. *app. n.* 47.
Habitat in desertis Uralensibus, *obscuro major, colore varians.*

miniatus. 180. Gr. thorace subcarinato, alis miniatis: apicis arcu nigro. *Pallas it.* 1. *app. n.* 49.
Habitat in desertis australibus ad fluvium Ural, *caerulescentis forma et magnitudine.*

variabilis. 181. Gr. thorace subcarinato, alis nigro reticulatis: area ad marginem crassiorem atra apice fusco-hyalino. *Pallas it.* 1. *app. n.* 52.
Habitat in campis per fluvium Samara *irrigatis, magnitudine facieque striduli, alis nunc hyalinis, nunc albicantibus, nunc pallidis, nunc caerulescentibus.*

salinus. 182. Gr. thorace subcarinato, alis fascia nigra lata, basi roseis, apice hyalinis. *Pallas it.* 2. *app. n.* 78.
Habitat in desertis salsis aridissimis ad fluvios Ural *et* Irtisch *sitis, facie fere caerulescentis.*

tibialis. 183. Gr. elytris nebulosis, alis caerulescentibus fusco reticulatis, tibiis albidis longius spinosis. *Pallas it.* 2. *app. n.* 78. b.
Habitat in regionibus australibus Uralensibus, *facie et magnitudine salini.*

barabensis. 184. Gr. elytris pallidis punctis fuscis irroratis, alis hyalino-flavescentibus: margine et apice venis punctisque fuscis. *Pallas it.* 2. *app. n.* 79. 3. *p.* 433.
Habitat in pinetis arenosis deserti Barabensis, *magnitudine tibialis, chenopodii amans.*

numidicus. 185. Gr. thorace carinato, alis minimis squameis. *Poiret Journ. de physiq.* 1787. *Apr. p.* 242. *t.* 1. *f.* 1.

cruentatus. β) Gr. maculis sanguineis coopertus. *Poiret Journ. de phys.* 1787. *Apr. p.* 244.
Habitat in Numidia, *voracissimus, glaberrimus, totus viridis, elephante minor, sed longior, ova glutine coacta in arena sepeliens.*

cinereus. 186. Gr. fusco punctatus, thorace subcarinato, alis albis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 100. *n.* 1138.
Habitat in Dania.

flavescens. 187. Gr. flavescens, elytris fuscescentibus obsolete maculatis, alis flavo nigroque reticulatis.
Schaeff. ic. t. 228. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

rhomboideus. 188. Gr. elytris cinereis apice albidis: maculis atris rhomboideis.
Schaeff. ic. t. 228. *f.* 6. 7.
Habitat in Germania.

angulatus. 189. Gr. flavescens, abdomine fusco: annulorum segmentis obtuse angulatis.
Schaeff. ic. t. 232. *f.* 2. 3.
Habitat in Germania.

rubicundus. 190. Gr. capite, thorace elytrorumque margine anteriore viridi, elytris lunula media albida, alis cinereis, abdomine posterius pedibusque rubicundis.
Schaeff. ic. t. 241. *f.* 5. 6.
Habitat in Germania.

pullus. 191. Gr. atro-fuscus, thorace quadrato: margine flavescente.
Schaeff. ic. t. 232. *f.* 6. 7.
Habitat in Germania.

lineatus. 192. Gr. virideſcens, thoracis linea longitudinali elytrorumque futura aurantiis.
Schaeff. ic. t. 243. *f.* 3. 4.
Habitat in Germania.

sphaericus. 193. Gr. virideſcens, elytrorum basi maculis binis albis sphaericis.
Schaeff. icon. t. 247. *f.* 3. 4.
Habitat in Germania.

194. Gr.

rubricollis. 194. Gr. flavidus, thorace rubro: margine flavo.
Schaeff. ic. t. 247. *f.* 3. 4.
Habitat in Germania.

rosaceus. 195. Gr. varius, thorace viridi: margine rosaceo.
Schaeff. ic. t. 252. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

similis. 196. Gr thorace subcarinato, alis atris: disco et margine rubris.
Schaeff. ic. t. 253. *f.* 1. 2.
β) Gryllus alis apice maculatis.
Schaeff. ic. t. 253. *f.* 5. 6.
Habitat in Germania, *stridulo affinis, an varietas?*

purpureus. 197. Gr. alis elytrisque pallidis maculatis, thoraee abdominisque annulis tribus anterioribus purpureis.
Schaeff. ic. t. 263. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

flavens. 198. Gr. flavescens, thorace lineis duabus longitudinalibus obscurioribus.
Schaeff. ic. t. 264. *f.* 4. 5.
Habitat in Germania.

viridis. 199. Gr. viridis, hinc inde flavescens.
Schaeff. icon. t. 265. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania; *an propria species?*

sexmaculatus. 200. Gr. subfuscus, alis flavescentibus: maculis sex fuscis longitudinaliter positis.
Schaeff. ic. t. 265. *f.* 4. 5.
Habitat in Germania, *parvus.*

maculosus. 201. Gr. elytris maculosis, alis rosaceis apice cinerascentibus.
Schaeff. icon. t. 267. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

polystictos. 202. Gr. fuscescens hinc inde pallide punctatus, alis rufescentibus: apice anis nigricantibus.
Schaeff. icon. t. 267. *f.* 4. 5.
Habitat in Germania.

limbatus. 203. Gr. viridis, elytris apice et margine exteriore rufis.
Degeer inf. 3. *p.* 481. *n.* 8. Acrydium rufo-marginatum.
Habitat in Europae *pratis*, 9 *lineas longus.*

pratensis. 204. Gr. viridis, elytris apice nigris, antennis corporis dimidio longitudine.
Degeer inf. 3. *p.* 481. *n.* 9. Acrydium nigro-terminatum.
Habitat in Europae *pratis*, *limbato minor.*

albipes. 205. Gr. thorace cristato: segmento quadruplici, elytris obscure virentibus, alis violaceis, femoribus posterioribus albo maculatis. *Degeer inf.* 3. *p.* 487. *n.* 2. *t.* 40. *f.* 7.
Habitat in Surinamo, 2½ *pollices longus.*

roseus. 206. Gr. viridis, antennis flavis, alis dimidiato tibiisque posterioribus roseis. *Degeer inf.* 3. *p.* 488. *n.* 3. *t.* 41. *f.* 1.
Habitat in Sina, 2½ *pollices longus.*

sanguinolentus. 207. Gr. capite flavo rubro nigroque maculato, thorace flavo, elytris viridibus, tibiis rubro maculatis. *Degeer inf.* 3. *p.* 489. *n.* 5. *t.* 40. *f.* 9.
Habitat - - - *sesquipollicaris.*

denticulatus. 208. Gr. viridis thorace cymbiformi carinato denticulato, capite acuminato, fasciis binis longitudinalibus griseis.
Degeer inf. 3. *p.* 495. *n.* 11. *t.* 42. *f.* 2. Acrydium serrato-fasciatum.
Habitat in Surinamo, *gracilis*, 2 *pollices longus.*

dentatus. 209. Gr. fuscus nebulosus, thorace cymbiformi rugoso: carina laevi, femoribus posterioribus denticulatis, capite ovato. *Degeer inf.* 3. *p.* 496. *n.* 12. *t.* 42. *f.* 3.
Habitat in India, 2½ *pollices longus.*

chloropterus. 210. Gr. fuscus, alis viridibus, thorace rotundato laevi, femoribus posterioribus linea flava.
Degeer inf. 3. *p.* 497. *n.* 13. *t.* 42. *f.* 4. Acrydium flavolineatum.
Habitat in Surinamo, 15 *lineas longus.*

erythropus. 211. Gr. griseo-fuscus, femoribus posterioribus subtus rubris, intus flavescentibus nigro maculatis, tibiis posterioribus rubris.
Degeer inf. 3. *p.* 498. *n.* 14. *t.* 42. *f.* 5. Acrydium Femur rubrum.
Habitat in Pensylvania, *pollicem longus.*

chrysomelas. 212. Gr. viridis, thorace carinato, elytris fuscis: margine inferiore viridi, alis nigris basi luteis.
Degeer inf. 3. *p.* 498. *n.* 15. *t.* 42. *f.* 6. Acrydium viridi fasciatum.
Habitat in Pensylvania, *pollicem longus.*

213. Gr.

varius. 213. Gr. viridi-obscurus, alis caeruleis, corpore fasciis maculisque flavis, femoribus basi sanguineis.
Degeer inf. 3. *p.* 500. *n.* 17. *t.* 42 *f.* 8. Acrydium variegatum.
Habitat in Surinamo, 9 *lineas longus.*

longipennis. 214. Gr. viridi-flavus, elytris abdomine duplo longioribus capite thoraceque fasciis binis nigris. *Degeer inf.* 3. *p.* 501. *n.* 18. *t.* 42. *f.* 9.
Habitat in Surinamo, 11 *lineas longus.*

acutus. 215. Gr. thorace nigro: macula flavo-viridi, elytris fuscis: macula viridi, femoribus posterioribus fasciis tribus nigris.
Degeer inf. 3. *p.* 54. *n.* 19. *t.* 42. *f.* 10. Acrydium acuminatum.
Habitat in Surinamo, 9 *lineas longus.*

chalcops. 216. Gr. griseo-fuscus, thorace fasciis binis nigris, elytris unica grisea, femoribus posterioribus intus tibiisque sanguineis.
Degeer inf. 3. *p.* 501. *n.* 20. *t.* 42. *f.* 11. Gryllus aceneo oculatus.
Habitat in Surinamo, 10 *lineas longus.*

sticticus. 217. Gr. griseo-fuscus, elytris lineis punctatis nigris.
Degeer inf. 3. *p.* 503. *n.* 21. *t.* 42. *f.* 12.
Habitat in Surinamo, 10 *lineas longus.*

hamatus. 218. Gr. thoracis scutello abdomine longiore anterius hamato, antennis longitudine abdominis, alis nigris, elytris nullis. *Degeer inf.* 3. *p.* 503. *n.* 22. *t.* 42. *f.* 13.
Habitat in Surinamo.

rugosus. 228. Gr. apterus, viridis cinereo varius, capite vesiculoso: fronte rugis duabus dentatis et utrinque ruga minore denticulata, vertice impresso: margine elevato dentato, thorace morbilloso spinoso: crista elevata compressa rugoso-dentata. *Mus. Lesk. p.* 48. *n.* 39.
Habitat extra Europam, *interdum cinereus fusco varius, abdominis segmentis singulis utrinque macula fusca notatis, utrinque dentibus* 2, *et praeterea crista dentata armatis, femoribus tibiisque posterioribus supra infraque dentatis.*

lunaris. 229. Gr. thorace carinato, alis basi rufis: lunula media margine anteriori maculisque tribus versus apicem ad margi-
nem

nem posteriorem fuscis, tibiis posterioribus albis nigrospinosis, griseo-villosis. *Mus. Lesk. p.* 48. *n.* 49.
Habitat - - -

flavipes. 230. Gr. thorace supra elytrisque brunneis: margine anteriori viridi-flavis, femoribus posterioribus subtus sanguineis tibiisque flavis. *Mus. Lesk. p.* 49. *n.* 50.
Habitat in Europa.

griseus. 231. Gr. thorace cruciato supra fusco, elytris griseo-fusco-nebulosis, pedibus quatuor anterioribus griseo-fusco-maculatis. *Mus. Lesk. p.* 49. *n.* 51.
Habitat in Europa.

cruciger. 232. Gr. thorace cruciato viridi: cruce alba elytris dorso viridibus margine inflexo fuscis apice albis. *Mus. Lesk. p.* 49. *n.* 52.
Habitat in Europa.

nubilus. 233. Gr. thorace carinato viridi: utrinque linea fracta alba, elytris fusco nebulosis supra viridibus. *Mus. Lesk. p.* 49. *n.* 53.
Habitat in Europa.

virens. 234. Gr. viridis, thorace cruciato, antennis corpore longioribus. *Mus. Lesk. p.* 49. *n.* 56.
Habitat in Europa.

venosus. 235. Gr. thorace cruciato rufo, elytris hyalinis rufo venosis. *Mus. Lesk. p.* 49. *n.* 58.
β) Gr. elytrorum maculis sex fuscis seriatis. *Mus. Lesk. p.* 49. *n.* 59.
Habitat in Europa.

bicolor. 236. Gr. griseus apterus, femoribus posterioribus subtus rufis. *Mus. Lesk. p.* 49. *n.* 60. b.
Habitat in Europa.

distinctus. 237. Gr. apterus viridis, femina dorso, mare femoribus posterioribus virideſcente. *Mus. Lesk. p.* 49. *n.* 61. c.
Habitat in Europa.

222. FULGORA. *Caput* fronte producta, inani.
Antennae breves infra oculos: articulis duobus; exteriore globoso majore.
Rostrum inflexum, elongatum: vagina quinquearticulata.
Pedes gressorii.

Laternaria. 1. F. fronte rostrata recta, alis lividis: posterioribus ocellatis. *Mus. Lud. Ulr.* 152.* *Gron. zooph.* 668. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 1. *mant. inf.* 2. *p.* 260. *n.* 1.
Grew. mus. 158. *t.* 13. Cucujus peruvianus.
Merian. surin. t. 49. Laternaria.
Reaumur inf. 5. *t.* 20. *f.* 6. 7.
Roesel inf. 2. *gryll. t.* 28. 29.
Seb. mus. 4. *t.* 77. *f.* 3. 4.
Degeer inf. 3. *p.* 195. *n.* 1.
Stoll. cicad. t. 1. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali, prominente fronte noctu lucem vividissimam spargens.*

serrata. 10. F. fronte rostrata adscendente quadrifariam serrata. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 2. *mant. inf.* 2. *p.* 260. *n.* 2.
Seb. mus. 4. *t.* 77. *f.* 5. 6.
Lindenb. Naturf. 13. *p.* 19. *t.* 3. *f.* 1. 2.
Habitat in Surinamo.

Diadema. 2. F. fronte rostrata muricata: apice trifido, alis nigris rubro maculatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 3. *mant. inf.* 2. *p.* 260. *n.* 3.
Drury inf. 3. *t.* 50. *f.* 4. Fulgora armata.
Seb. mus. 4. *t.* 77. *f.* 7. 8.
Lindenb. Naturf. 13. *p.* 20. *t.* 3. *f.* 3.
Stoll. cicad. 1. *t.* 5. *f.* 22.
Habitat in India, *candelaria major.*

Candelaria. 3. F. fronte rostrata adscendente, elytris viridibus luteo maculatis, alis flavis apice nigris. *Mus. Lud. Ulr.* 153.* *Act. Stockh.* 1746. *p.* 63. *t.* 1. *f.* 5. 6. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 4. *mant. inf.* 2. *p.* 260. *n.* 4.
Degeer inf. 3. *p.* 197. *n.* 2.

Roes.

Roef. inf. 2. gryll. p. 189. *t.* 30.
Edw. av. t. 120.
Sulz. inf. t. 10. *f.* 62.
Habitat in Sina.

phosphorea. 4. F. fronte rostrata subulata adscendente, corpore griseo glauco. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 314. *n.* 5. *mant. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 5.
Degeer inf. 3. *p.* 201. *n.* 4. *t.* 32. *f.* 6. Cicada filirostris.
Habitat in America *meridionali.*

noctivida. 5. F. fronte rostrata acuminata adscendente, corpore viridi, alis hyalinis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 314. *n.* 6. *mant. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 6.
Degeer inf. 3. *p.* 202. *n.* 5. *t.* 32. *f.* 4. Cicada conirostris.
Habitat in America *meridionali.*

lucernaria. 6. F. fronte rostrata prominente, corpore supra virideſcente, subtus flavo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 314. *n.* 7. *mant. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 7.
Degeer inf. 3. *p.* 202. *n.* 6. *t.* 32. *f.* 6. Cicada breviroſtris.
Habitat in America *meridionali.*

flammea. 7. F. fronte rostrata adscendente tereti truncata. *Amoen. ac.* 6. *p.* 399. *n.* 39. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 314. *n.* 8. *mant. inf.* 2. *p.* 260. *n.* 8.
Stoll. cicad. t. 2. *f.* 7.
Habitat in America *meridionali.*

tenebrosa. 11. F. fronte rostrata recta truncata, elytris griseis scabris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 314. *n.* 9. *mant. inf.* 2. *p.* 260. *n.* 9.
Degeer inf. 3. *p.* 200. *n.* 3. *t.* 32. *f.* 1. Cicada laternaria fusca.
Habitat in Guinea.

obscurata. 12. F. fronte rostrata recta truncata, elytris cinereis nigro maculatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 10. *mant. inf.* 2. *p.* 260. *n.* 10.
Stoll. cicad. 1. *t.* 6. *f.* 28.
Habitat in nova Hollandia.

adscendens. 13. F. fronte rostrata subulata adscendente, elytris ferrugineo-fuscis albo punctatis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 260. *n.* 11.
Habitat in Cayenna, *parva.*

14. F.

fasciata. 14. F. fronte rostrata adscendente, elytris ferrugineo-fuscis: fasciis duabus punctoque posteriore viridibus. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 261. *n.* 12.
Habitat in Cayenna, *adscendentis statura, an varietas?*

truncata. 8. F. fronte obtusiuscula, alis truncatis viridibus. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 11. *mant. inf.* 2. *p.* 261. *n.* 13.
Amoen. acad. 6. *p.* 399. *n.* 40. Cicada viridi-albicans, alis deflexis compressis postice truncatis.
Habitat in India.

plana. 15. F. flavescens, fronte porrecta plana, thorace elytrisque ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 261. *n.* 14.
Habitat in Cayenna, *parva.*

pallipes. 16. F. fronte porrecta plana, elytris viridibus apice hyalinis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 261. *n.* 15.
Habitat in Cayenna, *statura planae.*

hyalina. 17. F. fronte conica inaequali, elytris hyalinis: striga atra. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 12. *mant. inf.* 2. *p.* 261. *n.* 16.
Habitat in Bengala, *obscurata major.*

festiva. 18. F. fronte conica, elytris fuscis: margine exteriori virescente, punctis nigris fulvisque, alis basi rubris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 13. *mant. inf.* 2. *p.* 261. *n.* 17.
Habitat in Coromandel.

fenestrata. 19. F. fronte conica bisulcata, elytris hyalinis: macula marginali fusca. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 14. *mant. inf.* 2. *p.* 261. *n.* 18.
Habitat in Africa *aequinoctiali, europaea minor.*

europaea. 9. F. fronte conica, corpore viridi, alis hyalinis reticulatis, plantis rufis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 15. *mant. inf.* 2. *p.* 261. *n.* 19.
Sulz. hist. inf. t. 9. *f.* 5.
Schulz. Naturf. 9. *t.* 2.
Stoll cicad. 1. *t.* 11. *f.* 51.
Habitat in Europa *australi, cicadae spumantis magnitudine.*

minuta. 20. F. fronte conica, capite thoraceque flavescentibus: linea dorsali, elytris albidis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 262. *n.* 20.
Habitat Halae Saxonum, *parva cicadae statura.*

Folium. 21. F. flavo-viridis, fronte roſtrata brevi recta, alis ampliſſimis verticalibus compreſſis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 204. *n.* 7. *t.* 32. *f.* 7.
Habitat in America.

223. CICADA. *Roſtrum* inflexum.
Antennae ſetaceae.
Alae quatuor membranaceae deflexae.
Pedes (plerisque) ſaltatorii.

* *antennis ſubulatis fronti inſertis*, Membracides Fabricii.

† *thorace compreſſo-membranaceo, corpore majore*, Foliaceae.

inflata. 52. C. thoracis folio inflato teſtaceo reticulato. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 262. *n.* 1.
Habitat in Cayenna, *magnitudine et ſtatura foliatae.*

rhombea. 1. C. folio thoracis rhombeo poſterius latiore. *Barker act. angl.* 1765. *p.* 55. *t.* 6. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 262. *n.* 2.
Habitat in America.

foliata. 2. C. thorace rotundato atro: arcubus albis. *Gron. zooph.* 677. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 3.
Fabr. mant. inſ. 2 *p.* 262. *n.* 5. Membracis (lunata) thorace foliaceo rotundato atro: lunulis tribus albis.
Degeer inſ. 3. *p.* 205. *n.* 8. *t.* 32. *f.* 9. 10. Cicada foliata faſciata.
Merian. ſurin. t. 5. *f. ult.*
Habitat in America *meridionali.*

flaveola. 53. C. thorace rotundato flavo: faſcia maculaque atris.
Fabr. mant. inſ. 2. *p.* 262. *n.* 4. Membracis foliacea.
Stoll. cicad. t. 1. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali, ſtatura foliatae, at paulo major.*

54. C.

Cicadae *ſuccis plantarum vivunt; larva aptera, puppa ſolis alarum rudimentis inſtructa, ceterum utraque hexapus, currens imagini ſimillima, cercopidum agillima; imago gryllorum inſtar ſtridula;* manniferarum *larvae, veterum* Tettigometrae, *per annum fodiunt, et ſub terra latent, declaratae maſculae lamellis duabus abdomen ſubtus obtegentibus ſonorae in arbuſtis ſtrident mutasque in venerem feminas provocant.*

fasciata. 54. C. thorace rotundato atro: fasciis duabus; anteriore fulva, posteriore alba. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 262. *n.* 6.
Habitat in Cayenna, *statura foliatae.*

bracteata. 55. C. thorace viridi immaculato. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 263. *n.* 7.
Habitat in Cayenna, *parva.*

fronditia. 3. C. thoracis dorso repando sinuato: apice porrecto obtusissimo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 2. *mant. inf.* 2. *p.* 262. *n.* 3.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 705. *n.* 3. *Gronov. zooph.* 676.* Cicada foliacea, dorso repando, rostro obtusissimo.
Degeer inf. 3. *p.* 208. *n.* 11. *t.* 32. *f.* 15. 16. Cicada foliata sinuata.
Stoll cicad. 1. *t.* 6. *f.* 3. A. B. C.
Habitat in Surinamo.

squamigera. 4. C. anterius posteriusque rostrata acuta.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 316. *n.* 4. *mant. inf.* 2. *p.* 263. *n.* 8. Membracis thorace foliaceo antice posticeque acuto griseo.
Degeer inf. 3. *p.* 209. *n.* 12. *t.* 32. *f.* 17. 18. Cicada hastata.
Habitat in America *meridionali.*

genistae. 56. C. thorace fusco posterius producto, abdomine dimidio breviore. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 17. *mant. inf.* 2. *p.* 265. *n.* 27.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 424. *n.* 19. Cicada thorace inermi pone producto.
Habitat in Angliae *genista tinctoria.*

inermis. 57. C. thorace virescente posterius subulato longitudine abdominis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 16. *mant. inf.* 2. *p.* 265. *n.* 26.
Habitat in Americae *plantis.*

mutica. 58. C. thorace ferrugineo posterius producto carinato longitudine abdominis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 378. *n.* 15. *mant. inf.* 2. *p.* 265. *n.* 25.
Habitat in America *boreali.*

convoluta. 59. C. thorace laevi virescente: margine flavo posterius producto abdomine longiore. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 14. *mant. inf.* 2. *p.* 265. *n.* 24.
Habitat in Brasilia, *mediae magnitudinis, flavo capite, thorace flavescente, apice atro.*

arcuata. 60. C. nigro fusca, thorace compresso verticali: arcu flavescente. *Degeer inf.* 3. *p.* 206. *n.* 9. *t.* 32. *f.* 10.
Habitat in Surinamo.

fusca. 61. C. tota fusca, thorace compresso verticali. *Degeer inf.* 3. *p.* 208. *n.* 10. *t.* 32. *f.* 14.
Habitat in Surinamo.

gibbosa. 62. C. nigra, thorace carinato gibbo, anterius obtuso, posterius acuto, elytris flavo-lividis, pedibus fulvis. *Degeer inf.* 3. *p.* 311. *n.* 13. *t.* 32. *f.* 20. 21.
Forst. nov. inf. spec. 1. *p.* 67. *n.* 67. Cicada carinata.
Habitat in America.

binotata. 63. C. thorace subinermi posterius producto, abdomine breviore testaceo, elytris macula baseos nigra. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 12. *mant. inf.* 2. *p.* 265. *n.* 22.
Habitat in nova Hollandia.

†† *thorace utrinque cornuto:* Cruciatae.

Crux. 5. C. thorace cruciformi corpus totum tegente. *Mus. Lud. Ulr.* 154.*
Habitat in America *australi et* India.

hastata. 64. C. thoracis cornu supra caput porrecto compresso carinato, corpore griseo. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 263. *n.* 9.
Habitat in America *meridionali*, *parva.*

lanceolata. 65. C. thoracis cornu supra caput porrecto incurvo, corpore atro: maculis duabus dorsalibus albis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 263. *n.* 10.
Habitat in Cayenna, *parva.*

spinosa. 66. C. thorace tricorni posterius producto longitudine alarum. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 5. *mant. inf.* 2. *p.* 263. *n.* 11. *Sulz. hist. inf. t.* 9. *f.* 6.
Habitat in America *australi et* India.

acuminata. 67. C. thorace tricorni: cornu intermedio longiori compresso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 6. *mant. inf.* 2. *p.* 263. *n.* 12.
Habitat in Pensylvania.

cornuta. 6. C. thorace bicorni nigro posterius subulato longitudine abdominis, alis fuscis. *Fn. suec.* 879.* *Scop. ent. carn.* 435. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 9. *mant. inf.* 2. *p.* 264. *n.* 19. *Geoffr.*

Geoffr. inf. par. 2. *p.* 423. *n.* 18. Cicata thorace acute bicorni, pone producto.
Schreb. inf. 7. *f.* 3. 4. Cicada cornuta.
Degeer inf. 3. *p.* 181. *n.* 3. *t.* 11. *f.* 22. Cicada fusca.
Petiv. gazoph. t. 47. *f.* 2. 3. Ranatra cornuta.
Sulz. inf. t. 10. *f.* 63.
Schaeff. ic. t. 96. *f.* 2.
Habitat in carduis, salicibus.

Taurus. 68. C. thorace bicorni fusco posterius producto filiformi longitudine abdominis: cornubus arcuatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 10 *mant. inf.* 2. *p.* 264. *n.* 20.
Habitat in Coromandel.

Vitulus. 69. C. thorace bicorni viridi posterius subulato longitudine abdominis, alis albis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 11. *mant. inf.* 2. *p.* 265. *n.* 21.
Habitat in America.

Bonasia. 70. C. thorace bicorni posterius producto: margine albo, alis puncto baseos albo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 13. *mant. inf.* 2. *p.* 265. *n.* 23.
Habitat in America.

aurita. 7. C. thorace biaurito, capitis clypeo antrorsum dilatato rotundato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 7. *mant. inf.* 2. *p.* 263. *n.* 13.
Geoffr. inf. par. 2. *p.* 422. *n.* 17. Cicada thorace obtuse bicorni.
Schreb. inf. 8. *f.* 1. 2. Cicada cristata, thorace bicorni, corniculis subrotundis.
Sulz. hist. inf. t. 9. *f.* 7.
Schaeff. icon. t. 96. *f.* 3.
Habitat in quercu, corylo, *tabani magnitudine, tota cinerea.*

sinensis. 71. C. thorace bicorni posterius producto abdomine longiori atro: margine flavescente. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 263. *n.* 14.
Stoll cicad. 1. *t.* 11. *f.* 53. B.
Habitat in Sina, *magna.*

horrida. 72. C. thorace bicorni posterius producto biclavato apice trispinoso. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 264. *n.* 15.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

trifida. 73. C. pilosa, thorace quadricorni posterius producto trifido: laciniis subulatis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 264. *n.* 16.
Habitat in Cayenna, *magnitudine c. tauri.*

clavata. 74. C. thorace quadricorni posterius producto trifido: laciniis lateralibus ante apicem clavatis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 264 *n.* 17.
Habitat in Cayenna, *parva.*

brasiliensis. 75. C. thorace bicorni albo punctato posterius producto abdomine longiori. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 8. *mant. inf.* 2. *p.* 264. *n.* 18.
Habitat in Brasilia.

** *non saltantes*, Manniferae, Tettigoniae Fabricii.

ciliaris. 8. C. alis posterioribus ferrugineo-fuscis: vittis longitudinalibus luteis, abdominis segmentis ciliatis. *Mus. Lud. Ulr.* 155.*
Rumpf amb. 3. *p.* 210. *t.* 135? Folium ambulans.
Habitat in America *australi et* India.

fornicata. 11. C. thorace virescente, abdomine fornicato. *Mus. Lud. Ulr.* 156. *
Habitat in America *australi et* India.

stridula. 12. C. elytris margine dilatato: punctis septem albis. *Mus. Lud. Ulr.* 157.*
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 320. *n.* 9. *mant. inf.* 2. *p.* 266. *n.* 13. Cicada villosa, elytris griseis, alis flavis: omnibus margine hyalino.
Drury inf. 2. *t.* 37. *f.* 2. Cicada catenata.
Habitat ad caput bonae spei.

cingulata. 76. C. thorace maculato, elytris hyalinis: costa maculaque fuscis, abdomine atro: fasciis flavis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 310. *n.* 10. *mant. inf.* 2. *p.* 266. *n.* 14.
Habitat in nova Seelandia.

villosa. 77. C. thorace fusco viridique variegato, pectore albo villoso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 320. *n.* 11. *mant. inf.* 2. *p.* 267. *n.* 15.
Habitat ad caput bonae spei, *minor, fronte viridi, utrinque atro-striata.*

cruentata. 78. C. thorace variegato, elytris hyalinis: costa flavescente, abdomine atro: fasciis sanguineis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 320. *n.* 12. *mant. inf.* 2. *p.* 267. *n.* 16.
Habitat in nova Hollandia.

79. C.

conſpurcata. 79. C. atra, elytris baſi flavo maculatis, ano flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.*320. *n.* 13. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 17.
Habitat in India.

capenſis. 13. C. alis inferioribus limbo poſteriore fuſceſcente palmato picto. *Muſ. Lud. Ulr.* 158.
Petiv. gaz. 7. *t.* 4. *f.* 1. Cicada capenſis variegata, marginibus tranſparentibus.
Habitat ad caput bonae ſpei.

haematodes. 14. C. nigra immaculata, abdominis inciſuris ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 320. *n.* 14. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 18. *Scop. ent. carn.* 347.
Petiv. gazoph. t. 15. *f.* 7.
Gron. zooph. 675.
Fueſſli inſ. helv. p. 24. *n.* 452.
Stoll cicad. t. 2. *f.* 11.
Habitat in Europa *magis auſtrali, mediae magnitudinis, gibboſa.*

plebeja. 15. C. ſcutelli apice bidentato, elytris anaſtomoſibus quatuor lineisque ſex ferrugineis. *Scop. entom. carn.* 345.
Mouff. inſ. 127.
Aldrov. inſ. 307.
Matthiol. Dioſc. 264.
Habitat in Italia, Africa, *maxima.*
Et cantu querulae rumpent arbuſta cicadae. Virgil.

orni. 16. C. elytris intra marginem tenuiorem punctis ſex concatenatis anaſtomoſibusque interioribus fuſcis. *Scop. ent. carn.* 346.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 320. *n.* 15. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 19. Cicada nigra flavo maculata, alis albis baſi flavis: maculis duabus nigris.
Reaum. inſ. 5. *t.* 5. *f.* 16-19.
Seb. muſ. 4. *t.* 85. *f.* 4. 5.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 25.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 65.
Schaeff. icon. t. 4. *f.* 14.
Habitat in Europa *auſtrali; larva eduli.*
Sole ſub ardenti reſonant arbuſta cicadis. Virgil.

repanda. 17. C. elytris linea flexuoſa, alis margine hyalino. *Muſ. Lud. Ulr.* 159.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 321. *n.* 16. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 20.

Degeer inf. 3. *p.* 219. *n.* 15. *t.* 33. *f.* 1. Cicada nigra.
Habitat in India.

reticulata. 18. C. grifea, thoracis linea alba, elytris albo reticulatis. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 321. *n.* 17. *mant. inf.* 2. *p.* 267. *n.* 21. *Degeer inf.* 3. *p.* 227. *n.* 24. *t.* 23. *f.* 15. 16. Cicada fuſco-teſtacea.
Habitat in America *meridionali.*

atrata. 80. C. atra alis albis baſi nigris: venis teſtaceis. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 321. *n.* 18. *mant. inf.* 2. *p.* 267. *n.* 22.
Habitat in Sina.

ſanguinea. 81. C. nigra, ore, thoracis maculis duabus abdomineque ſanguineis. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 321. *n.* 19. *mant. inf.* 2. *p.* 267. *n.* 24.
Degeer inf. 3. *p.* 221. *n.* 18. *t.* 33. *f.* 17. Cicada ſanguinea.
Habitat in Sina.

teſtacea. 82. C. nigra, abdomine ſanguineo, elytris alisque teſtaceis: venis nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 267. *n.* 23.
Stoll cicad. 1. *t.* 8. *f.* 41. C.
Habitat Tranquebariae, *mediae magnitudinis.*

ſplendidula. 83. C. elytris fuſco-aureis, tibiis anterioribus incraſſato-dentatis rufis. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 321. *n.* 20. *mant. inf.* 2. *p.* 267. *n.* 25.
Habitat in Sina.

muta. 84. C. elytris hyalinis: coſta ſanguinea, abdomine linea dorſali ſanguinea. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 322. *n.* 21. *mant. inf.* 2. *p.* 267. *n.* 26.
Habitat in nova Seelandia.

groſſa. 85. C. thorace viridi nigro ſublineato, alis albis poſterioribus macula baſeos flava. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 1. *mant. inf.* 2. *p.* 265. *n.* 1.
Habitat in Braſilia.

javana. 86. C. capite thoraceque nigris rufo maculatis, elytris nigris: faſcia abbreviata alba. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 265. *n.* 2. *Stoll cicad.* 1. *t.* 4. *f.* 17.
Habitat in Java, *magna.*

griſea. 87. C. griſea, elytris aqueis: margine poſteriori nigro punctato, coſta anterius alba. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 2. *mant. inf.* 2. *p.* 265. *n.* 3.
Habitat in inſulis Americae *oppoſitis.*

88. C.

limbata. 88. C. thoracis margine dilatato acuto, alis atris: margine albo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 265. *n.* 4. *Stoll cicad.* 1. *t.* 12. *f.* 57.
Habitat in America.

dilatata. 89. C. atra, thoracis margine dilatato, alis albidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 5.
Habitat in Jamaica.

biſpinoſa. 90. C. fuſca, thorace utrinque uniſpinoſo, elytris obſcuris: ſtriga maculari nigra. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 6.
Habitat in Sumatra, *magna.*

vaginata. 91. C. teſtacea, elytris albidis: coſta nigra. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 7.
Habitat in Sumatra, *magna.*

Tibicen. 19. C. elytris anaſtomoſibus ferrugineis, ſcutelli apice emarginato. *Muſ. Lud. Ulr.* 160.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 319. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 8. Tettigonia ſcutello emarginato, alarum coſta vireſcente.
Degeer inſ. 3. *p.* 212. *n.* 14. *t.* 22. *f.* 23. Cicada Lyricea.
Brown jam. 436. *t.* 43. *f.* 15. Panorpa.
Marcgr. braſil. 256. Gueruca Eremenbi.
Merian. inſ. ſurin. t. 49. Tibicen.
Seb. muſ. 4. *t.* 85. *f.* 9. 10.
Habitat in America, *thorace nunc nigro, nunc nigro brunneoque vario.*

ſeptendecim. 20. C. nigro vireſcens, elytris margine flaveſcente, capite utrinque octoſtriato.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 319. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 9. Tettigonia nigra, elytris albis, coſta flava.
Kalm act. Stockh. 1756. *p.* 101. Cicada maxilla utraque lineis octo transverſis concavis, alarum margine inferiore luteſcente.
Collinſ. act. angl. 1765. *p.* 65. *t.* 8.
Habitat in America.

catena. 92. C. thorace variegato, elytris hyalinis anterius nervis punctatis, poſterius ſtrigis duabus undatis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 7. *mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 10.
Habitat ad caput bonae ſpei.

pustulata. 93. C. atra, capite thoraceque rubro maculatis, elytris fuscis basi obscurioribus: venis testaceis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 266. *n.* 11.
Habitat in America *meridionali, magna.*

maculata. 94. C. atra, thorace elytris alisque flavo maculatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 8. *mant. inf.* 2. *p.* 266. *n.* 12.
Drury inf. 2. *t.* 37. *f.* 1.
Habitat in Siria.

violacea. 21. C. violacea, alis apice fuscis. *Mus. Lud. Ulr.* 162.*
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 322. *n.* 22. *mant. inf.* 2. *p.* 267. *n.* 27.
Fuessli inf. helv p. 24. *n.* 455.
Habitat in Europa *magis australi.*

querula. 95. C. capite thoraceque griseis: characteribus maculisque nigris. *Pallas it.* 2. *app. n.* 83.
Habitat in australibus circa fluvium Ural, *haematodi affinis.*

prasina. 96. C. dilute viridis, thoracis maculis fuscis inauratis. *Pallas it.* 2. *app. n.* 84.
Habitat in desertis magis australibus circa fluvios Ural *et* Irtis, *Junio frequens, querula minor.*

marginella. 97. C. pallida, thoracem inter et alas nigra: macula alba acuminata, thorace marginato. *Scop. entom. carn. p.* 116. *n.* 342.
Habitat in Carnioliae *salicetis.*

graminis. 98. C. elytris albidis: lineis tribus ocellisque duodecim. *Scop. ent. carn. p.* 116. *n.* 343.
Habitat in Carnioliae *gramine.*

notata. 99. C. pallide flavicans, elytris albidis nigro punctatis. *Scop. ent. carn. p.* 117. *n.* 344.
Habitat in Carnioliae *plantis variis.*

montana. 100. C. abdominis segmentis margine rubellis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 109. *n.* 108.
Habitat in Carnioliae *montanis circa* Idriam, *c. orni duplo minor.*

Schaefferi. 101. C. ex fusco lutea, elytris alisque flavo-fenestratis.
Schaeff. icon. 2. *t.* 121. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

*** an-

**** antennis filiformibus, sub oculis insertis.*
† rostri vagina porrecta, obtusa, superne canaliculata.
Cercopides Fabricii.

afra. 102. C. elytris fusco-griseis: macula marginali fulva cinereaque. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 328. *n.* 1. *mant. inf.* 2. *p.* 273. *n.* 1. Cercopis grossa.
Habitat in Africa *aequinoctiali, in hac tribu magna.*

atra. 103. C. atra, elytris utrinque vitta marginali sanguinea. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 273. *n.* 2.
Habitat in America *meridionali, magna.*

maculosa. 104. C. thorace atro: fascia fulva, elytris fulvis: maculis apiceque nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 329. *n.* 2. *mant. inf.* 2. *p.* 273. *n.* 3.
Habitat in Africa *aequinoctiali, statura afrae.*

quadrifasciata. 10. C. flava: fasciis quatuor fuscis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 329. *n.* 6. *mant. inf.* 2. *p.* 274. *n.* 9.
Degeer inf. 3. *p.* 225. *n.* 21. *t.* 33. *f.* 11. Cicada flava, fasciis quatuor transversis nigris.
Habitat in America *meridionali.*

bifasciata. 11. C. flavescens elytris fuscis: fasciis duabus albis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 330. *n.* 13. *mant. inf.* 2. *p.* 275. *n.* 20.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 706. *n.* 11. *Fn. suec.* 898.* *Fn. suec.* 1. *n.* 633. Cicada fusca, fasciis alarum binis albis.
Degeer inf. 3. *p.* 186. *n.* 6. *t.* 11. *f.* 25. Cicada trifasciata.
Habitat in Europae *borealis plantis.*

sanguinolenta. 22. C. atra, elytris maculis duabus fasciaque sanguineis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 329. *n.* 3. *mant. inf.* 2. *p.* 274. *n.* 4. *Scop. ent. carn.* 330.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 418. *t.* 8. *f.* 5. Cicada nigra, elytris maculis sex rubris.
Goeze Naturf. 6. *t.* 2.
Fuessli inf. Helv. p. 24. *n.* 456.
Habitat in Europae *salicibus et gramine.*

Schach. 105. C. nigra, elytris fuscis: fascia interrupta sanguinea. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 274. *n.* 5.
Habitat in America *septentrionali, statura sanguinolentae.*

23. C.

An huic etiam inserendae tanquam propriae species cicadae a Seba *musei vol.* 4. *delineatae, fusca t.* 85. *f.* 1. 2. *albo-guttata t.* 85. *f.* 3. 4. *scutata t.* 85. *f.* 7. 8. *et fusco-maculata t.* 85. *f.* 11. 12?

coleoptrata. 23. C. elytris totis coriaceis alas obtegentibus griseis fusco irroratis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 330. *n.* 9. *mant. inf.* 2. *p.* 274. *n.* 14.
Habitat in Germaniae *plantis, mediae magnitudinis, capite thoraceque flavescentibus, abdomine fusco.*

rustica. 106. C. grisea immaculata, alis albis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 330. *n.* 10. *mant. inf.* 2. *p.* 275. *n.* 15.
Habitat in Europae *plantis.*

gibba. 107. C. nigra, elytris albo maculatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 334. *n.* 11. *mant. inf.* 2. *p.* 275. *n.* 16.
Habitat in Daniae *nemoribus.*

biguttata. 108. C. nigra flavo-maculata, elytris fuscis: puncto marginali albo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 325. *n.* 22. *mant. inf.* 2. *p.* 275. *n.* 17.
Habitat in Germania, *statura leucophthalmae.*

kiloniensis. 109. C. flavescens, elytris obscuris: fascia maculisque duabus oppositis albidis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 275. *n.* 18.
Habitat Kilonii, *statura et magnitudine biguttatae.*

unifasciata. 110. C. cinerea, elytris fascia obliqua fusca. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 330. *n.* 12. *mant inf.* 2. *p.* 275. *n.* 19.
Habitat in agro Pedemontano, *gibba major.*

spumaria. 24. C. fusca, elytris maculis binis albis lateralibus: fascia duplici interrupta albida. *Fn. suec.* 881.* *Scop. ent. carn.* 331. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 329. *n.* 7. *mant. inf.* 2. *p.* 274. *n.* 10. *Fuessli inf. helv. n.* 450.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 415. *n.* 2. Cicada fascia duplici albida interrupta transversa.
Degeer inf. 3. *p.* 163. *n.* 1. *t.* 11. *f.* 1-21. Cicada spumaria graminis.
Degeer act. Stockh. 1741. *p.* 221. *t.* 7.
Reaumur act. paris. 1705. *p.* 162.
Ràj. inf. 67.
Swammerd. quart. p. 83.
bibl. 1. *p.* 215.
Merian. inf. 77. *t.* 51.
Petiv. gazoph. t. 61. *f.* 9.
Blanck. inf. 97. *t.* 11. *f.* N. O. P.
Frisch inf. 8. *p.* 26. *t.* 12.
Roes. inf. 2. *gryll. p.* 139. *t.* 23.

Sulz.

Sulz. inf. t. 10. *f.* 64.
Schaeff. elem. t. 42.
Habitat in Europae *plantis variis, frequens in* rosis, graminibus, salice *viminali, more plurium hujus et sequentis tribus ramis insidendo ano evacuans numerosas vesiculas, quasi spumam, intra quam latitat.*

aurea. 111. C. cinereo-aurea nitida immaculata. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 274. *n.* 11.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

hafniensis. 112. C. nigra, capite, thorace elytrorumque margine albis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 274. *n.* 12.
Habitat Hafniae, *statura spumariae.*

albifrons. 27. C. nigra, fronte alba. *Fn. suec.* 884.*
Habitat in Europa, *an hujus tribus?*

striata. 30. C. elytris albido nigroque ad angulum acutum suturae dorsalis striatis. *Fn. suec.* 887.*
Raj inf. 68. *n.* 1.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 424. *n.* 20.
Habitat in Europa, *an ex hac tribu.*

lineata. 31. C. flavescens, coleoptris striis tribus nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 330. *n.* 8. *mant. inf.* 2. *p.* 274. *n.* 13.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 709. *n.* 31? *Fn. suec.* 888? Cicada exalbida; linea utrinque longitudinali nigra.
Habitat in Europa, *mediae magnitudinis.*

populi. 32. C. subtus flavescens, fronte punctis duobus nigris, alis hyalinis. *Fn. suec.* 890.*
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 331. *n.* 14. *mant. inf.* 2. *p.* 275. *n.* 21. Cercopis nebulosa, vertice punctis duobus, abdomineque basi atris.
Habitat in Europae *borealis plantis.*

rubra. 45. C. alis deflexis fuscis: fasciis duabus flavis.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 329. *n.* 4. *mant. inf.* 2. *p.* 274. *n.* 6. Cercopis (cruentata) rufa, elytris nigris: fasciis duabus flavis.
Degeer inf. 3. *p.* 224. *n.* 20. *t.* 33. *f.* 8.
Stoll cicad. t. 2. *f.* 10. C.
Habitat in America *meridionali, alis inferioribus hyalinis immaculatis.*

113. C.

Carnifex. 113. C. ſanguinea, thorace macula, elytris faſciis duabus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 329. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 274. *n.* 7.
Habitat in nova Hollandia.

varia. 114. C. capite thoraceque vireſcentibus, elytris fuſcis: maculis duabus baſeos ſtrigaque poſteriore flavis. *Fabr. mant.* 2. *p.* 274. *n.* 8.
Habitat in Cayenna, *atra, abdomine rufo.*

lineolata. 208. C. elytris griſeis fuſco lineolatis: diſci litura transverſa. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 46.
Habitat in Europa.

guttata. 209. C. fuſca, elytris maculis lacteis. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 47.
Habitat in Europa.

unicolor. 210. C. pallida immaculata. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 48.
Habitat in Europa.

bicolor. 211. C. griſea, thorace ſupra ſanguineo. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 49.
Habitat in Europa.

punctulata. 212. C. fuſca, thorace anterius punctis impreſſis, elytris maculis duabus albis lateralibus. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 50.
Habitat in Europa.

leucoptera. 213. C. elytris albis: ſtriis fuſcis interruptis. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 51.
Habitat in Europa.

venoſa. 214. C. alis hyalinis albo venoſis: poſterius faſciis duabus fuſcis irregularibus. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 52.
Habitat in Europa.

nebuloſa. 215. C. alis albis luteo-nebuloſis. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 53.
Habitat in Europa.

†† *roſtri vagina breviſſima, membranacea, cylindrica, obtuſa*, Cicadae Fabricii.

† *ſaltatoriae*, Ranatrae.

perſpicillata. 115. C. atra, alis macula ocellari albo-hyalina, abdomine apice flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 322. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 1.
Stoll cicad. 1. *t.* 1. *f.* 5.
Habitat in India, *in hac tribu magna.*

116. C.

elongata. 116. C. thorace rubro flavo lineato, elytris longissimis nigro punctatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 324. *n.* 16. *mant. inf.* 2. *p.* 270. *n.* 22.
Habitat in nova Hollandia, *parva, gibba.*

cayennensis. 117. C. capite thoraceque fusco-aureis nigro variis, elytris hyalinis apice obscurioribus: macula aurea. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 269. *n.* 20.
Habitat in Cayenna, *fusca, femoribus posterioribus flavis, statura ferrugineae.*

aurulenta. 118. C. capite thoraceque rufis, elytris fuscis apice cinereis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 269. *n.* 19.
Habitat in Cayenna, *statura et magnitudine obtusae.*

obtusa. 119. C. nigra, elytris apice cinereo-hyalinis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 269. *n.* 18.
Habitat in Cayenna, *statura ferrugineae.*

ferruginea. 120. C. capite, thorace scutelloque nigro punctatis, elytris rufis, alis atris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 269. *n.* 17.
Habitat ad caput bonae spei, *mediae magnitudinis.*

nervosa. 25. C. fusca, alis hyalinis fusco maculatis: nervis punctatis. *Fn. suec.* 882.* *Scop. ent. carn.* 341. *Fuessli inf. Helv.* *p.* 24. *n.* 459.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 327. *n.* 35. *mant. inf.* 2. *p.* 272. *n.* 48. Cicada alis fuscis, nervis albo nigroque punctatis.
Degeer inf. 3. *p.* 182. *n.* 4. *t.* 12. *f.* 1. 2. Cicada nervoso-punctata.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 415. *n.* 1.
Habitat in Europae *plantis.*

variegata. 121. C. atra viridi variegata, alis hyalinis: punctis tribus costalibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 327. *n.* 36. *mant. inf.* 2. *p.* 272. *n.* 49.
Habitat in Germania.

lyncea. 122. C. fronte thoraceque glaucis: punctis quatuor ocellaribus nigris, elytris hyalinis: margine flavescente. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 327. *n.* 37. *mant. inf.* 2. *p.* 272. *n.* 50.
Habitat in India.

fulgida. 123. C. flava, elytris fusco-auratis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 327. *n.* 38. *mant. inf.* 2. *p.* 272. *n.* 51.
Habitat in Angliae *plantis.*

punctata. 124. C. elytris flavescentibus fusco punctatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 327. *n.* 39. *mant. inf.* 2. *p.* 272. *n.* 52.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 417. *n.* 4. Cicada fusco-pallida &c.
Habitat in Europae *nemoribus.*

leucophthalma. 26. C. nigra, oculis albis. *Fn. suec.* 883.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 325. *n.* 21. *mant. inf.* 2. *p.* 270. *n.* 28.
Habitat in Europae *borealis plantis.*

leucocephala. 28. C. nigra, capite albo. *Fn. suec.* 885.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 325. *n.* 23. *mant. inf.* 2. *p.* 270. *n.* 29.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 421. *n.* 13.
β) Schaeff. ic. t. 237. *f.* 6.
Habitat in Europae *plantis.*

lateralis. 29. C. nigra, elytris latere albis. *Fn. suec.* 886.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 324. *n.* 18. *mant. inf.* 2. *p.* 270. *n.* 24. *Fuessli inf. helv. p.* 24. *n.* 460.
Raj. inf. 68. 2. Locusta pulex fusca, utrinque in lateribus alarum arcu albicante.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 416. *n.* 3.
Habitat in Europae *pratis.*

bimaculata. 125. C. supra nigra, scutello elytrorum maculis duabus dorsalibus margineque exteriori flavescentibus. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 325. *n.* 19. *mant. inf.* 2. *p.* 270. *n.* 25.
Habitat in Brasilia.

fenestrata. 126. C. supra nigra, capite scutelloque flavis, elytrorum margine hyalino. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 325. *n.* 20. *mant. inf.* 2. *p.* 270. *n.* 26.
Habitat in insula Tahiti *oceani australis.*

flavipes. 127. C. nigra, capite pedibusque flavis, elytris apice hyalinis nigro striatis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 270. *n.* 27.
Habitat in insula Rotterdam *oceani australis*, *fenestratae proxime affinis.*

flavicollis. 33. C. fusca, capite thoraceque flavis. *Fn. suec.* 891.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 325. *n.* 25. *mant. inf.* 2. *p.* 271. *n.* 33. Cicada nigra, capitis margine posteriori thoraceque flavis.
Habitat in Europae *graminibus.*

flava. 34. C. flava unicolor. *Gron. zooph.* 681.
Habitat in Europa.

35. C.

interrupta. 35. C. elytris flavis: linea nigra duplici interrupta longitudinali. *Fn. ſuec.* 889.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 325. *n.* 24. *mant. inſ.* 2. *p.* 270. *n.* 30.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 419. *n.* 9.
Petiv. gazoph. t. 61. *f.* 10.
Degeer inſ. 3. *p.* 186. *n.* 7. *t.* 12. *f.* 6.
Fueſſli inſ. helv. p. 24. *n.* 462.
Habitat frequens in Europae *plantis.*

Hybneri. 128. C. pallida; capite thoraceque nigro punctatis, elytris lineatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 270. *n.* 31.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura interruptae.*

abbreviata. 129. C. flaveſcens, elytris cinereis: vitta abbreviata atra. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 271. *n.* 32.
Habitat Hafniae, *ſtatura interruptae.*

vittata. 36. C. flava: vitta ferruginea longitudinali duplici repando-dentata. *Fn. ſuec.* 889.* *Fueſſli inſ. helv. p.* 24. *n.* 463. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 324. *n.* 17. *mant. inſ.* 2. *p.* 270. *n.* 23.
Habitat in Europae *hortis.*

Lanio. 37. C. viridis, capite thoraceque carneis. *Fueſſli inſ. helv. p.* 24. *n.* 464. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 326. *n.* 27. *mant. inſ.* 2. *p.* 271. *n.* 38.
Habitat in Europae *plantis.*

ochromelas. 130. C. nigra, capite faſciis duabus flavis, elytris albo ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 271. *n.* 39.
Habitat in Kilonii *plantis*, *ſtatura viridis.*

ignita. 131. C. vireſcenti-nitidula, capite ſcutello abdomineque fulvis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 40.
Habitat in Cayenna, *parva.*

turca. 132. C. atra, abdomine flavo, alis apice fuſcis: lunula hyalina. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 326. *n.* 28. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 41.
Habitat in Europae *plantis.*

maura. 133. C. nigra, pectore abdomineque ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 326. *n.* 29. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 42.
Habitat in nova Hollandia.

nebuloſa. 134. C. nigra, elytris hyalinis baſi fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 326. *n.* 30. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 43.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *mediae magnitudinis.*

hyalina. 135. C. fusca, elytris fascia abbreviata margineque posteriori hyalinis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 326. *n.* 31. *mant. inf.* 2. *p.* 272. *n.* 44.
Fabr. syst. entom. p. 688. *n.* 1. Cercopis fenestrata.
Habitat in India.

pellucida. 136. C. grisea, elytris fascia media hyalina. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 326. *n.* 32. *mant. inf.* 2. *p.* 272. *n.* 45.
Habitat in nova Hollandia.

cynosbatos. 137. C. fusca, alis albo-hyalinis: margine fusco punctato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 327. *n.* 33. *mant. inf.* 2. *p.* 272. *n.* 46.
Habitat in Daniae *rosis.*

serratulae. 138. C. flava, elytris albis: puncto fasciisque duabus nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 327. *n.* 34. *mant. inf.* 2. *p.* 272. *n.* 47.
Habitat in Angliae *carduis.*

aptera. 38. C. aptera atra, elytris abbreviatis, tibiis antennisque pallidis. *Fn. suec.* 894.*
Habitat in Sudermania *ad* Akeroum, *pulicis magnitudine.*

tricolor. 139. C. elytris lacteis: punctis nigris, capite thoraceque virentibus. *Thunb. nov. act. Ups.* 4. *p.* 21. *n.* 36.
Habitat Upsaliae *frequens et* Lutatiis, *pediculo vix duplo major.*

reticulata. 140. C. elytris hyalinis fusco reticulatis, capite thoraceque albis nigro maculatis. *Thunb. nov. act. Ups.* 4. *p.* 21. *n.* 37.
Habitat Upsaliae, *interrupta paulo major.*

variabilis. 141. C. elytris fusco-flavescentibus: margine maculis duabus pallidis, capite thoraceque flavescentibus. *Thunb. nov. act. Ups.* 4. *p.* 22. *n.* 38.
Habitat frequens Upsaliae, *interrupta vix major, elytris nunc flavescentibus, nunc fusco flavoque variis, nunc fuscis.*

cincta. 142. C. elytris fuscis: margine maculis duabus albis, capite thoraceque fuscis. *Thunb. nov. act. Ups.* 4. *p.* 23. *n.* 39.
Habitat Upsaliae, *magnitudine nervosae, variabili sextuplo major.*

exclamationis. 143. C. elytris nigris: linea punctoque albis, capite thoraceque nigris. *Thunb. nov. act. Ups.* 4. *p.* 24. *n.* 40.
Habitat Upsaliae, *bifasciatae magnitudine, supra nigra, subtus flavescens.*

144. C

guttata. 144. C. fusco varia, capite thorace elytrisque ferrugineis: punctis flavis albisque, tergo coccineo. *Forst. nov. inf. sp.* 1. *p.* 68. *n.* 68.
Habitat in America *septentrionali, magnitudine spumariae, an ejusdem tribus?*

cruenta. 145. C. capite thorace alisque subfuscis, abdomine nigro, elytris ruberrimis apice flavis.
Drury inf. 2. *p.* 73. *t.* 38. *f.* 5. 6. Cicada sanguinea.
Habitat in Jamaica.

salicina. 146. C. grisea, pedibus rufo-testaceis.
Degeer inf. 3. *p.* 180. *n.* 2. Cicada spumaria salicis.
Habitat in salice, *an ad cercopides releganda?*

muscaeformis. 147. C. fronte quadrata, thorace brevissimo, scutello albido: punctis duobus impressis, alis fuscescentibus: basi fasciaque abrupta albis. *Schranck inf. austr. p.* 253. *n.* 482.
Habitat in Austria *superiore, infra* 3 *lineas longa.*

bicincta. 148. C. pallide fusca, capite thoraceque fascia albida. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 75. §. 26. *inf. austr. p.* 254. *n.* 483.
Habitat in Austria *superiori, infra* 3 *lineas longa.*

decimaquarta. 149. C. pallida, elytris numero 14 nigro notatis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 76. §. 28. *inf. austr. p.* 254. *n.* 485.
Habitat in Austria, *infra* 3 *lineas longa.*

quadrimaculata. 150. C. ferruginea, elytris ad marginem exteriorem maculis duabus albis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 77. §. 30. *inf. austr. p.* 254. *n.* 486.
Habitat Siennae austriae, $2\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

Schrankii. 151. C. fusca subtus flava, alis hyalinis: apice nervis nigris fenestratis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 74. §. 24. *inf. austr. p.* 255. *n.* 487.
Habitat in Austria *superiore,* $2\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

austriaca. 152. C. nigra, pedibus pallidis, oculorum basi alba, alis hyalinis: fasciis subtribus nigris. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 73. §. 23. *inf. austr. p.* 255. *n.* 488.
Habitat in Austria, $2\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

haemorrhousa. 153. C. nigra, thorace maculis duabus sanguineis. *Schranck inf. austr. p.* 256. *n.* 490.
Habitat in Austriae *arbustis, vix ultra* 2 *lineas longa.*

trilineata. 154 C. ferruginea, lineis tribus longitudinalibus nigris. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 75. §. 27. *inf. auſtr. p.* 258. *n.* 496.
Habitat in Auſtria *ſuperiore.*

erythrophthalma. 155. C. flaveſcens, oculis rubris, tibiis anterioribus nigro marginatis, alis hyalinis: lineolis obſcuriuſculis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 77. §. 31. *inf. auſtr. p.* 258. *n.* 498.
Habitat in Auſtria.

melanoſticta. 156. C. ſulphurea, capite punctis duobus, elytris maculis aliquot nigris: apice fuſco. *Schranck inf. auſtr. p.* 259. *n.* 499.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 426.
Habitat in Auſtria *ſuperiore et* Gallia, *ſeſquilineam longa.*

arunci. 157. C. tota ferruginea, oculis fuſcis. *Scop. ent. carn. p.* 113. *n.* 332.
Habitat in Spiraea Arunco.

marginalis. 158. C. fuſca, elytri margine externo pedibusque flaveſcentibus, corpore luteo. *Scop. ent. carn. p.* 113. *n.* 333.
Habitat in Carniolia.

bicordata. 159. C. elytris nigris: latere utroque et linea media, pedibusque flavis. *Scop. ent. carn. p.* 114. *n.* 334.
Habitat in Carnioliae *corylo, frontis macula media nigra, cujus apici utrique inſidet macula obcordata nigra.*

oenotherae. 160. C. flaveſcens, oculis nigris, elytris rivulis fuſcis. *Scop. ent. carn. p.* 114. *n.* 336.
Habitat in Carnioliae *oenothera bienni, ſpumans, ſpumaria major; an ex cercopidum tribu?*

carniolica. 161. C. nigricans, elytris margine omni lineolisque tribus longitudinalibus luteis. *Scop. ent. carn. p.* 114. *n.* 337.
Habitat in Carnioliae *fruticibus.*

pallida. 207. C. pallida thorace punctis ſex impreſſis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 419 *n.* 8.
Habitat in Gallia *et* Calabria.

biguttata. 216. C. nigra, thorace utrinque gutta ſanguinea. *Muſ. Lesk. p.* 116 *n.* 20.
Habitat in Europa.

217. C.

rivulosa. 217. C. testacea, elytris ferrugineo variis: rivulis transversis albis. *Mus. Lesk. p.* 116. *n.* 25.
Habitat in Europa.

strigosa. 218. C. scutello thoraceque transversim strigoso rufescentibus, elytris fusco, rufo cinereoque variis, ano setoso, pedibus posterioribus longis: tibiis spinis ciliatis. *Mus. Lesk. p.* 116. *n.* 26.
Habitat in Europa.

casta. 219. C. fusco-pallida immaculata. *Mus. Lesk. p.* 116. *n.* 28.
Habitat in Europa.

quadristriata. 220. C. elytris nervosis elevato-punctatis rugosis tibiarumque apice griseis, thorace depresso: striis quatuor longitudinalibus, pedibus anterioribus latis. *Mus. Lesk. p.* 116. *n.* 27.
Habitat in Europa.

lutea. 221. C. lutea, elytris ad scutelli margines albis. *Mus. Lesk. p.* 116. *n.* 29.
Habitat in Europa.

bipunctata. 222. C. flava, fronte punctis duobus fuscis, elytris albis luteo venosis. *Mus. Lesk. p.* 116. *n.* 30.
Habitat in Europa.

flavifrons. 223. C. lutea fronte flava: punctis duobus minimis nigris. *Mus. Lesk. p.* 116. *n.* 31.
Habitat in Europa.

reticulata. 224. C. flava, elytris albis luteo venosis. *Mus. Lesk. p.* 116. *n.* 32. 35.
Habitat in Europa.

lineolata. 225. C. fusca, elytris albidis fusco venosis: lineolis interruptis albis. *Mus. Lesk. p.* 116. *n.* 33.
Habitat in Europa.

virescens. 226. C. ex flavo virescens. *Mus. Lesk. p.* 116. *n.* 34.
Habitat in Europa.

lugubris. 227. C. elytris albis: margine interno posteriorique nigro, dorso interrupto. *Mus. Lesk. p.* 116. *n.* 36.
Habitat in Europa.

hyalina. 228. C. elytris hyalinis albo venosis. *Mus. Lesk. p.* 118. *n.* 37.
Habitat in Europa.

lactea. 229. C. pallida, alis lacteis. *Muſ. Lesk. p.* 118. *n.* 38.
Habitat in Europa.

denigrata. 230. C. flava, alis albis, abdomine ſupra nigro. *Muſ. Lesk. p.* 118. *n.* 39.
Habitat in Europa.

maculoſa. 231. C. fuſca, elytris albidis fuſco maculatis. *Muſ. Lesk. p.* 118. *n.* 40.
Habitat in Europa.

pallens. 232. C. aptera pallida. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 42.
Habitat in Europa.

†† *alis deflexis, latera obvolventibus*, Deflexae.

ocellata. 162. C. elytris compreſſis adſcendentibus viridibus: punctis ocellaribus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 322. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 2.
Degeer inſ. 3. *t.* 33. *f.* 2.
Habitat Tranquebariae.

aequinoctialis. 163. C. elytris deflexis viridibus: margine rubro; interiori baſi nigro punctato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 322. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 3.
Habitat in Africa *aequinoctiali, magna.*

marginata. 39. C. flava, elytris deflexis nigris: linea laterali alba. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 322. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 4.
Habitat in America, *lateralis magnitudine, alis pallidis.*

phalaenoides. 40. C. exalbida, alis patulis, elytris anterius nigro punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 323. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 5.
Degeer inſ. 3. *p.* 222. *n.* 19. *t.* 33. *f.* 6. Cicada flava, alis ampliſſimis deflexis albidis nigro punctatis.
Sulz. hiſt. inſ. t. 9. *f.* 10.
Stoll cicad. t. 2. *f.* 9.
Habitat in America *meridionali, hemerobio perlae ſimilis.*

bipunctata. 41. C. exalbida, elytris deflexis griſeis, thoracis margine anteriori punctis duobus impreſſis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 323. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 6.
Habitat in America *meridionali, cornutae magnitudine.*

retuſa. 164. C. exalbida immaculata, capite anterius retuſo. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 7.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine marginatae.*

165. C.

grisea. 165. C. grisea, elytris deflexis, capite apice puncto nigro. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 323. *n.* 7. *mant. inf.* 2. *p.* 268. *n.* 8.
Habitat in insulis Americae *meridionali oppositis.*

tripunctata. 166. C. elytris deflexis viridibus: punctis tribus albidis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 323. *n.* 8. *mant. inf.* 2. *p.* 268. *n* 9.
Habitat in America *meridionali, viridis, vivida major.*

vivida. 167. C. viridis, elytris deflexis, alis albis, fronte conica. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 323. *n.* 9. *mant. inf.* 2. *p.* 268. *n.* 10.
Habitat in insulis, Americae *meridionali oppositis, in* nova *quoque* Hollandia.

minuta. 168. C. elytris deflexis viridibus: dorso scabro, capitis margine posteriori thoraceque linea dorsali sanguinea. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 323. *n.* 10. *mant. inf.* 2. *p.* 268. *n.* 11.
Habitat in nova Hollandia.

lanata. 42. C. alis nigris: punctis caeruleis, fronte lateribusque rubris, ano lanato. *Mus. Lud. Ulr.* 163.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 324. *n.* 12. *mant. inf.* 2. *p.* 268. *n.* 13.
Sulz. hist. inf. t. 9. *f.* 11.
Drury inf. 2. *t.* 37. *f.* 11.
Stoll cicad. 1. *t.* 10. *f.* D. 49.
Habitat in America *australi et* India, *nigricans, oculis spinosis.*

tomentosa. 169. C. elytris deflexis viridibus fulvo subfasciatis, alis albis: fasciis duabus atris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 324. *n.* 13. *mant. inf.* 2. *p.* 269. *n.* 14.
Habitat in India.

barbata. 170. C. fusca, abdomine virescente, ano lanato niveo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 324. *n.* 14. *mant. inf.* 2. *p.* 269. *n.* 15.
Habitat in India.

atrata. 171. C. atra, thorace maculis quatuor griseis, abdominis margine flavo: punctis niveis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 269. *n.* 16.
Habitat in Cayenna, *statura et magnitudine lanatae, antennis testaceis, genubus flavis.*

villosa. 172. C. viridis, elytris deflexis exalbidis, ano lanato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 324. *n.* 15. *mant. inf.* 2. *p.* 270. *n.* 21.
Habitat in America *meridionali.*

leporina. 43. C. alis exalbidis: anterius anaſtomoſibus pallidis ſupra lineolam nigricantem, ano lanato. *Fn. ſuec.* 895.*
Habitat in Europa.

cunicularia. 44. C. alis hyalinis: ſtriga faſcia punctisque fuſcis, ano lanato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 323. *n.* 11. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 12.
Habitat in India, *fronte ovata ferruginea.*

viridis. 46. C. elytris viridibus, capite flavo: punctis nigris. *Fn. ſuec.* 896. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 417. *n.* 5. *Fueſſli inſ. helv. p.* 24. *n.* 465. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 326. *n.* 26. *mant. inſ.* 2. *p.* 271. *n.* 34.
Raj. inſ. p. 68. *n.* 3. Locuſta pulex paulo minor.
Petiv. gaz. 73. *t.* 76. *f.* 6. Ranatra viridescens.
Habitat in Europa, *elytris rarius caeruleſcentibus.*

laeta. 173. C. ſupra nigra nitida: punctis caeruleſcentibus. *Fabr. mant.* 2. *p.* 271. *n.* 34.
Habitat in Cayenna, *viridi minor, ſubtus flaveſcens, ano coccineo.*

quadriguttata. 174. C. elytris rufeſcentibus: maculis duabus viridibus apice hyalinis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 271. *n.* 36.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis, ſubtus flaveſcens.*

marginella. 175. C. nigra, capitis thoracis elytrorumque margine coccineis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 271. *n.* 37.
Habitat in Cayenna, *parva.*

compreſſa. 47. C. flava compreſſa. *Fn. ſuec.* 897.*
Habitat in Europa.

aurata. 48. C. flava, elytris fulvo pictis: maculis quatuor nigris poſteriusque auratis. *Fn. ſuec.* 899.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 328. *n.* 41. *mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 55. *Fueſſli inſ. helv. p.* 24. *n.* 466.
Habitat in Europae *magis borealis plantis.*

ulmi. 49. C. alis viridi luteis: apicibus nigricantibus inauratis. *Fn. ſuec.* 900.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 328. *n.* 42. *mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 56. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 427. *n.* 27.
Degeer inſ. 3. *p.* 189. *n.* 8. Cicada muſciformis ulmi.
Habitat in Europae *ulmis.*

nitidula. 176. C. elytris pallide auratis albo nigroque punctatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 57.
Habitat Halae Saxonum, *parva, flava.*

177. C.

cuſpidata. 177. C. griſea, capite depreſſo plano apice fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 328. *n.* 43. *mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 58.
Habitat in Angliae *plantis.*

quercus. 178. C. flaveſcens, elytris ſanguineo apice fuſco maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 328. *n.* 44. *mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 59.
Habitat in quercu.

roſae. 50. C. flava, alis albis apice fuſco ſtriatis. *Fn. ſuec.* 902.* *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 428. *n.* 28. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 327. *n.* 40. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 53.
Fueſſli inſ. helv. p. 24. *n.* 467.
Degeer inſ. 3. *p.* 103. *n.* 9. Cicada muſciformis roſae.
Reaum. inſ. 5. *t.* 20. *f.* 10-14.
Friſch inſ. 11. *p.* 13. *t.* 20.
Habitat in roſae *foliis.*

fuſcata. 179. C. griſea, elytris punctis apiceque fuſcis, alis albis apice fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 54.
Habitat in Europa, *ſtatura et magnitudine C. roſae.*

coryli. 51. C. alis fuſcis convolutis: faſcia albida pone maculam cordatam caeruleſcentem. *Fn. ſuec.* 901.*
Habitat in corylo.

coccinea. 180. C. flava, capite thorace ſcutello tergo elytrisque coccineis, elytris lineis duabus longitudinalibus obliquis virentibus. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 69. *n.* 69.
Habitat in America *ſeptentrionali, compreſſae circiter magnitudine.*

americana. 181. C. elytris maculatis, ano lanato.
Habitat in America, *an vere diſtincta a* 42, 169-172 *ſpecies?*

albida. 182. C. albida, elytris nigro punctatis.
Habitat in America; *an diſtincta a* 42, 169-172 *ſpecies?*

globuliſera. 183. C. atra, capite conico in ſpinam longiſſimam deſinente: pedunculis quatuor globuliferis. *Pall. miſcell. zool. p.* 187. *ſpicil. zool.* IX. *p.* 22. *t.* 1. *f.* 12. D. E. F.
Habitat - - - - pediculo duplo vel triplo major.

erythroptera. 184. C. fuſca, capite flavicante, elytris rubris: ſtrigis quatuor nigris. *Lepechin it.* 2. *p.* 209. *t.* 11. *f.* 24.
Habitat in Sibiria.

nitens. 185. C. griseo-viridis, alis hyalinis nitidissimis, femoribus anterioribus tridentatis. *Degeer inf.* 3. *p.* 220. *n.* 17. *t.* 33. *f.* 4.
Habitat in Surinamo, 11 *lineas longa.*

collaris. 186. C. flavo-fulva, thorace fascia rubra pallida, antennis longioribus. *Degeer inf.* 3. *p.* 226. *n.* 22. *t.* 33. *f.* 12.
Habitat in Surinamo, *muscae minoris magnitudine.*

melanoptera. 187. C. fusca: utrinque linea laterali flava, alis nigris. *Degeer inf.* 3. *p.* 226. *n.* 23. *t.* 23. *f.* 14.
Habitat in Surinamo, *statura et magnitudine collaris.*

gibberula. 188. C. fusco-viridis reticulata, alarum basi dilatata. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 418. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

sexpunctata. 189. C. flavescens, thorace punctis sex impressis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 429. *n.* 8.
Habitat in Gallia.

crocata. 190. C. nigra, thorace elytrisque fascia crocea. *Geoffr. inf. par.* 3. *p.* 422. *n.* 16.
Habitat in Gallia.

castaneae. 191. C. tota nigra. *Geoffr. inf. par.* 3. *p.* 422. *n.* 15.
Habitat in Galliae *castanea.*

tristriata. 192. C. fusca, elytris albidis: fasciis tribus transversis fuscis. *Geoffr. inf. par.* 3. *p.* 425. *n.* 21.
Habitat in Gallia.

bistriata. 193. C. flava, elytrorum fasciis duabus transversis fuscis. *Geoffr. inf. par.* 3. *p.* 425. *n.* 22.
Habitat in Gallia.

tripunctata. 194. C. viridi-flava, elytris punctis tribus nigris apice fuscis. *Geoffr. inf. par.* 3. *p.* 426. *n.* 25.
Habitat in Gallia.

geographica. 195. C. viridis, elytris maculis plurimis fuscis ovatis. *Geoffr. inf. par.* 3. *p.* 427. *n.* 26.
Habitat in Gallia.

squalida. 196. C. fusca elytris nebulosis: nervis albidis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 102. *n.* 1152. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 422. *n.* 14.
Habitat in Europa.

197. C.

quadrinotata. 197. C. nigricans, thorace bipunctato, elytris totis coriaceis: fascia duplici interrupta alba. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 102. *n.* 1149.
Habitat in Dania.

pallescens. 198. C. elytris abbreviatis striatis fusco maculatis, alis albis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 102. *n.* 1150.
Habitat in Dania.

fusca. 199. C. flavescens, elytris fuscis nervosis, oculis nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 102. *n.* 1151.
Habitat in Dania.

pusilla. 200. C. pallida, alis membranaceis albis: punctis raris nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103. *n.* 1163.
Habitat in Dania, *adeo exilis, ut saliens tantum oculis percipiatur.*

diaphana. 201. C. luteo-alba, oculis cinereis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103. *n.* 1169.
Habitat in Dania.

arvensis. 202. C. lutea, fronte, abdomine subtus, lateribusque nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103, *n.* 1170.
Habitat in Daniae *arvis.*

neuroptera. 203. C. flavescens, alis hyalinis nervosis: maculis subfulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103. *n.* 1171.
Habitat in Dania.

cancellata. 204. C. lutea, scutello tripunctato apice fusco, alis albis reticulatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103. *n.* 1172.
Habitat in Dania.

glabra. 205. C. fusca, thorace nigro, elytris politis fulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103. *n.* 1173.
Habitat in Dania.

amphibia. 206. C. antennis crassis elevatis, alis nullis, pedibus posterioribus natatoriis. *Pontopp. Naturg. Daennem. p.* 214. *n.* 13. *t.* 16. a. b. *atl. dan.* 1. *t.* 29.
Müll. zool. dan. prodr. p. 103.
Habitat in Dania, *magnitudine pulicis, feminae abdomine ensifero; an hujus generis?*

224. NO-

224. NOTONECTA.

Rostrum inflexum.
Antennae thorace breviores.
Alae quatuor cruciato-complicatae, anterius coriaceae.
Pedes posteriores pilosi, natatorii.

* *labio elongato.*

glauca. 1. N. elytris griseis margine fusco punctatis apice bifidis. *Fn. suec.* 903.* *Scop ent. carn.* 348 *Fuessli inf. helv. p.* 24. *n.* 468. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 331. *n.* 1. *mant. inf.* 2. *p.* 275. *n.* 1.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 476. *n.* 1. *t.* 9. *f.* 6. Notonecta capite luteo &c.
Degeer inf. 3. *p.* 382. *n.* 5. *t.* 18. *f.* 16. 17. Nepa notonecta.
Petiv. gazoph. t. 72. *f.* 6. Notonecta vulgaris nigro pallidoque mixta.
Raj. inf. 58. Cicada aquatica Mouffeti.
Bradl. nat. t. 26. *f.* 2. E.
Hufn. inf. t. 12. *f.* 19.
Frisch inf. 6. *p.* 28. *t.* 13.
Roes. inf. 3. *app.* 1. *p.* 165. *t.* 27.
Pod. inf. t. 1. *f.* 5.
Sulz. inf. t. 10. *f.* 67.
Schaeff. elem. t. 90.
icon. t. 33. *f.* 5. 6.
Stoll cimic. 2. *t.* 12. *f.* IX. X.
Habitat in Europae *aquis, piscibus molesta.*

americana. 4. N. grisea, posterius nigra, scutello atro, utrinque puncto basceos flavo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 331. *n.* 2. *mant. inf.* 2. *p.* 275. *n.* 2.
Habitat in Americae *aquis.*

5. N.

Notonectae *et* Nepae *sub aquis degunt, animalculis aquaticis victitantes; larva et puppa hexapus, agilis, natans imagini simillima, haec cum alarum rudimentis, illa aptera.*

nivea. 5. N. elytris albis immaculatis apice rotundatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 332. *n.* 3. *mant. inf.* 2. *p.* 275. *n.* 3.
Habitat in India.

minutissima. 3. N. grisea, capite fusco elytris truncatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 332. *n.* 4. *mant. inf.* 2. *p.* 275. *n.* 4.
Syst nat. XII. 2. *p.* 713. *n.* 3. *Fn. suec* 905. Notonecta elytris cinereis maculis fuscis longitudinalibus.
Fn. suec. 1. *n.* 690. Notonecta arenulae magnitudinis.
Geoffr. inf. par. 1. p. 477. *n.* 2. Notonecta cinerea anelytra.
Fuessli inf. helv. p. 24. *n.* 470.
Habitat in Europae *aquis.*

minuta. 6. N. capite flavo, thorace elytrisque viridibus: lineis transversis fuscis. *Sulz. hist. inf. p.* 91. *t.* 10. *f.* 1.
Habitat in Europae *aquis.*

noveboracensis. 7. N. flavescens, elytris concoloribus: maculis tribus nebulosis fuscis longitudinalibus. *Forst. nov. inf. spec.* 1. *p.* 70. *n.* 70.
Habitat in Noveboraco.

octopunctata. 8. N. capite flavo, thorace subfusco, scutello nigro: punctis quinque albis, elytris fuscis: margine albo; punctis quatuor atris.
Schaeff. ic. t. 97. *f.* 1.
Habitat in Germania, *magnitudine striatae.*

indica. 9. N. glauca, elytris apice nigris. *Mant.* 2. *p.* 534.
Habitat in India.

atomaria. 10. N. alba, supra elytrisque pallide griseis, alis lacteolis. *Pall. it.* 1. *app. n.* 55.
Habitat in fluento Russiae Volchova *ad* Novogrodium, *pediculi magnitudine.*

lutea. 11. N. elytris albidis: striga marginali nigra. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103. *n.* 1175.
Habitat in Daniae *aquis.*

marginata. 12. N. elytris nigris: margine suturaque luteis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 104. *n.* 1176.
Habitat in Dania. *De his* 6-12 *dubium, utrum huic, an sequenti tribui accensendae.*

** la-

** *labio nullo*, Sigarae Fabricii.

lineata. 13. N. elytris fuſcis: lineis duabus abbreviatis flavis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 276. *n.* 1.
Habitat in Cayenna, *ſtatura ſtriatae, at paulo major.*

ſtriata. 2. N. elytris fuſcis: lineolis transverſis undulatis numeroſiſſimis fuſcis. *Fn. ſuec.* 904.* *Scop. ent. carn.* 349. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 332. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 276. *n.* 2.
Petiv. gazoph. t. 72. *f.* 7. Notonecta vulgaris compreſſa fuſca.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 478. *n.* 1. *t.* 9. *f.* 7. Corixa.
Degeer inſ. 3. *p.* 389. *n.* 6. *t.* 20. *f.* 1. 2. Nepa ſtriata.
Joblot microſc. 1. *p.* 1. *t.* 7. *f.* 2. 3.
Roeſ. inſ. 3. *app.* 1. *p.* 177. *t.* 29.
Schaeff. elem. t. 50.
icon. t. 97. *f.* 2.
Stoll cimic. 2. *t.* 15. *f.* XIII. B.
Habitat in Europae *aquis frequens, magnitudine varians.*

coleoptrata. 14. N. elytris totis coriaceis fuſcis: margine exteriori flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 332. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 276. *n.* 3.
Habitat in Kilonii *aquis.*

225. NEPA. *Roſtrum* inflexum.

Antennae breves.

Alae quatuor cruciato-complicatae: anterius coriaceae.

Pedes anteriores cheliformes; reliqui quatuor ambulatorii.

* *antennis palmato-diviſis, labio nullo.*

grandis. 1. N. ecaudata teſtacea flavo maculata. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 332. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 276. *n.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 713. *n.* 1. *Muſ. Lud. Ulr.* 164.* *Gron. zooph.* 685. Nepa teſtacea ſcutello laevi, alis albis maculis venisque flavis.
Degeer inſ. 3. *p.* 379. *n.* 4. Nepa ſurinamenſis.
Marcgr. braſ. 250. *f.* 259. Insectum magnitudine bruſci.
Merian. inſ. ſurin. t. 56.
Roeſ. inſ. 3. *app.* 1. *t.* 26.
Habitat in Americae *aquis.*

2. N.

rubra. 2. N. fusca, abdomine supra alarumque nervis rubris. *Mus. Lud. Ulr.* 165.*
Fabr. mant. inf. 2. *p.* 277. *n.* 6. Nepa cauda biseta corpore ovato, cauda corpore longiore.
Stoll cimic. 2. *t.* 7. *f.* V. Scorpio aquaticus.
Habitat Tranquebariae.

annulata. 8. N. ecaudata subrotunda, pallide fusca, tibiis anterioribus pallidis fusco annulatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 333. *n.* 2. *mant. inf.* 2. *p.* 276. *n.* 2.
Habitat in Coromandel, *congeneribus latior, magis rotundata.*

rustica. 9. N. ecaudata fusca, thoracis elytrorumque margine anteriore albido. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 333. *n.* 3. *mant. inf.* 2. *p.* 276. *n.* 3.
Sulz. hist. inf. t. 10. *f.* 2. Nepa plana.
Stoll cimic. 2. *t.* 7. *f.* VI.

fusca. 3. N. fusca, cauda biseta, scutello rugoso, alis niveis. *Mus. Lud. Ulr.* 166.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 333. *n.* 4. *mant. inf.* 2. *p.* 277. *n.* 4.
Stoll cimic. 2. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat in Indiae *aquis, cauda corporis longitudine.*

grossa. 10. N. cauda biseta, corporis ovati longitudine. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 277. *n.* 5.
Habitat in Sina, *rubra major, cinerea, abdomine supra rubro, medio nigro, ano cinereo.*

atra. 4. N. atra thorace inaequali, corpore oblongo.
Habitat in Africa, *cinereae simillima, at duplo major et duplo longior.*

cinerea. 5. N. cinerea, thorace inaequali, corpore oblongo ovato. *Fn. suec.* 906. *Scop. ent. carn.* 350. *Fuessli inf. helv. p.* 24. *n.* 471.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 333. *n.* 5. *mant. inf.* 2. *p.* 277. *n.* 6. Nepa cauda biseta, corpore ovato.
Fn. suec. 1. *n.* 691. Nepa abdominis margine integro.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 481. *n.* 2. Nepa corpore ovato.
Degeer inf. 3. *p.* 361. *n.* 1. *t.* 18. *f.* 1. Nepa Scorpio aquaticus.
Mouff. inf. 321. Scorpio palustris.
Raj. inf. 58. Scorpio palustris ad cimices referenda.
Jonst. inf. t. 25. *f.* 1. 2. Scorpiones aquatici.

Pet.

Pet. gazoph. t. 74. *f.* 4. Scorpio vulgaris aquaticus.
Bauh. ballon. 212. *f.* 2. Araneus aquaticus.
Swammerd. bibl. 1. *t.* 3. *f.* 4.
Bradl. natur. t. 26. *f.* 2. C.
Frisch inf. 7. *t.* 15.
Hufn. inf. t. 11. *f.* 2.
Roef. inf. 3. *app.* 1. *p.* 136. *t.* 22. *f.* 6-8.
Sulz. inf. t. 10. *f.* 68.
Schaeff. elem. t. 69.
icon. t. 33. *f.* 7. 9.
Stoll cimic. t. 1. *f.* 11. a.
Habitat in Europae *aquis, abdomine supra rubro, antennis palmato-bifidis.*

maculata. 11. N. nigra, thorace scutelloque ferrugineo maculatis, alis nigris, cauda bifeta. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 334. *n.* 6. *mant. inf.* 2. *p.* 227. *n.* 8.
Habitat in Indiae *aquis.*

linearis. 7. N. linearis, manibus spina laterali pollicatis. *Fn. suec.* 908. *Gron. zooph.* 683.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 334. *n.* 7. *mant. inf.* 2. *p.* 277. *n.* 9. Nepa cauda bifeta corpore lineari.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 480. *t.* 10. *f.* 1. Nepa corpore lineari.
Degeer inf. 3. *p.* 369. *n.* 2. *t.* 19. *f.* 1. 2. *Fuessli inf. helv. p.* 25. *n.* 473. Nepa linearis.
Raj. inf. 59. Locusta aquatica Mouffeti.
Swammerd. bibl. nat. 1. *p.* 233. *t.* 3. *f.* 9.
Frisch inf. 7. *p.* 24. *t.* 16.
Roef. inf. 3. *app.* 1. *p.* 141. *t.* 23.
Sulz. hist. inf. t. 10. *f.* 4.
Schaeff. ic. t. 5. *f.* 5. 6.
Habitat in Europae *et* Indiae *aquis.*

** *labio porrecto rotundato,* Naucorides Fabricii.

cimicoides. 6. N. abdominis margine serrato. *Fn. suec.* 907. *Gron. zooph.* 686. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 474. *n.* 1. *t.* 9. *f.* 5. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 334. *n.* 1. *mant. inf.* 2. *g.* 277. *n.* 1. *Fuessli inf. helv. p.* 24. *n.* 472.
Degeer inf. 3. *p.* 375. *n.* 3. *t.* 19. *f.* 8. 9. Nepa Naucoris.
Frisch inf. 6. *p.* 31. *t.* 14. Cimex aquaticus latior.
Roef. inf. 3. *app.* 1. *p.* 176. *t.* 28.
Sulz. hist. inf. t. 10. *f.* 3.
Schaeff. elem. t. 87.

Schaeff.

Schaeff. icon. t. 33. *f.* 3. 4.
Stoll cimic. 2. *t.* 12. *f.* VIII. C. B.
β) Naucoris ſutura integra. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 62.
Habitat in Europae *aquis.*

antiguen-ſis. 12. N. abdominis margine integro.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 335. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 277. *n.* 2.
Naucoris nepaeformis.
Habitat in inſula Antigua.

226. CIMEX.

Roſtrum inflexum.
Antennae thorace longiores.
Alae quatuor cruciato-complicatae: ſuperioribus anterius coriaceis.
Dorſum planum: thorace marginato.
Pedes curſorii.

* *antennis ante oculos inſertis.*
† *labio nullo*, Acanthiae Fabricii.
⊤ *apteri.*

lectularius. 1. C. apterus. *Fn. ſuec.* 909. *Scop. ent. carn.* 354. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 434. *n.* 1. *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 474. *Degeer inſ.* 3. *t.* 17. *f.* 9. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 335. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 1.
Mouff. inſ. 269. *f. ſuperiores.* Cimex domeſticus.
Bonann. microſc. t. 65.
Aldr. inſ. 534.
Jonſt. inſ. 89.
Raj. inſ. 7.
Ledermüll. microſc. t. 52. 63.
Sonthall tr. of Buggs. Lond. 1730. *oct.*
Sulz. inſ. t. 10. *f.* 69.
Stoll cimic. 2. *t.* 19. *f.* 131.
Habitat in Europae *domibus*, *exoticus*, *ante epocham ſalutarem jam in* Europa, *vix ante* 1670. *in* Anglia, *nocturnus*, *foetens*, *ſanguiſugus*, *rarius*, *aliquando tamen*, *teſtibus* Scopolio *et* Hermanno, *alatus*, *vivus facile occidendus*, *nidore carbonum*, *terebinthinae oleo accenſo*, *mentha arvenſi*, *lepidio ruderali*, *myrica*, *geranio robertiano*,

agarico muſcario, cimicifuga, cannabis ſeminibus herbaque, opuli baccis, ledo paluſtri, tabaci oleo, capſici fumo, plumbaginis europaeae infuſo, acoro paluſtri, melolontheo oleo infuſo, meduſa, cimice perſonato, formicis rubris pellendus.

TT *elytris fere totis coriaceis*, coleoptrati.

Zoſterae. 122. C. niger, elytris abdomine longioribus apice hyalino ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 335. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 2.
Fabr. it. norw. Acanthia pellucens.
Habitat ad littora maris, *velociſſime ſupra fucos zoſteramque decurrens*, Kilonii *frequens.*

ater. 123. C. ater nitidus, elytris apice palleſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 3.
Habitat Kilonii, *c. zoſterae duplo minor.*

grylloides. 13. C. apterus niger, elytris ovatis margine luteis abdomine brevioribus. *Fn. ſuec.* 910.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 335. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 4. Acanthia (coriacea) aptera, elytris coriaceis nigro-griſeis.
Habitat in Europa, *thorace gryllum referens.*

clavipes. 124. C. apterus niger, pedibus piceis: femoribus anterioribus incraſſatis dentatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 5.
Habitat Tranquebariae, *magnitudine c. zoſterae.*

pedemontanus. 125. C. apterus, elytris connatis abbreviatis cinereis, ano ſetoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 336. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 6.
Habitat in agro Pedemontano, *parvus, totus cinereus.*

littoralis. 14. C. elytris ſordidis albo punctatis, alis abbreviatis, corpore nigro. *Fn. ſuec.* 914. 915.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 336. *n.* 7. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 12.
Degeer inſ. 3 *p.* 278. *n.* 21. *t.* 14. *f.* 17. 18. Cimex ovatus nigricans.
Habitat in Europae *littoribus.*

15. C.

Cimices *plurimi foetent, omnes, reduviis exceptis, plantarum, omnes animalium, praeſertim inſectorum molliorum ſucco victitant, quem, volatilium more, roſtro ſugunt; larva et puppa hexapus, agilis, obambulat, imagini ſimillima, illa aptera, haec alarum rudimentis inſtructa.*

rugosus. 15. C. elytris pallidis, corpore oblongo, femoribus anterioribus crassissimis. *Fn. suec.* 916. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 336. *n.* 8 *mant. inf.* 2. *p.* 279. *n.* 13.
Habitat in Europa *boreali.*

lunatus. 126. C. thorace lunato: margine prominente, abdomine serrato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 337. *n.* 9. *mant. inf.* 2. *p.* 279. *n.* 14
Stoll cimic. 2. *t.* 13. *f.* 84.
Habitat in America *australi et* India.

clavicornis. 16. C. elytris nervoso-carinatis reticulato-punctatis, antennis clavatis. *Fn. suec.* 911.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 336. *n.* 5. *mant. inf.* 2. *p.* 278. *n.* 7. *Fuessli inf. helv. p.* 25. *n.* 480.
Reaum. inf. 3. *t.* 34. *f.* 1-4.
Geoffr. inf. par. 1 *p.* 461. *n.* 56.
Habitat in Europae *hortis.*

serratulae. 127. C. niger, elytris pallescentibus, alis apice fuscis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 336. *n.* 6. *mant. inf.* 2. *p.* 278. *n.* 9.
Habitat in Angliae serratulis.

lavaterae. 128. C. niger, elytris abdomineque basi rufis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p* 278. *n.* 8.
Habitat in Barbariae *lavateris, parvus in hac tribu.*

fasciatus. 129. C. ater, elytris pallescentibus: fasciis duabus abbreviatis nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 278. *n.* 10.
Habitat Kilonii, *parvus, nitidus.*

Mülleri. 130. C. niger, pedibus fulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 105. *n.* 1188
Habitat in Dania.

maculatus. 131. C. fuscus, thorace albo trimaculato, abdomine subtus albo: margine nigro-punctato. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 279. *n.* 11.
Habitat Tranquebariae, *parvus.*

TTT *membranacei et valde depressi.*

corticalis. 17. C. abdominis margine imbricatim secto, corpore nigro. *Fn. suec.* 917. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 337. *n.* 10. *mant. inf.* 2. *p.* 279. *n.* 15.
Schaeff. ic. t. 51. *f.* 6. 7.
Habitat in Europae *arboribus silvaticis.*

paradoxus. 132. C. thorace abdomineque lobatis ciliato-ſpinoſis. *Sparrm. act. Stockh.* 1777. *p.* 234. *t.* 6. *f.* A. B. C. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 510. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 16.

Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura corticalis, folia decidua emortua aemulans.*

laevis. 133. C. niger, abdomine laevi brunneo, alis pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 337. *n.* 11. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 17.

Habitat in Anglia.

betulae. 18. C. thorace denticulato, capite muricato, elytris anterius dilatatis. *Fn. ſuec.* 918. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 337. *n.* 12. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 18.

Degeer inſ. 3. *p.* 305. *n.* 36. *t.* 15. *f.* 16. 17. Cimex depreſſus betulae.

Habitat in Europae *borealis betula alba.*

craſſipes. 134. C. abdomine incraſſato fuſco: apice flaveſcente, tibiis anterioribus incraſſatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 337. *n.* 13. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 19.

Habitat Dresdae.

croſus. 19. C. abdomine flavo: faſcia nigra, thoracis margine ſinuato, tibiis anterioribus incraſſatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 337. *n.* 14. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 20.

Degeer inſ. 3. *p.* 350. *n.* 25. *t.* 35. *f.* 13. 14. Cimex Scorpio.

Habitat in America *meridionali.*

niger. 585. C. niger, thorace ferrugineo marginato conico: apice truncato, elytris abdomine dimidio brevioribus margine externo ferrugineis, abdomine ſupra albo maculato: lobis utrinque ſex ferrugineis, totidemque ſubtus paribus guttarum albarum. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 66. b.

Habitat extra Europam.

umbraculatus. 135. C. ferrugineus, thorace marginato: margine anterius ſcutelloque apice albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 337. *n.* 15. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 21.

Habitat Hafniae.

leucopterus. 136. C. thoracis margine ſerrato, corpore griſeo, alis albis fuſco maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 338. *n.* 16. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 22.

Habitat - - - - -

20. C.

filicis. 20. C. elytrorum apicibus capite pedibusque lividis, corpore nigro. *Fn. ſuec.* 919.*
Habitat in filicibus.

cardui. 21. C. ſcutello lineis tribus elevatis, antennis apice nigris. *Fn. ſuec.* 920.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 338. *n.* 17. *mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 24
Degeer inſ. 3. *p.* 309. *n.* 38. *t.* 6. *f.* 1. Cimex depreſſus ovatus griſeus nigro-maculatus.
Habitat in Europae *borealis cardui capitulis.*

pyri. 137. C. thorace trialato: ſcutello foliato, elytris reticulatis baſi gibbis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 338. *n.* 18. *mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 25.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 461. *n.* 57.
Habitat in pyri *communis foliorum pagina inferiori, quam maculat.*

rhombeus. 22. C. thorace acutangulo, abdomine dilatato rhombeo posterius ſexdentato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 338. *n.* 19. *mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 26.
Habitat in Africae *arboribus.*

ſylveſtris. 111. C. ater, elytris albis: arcu apicis nigro. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 23.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 731. *n.* 111. *Fn. ſuec.* 965. Cimex oblongus niger, alis elytrisque albo fuſcoque caeruleis, pedibus rufis.
Habitat in Europae *ſilvis, parvus.*

corticatus. 138. C. thoracis denticulati corporis pedumque cortice nigricante viridi, antennis clavatis.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 7.
Drury inſ. 2. *p.* 76. *t.* 40. *f.* 2.
Habitat in Braſilia.

†† *labio elongato, ſubulato, annulato.*
† *ſcutello longitudine abdominis*, Scutellati.

Stockerus. 2. C. corpore viridi: maculis nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 167.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 338. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 1. Cimex ſcutellaris ovatus, corpore viridi, maculis nigris abdomine ferrugineo.
Pet. gazoph. 34. *t.* 21. *f.* 12. Stockerus benghalenſis viridis nigro-maculatus.

Stoll cimic. 2. *t.* 3. *f.* C.
Habitat in Sina, *nobili affinis, ſubtus ferrugineus: lateribus cyaneis.*

nobilis. 3. C. viridi-auratus nigro maculatus. *Amoen. acad.* 6. *p.* 409. *n.* 46.*
Fabr. ſp inſ. 2. *p.* 338. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 2. Cimex ſcutellaris oblongus caeruleo-auratus nigro maculatus.
Sulz. hiſt. inſ t. 11. *f.* C.
Schroet. Abh. 1. *t.* 1. *f.* 9.
Stoll cimic. 1. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat in Aſia, *ſubtus rufus, faſciis lateralibus caeruleo auroque nitentibus.*

regalis. 139. C. thorace ſcutelloque aureis, thorace punctis duobus, ſcutello maculis duabus caeruleſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 339. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 3.
Habitat in nova Hollandia.

imperialis. 140. C. thorace ſcutelloque rufis, abdomine cyaneo: margine ſanguineo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 339. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 4.
Habitat in nova Hollandia.

nigellae. 141. C. niger obſcurus, thorace anterius, abdominis margine pedibusque albis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 5.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 339. *n.* 5. Cimex (ruſticus) ſcutellaris niger obſcurus, abdominis margine ferrugineo, pedibus pallidis.
Habitat in Barbariae *nigella, elytris intus ſanguineis.*

cerinthes. 142. C. niger obſcurus immaculatus. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 6.
Habitat in Africae *nigella ſativa, ſtatura et magnitudine c. nigellae.*

annulus. 143. C. vireſcens, maculis annularibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 339. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 7.
Drury inſ 3. *t.* 46. *f.* 9. Cimex Argus.
Habitat ad fluvium Senegal, *alis apice nigris, interdum obſcure pallidus.*

ſexguttatus. 144. C. ſupra teſtaceus, thorace punctis duobus, ſcutello quatuor cyaneo-nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 339. *n.* 7. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 8.

Habitat

Habitat in America *meridionali, mediae magnitudinis, antennis nigris.*

Druraei. 145. C. sanguineus, punctis maculisque nigris, subtus atro-caerulescens. *Mant. p.* 534.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 339. *n.* 8. *mant. inf.* 2. *p.* 281. *n.* 9. Cimex scutellaris supra rufus, maculis difformibus nigris.
Sulz. hist. inf t. 10 *f.* 5.
Drury inf. 1. *t.* 42. *f.* 1. 5.
Habitat in America *meridionali.*

Fabricii. 146. C. purpureus: punctis sanguineis, subtus atro-caerulescens. *Mant. p.* 534.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 340 *n.* 9. *mant. inf.* 2. *p* 281. *n.* 10. Cimex scutellaris subpurpurascens fulvo-punctatus.
Habitat in Cayenna, *altero sexu supra rufescente, altero obscure caerulescente.*

Argus. 147. C. niger: punctis ocellaribus fulvis numerosis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 281. *n.* 11.
Stoll cimic. 2. *t.* 7. *f.* 50.
Habitat in Surinamo, *statura et magnitudine c. Fabricii, subtus flavus nigro varius.*

Schulzii. 148. C. atro-aeneus, scutello utrinque macula baseos coccinea. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 340. *n.* 10. *mant. inf.* 2. *p* 281. *n.* 12.
Habitat in Cayenna, *statura et magnitudine scarabaeoidis, praecedentibus minor.*

paganus. 149. C. cyaneus, scutello abdomineque rufis cyaneo maculatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 340. *n.* 11. *mant. inf.* 2. *p.* 281. *n.* 13.
Habitat in nova Hollandia, *thorace interdum macula rufa, abdomine medio punctis* 4 *cyaneis insignito.*

illustris. 150. C. glaucus, thorace scutelloque punctis duobus fuscis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 340. *n.* 12. *mant. inf.* 2. *p.* 281. *n.* 14.
Stoll. cimic. 2. *t.* 24. *f.* 166.
Habitat ad caput bonae spei, *magnus.*

lineola. 151. C. supra cyaneus, capite thoraceque linea dorsali, scutello punctis duobus rubris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 340. *n.* 13. *mant. inf.* 2. *p.* 281. *n.* 15.
Habitat ad caput bonae spei, *mediae magnitudinis, antennis nigris.*

trilineatus. 152. C. niger, lineis tribus flavescentibus. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 340. *n.* 14. *mant. inf.* 2. *p.* 281. *n.* 16.
Habitat in America *meridionali*, *lineato minor*, *subtus niger*, *viridi irroratus*, *abdomine utrinque linea punctorum rubrorum insignito.*

scarabaeoides. 4. C. corpore atro-aeneo. *Fn. suec.* 912.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 342. *n.* 25. *mant. inf.* 2. *p.* 282. *n.* 29. *Fuessli inf. helv. p.* 25. *n.* 475.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 435. *n.* 2. Cimex hemisphaericus nigro-aeneus &c.
Sulz. inf. p. 26. *t.* 11. *f.* 70.
Habitat in Europa, *frequentius in ranunculi floribus.*

pallipes. 153. C. nigro-aeneus, scutelli abdominisque margine pedibusque pallidis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 343. *n.* 26. *mant. inf.* 2. *p.* 282. *n.* 30.
Thunb. nov. inf. sp. 2. *p.* 29. Cimex (acaroides) scutellatus ater, thorace scutello abdomineque albo marginatis.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *flavipedi affinis*, *at paulo major.*

flavipes. 154. C. nigro-aeneus, margine omni pedibusque flavis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 343. *n.* 27. *mant. inf.* 2. *p.* 282. *n.* 31.
Habitat in nova Hollandia.

Vahlii. 155. C. ater nitidus, capite lituris duabus, thorace scutellique margine pedibusque flavis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 283. *n.* 32.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

maurus. 5. C. corpore griseo. *Fn. suec.* 913.* *Scop. ent. carn.* 352. *Fuessli inf. helv. p.* 25. *n.* 476.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 342. *n.* 20. *mant. inf.* 2. *p.* 282. *n.* 23. Cimex scutellaris cinereus, scutello basi punctis duobus albis.
Sulz. hist. inf. t. 4. *f.* d.
Schaeff. ic. t. 43. *f.* 3. 4. 15. 16.
Habitat in Oriente, Calabria, *in* Europa *quadruplo minor.*

costatus. 156. C. griseus, alarum costa basi pedibusque rufis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 282. *n.* 22.
Habitat in insula Rotterdam *oceani australis*, *mauro proxime affinis.*

157. C.

hottentotta. 157. C. ferrugineus immaculatus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 342. *n.* 21. *mant. inſ.* 2 *p.* 282. *n.* 24.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 435. *n.* 3? Cimex fuſcus &c.
Habitat in Arabia.

leucogrammes. 158. C. griſeus albo ſtriatus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 342. *n.* 22. *mant. inſ.* 2. *p.* 282. *n.* 25.
Habitat in Italia, *minor.*

ruſticus. 159. C. fuſcus, capite thoracisque anteriore ferrugineis, ſubtus albo fuſcoque varius. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 282. *n.* 26.
Habitat Tranquebariae, *mediae magnitudinis, antennis ferrugineis apice fuſcis.*

irroratus. 160. C. vireſcens fuſco irroratus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 342. *n.* 23. *mant. inſ.* 2 *p.* 282. *n.* 27.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis.*

lanatus. 161. C. aeneo niger griſeo-hirtus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 342. *n.* 24. *mant. inſ.* 2. *p.* 282. *n.* 28.
Pall. it. 2. *app. p.* 729. *n.* 82.
Stoll cimic. 2. *t.* 9. *f.* 61.
Habitat in Sibiria, *oblongus, chryſomelae majoris magnitudine, frequens ad ſpicas elymi canini.*

lineatus. 6. C. niger, thorace lineis quinque, ſcutello tribus aurantiis, abdomine flavo punctis nigris. *Scop. ent. carn.* 351. *Gron. zooph.* 689. *Fueſſli inſ. helv. t.* 20. *f.* 6.
Mouff. inſ. 174 *f.* 5.
Poda inſ. 55. *n.* 2.
Buchholz de hepatomphal. Arg. 1768. *t.* 2. *f.* 3.

nigrolineatus. β) C. ruber, thorace lineis quinque, ſcutello tribus nigris, abdomine flavo: punctis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 341. *n.* 15. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 17.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 6.
Schaeff. elem. t. 44. *f.* 1.
icon. t. 2. *f.* 3.
Stoll cimic. 2. *t.* 11. *f.* 9.
Habitat in Europae *magis auſtralis potiſſimum montoſis, in floribus mali et ſambuci.*

ſemipunctatus. 162. C. ſupra rufus, thorace punctis decem, ſcutello lineis quatuor nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 341. *n.* 16. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 18.

Stoll cimic. 2. *t.* 11. *f.* 8.
Habitat in America, Europa *australi.*

anchorago. 163. C. cyaneus, scutello basi apiceque flavescente, abdominis margine flavo nigro punctato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 341. *n.* 17. *mant. inf.* 2. *p.* 281. *n.* 19.
Habitat in America *boreali, ubi mas rufus, ibi femina flava.*

grammicus. 7. C. corpore flavescente: supra lituris longitudinalibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 2 *p* 341. *n.* 18. *mant. inf.* 2. *p.* 281. *n.* 20.
Habitat in Africa, *mediae magnitudinis.*

Allioni. 164. C. fuscus, atomis numerosissimis albis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 342. *n.* 19. *mant. inf.* 2. *p.* 281. *n.* 21.
Habitat in agro Pedemontano, *grammico paulo minor.*

fuliginosus. 8. C. scutello fuliginoso: lituris quinque nigris; posteriore alba bifida. *Fn. suec.* 914.* *Fuessli inf. helv. p.* 25. *n.* 478. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 343. *n.* 28. *mant. inf.* 2. *p.* 283. *n.* 33. *Schaeff. ic. t.* 11. *f.* 10-12.
Habitat in Europa *et* Oriente.

litura. 165. C. niger, scutello lituris tribus albis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 343. *n.* 29. *mant. inf.* 2. *p.* 283. *n.* 34.
Habitat in Arabia.

tuberculatus. 166. C. obscurus, scutello scabro ante apicem tuberculato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 343. *n.* 30. *mant. inf.* 2. *p.* 283. *n.* 35.
Habitat in Italia, *litura paulo minor.*

inunctus. 167. C. ater, scutello basi pedibusque griseis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 343. *n.* 31. *mant. inf.* 2. *p.* 283. *n.* 36.
Habitat in Angliae *nemoribus.*

arabs. 9. C. thorace spinoso, corpore ovato livido, ano bidentato. *Mus. Lud. Ulr.* 168.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 344. *n.* 32. *mant. inf.* 2. *p.* 383. *n.* 37.
Sloane jam. 2. *t.* 237. *f.* 15. 16. Cimex sylvestris foetens viridis triangularis.
Habitat in America *meridionali.*

serratus. 10. C. thorace spinoso, corpore livido, abdominis marginibus serratis. *Mus. Lud. Ulr.* 169.*
Habitat in Arabia.

11. C.

ſtolidus. 11. C. thorace ſubangulato, corpore ſupra viridi ſubtus flavo, ano bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 170.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 344. *n.* 33. *mant. inſ.* 2. *p.* 283. *n.* 38.
Degeer inſ. 3. *t.* 34. *f.* 3.
Habitat in America *auſtrali et* India.

Hiſtrio. 12. C. thorace ſcabro depreſſo griſeo pallidoque vario.
Habitat in America *auſtrali*, India, Sibiria.

ſilphoides. 168. C. niger, thorace poſterius, ſcutello anterius margine linea media maculisque duabus albis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 29.
Stoll cimic. p. 19. *t.* 4. *f.* 21.
Habitat ad caput bonae ſpei, *glaber*, *ovatus*, *magnitudine c. buccarum*, *facie ſilphae.*

diophthalmus. 169. C. ruber, thorace punctis duobus nigris, pedibus cyaneis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 30. *f.* 45.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ovatus*, *glaber*, *magnitudine fere ſcarabaei ſtercorarii.*

multipunctatus. 170. C. ruber, thorace ſcutelloque punctis minutiſſimis plurimis nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 30.
Stoll cimic. p. 40. *t.* 9. *f.* 60.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ovatus*, *glaber*, *ſubtus griſeus*, *magnitudine griſei.*

grandis. 171. C. rufus, maculis thoracis tribus ſcutellique quinque nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 31. *f.* 46.
Habitat in India, *oblongus*, *convexus*, *glaber*, *ſubtus violaceus*, *magnitudine fere ſcarabaei ſtercorarii.*

liligerus. 172. C. ferrugineus, ſcutello punctis nigris duobus faſciaque undulata albida. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 32.
Stoll cimic. p. 40. *t.* 9. *f.* 59.
Habitat in interioribus regionibus ad caput bonae ſpei, *ovatus*, *convexus*, *glaber*, *magnitudine ſtockeri.*

guttigerus. 173. C. cinereus, ſcutello baſi punctis duobus albis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 32. *f.* 47.
Habitat in Japonia, *ſcarabaeoide vix major.*

ocellatus. 174. C. ſupra purpureus, thorace ſpinoſo, ſcutello ocellis ſenis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 60. *f.* 72.

Habitat

An huc quoque referendi a Seba *muſ. vol.* 4. *delineati cimices, nigro-punctulatus t.* 95. *f.* 26. *et nigro denſe punctatus t.* 95. *f.* 27?

Habitat in Japonia *et* Sina, *oblongus, convexus, rufipedis magnitudine.*

ſurinamenſis. 175. C. niger, ſcutelli appendice rubra, elytris rubellis poſterius nigricantibus. *Schroet. Abh. zur Naturg. p.* 338. *t.* 2. *f.* 4.
Habitat in Surinamo.

exanthematicus. 176. C. nigricans: ſupra punctis confertis albis. *Scop. ent. carn. p.* 121. *n.* 353.
Habitat prope Tergeſtum.

torridus. 177. C. fuſcus: punctis miniatis. *Scop. ann. hiſtor. nat.* 5. *p.* 110. *n.* 109.
Habitat in America *torrida.*

Friſchii. 178. C. nigricans excavato-punctatus, elytris coriaceis connatis, alis nigris.
Friſch inſ. 13. *p.* 26. *n.* 28. *t.* 24.
Habitat in Germania, *roſtro rufeſcente, antennarum articulis* 4.

Schranckii. 179. C. obſcure ferrugineus ſubtus flavus, ſcutello carinato: carina et ad baſin utrinque macula flavis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 78. §. 32.
Habitat in Auſtria.

variegatus. 180. C. fuſcus, abdominis limbo pedibusque luteo fuſcoque variis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 467. *n.* 65.
Habitat in Gallia.

fuſcus. 181. C. nigro-ferrugineus, ſcutello ad anum usque producto. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 467. *n.* 66.
Habitat in Gallia.

cucullatus. 182. C. ater punctatus, ſcutello ad anum usque producto. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 468. *n.* 67.
Habitat in Gallia.

ſagittifer. 183. C. ſupra ater, infra exalbidus nigro punctulatus, ſcutello atro albo-punctato poſterius ſagittato.
Schaeff. ic. t. 41. *f.* 1-3.
Habitat in Germania.

carneus. 184. C. thorace croceo, elytris incarnatis.
Schaeff. ic. t. 57. *f.* 3.
Habitat in Germania.

185. C.

flavo-viridis. 185. C. flavo-virescens, scutelli apice nitide albo.
Schaeff. ic. t. 109. *f.* 8. 9.
Habitat in Germania.

caruncu-latus. 186. C. flavo viridique varius, abdomine atro: margine flavo, ano tuberculis sex sanguineis.
Schaeff. ic. t. 244. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

TT *thorace utrinque spina armato*, spinosi.

Taurus. 187. C. griseus, thoracis spinis porrectis compressis truncatis.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 344. *n.* 34. *mant. inf.* 2. *p.* 283. *n.* 39.
Habitat in Coromandel, *magnus.*

Cervus. 188. C. viridis, elytris fuscis: margine albo, thoracis spinis obtusis subbifidis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 283. *n.* 40.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

bidens. 23. C. ovatus griseus, thorace acute spinoso, antennis rufis.
Fn. suec. 921.* *Fuessli inf. helv. p.* 25. *n.* 482. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 344. *n.* 35. *mant. inf.* 2. *p.* 283. *n.* 41.
Degeer inf. 3. *p.* 259. *n.* 6. *t.* 13. *f.* 9. Cimex ovatus fuscus &c.
Sulz. inf. t. 11. *f.* 72.
Habitat in Europa.

sanguinipes. 189. C. fuscus, thoracis spinis obtusis, scutello apice albido, abdominis margine maculato, pedibus rufis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 344. *n.* 36. *mant. inf.* 2. *p.* 283. *n.* 42.
Habitat in Italia, *statura grisei.*

rufipes. 24. C. ovatus griseus, thorace obtuse spinoso, pedibus rubris.
Fn. suec. 922.* *Fuessli inf. helv. p.* 25. *n.* 483. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 344. *n.* 37. *mant. inf.* 2. *p.* 283. *n.* 43.
Degeer inf. 3. *p.* 253. *n.* 2.
Raj. inf. p. 54. *n.* 2.
Schaeff. icon. t. 57. *f.* 6. 7.
Habitat in Europa *frequens.*

lentiginosus. 586. C. ovatus griseus, thorace obtuse spinoso, elytrorum punctis antennisque fuscis; articulis 2. 3. 4. lividis, membrana maculis lentiginosis adspersa. *Mus. Lesk. p.* 118. *n.* 78. b.
Habitat in Europa.

587. C.

multicolor. 587. C. ovatus fuscus, thorace elytrisque rufo-griseis, antennis albo-annulatis, femoribus nigris basi albis, tibiis albis: apice plantisque nigris. *Mus. Lesk. p.* 118. *n.* 78. c.
Habitat in Europa.

luridus. 190. C. thorace obtuse spinoso subvirescente, elytris griseis: macula fusca, clypeo emarginato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 345. *n.* 38. *mant. inf.* 2. *p.* 283. *n.* 44.
Habitat in Angliae *nemoribus.*

nigricornis. 191. C. subferrugineus, thorace obtuse spinoso, spinis antennisque nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 345. *n.* 39. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 45.
Habitat in Saxonia.

nigrispinus. 192. C. supra griseus, thorace obtuse spinoso, capite spinisque nigris, antennis annulo albo. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 46.
Habitat in Sina, *statura et magnitudine nigricornis.*

ictericus. 25. C. ovatus incarnatus subtus flavus, thorace acute spinoso. *Amoen. acad.* 6. *p.* 399. *n.* 41.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 345. *n.* 40. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 47. Cimex thorace spinoso, oblongus supra rufescens subtus flavus.
Habitat in America *et* Calabria.

floridanus. 26. C. ovatus niger rubro varius, scutello maculis tribus rubris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 346. *n.* 49. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 52.
Habitat in America, *mediae magnitudinis.*

armatus. 193. C. thorace acute spinoso, scutello nigro: punctis duobus apiceque testaceis, antennis pedibusque rubris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 346. *n.* 45. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 53.
Habitat in nova Hollandia.

haemorrhous. 27. C. oblongus niger, abdomine rufo, elytris punctis linearibus quinque nigris. *Amoen. acad.* 6. *p.* 400. *n.* 45. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 346. *n.* 46. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 54.
Habitat in America.

28. C.

An huc etiam referendae species a Seba *vol. mus.* 4. *delineatae, flavo-tessulatus t.* 95. *f.* 25. *spinosus t.* 95. *f.* 31. 32. *quadrispinosus t.* 95. *f.* 33. 34. *hispidus t.* 97. *f.* 35.

marginatus. 28. C. thorace obtuse spinoso, abdomine marginato acuto, antennis rufis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 349. *n.* 70. *mant. inf.* 2. *p.* 287. *n.* 82.

Syst. nat. XII. 2. *p.* 719. *n.* 28. *Fn. suec.* 923.* *Scop. ent. carn.* 363. *Fuessli inf. helv. p.* 25. *n.* 484. Cimex oblongo-ovatus griseus, thorace obtuse spinoso, antennis medio rubris.

Fn. suec. 1. *n.* 662. Cimex oblongus rufus immaculatus, thorace utrinque angulato.

Degeer inf 3. *p.* 272. *n.* 17. Cimex auriculatus.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 446. *n.* 20.

Schaeff ic. t. 41. *f.* 415.

Stoll cimic. 2. *t.* 5. *f.* 37.

Habitat in Europae *plantis.*

spiniger. 194. C. thorace obtuse spinoso dentatoque, capite quadrispinoso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 350. *n.* 71. *mant. inf.* 2. *p.* 287. *n.* 83.

Habitat in Italia, *statura marginati, at duplo minor.*

pugnator. 195. C. oblongus supra fuscus subtus flavescens, thorace acute spinoso, antennis rufis apice nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 287. *n.* 84.

Habitat Tranquebariae, *statura et magnitudine spinigeri.*

fasciculatus. 196. C. cinereus, thorace subspinoso, alis fuscis, pedibus fasciculato-tuberculatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 350. *n.* 72. *mant. inf.* 2 *p.* 287. *n.* 85.

Habitat ad caput bonae spei, *marginato duplo minor.*

insidiator. 197. C. supra rufus subtus flavescens, thorace acute spinoso. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 287. *n.* 86.

Habitat in Barbaria, *quadrato minor, alis albidis.*

quadratus. 198. C. supra fuscus subtus flavescens, thorace obtuse spinoso, abdomine quadrato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 350. *n.* 73. *mant. inf.* 2. *p.* 287. *n.* 87.

Stoll cimic. 2. *t.* 5. *f.* 36.

Habitat in Germania.

hastatus. 199. C. thorace acute spinoso dentatoque, elytris obscuris: striga posteriore alba. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 287. *n.* 88.

Habitat Tranquebariae, *statura quadrati, at minor.*

200. C.

velox. 200. C. thorace acute ſpinoſo bipunctato, elytris puncto baſcos ſtrigaque flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 350. *n.* 74. *mant. inſ.* 2. *p.* 287. *n.* 88.
Habitat in America.

Merianae. 201. C. thorace ſubſpinoſo, elytris fuſcis albo reticulatis, abdominis baſi ſpinoſa. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 350. *n.* 75. *mant. inſ.* 2. *p.* 287. *n.* 89.
Merian. inſ. ſurin. t. 51.
Habitat in Surinamo.

bipuſtulatus. 29. C. oblongiuſculus niger, punctis verticis duobus coccineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 346. *n.* 47. *mant. inſ.* 2. *p.* 284. *n.* 55. Cimex thorace ſpinoſo niger, elytris lividis, capite punctis duobus coccineis.
Degeer inſ. 3. *p.* 334. *n.* 8. *t.* 34. *f.* 10. Cimex balteatus.
Habitat in America *meridionali.*

ſcaber. 30. C. oblongiuſculus teſtaceus, thorace angulato-ſpinoſo, alis nigris, femoribus denticulatis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 400. *n.* 43.*
Habitat in Java.

punicus. 31. C. ovatus niger, ſcutello lunula apiceque rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 346. *n.* 48. *mant. inſ.* 2. *p.* 284. *n.* 56.
Habitat in Africa, *magnitudine c. baccarum.*

Ypſilon. 32. C. ovatus lividus, ſcutello ypſilo flavo inſcripto. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 346. *n.* 49. *mant. inſ.* 2. *p.* 284. *n.* 57.
Degeer inſ. 3. *p.* 332. *n.* 6. *t.* 34. *f.* 7. 8. Cimex ypſilon aeneus.
Habitat in America *meridionali.*

clypeatus. 33. C. ovatus viridis, faſcia flavicante, capite clypeato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 346. *n.* 50. *mant. inſ.* 2. *p.* 284. *n.* 58.
Gron. zooph. 691. Cimex ovatus, thorace utrinque aculeato faſcia transverſali flavicante, ſcutello gibboſo, capite clypeato, ano ſerrato.
Habitat in Sina.

albicollis. 202. C. ſupra viridis, thorace dentato, capite thoracisque anteriore ſcutellique baſi flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 347. *n.* 51. *mant. inſ.* 2. *p.* 284. *n.* 59.
Drury inſ. 2. *t.* 36. *f.* 4. Cimex flavicollis.
Habitat in Jamaica, *ſubtus flaveſcens.*

34. C.

punctatus. 34. C. ovatus punctatus, tibiis annulo albo. *Fn. suec.* 924.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 345. *n.* 41. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 48. Cimex thorace subspinoso fuscus, abdominis margine variegato, tibiis annulo albo.
Degeer inf. 3. *p.* 269. *n.* 14.
Habitat in America *boreali*, *subtus griseus*, *antennis nigris.*

varius. 203. C. supra rufus subtus flavescens, thorace obtuse spinoso, scutello nigro basi apiceque albo. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 49.
Habitat in Hispania, *statura et magnitudine albipedis*, *capite antennisque nigris*, *pedibus rufis.*

albipes. 204. C. supra nigricans, thoracis subspinosi margine scutellique apice albis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 345. *n.* 42. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 50.
Habitat in Italia, *subtus pallidus*, *statura punctati.*

dentatus. 205. C. thorace acute spinoso serrulato, corpore cinereo nigroque vario. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 346. *n.* 43. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 51.
Habitat in India.

haemorrhoidalis. 35. C. ovato-oblongus griseus, thorace acute spinoso, antennis nigris, sterno porrecto. *Fn. suec.* 925.* *Fuessli inf. helv. p.* 25. *n.* 485.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 347. *n.* 52. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 60. Cimex thorace obtuse spinoso subvirescens, antennis nigris, sterno porrecto.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 465. *n.* 63.
Degeer inf. 3. *p.* 254. *n.* 3. *t.* 35. *f.* 7.
Sulz. hist. inf. t. 11. *f.* 72.
Schaeff. ic. t. 57. *f.* 8?
Habitat in Europae *graminosis.*

spinidens. 206. C. fuscus, thorace acute spinoso, scutello apice elytris margine albis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 61.
Habitat Tranquebariae, *magnus*, *spinis unidentatis.*

oculatus. 207. C. griseus, scutello punctis duobus flavis, tarsis anterioribus apice compresso membranaceis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 347. *n.* 53. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 62.
Habitat in Sina.

annulatus. 208. C. griseus, tibiis albo annulatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 347. *n.* 54. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 63.
Habitat in Virginia.

quadripustulatus. 209. C. thorace crenato obtuse spinoso scutelloque punctis duobus rufis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 347. *n.* 55. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 64.
Habitat in America.

maculatus. 210. C. virescens, thorace obtuse spinoso: maculis quatuor, scutello elytrisque apice fuscis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 347. *n.* 56. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 65.
Habitat in America, *elytrorum apice rarius concolore.*

pugnax. 211. C. oblongus virescens, thorace acute spinoso, antennis rufis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 348. *n.* 57. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 66.
Habitat in America.

emeritus. 212. C. virescens, thorace acute spinoso, abdomine lineis duabus albis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 348. *n.* 58. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 67.
Habitat in nova Hollandia.

gladiator. 213. C. thorace acute spinoso scutelloque flavescentibus nigro punctatis elytris punctis albis scabris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 348. *n.* 59. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 68.
Stoll cimic. 2. *t.* 2. *f.* 12.
Habitat in America *et ad* caput bonae spei.

furcatus. 214. C. fuscus, thorace acute spinoso serrato, clypeo acuminato bifido. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 348. *n.* 60. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 69.
Habitat in Patagonia, *nonnunquam totus griseus.*

pugillator. 215. C. fuscus, subtus fulvus nigro punctatus: margine flavo thorace acute spinoso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 348. *n.* 61. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 70.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *magnus.*

victor. 216. C. fuscus, thorace acute spinoso, scutello apice rufo, pedibus pallidis nigro punctatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 348. *n.* 62. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 71.
Habitat in Brasilia, *et insulis* Americae *oppositis.*

ciliatus. 217. C. thorace ciliato obtuse spinoso nigro: margine fasciaque posteriore flavis, femoribus posterioribus serratis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 348. *n.* 63. *mant. inf.* 2. *p.* 286. *n.* 72.
Habitat in America.

218. C.

bellator. 218. C. supra fuscus subtus flavescens, antennis atris albo annulatis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 286. *n.* 73.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

armiger. 219. C. griseus, thorace acute spinoso, scutello punctis duobus, antennis pedibusque pallidis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 348. *n.* 64. *mant. inf.* 2. *p.* 286. *n.* 74.
Habitat in Africa *aequinoctiali.*

scorbuticus. 220. C. fuscus, thorace obtuse spinoso, pedibus pallidis nigro punctatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 349. *n.* 65. *mant. inf.* 2. *p.* 286. *n.* 75.
Habitat in America.

delirator. 221. C. flavescens nigro punctatus, thorace acute spinoso posterius elytrisque fuscis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 286. *n.* 76.
Habitat in Cayenna, *parvus.*

melacanthus. 222. C. obscure ferrugineus, thoracis spinis acutis atris, abdomine atro: vittis flavescentibus. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 349. *n.* 66. *mant. inf.* 2. *p.* 286. *n.* 77.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *parvus.*

aggressor. 223. C. corpore flavescente, thoracis spinis acutis subconcoloribus, ano quadridentato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 349. *n.* 67. *mant. inf.* 2. *p.* 286. *n.* 78.
Habitat in nova Hollandia.

vittatus. 224. C. virescens, thorace subspinoso, elytris vitta submarginali flava. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 349. *n.* 68. *mant. inf.* 2. *p.* 286. *n.* 79.
Habitat ad caput bonae spei, *antennis ferrugineis*, *alis albidis.*

hamatus. 225. C. viridis, thorace acute spinoso, abdomine serrato: denticulis nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 286. *n.* 80.
Habitat in India, *magnus*, *antennis nigris.*

defensor. 226. C. corpore viridi, thoracis spinis acutis nigris, ano quadridentato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 349. *n.* 69. *mant. inf.* 2. *p.* 287. *n.* 81.
Habitat in nova Hollandia.

valgus. 36. C. oblongus niger, thorace serrato, femoribus posterioribus incurvis tibiisque posterioribus unidentatis. *Mus. Lud. Ulr.* 171.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 351. *n.* 76. *mant. inf.* 2. *p.* 288. *n.* 91.

Habitat ad caput bonae spei, *basi abdominis nunc inermis nunc quadridentata.*

tragus. 227. C. thoracis spinis compresso-lunatis serratis, tibiis posterioribus membranaceo-serratis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 288. *n.* 92.
Habitat in Sina, *statura et magnitudine valgi.*

tenebrosus. 228. C. thorace serrulato, femoribus posterioribus incurvis clavatis, abdomine basi trispinoso. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 288. *n.* 93.
Habitat in India, *statura et magnitudine valgi.*

fulvicornis. 229. C. fuscus, thorace serrato, femoribus bidentatis: posterioribus multidentatis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 288. *n.* 94.
Habitat in India, *magnus, antennis ferrugineis.*

femoratus. 230. C. thorace serrulato, femoribus posterioribus incurvis dentatis, tibiisque posterioribus compressis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 351. *n.* 77. *mant. inf.* 2. *p.* 288. *n.* 95.
Habitat in India.

curvipes. 231. C. thorace acute spinoso, femoribus omnibus apice bidentatis, posterioribus incurvis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 351. *n.* 78. *mant. inf.* 2. *p.* 288. *n.* 96.
Habitat in Africa *aequinoctiali, statura femorati.*

magnipes. 232. C. obscurus, thorace serrato, femoribus multispinosis: posterioribus incrassatis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 288. *n.* 97.
Habitat in Sina, *femorato triplo minor.*

membranaceus. 233. C. thorace acute spinoso nigro: fascia flava, tibiis posterioribus membranaceis dentatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 351. *n.* 79. *mant. inf.* 2. *p.* 288. *n.* 98.
Habitat in insula S. Jago *promontorii viridis.*

quadrispinosus. 37. C. elongatus ruber, thorace quadrispinoso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 353. *n.* 91. *mant. inf.* 2. *p.* 290. *n.* 115.
Degeer inf. 3. *p.* 347. *n.* 22. *t.* 35. *f.* 7.
Habitat in America *meridionali, antennis longissimis capillaribus.*

phyllopus. 113. C. nigricans, thorace immaculato, elytris fascia albicante, tibiis posterioribus membranaceis dentatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 351. *n.* 80. *mant. inf.* 2. *p.* 289. *n.* 99.
Stoll cimic. 2. *t.* 8. *f.* 54.
Habitat in America *australi, mediae magnitudinis.*

235. C.

auctus. 235. C. thorace subspinoso nigro: maculis duabus fulvis, elytris fascia flava, tibiis posterioribus membranaceis dentatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 351. *n.* 81. *mant. inf.* 2. *p.* 289. *n.* 100.
Habitat in Cayenna, *phyllopodi proxime affinis.*

Gonagra. 236. C. thorace subspinoso: fascia alba, elytris fuscis: puncto cinereo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 351. *n.* 82. *mant. inf.* 2. *p.* 289 *n.* 101.
Habitat in insula S. Thomae *in* oceano americano.

kermesinus. 116. C. oblongus rufus: fascia albida nigro punctata, femoribus posterioribus multidentatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 352. *n.* 83. *mant. inf.* 2. *p.* 289. *n.* 102.
Degeer inf. 3. *p.* 337. *n.* 11. *t.* 34. *f.* 15. Cimex rubro balteatus.
Habitat in Surinamo, *antennis fuscis.*

australis. 237. C. oblongus niger, thorace subspinoso: fascia anteriore rubra, tibiis posterioribus basi membranaceis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 352. *n.* 84. *mant. inf.* 2. *p.* 289. *n.* 103.
Habitat in insula Tahiti *maris australis.*

cruciger. 238. C. oblongus supra niger, thorace acute spinoso lineis, elytris cruce ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 352. *n.* 85. *mant. inf.* 2. *p.* 289. *n.* 104.
Habitat in Brasilia.

sanctus. 239. C. oblongus rufus, thorace acute spinoso elytris nigris: cruce ferruginea. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 352. *n.* 86. *mant. inf.* 2. *p.* 289. *n.* 105.
Habitat in Brasilia.

laetus. 240. C. viridis capite fascia elytrorum abdominisque femoribusque flavis, elytris atris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 289. *n.* 106.
Habitat in Cayenna, *magnus, oblongus.*

lunatus. 241. C. niger, thorace arcu anteriore, elytris fascia, corpore maculis albis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 289. *n.* 107.
Habitat in Cayenna, *statura laeti.*

elatus. 242. C. thorace acute spinoso viridi: margine ferrugineo, elytris striatis ferrugineis, corpore ferrugineo. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 290. *n.* 108.
Habitat in Cayenna, *lunato minor.*

balteatus. 243. C. oblongus ferrugineus, elytris linea transversa flava, femoribus posterioribus multidentatis. *Mant. p.* 534. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 352. *n.* 87. *mant. inf.* 2. *p.* 290. *n.* 109. *Drury inf.* 1. *t.* 43. *f.* 3.
Habitat in America *meridionali.*

sinuatus. 244. C. lividus, thorace acute spinoso, tibiis posterioribus compressis sinuatis nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 290. *n.* 110.
Habitat in Cayenna, *statura serripedis, at major.*

serripes. 245. C. oblongus rufus, thorace acute spinoso, femoribus posterioribus dentatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 353. *n.* 88. *mant. inf.* 2. *p.* 290. *n.* 111.
Habitat in nova Hollandia.

dentipes. 246. C. elongatus, femoribus posterioribus elongatis serratis, corpore fusco subtus lateribus albis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 290. *n.* 112.
Habitat in Sierra Leon Africae, *lineari proxime affinis.*

linearis. 247. C. elongatus fuscus, thorace acute spinoso, femoribus posterioribus elongatis denticulatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 353. *n.* 89. *mant. inf.* 2. *p.* 290. *n.* 113.
Habitat in Sina.

crenulatus. 248. C. thorace dentato rufo: macula nigra, femoribus posterioribus dentatis, corpore atro. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 353. *n.* 90. *mant. inf.* 2. *p.* 290. *n.* 114.
Drury inf. 1. *t.* 45. *f.* 1.
Habitat in insulis, Americae *meridionali oppositis, capite nigro, rubro-lineato.*

spinifex. 249. C. linearis cinereus, scutello bispinoso. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 33. *f.* 48.
Habitat - - - facie et magnitudine tipularii.

setosus. 250. C. oblongus griseus, thorace capite pedibusque hispidis. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 33.
Habitat in America *australi et* India, *annulati magnitudine, at duplo angustior.*

acutus. 251. C. linearis cinereus, thoracis margine albido, abdomine punctis sex nigris. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 34.
Habitat - - - magnitudine et facie clavati.

252. C.

clavatus. 252. C. lineari-oblongus ferrugineus, femoribus posterioribus incrassatis, scutello immaculato. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 34. *f.* 49.
Habitat in Japonia, *annulati magnitudine, sed paulo angustior.*

Jaculus. 253. C. linearis fuscus, femoribus posterioribus incrassatis spinosis, scutello linea alba. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 34. *f.* 50.
Habitat - - - magnitudine et facie pilosi.

pilosus. 254. C. linearis ferrugineus, linea capitis pectorisque laterali albida. *Thunb. nov. inf. sp.* 2 *p.* 35.
Habitat - - - clavato paulo minor, subtus pallidus.

villosus. 255. C. spinoso-tuberculatus totus piceus villosus. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 35.
Stoll cimic. t. 13. *f.* 90.
Habitat - - - annulato major.

Crux. 256. C. niger, thorace flavo: cruce nigra. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 35.
Stoll cimic. t. 9. *f.* 65.
Habitat ad caput bonae spei, *personati magnitudine.*

pungens. 257. C. oblongus supra fuscus subtus albidus, pectore abdominisque lateribus nigro punctatis. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 36.
Habitat ad caput bonae spei, *annulati magnitudine, glaber.*

notatus. 258. C. oblongus supra ferrugineus subtus cinereus, abdomine sextuplici serie punctorum nigrorum. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 37.
Habitat ad caput bonae spei, *glaber, vix annulati magnitudine.*

trigonus. 259. C. testaceus, elytris scutelloque puncto albo. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 37.
Stoll cimic. t. 11. *f.* 78. 79.
Habitat in Japonia *et* Surinamo, *glaber, c. abietis magnitudine.*

muricatus. 260. C. oblongus cinereus muricatus, tibiis posterioribus basi dilatatis. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 38. *f.* 51.
Habitat ad caput bonae spei, *magnitudine c. hyoscyami, femorato similis.*

unipunctatus. 261. C. oblongus testaceus, elytris puncto nigro. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 38. *f.* 52.
Habitat in Japonia, *glaber, trigono plus quam duplo major.*

thoracicus. 262. C. oblongus viridi-aureus, thoracis margine luteo. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 39.
Stoll cimic. t. 8. *f.* 55. A.
Habitat in India *et* Surinamo, *annulati magnitudine, sed longior.*

analis. 263. C. oblongus viridis, abdomine rubro, ano nigro. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 39.
Stoll cimic. t. 16. *f.* 72. B.
Habitat in India *et* Surinamo, *thoracici magnitudine, sed paulo latior.*

transversus. 264. C. rotundatus viridis, capite thoraceque anterius flavis. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 40. *f.* 53.
Habitat in Africa, *juniperini magnitudine, glaber.*

humeralis. 265. C. ovatus viridis, elytris basi luteis. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 40. *f.* 54.
Habitat - - - juniperino quadruplo major, punctis impressis.

subulatus. 266. C. ovatus virescens, scutelli linea elevata subulata. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 41. *f.* 55.
Habitat - - - humeralis magnitudine et facie, subtus albidus.

Comma. 267. C. rotundatus cinereus, scutello linea flava. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 41. *f.* 56.
Habitat ad caput bonae spei, *magnitudine c. baccarum.*

reticulatus. 268. C. cinereus nigro varius, thorace serrato. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p* 42.
Stoll cimic. t. 16. *f.* 111.
Habitat ad caput bonae spei, *glaber, magnitudine c. baccarum.*

Fullo. 269. C. ovatus niger, albo irroratus, capite thoraceque linea alba. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 42. *f.* 57.
Habitat in Japoniae *insula* Dezima, *rufipede major, scarabaeo fulloni similis.*

tibialis. 270. C. ovatus brunneus albo fuscoque lineatus, scutello maculis tribus albis. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 43. *f.* 58.
Habitat - - - magnitudine c. baccarum, glaber.

271. C

sulcatus. 271. C. ovatus cinereus fusco-nebulosus, abdomine sulcato. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 43.
Stoll cimic. t. 6. *f.* 47.
Habitat in India, *c. baccarum paulo major.*

fuscus. 272. C. oblongus ferrugineo-fuscus, antennis pedibusque hirsutis. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 44.
Habitat - - - - *valgi fere magnitudine.*

sordidus. 273. C. cinereus, thorace denticulato, antennis pedibusque piloso-hispidis. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 44.
Habitat in Japonia, *marginati magnitudine.*

senegalensis. 274. C. thorace acute spinoso flavo: maculis nigricantibus, scutello viridi-striato posterius flavo, elytris dimidiato nigricantibus: striis obliquis viridibus, posterius fuscis: striis longitudinalibus nigris, corpore rubro: margine nigro maculato.
Drury inf. 2. *p.* 70. *t.* 38. *f.* 4. Cimex variegatus.
Habitat ad fluvium Senegal, *ano denticulato, alis cinerascentibus nigro-reticulatis.*

bidentatus. 275. C. longus fuscus, rostro arcuato, thorace subtus anterius bidentato. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 438. *n.* 6.
Habitat in Gallia.

Leviathan. 276. C. planus fuscus, thorace elytrisque alatis, capite anterius cornuto, antennis brevibus crassis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 439. *n.* 9.
Habitat in Gallia.

rostratus. 277. C. oblongus fuscus immaculatus, thorace utrinque obtuse angulato, capite inter antennas bidentato. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 446. *n.* 21.
Habitat in Gallia.

acutangulus. 278. C. oblongus rufus immaculatus, thorace utrinque acute angulato: margine laevi. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 447. *n.* 22.
Habitat in Gallia.

immaculatus. 279. C. oblongus rufus immaculatus, thorace utrinque acute angulato: margine spinoso. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 447. *n.* 23.
Habitat in Gallia.

porphyropterus. 280. C. ovatus flavo-viridis, thorace angulato, elytris pallide purpureis, antennis nigris, pedibus roseis. *Degeer inf.* 3. *p.* 258. *n.* 5. *t.* 13. *f.* 152.

Habitat in Europae *arboribus herbisque, mediae magnitudinis, an hujus tribus?*

pustulatus. 281. C. ovatus rufus: maculis flavescentibus sparsis, thorace angulato, scutello elongato. *Degeer inf.* 3. *p.* 329. *n.* 2. *t.* 34. *f.* 2.
Habitat in India, *varioloso paulo minor, an hujus tribus?*

leucostictos. 282. C. ovatus flavo-griseus, thorace acute spinoso scutelloque punctis excavatis nigris, elytris punctis elevatis albis. *Degeer inf.* 3. *p.* 331. *n.* 5. *t.* 34. *f.* 6.
Habitat in Surinamo, *satis magnus.*

pensylvanicus. 283. C. subrotundus totus viridis, thorace angulato. *Degeer inf.* 3. *p.* 330. *n.* 4. *t.* 34. *f.* 5.
Habitat in Pensylvania; *an hujus tribus?*

litteratus. 284. C. oblongo-ovatus griseus, scutello ypsilo flavo inscripto, antennis pedibusque testaceis.
Degeer inf. 3. *p.* 333. *n.* 7. *t.* 34. *f.* 9. Cimex Ypsilon griseus.
Habitat in Surinamo, *ypsilo affinis.*

tigripes. 285. C. oblongus supra fuscus subtus griseus, femoribus dentatis nigro maculatis. *Degeer inf.* 3. *p.* 335. *n.* 10. *t.* 34. *f.* 12.
Habitat in Surinamo, *muscae domesticae magnitudine.*

austriacus. 286. C. ovatus ferrugineus, scutello interstincto: fascia nigra. *Schranck Beytr. z. Naturg.* §. 33. *p.* 78. *t.* 3. *f.* 16.
Habitat prope Mauer Austriae *inferioris.*

chalybeus. 588. C. nigro-aeneus immaculatus. *Mus. Lesk. p.* 118. *n.* 78. d.
Habitat in Europa.

berynllinus. 589. C. thorace obtuse spinoso utrinque dentato, spinarum apicibus clypeoque bifido ex caeruleo virescentibus. *Mus. Lesk. p.* 118. *n.* 79.
Habitat in Europa, *antennarum articulo quarto posterius dimidio albo.*

adustus. 590. C. thorace acute spinoso, capite, spinarum apice, scutelli medio, elytris utrinque ad basin scutelli membranarumque marginibus externis nigris. *Mus. Lesk. p.* 118. *n.* 80.
Habitat in Europa.

591. C.

bidens. 591. C. thorace obtuse spinoso, elytrorum margine interno et posteriore anoque bidentato sanguineis, elytris pallidis. *Mus. Lesk. p.* 118. *n.* 81.
Habitat in Europa.

bilobus. 592. C. thorace obtuse dentato, elytris griseis punctatis aut rufescentibus, ano bilobo. *Mus. Lesk. p.* 118. *n.* 82.
Habitat in Europa.

distinctus. 593. C. oblongus, thorace obtuse spinoso subtus luteo, supra antennisque ferrugineis. *Mus. Lesk. p.* 119. *n.* 83.
Habitat in Europa.

rubricornis. 594. C. thorace hispido obtuse spinoso, antennis hispidis coccineis: articulo ultimo nigro. *Mus. Lesk. p.* 119. *n.* 84.
Habitat in Europa.

aculeatus. 595. C. griseus, thorace spinoso: spinis anterius antennarumque articulis secundo tertioque nigris. *Mus. Lesk. p.* 119. *n.* 85.
Habitat in Europa.

conspersus. 596. C. thorace obtuse spinoso: anterius punctis duobus impressis, abdomine subtus utrinque nigro punctato, gutta ad anum nigra. *Mus. Lesk. p.* 119. *n.* 86.
Habitat in Europa.

TTT *thorace mutico.*

T *rotundati s. ovati.*

aurantius. 287. C. aurantius, capite, thoracis margine anteriori, abdominis maculis marginalibus pedibusque atris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 290. *n.* 116. *Sulz. hist. inf. t.* 10. *f.* 10.
Drury inf. 2. *t.* 36. *f.* 5. Cimex incarnatus.
Thunb. nov. inf. sp. 2. *p.* 46.
Stoll cimic. 2. *t* 6. *f.* 39. *et. t.* 2. *f.* 10. A.
Habitat in Java, Zeilona, India, *magnus.*

Punctum. 288. C. supra nigricans, thorace posterius aurantio, elytris albis: puncto nigro. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 291. *n.* 117.
Sulz. hist. inf. t. 10. *f.* 9. Cimex nigripes.
Stoll cimic. 2. *t.* 6. *f.* 40.
Habitat in Java, *magnus.*

melanopus. 289. C. supra sanguineus, scutello maculis duabus, elytris unica nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 353. *n.* 92. *mant. inf.* 2. *p.* 291. *n.* 118.

Drury

Drury inſ. 2. *t.* 36. *f.* 5. Cimex incarnatus.
Stoll cimic. 2. *t.* 2. *f.* 10.
Habitat in India, *ſcutelli maculis interdum nullis.*

torquatus. 290. C. viridis, capite thoraceque anterius flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 353. *n.* 93. *mant. inſ.* 2. *p.* 291. *n.* 119.
Habitat in India, Italia.

rutilans. 291. C. viridi-aeneus, thorace faſcia anteriore ſanguinea, ſcutello elytrisque anterius flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 353. *n.* 94. *mant. inſ.* 2. *p.* 291. *n.* 120.
Stoll cimic. 2. *t.* 18. *f.* 122. A.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *magnus*, *antennis nigris.*

guttatus. 292. C. viridi-aeneus albido punctatus, tibiis anterioribus membranaceis dilatatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 291. *n.* 121.
Habitat in Siam, *magnus.*

viridulus. 39. C. ſupra flavus: punctis viridibus, ſubtus viridis. *Muſ. Lud. Ulr.* 172.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 354. *n.* 95. *mant. inſ.* 2. *p.* 291. *n.* 122.
Habitat in America *auſtrali et* India.

peregrinator. 40. C. ſuborbiculatus depreſſus griſeo pallidoque varius, thorace ſcabro. *Muſ. Lud. Ulr.* 173.*
Habitat in America *auſtrali et* India.

bipunctatus. 41. C. pallide griſeus: puncto albo utrinque ad baſin ſcutelli. *Muſ. Lud. Ulr.* 174.
Habitat in Syria.

ſex punctatus. 42. C. rotundatus luteo nigroque varius, thorace luteo: punctis ſex nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 175.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 355. *n.* 105. *mant. inſ.* 2. *p.* 293. *n.* 136.
Habitat in America *auſtrali*, India, Sibiria.

ſignatus. 293. C. griſeus, ſcutello vitta nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 355. *n.* 106. *mant. inſ.* 2. *p.* 293. *n.* 137.
Habitat in Sierra Leon Africae.

gravis. 294. C. fuſcus, ſcutello punctis duobus flavis, elytris puncto nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 355. *n.* 107. *mant. inſ.* 2. *p.* 293. *n.* 138.
Habitat in nova Seelandia, *mediae magnitudinis.*

Forskählii. 295. C. viridis, thoracis abdominisque margine ſanguineo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 356. *n.* 108. *mant. inſ.* 2. *p.* 293. *n.* 139.
Habitat in Oriente.

296. C.

Hybneri. 296. C. virescens, thorace fascia sanguinea. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 293. *n.* 140.
Habitat Tranquebariae, *statura et magnitudine cincti, subtus flavescens.*

cruentus. 297. C. viridis, thoracis abdominisque marginibus, antennis pedibusque sanguineis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 356. *n.* 109. *mant. inf.* 2. *p.* 293. *n.* 141.
Habitat in Surinamo.

geniculatus. 298. C. obscurus, thoracis abdominisque margine flavescente, ano pedumque geniculis ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 293, *n.* 142.
Habitat in Cayenna, *magnus, capite nigro.*

mixtus. 299. C. punctatus griseus nigro maculatus, abdominis margine nigro: punctis flavis. *Fabr. mant. inf* 2. *p.* 294. *n.* 143.
Habitat in Cayenna, *magnus, antennis fuscis.*

tripterus. 300. C. flavo rufoque varius, antennis nigris: ultimo articulo apice albo. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 294. *n.* 144.
Habitat in Cayenna, *statura mixti, at paulo minor.*

griseus. 43. C. griseus, abdominis lateribus albo nigroque variis, alis nebulosis, sterno porrecto. *Fn. suec.* 926.*
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 356. *n.* 110. *mant. inf.* 2. *p.* 294. *n.* 145. Cimex ovatus griseus, abdominis lateribus albo nigroque variis, ventre antice spinoso.
Degeer inf. 3. *p.* 261. *n.* 8. *t.* 14. *f.* 9. Cimex betulae.
Habitat in Europa, *antennis nigris flavo annulatis.*

interstinctus. 44. C. griseus, abdominis lateribus rubro nigroque variis, alis albis, sterno porrecto. *Fn. suec.* 927.*
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 356. *n.* 111. *mant. inf.* 2. *p.* 294. *n.* 146. Cimex ovatus griseus, abdominis margine nigro maculato.
Habitat in Europae *cultis.*

papillosus. 301. C. fuscus, antennis nigris, sterno gibbo compresso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 356. *n.* 112. *mant. inf.* 2. *p.* 294. *n.* 147.
Stoll cimic. 2. *t.* 1. *f.* 2.
Drury inf. 1. *t.* 43. *f.* 2.
Habitat in Sierra Leon Africae.

funebris. 302. C. ater, antennis, pedibus alisque concoloribus. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 356. *n.* 113. *mant. inf.* 2. *p.* 294. *n.* 148.
Habitat in Sierra Leon Africae.

303. C.

ruficornis. 303. C. ater, antennis rufis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 356. *n.* 114. *mant. inf.* 2. *p.* 294. *n.* 149.
Habitat in India.

baccarum. 45. C. subfulvus, abdominis margine fusco maculato. *Fn. suec.* 928. *Scop. ent. carn.* 360. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 356. *n.* 115. *mant. inf.* 2. *p.* 294. *n.* 150. *Fuessli inf. helv. p.* 25. *n.* 486.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 466. *n.* 64. Cimex fuscus, antennis abdominisque margine nigro croceoque variegatis.
Degeer inf. 3. *p.* 257. *n.* 4. *t.* 14. *f.* 5. Cimex verbasci.
Raj. inf. p. 54. *n.* 2. Cimex scapulis magnis exstantibus, macula e flavo rubente in centro crucis dorsalis.
List. loq. 396. *mut. t.* 31. *f.* 19. Cimex ex luteo virescenti infuscatus ad alvi margines nigris maculis.
Jonst. inf. t. 17. *f.* 9.
Schaeff. icon. t. 57. *f.* 1. 2.
Habitat in Europae *baccis frequens.*

Cribrum. 304. C. fuscus, thorace scutelloque punctatis, abdominis punctis genubusque flavis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 357. *n.* 116. *mant. inf.* 2. *p.* 294. *n.* 151.
Habitat in America, *magnus, antennis nigris.*

brevicornis. 305. C. obscure cupreus, antennis brevibus compressis, femoribus anterioribus dentatis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 294. *n.* 152.
Habitat in Sina, *statura c. baccarum.*

glaucus. 306. C. glaucus, elytris apice puncto nigro. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 357 *n.* 117. *mant. inf.* 2. *p.* 295. *n.* 153.
Habitat in nova Hollandia.

Janus. 307. C. rotundatus supra sanguineus, capite scutelli basi alisque atris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 357. *n.* 118. *mant. inf.* 2. *p.* 295. *n.* 154.
Drury inf. 3. *t.* 46. *f.* 7. Cimex afer.
Stoll cimic. 2. *t.* 6. *f.* 41.
Schroet. Abh. 1. *t.* 2. *f.* 4.
Habitat in America.

dumosus. 46. C. subrotundus griseus, margine undique sanguineo. *Fn. suec.* 929.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 355. *n.* 101. *mant. inf.* 2. *p.* 293. *n.* 131.
Habitat in Europa.

308. C.

tripunctatus. 308. C. rotundatus flavescens, capite lineis, scutello punctis tribus nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 355. *n.* 102. *mant. inf.* 2. *p.* 293. *n.* 132.
Habitat in America.

atomarius. 309. C. griseo fuscoque varius, alis albis fusco punctatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 355. *n.* 103. *mant. inf.* 2. *p.* 293. *n.* 133.
Habitat in insula terrae novae.

nubilus. 310. C. griseo nigroque varius, alis albis nigro striatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 355. *n.* 104. *mant. inf.* 2. *p.* 293. *n.* 134.
Habitat ad caput bonae spei.

tristriatus. 311. C. flavescens, elytris apice puncto ocellari atro, abdomine lineis tribus albis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 293. *n.* 135.
Habitat in agro Pedemontano, *statura parva nubili.*

variolosus. 47. C. flavus, thorace subspinoso punctis fuscis excavatis varioloso, scutello basi gibbo.
Habitat in America *majusculus, aunon ad praecedentem tribum relegandus?*

juniperinus. 48. C. subrotundus viridis, margine undique scutelloque apice flavo. *Fn. suec.* 930.* *Scop. ent. carn.* 359. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 354. *n.* 98. *mant. inf.* 2. *p.* 292. *n.* 125. *Fuessli inf. helv. p.* 25. *n.* 487.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 464. *n.* 61. Cimex subrotundus viridis.
Raj. inf. p. 53 *n.* 1. Cimex sylvestris viridis.
Degeer inf. 3. *p.* 231. *t.* 13. *f.* 1. 2.
Habitat in Europae *juniperetis.*

smaragdulus. 312. C. viridis, scutello punctis tribus basecos flavis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 354. *n.* 99. *mant. inf.* 2. *p.* 292. *n.* 126.
Habitat in insula Madera.

Beryllus. 313. C. pallidus, thoracis margine aurantio, elytris macula ferruginea lineolisque marginalibus nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 292. *n.* 127.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

calidus. 314. C. supra fuscus, subtus testaceus, antennis nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 292. *n.* 128.
Habitat in Sierra Leon Africae, *mediae magnitudinis.*

caelebs. 315. C. fusco griseus, scutello punctis tribus apiceque flavescentibus. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 355. *n.* 100. *mant. inf.* 2. *p.* 292. *n.* 129.
Habitat in nova Hollandia.

iratus. 316. C. viridi-fuscus, thorace fascia flava. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 292. *n.* 130.
Habitat in Cayenna, *parvus, antennis nigris.*

prasinus. 49. C. subrotundus totus viridis, scutello concolore. *Fn. suec.* 931. *Fuessli inf. helv. p.* 25. *n.* 488.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 354. *n.* 96. *mant. inf.* 2. *p.* 292. *n.* 123. Cimex ovatus viridis immaculatus, antennis apice albo fuscoque annulatis.
Degeer inf. 3. *p.* 266. *n.* 9. Cimex viridis totus.
Stoll cimic. 2. *t.* 19. *f.* 127.
Habitat in silvis Europae *et ad* caput bonae spei.

dissimilis. 317. C. supra viridis subtus ferrugineus. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 354. *n.* 97. *mant. inf.* 2. *p.* 292. *n.* 124.
Habitat in Germania, *prasino proxime affinis.*

caeruleus. 50. C. caeruleus immaculatus. *Fn. suec.* 933.* *Fuessli inf. helv. p.* 25. *n.* 489. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 359. *n.* 129. *mant. inf.* 2. *p.* 296. *n.* 169.
Degeer inf. 3. *p.* 268. *n.* 11.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 472. *n.* 75.
Schaeff. ic. t. 51. *f.* 4.
Stoll cimic. t. 31. *f.* 221.
Habitat in Europae *thesio.*

Morio. 51. C. ater, plantis rufis. *Fn. suec.* 932.* *Fuessli inf. helv. p.* 25. *n.* 491. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 359. *n.* 130. *mant. inf.* 2. *p.* 296. *n.* 170.
Sulz. inf. t. 11. *f.* 77.
Schaeff. icon. t. 57. *f.* 11. *et t.* 82. *f.* 6.
Stoll cimic. t. 32. *f.* 223.
Habitat in Europae *oleraceis.*

tristis. 318. C. ater, clypeo orbiculato, thorace retuso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 360. *n.* 131. *mant. inf.* 2. *p.* 296. *n.* 171.
Degeer inf. 3. *p.* 269. *n.* 13. Cimex niger spinipes.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 470. *n.* 70.
Habitat in Europae *plantis.*

ſpinipes. 319. C. ater, pedibus piceis, tibiis ſpinoſiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 360. *n.* 132. *mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 172.
Habitat in Africa *aequinoctiali, nitidus, magnitudine et ſtatura morionis.*

Aethiops. 320. C. ater, thorace ſtriga media impreſſa, tibiis ſpinoſiſſimis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 173.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine oleracei.*

lugens. 321. C. fuſcus, thoracis lineola, ſcutello abdominisque margine albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 360. *n.* 133. *mant. inſ.* 2. *p.* 297. *n.* 174.
Habitat in America.

melanocephalus. 322. C. ſubrotundus griſeus, capite ſcutellique baſi nigro-aeneis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 360. *n.* 134. *mant. inſ.* 2. *p.* 297. *n.* 175.
Habitat in Anglia *et* Italia.

Lineola. 52. C. thorace laevi anterius atro, poſterius livido diſtincto punctis excavatis.
Habitat in America, *magnitudine fere tabani, capite atro, abdomine flavo, elytris incarnatis pallidisque.*

oleraceus. 53. C. caeruleo-aeneus, thorace lineola, ſcutello apice elytrisque puncto albo rubrove. *Fn. ſuec.* 934.* *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 492. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 359. *n.* 126. *mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 165.
Raj. inſ. p. 54. *n.* 6. Cimex ſylveſtris caeruleſcens.
Geoffr inſ. par. 1. *p.* 471. *n.* 74.
Degeer inſ. 3. *p.* 266. *n.* 10. *t.* 15. *f.* 22.
Schaeff. icon. t. 46. *f.* 4. 5.
Stoll cimic. 2. *t.* 5. *f.* 32. 33.
Habitat in Europae *tetradynamis, quas* 1760 *in* Suecia *devaſtavit.*

pictus. 323. C. ſubrotundus ſupra ater, thorace lineis tribus, ſcutello linea punctisque quatuor, elytris margine ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 359. *n.* 127. *mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 166.
Habitat in India.

verſicolor. 324. C. varius, capite abdomineque atris albo lineatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 167.
Habitat Tranquebariae, *ſtatura et magnitudine picti.*

biguttatus. 54. C. niger, margine undique albo, elytris puncto albo. *Fn. ſuec.* 935.* *Scop. ent. carn.* 356. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 359. *n.* 128. *mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 168. *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 493.

Habitat in Europae *plantis.*

bicolor. 55. C. elytris nigro alboque variis, alis albis. *Fn. ſuec.* 936.* *Scop. ent. carn.* 357. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 358. *n.* 125. *mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 164. *Fueſſli inſ. helv. p.* 126. *n.* 494.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 470. *n.* 73. Cimex ovatus niger, thoracis lateribus elytrorumque maculis quatuor albis.

Degeer inſ. 3. *p.* 268. *n.* 12. Cimex ovatus niger nitidus, thorace elytris tibiisque ſpinoſis albo maculatis.

Raj. inſ. p. 54. *n.* 5. Cimex colore nigro ſplendente, maculis albis picto.

Liſt. ſcar. p. 396. *n.* 38. Cimex niger, maculis candidis notatus.

Petiv. gazoph. t. 14. *f.* 7. Cimex niger albo maculatus.

Schaeff. icon. t. 41. *f.* 8. 9.

Stoll cimic. t. 32. *f.* 224.

Habitat in Europae *hortis.*

ornatus. 56. C. nigro rubroque varius, capite alisque nigris. *Fn. ſuec.* 937.* *Scop. ent. carn.* 361. *Fueſſli inſ. helv. p.* 26. *n.* 495. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 357. *n.* 119. *mant. inſ.* 2. *p.* 295. *n.* 155

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 469. *n.* 69.

Sulz. inſ. t. 11. *f.* 73.

Schaeff. icon. t. 60. *f.* 10.

Stoll cimic. 2. *t.* 2. *f.* 11.

Habitat in Europa *et* Oriente.

feſtivus. 57. C. nigro rubroque varius, thorace punctis ſex nigris, alis fuſcis: margine albido. *Fueſſli inſ. helv. p.* 26. *n.* 490. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 358. *n.* 120. *mant. inſ.* 2. *p.* 295. *n.* 156.

Scop. ent. carn. 362. Cimex dominulus.

Habitat in America *boreali*, Carniolia, Calabria, *ſtatura bicoloris, ſed magis oblongus.*

rutilus. 325. C. thorace abdomineque rufis, thorace maculis quatuor, abdomine faſciis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 358. *n.* 121. *mant. inſ.* 2. *p.* 295. *n.* 157.

Habitat in nova Hollandia.

326. C.

cruciatus. 326. C. nigro pallidoque varius, ſcutello nigro: cruce alba. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 358. *n.* 122. *mant. inf.* 2. *p.* 295. *n.* 158.
Habitat in India.

diſcoideus. 327. C. flaveſcens, capite diſco communi pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 295. *n.* 159.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine ornati.*

biocularatus. 328. C. rotundatus ſupra niger, thorace rufo: punctis duobus nigris, ſcutello margine rufo. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 358. *n.* 123. *mant. inf.* 2. *p.* 295. *n.* 160.
Habitat in America.

graminеus. 329. C. rotundatus viridis immaculatus. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 295. *n.* 161.
Habitat Tranquebariae, *parvus.*

fimbriatus. 330. C. rotundatus viridis, elytris griſeis: macula fuſca marginequo viridi. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 295. *n.* 162.
Habitat in Sina, *parvus.*

italicus. 331. C. obſcure rufus, ſcutello punctis duobus apiceque albis, abdominis margine nigro punctato. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 358. *n.* 124. *mant. inf.* 2. *p.* 296. *n.* 162.
Habitat in Italia, *magnitudine oleracei.*

ruber. 58. C. ruber, alis fuſcis, elytris lineola tranſverſa alba. *Fn. ſuec.* 938.*
Habitat in Europae *urticis aliisque plantis.*

acuminatus. 59. C. ovalis anterius attenuatus cinereo-exalbidus, antennis incarnatis. *Fn. ſuec.* 939.* *Fueſſli inf. helv. p.* 26. *n.* 498. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 360. *n.* 135. *mant. inf.* 2. *p.* 297. *n.* 176.
Cimex ovalis antice attenuatus exalbidus fuſco ſtriatus, antennis apice rufis.
Degeer inf. 3. *p.* 271. *n.* 16. *t.* 14. *f.* 12. 13. Cimex roſtratus.
Raj. inf. p. 56. *n.* 6. Muſca cimiciformis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 472. *n.* 77.
Liſt. mut. t. 31. *f.* 20.
Schaeff. icon. t. 42. *f.* 11.
Habitat in Europae *plantis.*

minutus. 61. C. elytris lividis apice fuſcis. *Fn. ſuec.* 941.*
Habitat in Europa.

collaris. 63. C. rostro arcuato, corpore nigro, thorace posterius elytrisque anterius ferrugineis, elytris posterius alisque nigris.
Habitat in Guinea, *oblongus, magnitudine et statura personati, an forte ejusdem cum eo tribus?*

javanicus. 332. C. luteus ano obtuso, antennis pedibusque ferrugineis. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 45.
Stoll cimic. t. 1. *f.* 2.
Habitat in Java, *glaber, inter maximos hujus generis.*

sinensis. 333. C. flavescens, ano quadridentato, sterno porrecto. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 45. *f.* 59.
Habitat in Japonia *et* Sina, *glaber, inter maximos hujus generis.*

brunneus. 334. C. supra brunneus subtus fuscus, antennis pilosis. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 45.
Habitat in India, *rufipede paulo major, glaber.*

Anchora. 335. C. rotundatus thorace elytrisque maculis sex nigris, scutello anchora alba. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 47. *f.* 60.
Habitat in Japonia *et* Sina, *grisei magnitudine, cruciato affinis.*

capensis. 336. C. rotundatus niger, thoracis elytrorumque marginibus rubris. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 47. *f.* 61.
Habitat ad caput bonae spei, *oleraceo paulo major, glaberrimus.*

Thunbergii. 337. C. rotundatus nigro cinereoque varius scutello punctis duobus flavis, capite thoraceque albo lineatis. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 48. *f.* 62.
Habitat - - - - grisei magnitudine, punctatissimus.

venosus. 338. C. rotundatus ruber fusco pictus, abdomine serie sextuplici punctorum nigrorum. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 49.
Habitat ad caput bonae spei, *oleracei magnitudine.*

costatus. 339. C. cinereus, linea elytrorum nigra. *Thunb. nov. inf. sp. p.* 50. *f.* 63.
Habitat in regionibus interioribus capitis bonae spei, *oleraceo paulo major, glaber.*

cornutus. 340. C. depressus cinereus, thorace lineis tribus elevatis, antennis fusiformibus. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 50.
Habitat in Japonia, *facie et magnitudine c. cardui, an hujus tribus?*

341. C.

melaleucos. 341. C. ater, elytris albis: maculis duabus nigris. *Thunb nov. inf. ſp.* 2. *p.* 50.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine ſcarabaeoidis, nitidus.*

hirtus. 342. C. ater, totus hirtus. *Thunb. nov. inf. ſp.* 2. *p.* 51.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine oleracei, opacus.*

niger. 343. C. ater, thorace tibiisque ciliatis. *Thunb. nov. inf. ſp.* 2. *p.* 51.
Habitat ad caput bonae ſpei, *in* America *auſtrali,* India, *oleracei magnitudine, aterrimus.*

aterrimus. 344. C. ater, elytris dimidiato hyalinis. *Forſter nov. inf. ſp.* 1. *p.* 71. *n.* 71.
Habitat in Hiſpania, *circa* fretum Gaditanum, *magnitudine ornati.*

flavatus. 345. C. niger, ſcutello elytrisque apice lateribusque flavis, thoracis margine lineaque media flavis. *Schranck Beytr. z. Naturg. p.* 79. §. 34.
Habitat Vindobonae.

viennenſis. 346. C. caeruleo-aeneus, elytris margine albo. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 80. §. 35.
Habitat Vindobonae.

venuſtiſſimus. 347. C. argenteus, capite thoracis ſcutellique baſi violaceo-aeneis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 80. §. 36.
Habitat in Auſtria *ſuperiore.*

dubius. 348. C. atro-caeruleus punctatus nitens, thoracis elytrorumque margine exteriore albo. *Scop. ent. carn. p.* 121. *n.* 355.
Habitat in Carniolia.

aeneus. 349. C. pallide aeneus: punctis impreſſis nigris, ſcutello abdomen ſubaequante: baſi punctis duobus albis. *Scop. ent. carn. p.* 122. *n.* 358.
Habitat prope Idriam Carnioliae.

danicus. 350. C. niger, elytris faſciis duabus luteis. *Müll. Fn. Fridrichsd. p.* 29. *n.* 274. *zool. dan. prodr. p.* 106. *n.* 1202.
Habitat in Dania.

roſeus. 351. C. fuſcus, abdomine incarnato, pedibus pallidis: femoribus puncto nigro. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 105. *n.* 1197.
Habitat in Dania.

alatus. 352. C. rufus elytris alas mentientibus, antennis clavatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 106. *n.* 1204.
Habitat in Dania.

rufescens. 353. C. thorace obtuse angulato, corpore e viridi rubroque nebuloso. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 465. *n.* 62.
Habitat in Gallia.

pullus. 354. C. ex fusco niger, alis pallidis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 470. *n.* 71.
Habitat in Gallia.

leucomelas. 355. C. niger, elytrorum limbo exteriore albo. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 470. *n.* 72.
Habitat in Gallia.

arboreus. 356. C. supra fusco-viridis, subtus flavescens, thorace linea transversa flava, elytris rubro marginatis, ano bidentato rubro. *Degeer inf.* 3. *p.* 260. *n.* 7.
Habitat in Europae *arboribus*, 5 *lineas longus.*

pusillus. 357. C. griseus albo marginatus nigro punctatus, abdomine aeneo nigro. *Degeer inf.* 3. *p.* 270. *n.* 15.
Habitat in Europa.

parnassiae. 584. C. thorace rubro, alis fuscis, corpore nigro. *Mayer Abh. boehm. Ges.* 4. *p.* 183.
Habitat in Bohemiae *floribus parnassiae palustris, minimus, lente incedens, volatu agilis.*

fulvus. 597. C. fulvus, alis posterius ex fusco violaceis, abdomine subtus pallido: apice quadridentato. *Mus. Lesk. p.* 119. *n.* 88.
Habitat extra Europam.

varius. 598. C. rotundatus ater, scutelli abdominisque marginibus, elytris thoraceque rubris: hoc anterius linea atra, membranis fuscis, alis luteis apice fuscis. *Mus. Lesk. p.* 119. *n.* 89.
Habitat extra Europam.

tricolor. 599. C. subrotundus virescens, margine undique flavo, antennis rufis. *Mus. Lesk. p.* 119. *n.* 91.
Habitat in Europa.

albidus. 600. C. ſubrotundus albidus, antennis nigris: geniculis albis, elytris livido rufoque variis, ſcutelli apice albo. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 93.
Habitat in Europa.

undatus. 601. C. ovalis pallidus, capite acuminato: lineis quatuor, ſcutelli thoracisque punctis, antennis elytrorumque rugis transverſis undatis nigris. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 97.
Habitat extra Europam.

palleſcens. 602. C. pallidus nigro punctatus thoracis ſcutellique apice elytrorumque marginibus externis albidis. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 98.
Habitat in Europa.

nigerrimus. 603. C. niger immaculatus. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 103.
Habitat in Europa.

melanoleucos. 604. C. ovatus niger, thorace elytrorumque margine exteriore albo. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 104.
Habitat in Europa.

ciliatus. 605. C. niger, capite, thorace elytrisque ciliatis et pedibus nigris. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 105.
Habitat in Europa.

exciſus. 606. C. griſeus, elytrorum membrana extus exciſa, abdomine nigro. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 106.
Habitat in Europa.

†† *Oblongi.*
⊥ *antennis apice capillaribus.*

triſaſciatus. 67. C. corpore nigro rubroque vario.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 372. *n.* 202. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 267.
Cimex oblongus niger, antennis apice capillaribus, elytris faſciis tribus rufis.
Schaeff. icon. t. 13. *f.* 8.
Habitat in Europa.

olivaceus. 358. C. elytris fuſco-ferrugineis baſi coccineis: puncto atro.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 372. *n.* 203. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 268.
Schaeff. icon. t. 13. *f.* 2.
Habitat in Germania.

ſeticornis. 359. C. ater, elytris fuſcis baſi pallidis apiceque puncto coccineo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 372. *n.* 204. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 269.
Habitat Lipſiae, *capite rarius rufo.*

capillaris. 360. C. flaveſcens, elytris apice coccineis, antennis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 372. *n.* 205. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 270.
Habitat in Lipſiae *hortis.*

ſemiflavus. 68. C. corpore nigro, thorace pedibusque teſtaceis.
Habitat in Suecia, *ſtatura atri, capite antennarumque baſi pilis albis hirta teſtaceis.*

erythropus. 69. C. roſtro arcuato, thorace poſterius emarginato, pedibus rubris.
Habitat in Barbaria, *nigro rubroque varius, antennis fuſcis, elytris rufis, abdomine nigro: margine albo nigroque vario; an forte ad ultimam cimicum tribum relegandus?*

ater. 72. C. corpore atro. *Fn. ſuec.* 944. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 371. *n.* 197. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 261.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 460. *n.* 54. Cimex oblongus ater, antennis ſeta terminatis.
Habitat in Europa *boreali, etiam* Calabria.

tyrannus. 361. C. ater, roſtro femoribusque ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 371. *n.* 198. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 262.
Habitat in Italia, *atro proxime affinis.*

Schach. 362. C. ater, capite ſcutello maculisque duabus elytrorum coccineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 371. *n.* 199. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 263.
Habitat in Italia, *ſtatura tyranni.*

gothicus. 73. C. niger, ſcutello elytrorumque apicibus coccineis. *Fn. ſuec.* 966.* *Scop. ent. carn.* 381. *Fueſſli inſ. helv. p.* 26. *n.* 501. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 372. *n.* 206. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 271.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 445. *n.* 19. Cimex oblongus niger, thoracis lateribus ſcutelloque flavis, elytris antennis pedibusque flavo variegatis.
Schaeff. icon. t. 13. *f.* 5.
Habitat in Europa, *frequens.*

tricolor. 363. C. ater, elytris apice macula coccinea. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 306. *n.* 272.

Habitat

Habitat in Hiſpaniae *urtica*, *gothico proxime affinis*, *alis nigris*, *macula marginali transverſa pallida.*

umbratilis. 90. C. niger, elytris albo maculatis. *Fn. ſuec.* 951.*
Fabr. mant. inſ. 2. *p.* 305. *n.* 265. Cimex oblongus niger, elytris flavo lineatis apice faſcia alba, antennis apice capillaribus.
Habitat in Suecia, *mediae magnitudinis*, *pedibus piceis.*

flavicollis. 364. C. niger, capite thorace pedibusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 371. *n.* 201. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 266.
Habitat in Anglia.

inclavatus. 97. C. niger, elytris fuſcis: faſciis duabus nigris.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 371. *n.* 200? *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 264? Cimex (bifaſciatus) oblongus fuſcus, elytris faſciis duabus albis, antennis apice capillaribus.
Habitat Lipſiae.

cimbricus. 365. C. thorace elytrisque rubellis: apice macula coccinea, nigra duplicique alba. *Müll. prodr. zool. dan. p.* 106. *n.* 1212.
Habitat in Dania; *an varietas gothici?*

trilineatus. 366. C. niger, thorace pedibusque cinereis, elytris fuſcis: lineolis transverſis tribus candidis. *Müll zool. dan. prodr. p.* 106. *n.* 1213.
Habitat in Dania.

ſpiſſicornis. 367. C. niger, pedibus flavis, antennis incraſſatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 372. *n.* 207. *mant. inſ.* 2. *p.* 306. *n.* 273.
Habitat Hamburgi.

planicornis. 368. C. niger, alis lacteſcentibus, pedibus ex griſeo luteſcentibus, antennarum articulo medio compreſſo maximo. *Pall. ſpic. zool.* 9. *p.* 23. *t.* 1. *f.* 13.
Habitat in Belgio, *parvus.*

haſticornis. 369. C. rufus, pectore abdomineque faſciis albis nigrisque, antennarum articulo penultimo compreſſo rotundato. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 53. *f.* 64.
Habitat in Aittonia *capenſi*, *ad* caput bonae ſpei, *Decembri frequens*, *glaber*, *perſonati magnitudine.*

punctipes. 607. C. flaveſcens, femoribus fuſco punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 137.
Habitat in Europa.

quadrimaculatus. 608. C. flavescens, thorace maculis quatuor fuscis. *Mus. Lesk. p.* 121. *n.* 138.
Habitat in Europa.

fuliginosus. 609. C. niger, capite thorace elytrisque rufescentibus, thorace posterius fusco, scutello flavescente, elytrorum apice inflexo coccineo. *Mus. Lesk. p.* 121. *n.* 139.
Habitat in Europa.

erythrochlorus. 610. C. oblongus rufescens, thorace scutelloque flavis. *Mus. Lesk. p.* 121. *n.* 140.
Habitat in Europa.

chrysocephalus. 611. C. niger, capite flavo: linea longitudinali nigra, elytris ex fusco rufis: apice inflexo coccineo. *Mus. Lesk. p.* 121. *n.* 141.
Habitat in Europa.

stramineus. 612. C. niger, elytris pallidis: apice inflexo coccineo. *Mus. Lesk. p.* 121. *n.* 142.
Habitat in Europa.

concolor. 613. C. fuscus, capite thoraceque rufis, antennis scutelloque flavis, pedibus pallidis. *Mus. Lesk. p.* 121. *n.* 143.
Habitat in Europa.

tomentosus. 614. C. capite thoraceque fuscis fulvo tomentosis, abdomine rufo, elytris fusco pallidis: apice inflexo flavo, puncto extremo nigro. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 144.
Habitat in Europa.

melanochrysos. 615. C. niger, scutello posterius, elytris apice inflexo flavis. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 145.
Habitat in Europa.

bivenis. 616. C. niger, elytris e flavo fuscis: apice inflexo flavo venisque duabus rubris. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 146.
Habitat in Europa.

leucozonias. 617. C. angustus niger, antennis basi rubris, thorace posterius scutelloque flavis, elytris rufis: fascia obliqua apiceque inflexo albis. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 147.
Habitat in Europa.

tricolor. 618. C. niger, elytris flavis: fascia transversa apiceque fuscis. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 148.
Habitat in Europa.

619. C.

ochromelas. 619. C. niger, antennarum elytrorumque basi, horum apice inflexo pedibusque flavis. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 149.
Habitat in Europa.

exoletus. 620. C. niger, thorace posterius tibiis elytrisque pallidis, horum apice inflexo rufo marginato. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 150.
Habitat in Europa.

phoenicopterus. 621. C. fuscus, capite thorace elytrisque rufescentibus, antennis pedibusque pallidis. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 151.
Habitat in Europa.

fuscoculus. 622. C. flavus, oculis fuscis. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 152.
Habitat in Europa.

leucogrammus. 623. C. supra rufescens, capite dorsali, abdomine subtus utrinque linea alba, thoracis tribus, elytris medio et margine externo albis: apice inflexo flavo. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 153.
Habitat in Europa.

expallescens. 624. C. fuscus, capite ventre elytrisque pallidis, his fusco subnebulosis, thorace subconico: lineolis tribus fuscis. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 154.
Habitat in Europa.

flavescens. 625. C. pallide flavus. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 155.
β) Cimex flavescens, capite utrinque, scutello basi elytrisque apice inflexo fuscis. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 156.
Habitat in Europa.

pallescens. 626. C. pallidus rufo adspersus. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 158.
β) Cimex pallidus rufescens, scutello flavo. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 159.
Habitat in Europa.

leucodermis. 627. C. ovatus pallidus: membrana elytrorum alba. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 162.
Habitat in Europa.

discolor. 628. C. niger, elytris griseis: apice membranarumque apice albis. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 160.
Habitat in Europa.

imperialis. 629. C. niger, elytrorum margine externo, basi et apice inflexo flavis. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 161.
Habitat in Europa.

630. C.

melanorhous. 630. C. antennis, thoracis margine, ſcutelli apice, pedibus et abdomine flavis, hujus apice nigro. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 163.
Habitat in Europa.

vittatus. 631. C. niger, thorace anterius poſteriusque ſcutelloque flavis, antennarum baſi elytrisque rufis: vitta apiceque inflexo albis. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 164.
Habitat in Europa.

melanogaſter. 632. C. ovatus rufeſcens abdomine medio ſubtus atro. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 166.
Habitat in Europa.

ſordens. 633. C. ovatus niger, thorace pedibusque rufis, his fuſco variis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 167.
Habitat in Europa.

vitellinus. 634. C. ovatus flavus, elytris apicem verſus rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 168.
Habitat in Europa.

haematocephalus. 635. C. ovatus niger, elytris rufo-fuſcis: apice capiteque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 169.
Habitat in Europa.

leoninus. 636. C. ovatus flavo-rufus, thorace anterius maculis duabus nigris, elytris pallidis: apice inflexo fuſco. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 170.
Habitat in Europa.

carbonarius. 637. C. ovatus totus niger. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 171.
Habitat in Europa.

notatus. 638. C. ovatus pallidus, elytrorum apice inflexo: ſingulis angulo puncto fuſco. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 172.
Habitat in Europa.

diſcors. 639. C. ovatus ſupra pallidus ſubtus flavus. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 173.
Habitat in Europa.

fuſceſcens. 640. C. ovatus niger, capite elytrisque pallidis: margine externo apiceque inflexo fuſceſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 174.
Habitat in Europa.

641. C.

melanopterus. 641. C. ovatus fuſcus, elytris nigris: baſi, medio marginis antici apiceque inflexo, capite et thorace anterius flavis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 175.
Habitat in Europa.

leucoceras. 642. C. fuſcus, antennis, elytris pedibusque albidis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 176.
Habitat in Europa.

ochropterus. 643. C. ater, thorace, elytris pedibusque flaveſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 177.
Habitat in Europa.

melanoleucos. 644. C. ovatus niger, capite, thoracis dorſo, elytrorumque faſcia media et apice inflexo albis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 178.
Habitat in Europa.

erythrogaſter. 645. C. ovatus, thorace anterius nigro capite elytrisque pallidis: punctis apiceque inflexo fuſcis, abdomine rufeſcente. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 179.
Habitat in Europa.

ſtiſticus. 646. C. ovatus niger, capite elytrisque pallidis, femoribus nigro punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 180.
Habitat in Europa.

nubilus. 647. C. ovatus niger, elytris albis fuſco nebuloſis, pedibus rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 181.
Habitat in Europa.

leucopus. 648. C. fuſcus, antennis, thorace, elytris pedibusque albidis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 182.
Habitat in Europa.

conſperſus. 649. C. ovatus rufeſcens, elytris albis rufo adſperſis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 183.
Habitat in Europa.

chloropterus. 650. C. pallidus, thorace, elytris abdomineque vireſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 184.
Habitat in Europa.

albicans. 651. C. ovatus pallidus, alis albis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 185.
Habitat in Europa.

albidus. 652. C. ovatus rufeſcens, elytris antennis pedibusque albidis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 186.
Habitat in Europa.

brunneus. 653. C. ovatus brunneus, alis albis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 187.
Habitat in Europa.

chryſopus. 654. C. ovatus niger, capite elytrorum margine externo pedibusque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 188.
Habitat in Europa.

II *antennis clavatis.*

Branderi. 66. C. roſtro arcuato, thorace ſubſexſpinoſo, elytris punctis tribus albis.
Habitat in Barbaria, *mediae magnitudinis, griſeus, ſubtus teſtaceus, antennis rufis, ſtatura perſonati.*

craſſicornis. 92. C. ſubgriſeus rubro punctatus. *Fn. ſuec.* 952.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 369. *n.* 188. *mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 139.
Schaeff. icon. t. 13. *f.* 10.
Habitat in Europa.

Colon. 370. C. rubro nigroque varius, membranis elytrorum albis: puncto nigro. *Thunb. nov. inſ. ſpec.* 3. *p.* 57.
Habitat in Japonia, *campeſtris magnitudine.*

deuſtus. 371. C. rufo-fuſcus, ſcutelli apice, thoracis abdominisque marginibus rubris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 58.
β) Stoll cimic. t. 13. *f.* 87.
Habitat - - - magnitudine c. hyoſcyami.

tuberculoſus. 372. C. abdomine ſupra rufo, antennarum nodis binis: extremo longiore. *Scop. ent. carn. p.* 128. *n.* 372.
Habitat prope Idriam Carnioliae.

Oculus cancri. 373. C. ex livido flavus: maculis ſanguineis, oculis capitulo cylindrico inſidentibus. *Degeer inſ.* 3. *p.* 343. *n.* 18. *t.* 34. *f.* 24.
Habitat in Surinamo.

moeſtus. 374. C. fuſcus, ſubtus rufo-lividus, thoracis margine livido. *Degeer inſ.* 3. *p.* 340. *n.* 14. *t.* 34. *f.* 20.
Habitat in Penſylvania.

ſubrufus. 677. C. pallide rufus, elytrorum feneſtratorum apice, clava, ſcutelloque rufis, hujus apice pallido. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 119.
Habitat in Europa.

678. C.

ſtictopterus. 678. C. niger, elytris griſeis punctatis: apice maculis tribus fuſcis, membrana alba truncata, antennis pallidis: clava nigra. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 120. b.
Habitat in Europa.

ictericus. 679. C. fuſcus, capite thoraceque rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 130.
Habitat in Europa.

⊥⊥⊥ *antennis filiformibus.*
⊣ *pedibus muticis.*

leucocephalus. 60. C. niger, capite pedibusque fulvis. *Fn. ſuec.* 940.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 370. *n.* 192. *mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 255.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 472. *n.* 76.
Degeer inſ. 3. *p.* 290. *n.* 28.
Habitat in Europa.

transverſalis. 375. C. viridis, thorace lineola interrupta, elytris macula fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 256.
Habitat Kilonii, *ſtatura leucocephali, at duplo minor.*

haematodes. 376. C. ſanguineus, capite elytrorumque apicibus albidis, alis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 370. *n.* 193. *mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 257.
Habitat in Germania.

tripuſtulatus. 377. C. niger, ſcutello maculisque elytrorum tribus coccineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 370. *n.* 194. *mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 258.
Habitat in urticae dioicae *racemis,* Hafniae *frequens, parvus.*

Indus. 74. C. abdomine rubro bidentato, elytris fuſcis pallide ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 176.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 362. *n.* 140. *mant. inſ.* 2. *p.* 297. *n.* 183.
Habitat in America *auſtrali et* India.

militaris. 378. C. rufus nigro maculatus, alis exalbidis: ſtriga baſeos atra. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 362. *n.* 141. *mant. inſ.* 2. *p.* 297. *n.* 184.
Habitat in Oriente.

laniarius. 75. C. rufus, elytris apice ſanguineis, thorace nigricante, abdomine flavo.
Habitat in Suecia, *mediae magnitudinis.*

hyoſcyami. 76. C. rubro nigroque varius, alis fuſcis immaculatis. *Fn. ſuec.* 945.* *It. oel.* 155.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 362. *n.* 144.
mant.

mant. inf. 2. *p.* 298. *n.* 189. *Fuessli inf. helv. p.* 26. *n.* 502.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 441. *n.* 12. Cimex oblongus rubro nigroque variegatus, scutelli nigri apice rubro.

Degeer inf. 3. *p.* 274. *n.* 18. *t.* 14. *f.* 14. 15. Cimex oblongus ruber nigro maculatus &c.

List. scar. angl. p. 397. *n.* 39. Cimex miniatus nigris maculis notatus.

Raj. inf. p. 55. Cimex sylvestris minor, corpore oblongo angusto.

Petiv. gazoph. t. 62. *f.* 2.

Merian. inf. eur. t. 51. *f.* 1.

Sulz. inf. t. 11. *f.* 75.

Schaeff. icon. t. 13. *f.* 1.

familiaris. 379. C. rubro nigroque varius, alis fuscis: puncto baseos albo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 363. *n.* 145. *mant. inf.* 2. *p.* 298. *n.* 190.
Habitat in Europae *et* Indiae *plantis, statura et magnitudine c. hyoscyami.*

rostratus. 380. C. rufus, scutello vitta marginali flava. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 363. *n.* 146. *mant. inf.* 2. *p.* 298. *n.* 191.
Habitat in Africa *aequinoctiali, mediae magnitudinis.*

malabaricus. 381. C. fuscescens, thorace scutelloque punctis duobus nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 363. *n.* 147. *mant. inf.* 2. *p.* 298. *n.* 192.
Habitat ad littora malabarica.

aulicus. 382. C. rubro nigroque varius, elytris fascia atra, alis atris: lineola basis alba. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 363. *n.* 148. *mant. inf.* 2. *p.* 298. *n.* 193.

β) Cimex irroratus. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. *p.* 55. *f.* 65.
Habitat in insulis Americae *meridionali oppositis,* β) *ad* caput bonae spei.

383. C.

Huc inter oblongos scilicet cimices referas plures a Seba *mus. vol.* 4. *delineatas species, productiorem t.* 95. *f.* 28. *pallide virescente flavum t.* 95. *f.* 29. *sphaerico-collarem t.* 95. *f.* 30. *setaceum t.* 95. *f.* 35-37. *luteo-fuscum t.* 97. *f.* 3. *nigro-rufum t.* 97. *f.* 5. *apterum serratum t.* 97. *f.* 12. *informem t.* 97. *f.* 21. 22. *nigricantem t.* 97. *f.* 23. *brunneo-atrum t.* 97. *f.* 24. 25. *setipedem t.* 97. *f.* 28. 29. *sordidum t.* 97. *f.* 30. 31. *fusco discolorem t.* 97. *f.* 32. *nigro-cinerascentem t.* 97. *f.* 33. 34. *ovatis contra accenseas foliaceum t.* 96. *f.* 28. *peltoidem t.* 96. *f.* 29. *rubripedem t.* 97. *f.* 2. *et plures a* Schaeffero *in iconibus depictos t.* 46. *f.* 6. *t.* 46. *f.* 7. 8. *t.* 57. *f.* 4. *t.* 57. *f.* 5. *t.* 57. *f.* 10. *t.* 57. *f.* 11. *t.* 79. *f.* 4. *t.* 170. *f.* 4. 5. *t.* 210. *f.* 3. a. b. *t.* 219. *f.* 3. a. b. *t.* 250. *f.* 5. 6. *t.* 272. *f.* 3. 4. *t.* 272. *f.* 5. 6. *quorum descriptio ab* Hanero *exspectanda.*

varicornis. 383. C. variegatus, capite pedibusque rufis, thoracis marginibus pallidis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 298. *n.* 194.
Habitat in India, *magnus.*

pallens. 384. C. pallescens, thorace elytrisque fuscis: margine pallido. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 363. *n.* 149. *mant. inf.* 2. *p.* 299. *n.* 195.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *mediae magnitudinis.*

cingulatus. 385. C. thorace testaceo anterius nigro: margine albo, elytris puncto nigro. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 364. *n.* 150. *mant. inf.* 2. *p.* 299. *n.* 196.
Habitat in nova Hollandia.

superstitiosus. 386. C. rufus, antennis, thoracis basi, fascia elytrorum alisque nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 364. *n.* 151. *mant. inf.* 2. *p.* 299. *n.* 197.
Thunb. nov. inf. sp. 3. *p.* 55. *f.* 66. Cimex oblongus rufus, thorace fascia nigra albo adjecta, elytris puncto nigro.
Habitat in America *et ad* caput bonae spei, *equestris magnitudine.*

erythromelas. 387. C. rufus, elytris nigris: fascia alba. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 364. *n.* 152. *mant. inf.* 2. *p.* 299. *n.* 198.
Degeer inf. 3. *p.* 335. *n.* 9. *t.* 34. *f.* 11. Cimex albo fasciatus.
Habitat in Surinamo, *thoracis elytrorumque margine albido.*

ruficollis. 388. C. glaucus, capite atro, thorace anterius rufo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 364. *n.* 153. *mant. inf.* 2. *p.* 299. *n.* 199.
Habitat in Brasilia.

scabrosus. 389. C. niger, thoracis margine elytrorumque fasciis duabus rufescentibus. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 364. *n.* 154. *mant. inf.* 2. *p.* 299. *n.* 200.
Habitat in America.

leprosus. 390. C. thorace nigro, basi margine punctisque duobus rubris, elytris atris immaculatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 364. *n.* 155. *mant. inf.* 2. *p.* 299. *n.* 201.
Habitat in America.

leucurus. 391. C. niger, capite elytrisque rubris, alis atris basi apiceque albis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 299. n. 202.
Habitat in insula oceani australis Amsterdam, *magnitudine c. Koenigii.*

Koenigii. 392. C. teſtaceus, elytris puncto nigro, alis atris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 364. *n.* 156 *mant. inſ.* 2. *p.* 299. *n.* 203.
Stoll cimic. 2. *t.* 1. *f.* 5.
Habitat Tranquebariae.

Slanbuſchii. 393. C. ſanguineus, thorace faſcia abbreviata, ſcutello, elytris puncto alisque atris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 299. *n.* 204.
Habitat in Sina, *ſtatura et magnitudine c. Koenigii.*

equeſtris. 77. C. rubro nigroque maculatus, thorace anterius poſteriusque atro, alis atris albo maculatis. *Fabr. mant.* 2. *p.* 298. *n.* 185.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 726. *n.* 777. *Fn. ſuec.* 946.* *It. oel.* 155. *Muſ. Lud. Ulr.* 177. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 362. *n.* 142. Cimex oblongus rubro nigroque varius, alis fuſcis albo maculatis.
Scop. ent. carn. 369. Cimex ſpecioſus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 442. *n.* 14.
Degeer inſ. 3. *p.* 276. *n.* 19.
Schaeff. elem. t. 44. *f.* 2.
icon. t. 48. *f.* 8.
Habitat in Europae *potiſſimum vincetoxico, c. hyoſcyami duplo major.*

civilis. 394. C. rubro nigroque varius, thorace lunulis duabus nigris, alis fuſcis albo maculatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 298. *n.* 186.
Habitat Tranquebariae, *equeſtri affinis.*

crudelis. 395. C. rubro nigroque varius, alis exalbidis, antennis pedibusque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 362. *n.* 143. *mant. inſ.* 2. *p.* 298. *n.* 187.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura equeſtris.*

apterus. 78. C. rubro nigroque varius, elytris rubris: punctis duobus nigris, alis nullis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 366. *n.* 169. *mant. inſ.* 2. *p.* 301. *n.* 222. *Scop. ent. carn.* 370. *Fueſſli inſ. helv. p.* 26. *n.* 504.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 440. *n.* 11. *t.* 9. *f.* 4.
Degeer inſ. 3. *p.* 276. *n.* 20.
Raj. inſ. p. 55. *n.* 3.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 14.
Stoll cimic. 2. *t.* 15. *f.* 103.
Habitat gregarius in Europa, *rarius in malva ſilveſtri, interdum alatus.*

396. C.

ſtriatulus. 396. C. flaveſcens, ſcutello elytris alisque fuſcis, elytris apice cinereis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 366. *n.* 170. *mant. inſ.* 2. *p.* 301. *n.* 224.
Habitat in Braſilia.

nuſſax. 397. C. fuſcus, abdominis margine maculato, tibiis anterioribus femoribusque poſterioribus baſi pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 366. *n.* 171. *mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 223.
Habitat in Italia, *mediae magnitudinis.*

aegyptius. 79. C. rubro nigroque varius, elytris rubris: puncto nigro. *Muſ. Lud. Ulr.* 178.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 364. *n.* 157. *mant. inſ.* 2. *p.* 300. *n.* 205.
Habitat in Aegypto.

mendicus. 398. C. rubro fuſcoque varius, alis atris: apice lineolaque baſeos albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 365. *n.* 158. *mant. inſ.* 2. *p.* 300. *n.* 200.
Habitat in Malabaria.

ſervus. 399. C. rubro nigroque varius, elytris apice albis, alis nigris apice albidis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 300. *n.* 207.
Habitat in Sina, *parvus, ſtatura mendici.*

famelicus. 400. C. ſupra ater thorace elytrisque punctis duobus flaveſcentibus, alis lineola baſeos alba. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 365. *n.* 159. *mant. inſ.* 2. *p.* 300. *n.* 208.
Stoll cimic. 2. *t.* 8. *f.* 56?
Habitat ad caput bonae ſpei, *mediae magnitudinis.*

quadriguttatus. 401. C. elytris rufis: faſcia nigra, alis punctis duobus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 365. *n.* 160. *mant. inſ.* 2. *p.* 300. *n.* 209.
Habitat in nova Hollandia.

diſcolor. 402. C. niger, elytris rufis: puncto medio atro, alis atris: punctis duobus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 365. *n.* 161. *mant. inſ.* 2. *p.* 300. *n.* 210.
Habitat in Italia, *parvus.*

auſtralis. 403. C. elytris rufis: ſtriga undata nigra, alis nigris: puncto medio albo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 365. *n.* 162. *mant. inſ* 2. *p.* 300. *n.* 211.
Habitat in nova Hollandia.

sanguinolentus. 404. C. sanguineus, antennis elytris pedibusque fuscis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 365. *n.* 163. *mant. inf.* 2. *p.* 300. *n.* 212.
Habitat in insulis, Americae *meridionali oppositis.*

hispanicus. 405. C. thorace elytrisque rufis: maculis duabus nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 300. *n.* 213.
Habitat in Hispania, *magnitudine et statura sanguinolenti.*

cruentatus. 406. C. rufus, thoracis maculis duabus, antennis, alis pedibusque fuscis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 301. *n.* 214.
Habitat in India, *sanguinolento proxime affinis.*

futuralis. 407. C. rufus, antennis alisque nigris: futuris omnibus albis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 365. *n.* 164. *mant. inf.* 2. *p.* 301. *n.* 215.
Habitat in insulis, Americae *meridionali oppositis.*

rubiginosus. 408. C. supra rufus, alis albidis: macula magna fusca. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 301. *n.* 216.
Habitat ad caput bonae spei, *futurali major.*

excavatus. 409. C. rufus, antennis, pectore, ano pedibusque atris, scutello canaliculato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 365. *n.* 165. *mant. inf.* 2. *p.* 301. *n.* 217.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *magnus.*

fuscatus. 410. C. sanguineus, thoracis lineis, scutello, alis, ano pedibusque atris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 301. *n.* 218.
Habitat in Guinea, *magnus.*

Carnifex. 411. C. rufus, antennis tibiisque fuscis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 366. *n.* 166. *mant. inf.* 2. *p.* 301. *n.* 219. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 51.
Habitat ad caput bonae spei, *potissimum in tanaceto crithmifolio*, *magnitudine c. Rolandri.*

Augur. 412. C. rufus, antennis alis pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 366. *n.* 167. *mant. inf.* 2. *p.* 301. *n.* 220. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. *p.* 57.
Stoll cimic. 2. *t.* 18. *f.* 124.
β) *Stoll cimic.* 2. *t.* 13. *f.* 89.
Habitat ad caput bonae spei, India, Sina, *carnifici affinis, equestri major.*

mactans. 413. C. supra rufus, thorace scutelloque punctis duobus nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 366. *n.* 168. *mant. inf.* 2. *p.* 301. *n.* 221.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

80. C.

Andreae. 80. C. ſanguineus, antennis tibiis roſtro alisque nigris. *Muſ Lud. Ulr.* 179.*
Sloane jam. 2. *p.* 237. *f.* 29. 30. Cimex ſylveſtris oblongus e cinereo et nigro variegatus, ſupina parte cruce S. Andreae notatus.
β) Cimex ruficollis. *Muſ. Lud. Ulr.* 180.
γ) Cimex thorace nigro. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 56.
Habitat in America. γ) *in* Japonia.

ſaxatilis. 81. C. niger, thoracis margine laterali lineaque rubris, elytris maculis tribus rubris. *Scop. ent. carn.* 371. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 298. *n.* 188.
Habitat in Europa *magis auſtrali, ſubtus rubro nigroque varius, capitis macula rubra anterius bifida.*

ſuccinctus. 82. C. thoracis elytrorumque margine exteriore femorumque baſi rufis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 400. *n.* 44. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 369. *n.* 185. *mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 241.
Degeer inſ. 3. *p.* 339. *n.* 13. *t.* 34. *f.* 19. Cimex rubrocinctus.
Habitat in Americae *borealis plantis.*

tunicatus. 414. C. ſupra ferrugineo-fuſcus, corpore elytrorumque margine flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 369. *n.* 186. *mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 242.
Habitat in Germania, *antennis rufis: articulorum apice nigro.*

pubicornis. 415. C. rufus, antennis, pectore elytris tibiisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 369. *n.* 187. *mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 243.
Habitat in America.

Kalmii. 83. C. viridis, ſcutello macula cordata flava, elytris maculis duabus nigris. *Fn. ſuec.* 948.*
Habitat in Europa.

ſuperciliosus. 84. C. niger, palpebra elytrorumque margine albis.
Habitat in Suecia, *mediae magnitudinis.* Modeer.

pratenſis. 86. C. flaveſcens, elytris viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 370. *n.* 190. *mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 247.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 728. *n.* 86. *Fn. ſuec.* 949.* *Scop. ent. carn.* 386. Cimex oblongus griſeus, ſcutello macula cordata flava, elytris apice puncto fuſco.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 451. *n.* 33.
Habitat in Europae *pratis frequens.*

floralis. 416. C. ſupra obſcure griſeus, elytris apice puncto rubro, femoribus poſterioribus elongatis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 248.

Habitat in Hafniae *floribus*, *ſtatura pratenſis*, *antennis pallidis.*

norwegicus. 417. C. viridis, thorace bipunctato, elytris pallidioribus: puncto apicis flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 370. *n.* 191. *mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 249.
Habitat in Norwegiae *plantis.*

inquinatus. 418. C. flaveſcens, elytris nigris albo variis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 250.
Habitat Kilonii, *mediae magnitudinis.*

naſſatus. 419. C. viridis, antennis pedibusque flaveſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 251.
Habitat Hafniae *in tilia*, *parvus*, *immaculatus.*

tiliae. 420. C. vireſcens, faſciis tribus fuſcis; media angulata. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 374. *n.* 218. *mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 252.
Habitat Kilonii.

campeſtris. 87. C. flaveſcens, elytris macula ferruginea. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 370. *n.* 189. *mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 246.
Syſt. nat. XII. 2. *p* 728. *n.* 87. *Fn. ſuec.* 950.* Cimex oblongus viridis, ſcutello macula cordata viridi, elytris macula ferruginea.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 452. *n.* 34.
Habitat in Europae *campis.*

nemoralis. 421. C. niger, thorace elytrisque flaveſcentibus, ſcutello macula diſci nigra. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 245.
Habitat in Barbaria, *ſtatura et magnitudine campeſtris.*

melanocephalus. 88. C. niger, thorace, elytris antennis pedibusque pallidis.
Habitat in Suecia, *parvus.* Solander.

hiſtrionicus. 89. C. niger, ſcutello flavo, elytris pedibusque teſtaceis.
Habitat in Europa, *magnitudine culicis.*

nemorum. 91. C. niger, elytris alisque fuſco alboque variis, pedibus teſtaceis. *Fn. ſuec.* 953.*
Habitat in Europa.

ſaltatorius. 93. C. niger, elytris ſtriatis, alis poſterius flavo maculatis. *Fn. ſuec.* 954.* *It. oel.* 121. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 371. *n.* 196. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 260.
Raj. inſ. p. 57. *n.* 2. Cimex brevis et fere rotundus nigricans.
Habitat in Europa *ad littora.*

94. C.

trigutta- tus. 94. C. niger, elytris alisque apice puncto nigro. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 371. *n.* 195. *mant. inf.* 2. *p.* 305. *n.* 259.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 729. *n.* 94. Cimex oblongus niger, elytris testaceis: punctis tribus niveis; interiore minore.
Habitat in Europa, *pediculi magnitudine.*

arenarius. 95. C. niger, elytris cinereis, alis albis. *Fn. suec.* 955.* *It. oel.* 121. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 369. *n.* 184. *mant. inf.* 2. *p.* 303. *n.* 240.
Habitat in Europa *boreali frequens.*

pini. 96. C. ater, elytris fuscis: macula rhombea atra. *Fn. suec.* 956. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 367. *n.* 173. *mant. inf.* 2. *p.* 302. *n.* 227.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 449. *n.* 28.
Degeer inf. 3. *p.* 279. *n.* 22. *t.* 14. *f.* 22.
Schaeff. icon. t. 42. *f.* 12.
Habitat frequens in Europae *borealis pinetis.*

sylvaticus. 422. C. ater, elytris fuscis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 367. *n.* 174. *mant. inf.* 2. *p.* 302. *n.* 228.
Habitat in Europae *borealis nemoribus.*

Rolandri. 97. C. ater, alis macula rhombea flava. *Fn. suec.* 957. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 367. *n.* 175. *mant. inf.* 2. *p.* 302. *n.* 229. *Fuessli inf. helv. p.* 26. *n.* 511.
Degeer inf. 3. *p.* 294. *n.* 33. Cimex fulvo maculatus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 459. *n.* 51.
Sulz. inf. t. 11. *f.* 76.
Schaeff. icon. t. 87. *f.* 7.
β) Cimex bimaculatus. *Syst. nat.* X. 1. *p.* 449. *n.* 76.
Habitat in Europae *pinetis.*

Forsteri. 423. C. ater, scutelli apice, thoracis elytrorumque margine sanguineis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 368. *n.* 176. *mant. inf.* 2. *p.* 302. *n.* 230.
Habitat ad caput bonae spei, *statura et magnitudine c. Rolandri.*

squalidus. 424. C. niger, thorace posterius, elytris pedibusque griseis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 302. *n.* 231.
Habitat Tranquebariae, *mediae magnitudinis.*

sexpustulatus. 425. C. niger, thorace elytrisque maculis duabus rufis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 368. *n.* 177. *mant. inf.* 2. *p.* 302. *n.* 232.
Habitat in Jamaica.

lynceus. 426. C. niger, elytris griſeis: apice macula nigra; puncto albo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 368. *n.* 178. *mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 233.
Habitat in Angliae *et* Calabriae *plantis.*

urticae. 427. C. niger, elytris griſeis, alis albis: puncto nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 368. *n.* 179. *mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 234.
Habitat in Angliae *urtica.*

Lundii. 428. C. niger, elytris fuſcis apice nigro punctatis, alis nigris puncto baſeos apicisque albo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 368. *n.* 180. *mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 235.
Habitat Hafniae, *parvus ſtatura lyncei.*

lunaris. 429. C. niger, thorace maculato, elytris lunula marginali flava. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 237.
Habitat in Cayenna, *ſtatura lyncei.*

ferrugineus. 99. C. ferrugineus, capite thorace ſcutelloque nigris.
Habitat in Suecia, *c. Rolandri ſimilis.*

populi. 109. C. albo fuſcoque nebuloſus. *Fn. ſuec.* 963. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 374. *n.* 219. *mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 253.
Habitat in Europae *populo tremula.*

coryli. 121. C. niger, pedibus antennisque flavis. *Fn. ſuec.* 974.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 369. *n.* 188. *mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 244.
Habitat in Europae *borealis corylo.*

S. Crucis. 430. C. ſupra obſcure griſeus, ſcutello linea dorſali albida. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 226.
Habitat in inſula S. Crucis oceani americani, *parvus.*

agilis. 431. C. thorace atro: margine poſteriore flavo, elytris fuſcis, baſi apiceque pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 374. *n.* 220. *mant. inſ.* 2. *p.* 306. *n.* 274.
Degeer inſ. 3. *p.* 295. *n.* 34. Cimex flavo quadrimaculatus.
Habitat in Germania, *ſtatura et magnitudine c. populi.*

Daldorfii. 432. C. flaveſcens, capite ſcutellique margine atris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 306. *n.* 275.
Habitat Kilonii, *parvus.*

multicolor. 433. C. ſupra ſanguineus, thorace elytris ſcutelloque albo marginatis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 52.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine pratenſis, ſubtus cinereus vel lividus, glaber, capite rufeſcente.*

434. C.

adſperſus. 434. C. ſupra ferrugineus: margine fuſco, ſubtus cinereus nigro punctatus. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 53.
Habitat - - - *magnitudine equeſtris, glaber.*

hexophthalmus. 435. C. ſupra cinereus, ſubtus albus pectore faſciis tribus ſanguineis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 54.
Habitat ad caput bonae ſpei, *annulati magnitudine, capite rubro medio nigro, antennis pedibusque nigris.*

albidus. 436. C. rubro nigroque varius, membrana elytrorum nivea. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 56.
Stoll cimic. t. 2. *f.* 80.
Habitat ad caput bonae ſpei, *et in* Surinamo, *punctis lineisque rubris nigrisque varius, equeſtris magnitudine, antennis, roſtro, ſcutello pedibusque nigris.*

purpureus. 437. C. ſanguineus, capite, membrana elytrorum pedibusque nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 57. *f.* 67.
Habitat ad caput bonae ſpei, *glaberrimus, ſtatura annulati, at multo anguſtior, immaculatus, capite antennisque nigris.*

nebuloſus. 438. C. flaveſcens, thorace lineis quatuor, elytris faſciis tribus fuſcis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 59.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura et magnitudine campeſtris, glaber.*

cafer. 439. C. niger, thorace faſcia alba, elytris ferrugineis: maculis quatuor albis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 59. *f.* 70.
Habitat ad caput bonae ſpei, *glaber, ſtatura et magnitudine arenarii.*

Candelabrum. 440. C. niger, rubro viridique notatus, thoracis baſi rubra candelabrum referente: candela ſupra caput porrecta.
Drury inſ. 1. *p.* 107. *t.* 45. *f.* 1.
Habitat in inſula Antigua.

claviger. 441. C. niger, elytris maculatis, abdominis inciſuris rubris, thorace incarnata: ſtriis obliquis nigris, maculaque clavaeformi cinerea.
Drury inſ. 1. *p.* 109. *t.* 45. *f.* 5.
Habitat in Antigua *inſula.*

triops. 442. C. griſeus, elytris punctis tribus nigris in longitudinem diſpoſitis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 107. *n.* 1216.
Habitat in Dania.

inauratus. 443. C. flavescens, thorace linea interrupta nigra, elytris duabus obliquis luteis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 107. *n.* 1221.
Habitat in Dania.

hirtus. 444. C. niger, elytris litura longitudinali pallida. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1234.
Habitat in Dania.

cantharinus. 445. C. niger, thorace unidentato: circulo albo, elytris cinereis: maculis quatuor scutelloque luteis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1235.
Habitat in Dania.

sexmaculatus. 446. C. ater, elytris maculis sex pedibusque flavis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1238.
Habitat in Dania.

deses. 447. C. niger, thorace lineis tribus scutello margineque elytrorum flavis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1239.
Habitat in Dania.

rubellus. 448. C. sanguineus, elytris membranaceis albis, antennis pedibusque pallidis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1241.
Habitat in Dania.

ochromelas. 449. C. luteus, thorace punctis quatuor elytrisque striis sex nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1242.
Habitat in Dania.

leucostictos. 450. C. sanguineus, thorace linea transversa nigra, elytris apicem versus puncto albo. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1243.
Habitat in Dania.

gallorum. 451. C. niger, antennis brevioribus, elytris fuscis: macula flavescente alboque. *Degeer inf.* 3. *p.* 279. *n.* 23.
Habitat in plantarum *partibus ab aphidibus devastatis et relictis, pediculi magnitudine.*

fulvus. 452. C. flavo-fulvus, elytris fuscis: vasis fulvis, pedibus nigro maculatis. *Degeer inf.* 3. *p.* 341. *n.* 16. *t.* 34. *f.* 22.
Habitat in Surinamo.

erythrochlorus. 453. C. fuscus, thorace anterius flavo, elytrorum basi rubra: macula media flava. *Degeer inf.* 3. *p.* 342. *n.* 17. *t.* 34. *f.* 23.
Habitat in Surinamo, *muscae domesticae magnitudine.*

454. C.

nanus. 454. C. flavo-teſtaceus, oculis nigris prominentibus, thorace maculis quatuor, elytrisque faſciis nigris. *Degeer inſ.* 3. *p.* 343. *n.* 19. *t.* 34. *f.* 25.
Habitat in Surinamo.

arcuatus. 455. C. niger, roſtro arcuato, elytris albidis: macula alba arcuque nigro, femoribus quatuor clavatis rubris. *Degeer inſ.* 3. *p.* 346. *n.* 21. *t.* 35. *f.* 4.
Habitat in Surinamo, *muſcae domeſticae magnitudine; an hujus tribus?*

erythrozonias. 456. C. nigro-fuſcus, roſtro arcuato, thoracis abdominisque margine faſciisque transverſis rubris. *Degeer inſ.* 3. *p.* 349. *n.* 24. *t.* 35. *f.* 12.
Habitat in India, *magnus.*

bifurcatus. 457. C. nigricans, abdomine luteo bifurcato.
Schaeff. icon. t. 11. *f.* 15. 16.
Habitat in Germania, *antennarum articulis quatuor.*

triangularis. 458. C. luteo-nigricans, thorace nigro triangulari: macula media lutea, elytrorum apice maculis binis coccineis.
Schaeff. ic. t. 13. *f.* 2.
Habitat in Germania, *antennarum articulis tribus.*

haematoſtictos. 459. C. luteus, elytris maculis duabus ſanguineis.
Schaeff. ic. t. 13. *f.* 3.
Habitat in Germania, *antennarum articulis quatuor.*

digrammus. 460. C. flavicans: maculis rubentibus, elytrorum apice lineolis duabus albidis.
Schaeff. icon. t. 13. *f.* 9.
Habitat in Germania.

quinquepunctatus. 461. C. fuſco-nigricans: dorſo punctis quinque albis.
Schaeff. icon. t. 13. *f.* 12.
Habitat in Germania.

Rubecula. 462. C. collo thoraceque rubicundo, pedibus rubris.
Schaeff. ic. t. 112. *f.* 7.
Habitat in Germania.

ſtolatus. 463. C. laete ſanguineus, elytris ſtriis duabus nigris longitudinalibus.
Schaeff. icon. t. 119. *f.* 3.
Habitat in Germania.

464. C.

ſexſtriatus. 464. C. fulvo-nigricans, elytrorum margine ſtriis tribus nigris. *Schaeff. icon. t.* 185. *f.* 4. 5. a. b.
Habitat in Germania.

M flavum. 465. C. nigricans, thorace elytrorumque marginibus M flavum referentibus.
Schaeff. ic. t. 199. *f.* 4. 5.
Habitat in Germania.

V. flavum. 466. C. flavo luteoque varius, thoracis margine V flavum referente.
Schaeff. ic. t. 199. *f.* 6. 7.
Habitat in Germania.

Circulus. 467. C. nigricans, elytris maculis quatuor albis, thorace ſphaerico: margine albo punctato.
Schaeff. ic. t. 248. *f.* 3. 4.
Habitat in Germania.

inſignitus. 468. C. aterrimus, elytris litura rubra.
Schaeff. icon. t. 266. *f.* 4. a. b.
Habitat in Germania.

celer. 469. C. aeneo-fuſcus, impreſſo punctatus, abdomine ſupra rubro apice emarginato. *Scop. ent. carn. p.* 126. *n.* 366.
Habitat in littoribus auſtriacis maris adriatici.

rugoſus. 470. C. capite utrinque dentato abdomine rubello, dorſo plicis quatuor longitudinalibus. *Scop. ent. carn. p.* 126. *n.* 367.
Habitat in Carniolia *ſuperiore.*

Pandurus. 471. C. rubro nigroque varius, thorace rubro nigro lineato, elytris rubris: macula media nigra, apiceque punctis tribus albis. *Scop. ent. carn. p.* 126. *n.* 368.
Habitat in Carniolia.

trinervis. 472. C. elytris membranaceis: nervis fuſco punctatis punctoque ferrugineo trigono marginali. *Scop. ent. carn. p.* 129. *n.* 373.
Habitat Idriae *circa foſſorum et ruſticorum aedes.*

maritimus. 473. C. nigricans, elytris teſtaceis fuſco punctatis: macula cordata nigra, antennis pedibusque ferrugineis. *Scop. ent. carn. p.* 129. *n.* 374.
Habitat circa littora maris Adriatici.

474. C.

alpinus. 474. C. nigricans, elytrorum corio ferrugineo-punctato, membrana fusco lineata, pedibus ferrugineis. *Scop. ent. carn. p.* 129. *n.* 375.
Habitat in alpibus Vachinensibus.

idriacus. 475. C. nigricans, elytris pedibusque ferrugineis. *Scop. ent. carn. p.* 130. *n.* 377.
Habitat Idriae.

hybridus. 476. C. niger, rostro arcuato, abdomine elytrique corio rubro: maculis duabus atris, membrana fuscescente: macula ad basin nigra. *Scop. ent. carn. p.* 131. *n.* 380.
Habitat in Carnioliae *collibus.*

meriopterus. 477. C. rostro pedibusque citrinis, antennarum articulo secundo compresso villoso articulis binis setaceis pallidis terminato. *Scop. ent. carn. p.* 131. *n.* 382.
Habitat in Carniolia, *in origani vulgaris et eupatorii cannabini floribus; an hujus tribus?*

aequinoctialis. 478. C. elytris totis coriaceis villosis albidis: nervis fusco punctatis, femoribus anterioribus crassioribus. *Scop. ent. carn. p.* 132. *n.* 383.
Habitat in Carnioliae *floribus, praesertim cynoglosso omphalode, circa aequinoctium vernum frequens.*

umbellatarum. 479. C. ferrugineus, abdomine apicisque femorum fasciis fuscis. *Scop. ent. carn. p.* 133. *n.* 385.
Habitat in Carnioliae *umbellatis.*

euonymi. 480. C. niger, thoracis macula media oblonga, scutelli lineis duabus, elytrorum striis elevatis flavis: unica ramosa. *Scop. ent. carn. p.* 133. *n.* 387.
Habitat in euonymo.

avellanae. 481. C. niger, elytrorum corio fusco: basi apiceque albis, pedibus fulvis. *Scop. ent. carn. p.* 134. *n.* 388.
Habitat in corylo avellana.

genistae. 482. C. fuscus subvillosus, alis hyalinis. *Scop. ent. carn. p.* 134. *n.* 390.
Habitat in genista tinctoria.

hortensis. 483. C. niger, antennis trinodiis, rostro pedibusque flavis. *Scop. ent. carn. p.* 134. *n.* 390.
Habitat in Carnioliae *hortis.*

pellucidus. 484. C. fusco-niger, pedibus pallidis, elytris pellucidis: apice fusco. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 438. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

marmoratus. 485. C. luteo nigroque varius, oculis crassissimis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 438. *n.* 8.
Habitat in Gallia.

trigonus. 486. C. niger, thorace elytrisque rubris, elytris apice macula triangulari nigra. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 439. *n.* 10.
Habitat in Gallia.

leucopterus. 487. C. rubro nigroque varius, alis basi albis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 442. *n.* 13. *Raj. inf. p.* 55. *n.* 2.
Habitat in Gallia.

maculosus. 488. C. rubro nigroque varius, elytris puncto nigro, alis fuscis: maculis albis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 443. *n.* 15.
Habitat in Gallia.

tessellatus. 489. C. thorace nigro: lineis tribus rubris, elytris rubro nigroque tessellatis: limbis nigris. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 443. *n.* 16.
Habitat in Gallia.

croceus. 490. C. croceus, elytrorum apice rubro, alis nigris, antennarum articulo secundo clavato. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 444. *n.* 17.
β) Cimex niger, pedibus rufis.
γ) Cimex niger, capite, thorace pedibusque rufis.
Habitat in Gallia, *an hujus tribus?*

subfuscus. 491. C. viridi-fuscus, elytrorum nervis punctatis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 448. *n.* 25.
Habitat in Gallia.

melanochros. 492. C. fuscus, antennis, pedibus abdominisque margine nigro luteoque variis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 449. *n.* 26.
Habitat in Gallia.

naevius. 493. C. cinereo nigroque varius, alis glaucis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 449. *n.* 27.
Habitat in Gallia.

cinereus. 494. C. niger, thorace posterius cinereo, elytris fuscis: apice albo. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 450. *n.* 29.
Habitat in Gallia.

virideſcens. 495. C. pallide virideſcens, femoribus nigro punctatis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 450. *n.* 30.
Habitat in Gallia.

496. C.

erythropterus. 496. C. niger, elytris anterius rufis, alis albo maculatis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 451. *n.* 31.
Habitat in Gallia.

punctulatus. 497. C. atro fuſcus punctatus, alis venoſis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 451. *n.* 32.
Habitat in Gallia.

cordiger. 498. C. ſpadiceus, ſcutello macula cordata lutea, elytris apice luteis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 453. *n.* 35.
Habitat in Gallia.

recticornis. 499. C. flaveſcens, thorace faſciis duabus nigris, ſcutello maculis flavis, antennis apice porrectis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 453. *n.* 36.
Habitat in Gallia.

termaculatus. 500. C. niger, thorace faſciis tribus flavis, ſcutello elytrorumque apice maculis luteis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 454. *n.* 37.
Habitat in Gallia.

Chloris. 501. C. viridi-flavus, capite thoraceque nigro maculatis, elytris viridibus. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 455. *n.* 39.
Habitat in Gallia.

obfuſcatus. 502. C. viridis, elytris macula fuſca. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 455. *n.* 40.
Habitat in Gallia.

lineolatus. 503. C. viridis, elytrorum apice albido, ſcutello lineola fuſca. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 455. *n.* 41.
Habitat in Gallia.

viridiuſculus. 504. C. viridis, thorace ſcutelloque lineis quatuor nigris, elytris interius fuſcis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 456. *n.* 42.
Habitat in Gallia.

conicus. 505. C. fuſco-cinereus, oculis prominulis, elytris nervoſis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 458. *n.* 49.
Habitat in Gallia.

aduſtus. 506. C. niger, capite, elytrorum apice genubusque ferrugineo-rubris. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 459. *n.* 50.
Habitat in Gallia.

chloromelas. 507. C. niger, pedibus viridi nigroque variis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 459. *n.* 52.
Habitat in Gallia.

508. C.

atratus. 508. C. totus ater, alis atris. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 460. *n.* 53.
Habitat in Gallia.

brachypterus. 655. C. pallidus, corpore lineari, elytris abdomine tertia parte brevioribus. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 189.
Habitat in Europa.

luteſcens. 656. C. flaveſcens, abdomine luteſcente. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 190.
Habitat in Europa.

graminneus. 657. C. pallidus, thorace utrinque linea fuſca, elytris vireſcentibus, abdomine luteſcente. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 191.
Habitat in Europa.

herbaceus. 658. C. vireſcens, capite antennisque ruſeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 194.
Habitat in Europa.

pictus. 659. C. pallidus, thorace lineis tribus fuſcis, abdomine nigro: margine dilatato rubro flavove ſubtus fuſco medio pallido. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 195.
Habitat in Europa.

rubellus. 660. C. ruſeſcens. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 196.
Habitat in Europa.

albipes. 661. C. niger, thoracis lateribus elytris pedibusque albidis. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 197.
Habitat in Europa.

ſquamatus. 662. C. niger, pedibus pallidis, elytrorum loco ſquamis albis. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 198.
Habitat in Europa.

purus. 663. C. ater immaculatus. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 113.
Habitat in Europa.

annulatus. 664. C. niger, elytris anterius, thorace poſterius griſeis, pedibus fuſco annulatis. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 114.
Habitat in Europa.

macropus. 665. C. niger, elytris griſeis ad membranam nigro maculatis, femoribus anticis craſſiſſimis, tibiis ruſeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 115.
Habitat in Europa.

fenestratus. 666. C. pallidus, coleoptris fenestratis: nervis pallide rufis. *Mus. Lesk. p.* 120. *n.* 118.
Habitat in Europa.

melanopus. 667. C. fuscus, elytris griseis apice fuscis, femoribus nigris basi griseis. *Mus. Lesk. p.* 120. *n.* 121.
Habitat in Europa.

denigratus. 668. C. niger, elytris griseo-fuscis: membrana basi maculaque apicis alba. *Mus. Lesk. p.* 120. *n.* 122.
Habitat in Europa.

biguttatus. 669. C. fuscus, elytris maculis albis disco fuscis: membrana alba: venis maculisque duabus fuscis, pedibus pallidis. *Mus. Lesk. p.* 120. *n.* 123.
Habitat in Europa.

leucophlebs. 670. C. niger, elytris brunneis: membrana venis albis. *Mus. Lesk. p.* 120. *n.* 124.
Habitat in Europa.

unipunctatus. 671. C. niger, elytris fusco-luteis: puncto albo, membrana utrinque gutta alba, pedibus luteis. *Mus. Lesk. p.* 121. *n.* 125.
Habitat in Europa.

erythrurus. 672. C. rufescens, pedibus elytrisque pallidis, his apice rufescentibus. *Mus. Lesk. p.* 121. *n.* 126.
Habitat in Europa.

ochrorhous. 673. C. fuscus, ano luteo, elytris luteo-pellucidis: disco puncto gemino apiceque solitario fusco. *Mus. Lesk. p.* 121. *n.* 128.
Habitat in Europa.

platycerus. 674. C. rufescens, antennis compressis latis rufis. *Mus. Lesk. p.* 121. *n.* 129.
Habitat in Europa.

quadristriatus. 675. C. griseus, thorace lineis quatuor longitudinalibus elevatis. *Mus. Lesk. p.* 121. *n.* 131.
Habitat in Europa.

fuscicaudis. 676. C. capite, thorace elytrorumque griseorum apice fuscis. *Mus. Lesk. p.* 121. *n.* 132.
Habitat in Europa.

⊣ ⊣ *pedibus dentatis aut spinosis.*

Phasianus. 509. C. fuscus, femoribus arcuato-clavatis unidentatis, abdominis basi subtus gibba. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 136. *n.* 226. *mant. inf.* 2. *p.* 297. *n.* 177.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *magnus.*

bellicosus. 510. C. fuscus, femoribus posterioribus arcuatis dentatis, abdomine quadrispinoso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 361. *n.* 137. *mant. inf.* 2. *p.* 297. *n.* 178.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *statura valgi*, *at duplo minor.*

Meleagris. 511. C. fuscus, antennarum articulo ultimo tibiisque anterioribus flavis, femoribus posterioribus serratis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 297. *n.* 179.
Habitat in Sina, *magnus.*

Gallus. 512. C. elytris fuscis flavo striatis, abdominis disco rubro, femoribus posterioribus serratis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 361. *n.* 138. *mant. inf.* 2. *p.* 279. *n.* 180.
Habitat in Surinamo, *statura et magnitudine indi.*

Faber. 513. C. niger, abdomine fusco: margine flavo, femoribus anterioribus apice bidentatis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 297. *n.* 181.
Habitat in Pulicandor, *magnus.*

Harpator. 514. C. niger, subtus rubro punctatus, femoribus dentatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 361. *n.* 139. *mant. inf.* 2. *p.* 297. *n.* 180.
Habitat in America.

calcaratus. 114. C. fuscus, abdomine supra sanguineo, femoribus posterioribus sexdentatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 367. *n.* 172. *mant. inf.* 2. *p.* 302. *n.* 225.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 732. *n.* 114. *Fn. suec.* 968.* Cimex oblongus niger, capite linea rubra, femoribus posticis subtus sexdentatis.
Degeer inf. 3. *p.* 280. *n.* 24. *t.* 14. *f.* 23. 24.
Schaeff. icon. t. 123. *f.* 2. 3.
Habitat in Europa.

denticulatus. 515. C. thoracis margine laterali denticulato, abdomine bidentato, femoribus posterioribus spinosis. *Scop. ent. carn. p.* 125. *n.* 365.
Sulz. hist. inf. t. 10. *f.* 16.
Habitat Tergesti.

516. C.

collium. 516. C. niger, elytris nucis colore: puncto nigro, femoribus anterioribus denticulo notatis. *Scop. ent. carn. p.* 130. *n.* 376.
Habitat in Carnioliae *collibus.*

armatus. 680. C. niger, elytris fuscis: margine externo striis, posteriore punctis griseis, femoribus anticis crassissimis dente armatis. *Mus. Lesk. p.* 120. *n.* 116.
Habitat in Europa.

lacteolus. 681. C. niger, femoribus anterioribus crassis dente armatis, elytris basi griseis, membrana basi gutta lactea. *Mus. Lesk. p.* 120. *n.* 117.
Habitat in Europa.

setosus. 682. C. fuscus, femoribus et elytris rufescentibus, his apice fractis, tibiis albis setoso spinosis. *Mus. Lesk. p.* 121. *n.* 126.
Habitat in Europa.

⊥⊥⊥⊥ *antennis setaceis.*
⊣ *pedibus dentatis.*

abietis. 115. C. maculato-fulvus, pedibus rufis: femoribus crassis. *Fn. suec.* 969.* *Scop. ent. carn.* 364. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 375. *n.* 222. *mant. inf.* 2. *p.* 307. *n.* 290.
Degeer inf. 3. *p.* 308. *n.* 37. *t.* 15. *f.* 20. 21. Cimex grossipes.
Habitat in Europae *borealis abiete.*

⊣ ⊣ *pedibus inermibus.*

pabulinus. 83. C. viridis immaculatus, alis hyalinis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 373. *n.* 210. *mant. inf.* 2. *p.* 306. *n.* 279.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 727. *n.* 83. *Fn. suec.* 947.* *Scop. ent. carn.* 132. Cimex oblongiusculus flavescenti-viridis totus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 456. *n.* 53.
Degeer inf. 3. *p.* 293. *n.* 31.
Habitat in Europae *pratis.*

laevigatus. 101. C. exalbidus, lateribus albis. *Fn. suec.* 958.* *Fuessli inf. helv. p.* 26. *n.* 512. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 372. *n.* 208. *mant. inf.* 2. *p.* 306. *n.* 276.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 452. *n.* 26.
Degeer inf. 3. *p.* 292. *n.* 30.
Habitat in Europae *pratis, frequens.*

lateralis. 517. C. niger, lateribus albidis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 372. *n.* 209. *mant. inf.* 2. *p.* 306. *n.* 277.
Habitat Kilonii.

holsatus. 518. C. exalbidus, thorace lineis duabus, elytris interius fuscis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 306. *n.* 278.
Habitat Kilonii, *statura laevigati.*

virens. 102. C. viridis, plantis antennarumque apicibus rufis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 373. *n.* 211. *mant. inf.* 2. *p.* 306. *n.* 280.
Habitat in Europa, *pabulino duplo major.*

pallidus. 519. C. pallidus, capite corporeque atris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 306. *n.* 281.
Habitat in Suecia, *parvus.*

dolabratus. 103. C. elytris ferrugineis latere albidis, antennis nigris, linea thoracis alba. *Fn. suec.* 959. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 373. *n.* 212. *mant. inf.* 2. *p.* 307. *n.* 282.
Habitat in Europae *festuca nutante.*

calens. 104. C. capite, thorace elytrisque nigris, scutello fulvo. *Gron. zooph.* 712. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 373. *n.* 213. *mant. inf.* 2. *p.* 307. *n.* 283.
Habitat in India.

striatus. 105. C. niger, elytris flavo fuscoque striatis, apice pedibusque rufis. *Fn. suec.* 960.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 374. *n.* 217. *mant. inf.* 2. *p.* 307. *n.* 289.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 454. *n.* 38.
Degeer inf. 3. *p.* 290. *n.* 29. *t.* 15. *f.* 14. 15.
Petiv. gazoph. t. 26. *f.* 1.
Schaeff. ic. t. 13. *f.* 4.
Habitat in ulmi campestris *foliis.*

Gronovii. 106. C. thorace elytrisque atris, linea flava fasciam elytrorum formante. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 373. *n.* 214. *mant. inf.* 2. *p.* 307. *n.* 284. *Gronov. zooph.* 711.*
Habitat in India.

erraticus. 107. C. nigricans, elytris albis, antennis lividis: infimo articulo nigro. *Fn. suec.* 961.*
Habitat in Europa.

108. C.

ferus. 108. C. griseus immaculatus. *Fn. suec.* 962.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 374. *n.* 215. *mant. inf.* 2. *p.* 307. *n.* 285.
Habitat in Europae *silvis.*

vagans. 519. C. griseus, capite thoraceque linea nigra, pedibus testaceis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 307. *n.* 286.
Habitat in Suecia, *statura feri.*

orientalis. 520. C. fuscus, capite thoraceque lineis tribus, elytris margine omni albo. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 307. *n.* 287.
Habitat in India, *marginello proxime affinis.*

marginellus. 521. C. niger, thoracis lineis tribus, elytris margine omni albis punctoque apicis coccineo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 374. *n.* 216. *mant. inf.* 2. *p.* 307. *n.* 288.
Habitat in Italia, *statura feri.*

ulmi. 110. C. supra rubiginosus, elytris striis sanguineis, alis albo fuscoque variis. *Fn. suec.* 964.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 375. *n.* 223. *mant. inf.* 2. *p.* 307. *n.* 291.
Habitat in ulmo campestri.

mutabilis. 112. C. niger, alis caeruleis, antennis pedibusque flavis. *Fn. suec.* 967.*
Habitat in Suecia.

sauciatus. 522. C. viridis, elytris maculis sex roseis, pedibus rubro tinctis. *Degeer inf.* 3. *p.* 293. *n.* 32.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 457. *n.* 4.
Habitat in Europa.

subapterus. 523. C. griseus, alis brevissimis, abdomine nigro punctato. *Degeer inf.* 3. *p.* 287. *n.* 27. *t.* 15. *f.* 10.
Habitat in Europa.

† † † *lineares, corpore angusto elongato.*
⊥ *antennis setaceis.*

pedes. 524. C. fusco flavoque varius, femoribus posterioribus elongatis dentatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 375. *n.* 224. *mant. inf.* 2. *p.* 307. *n.* 292.
Habitat in India.

filiformis. 525. C. pallide virescens, antennis ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 375. *n.* 225. *mant. inf.* 2. *p.* 308. *n.* 293.
Habitat in insulis, Americae *meridionali oppositis.*

11 *antennis filiformibus.*

angustatus. 526. C. niger, capite thoraceque elongato. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. *p.* 59. *f.* 71.
Habitat - - - - *tipularii magnitudine, glaber.*

squalidus. 683. C. fuscus, elytris griseo fuscoque variegatis, pedibus linearibus antennisque griseo fuscoque alternatim annulatis. *Mus. Lesk. p.* 124. *n.* 201.
Habitat in Europa.

fossarum. 527. C. supra fuscus, thoracis scutellique marginibus lineaque dorsali flavis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 375. *n.* 226. *mant. inf.* 2. *p.* 308. *n.* 294.
Habitat in India.

lacustris. 117. C. supra niger depressus, pedibus anterioribus brevissimis. *Fn. suec.* 970. *it. wgoth.* 182. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 463. *n.* 59. *Scop. ent. car.* 394. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 375. *n.* 227. *mant. inf.* 2. *p.* 308. *n.* 295.
Degeer inf. 3. *p.* 311. *n.* 39. *t.* 16. *f.* 7. Cimex Najas.
Raj. inf. p. 57. *n.* 1. Cimex aquaticus figurae longioris.
Bauh. Ballon. 213. *f.* 1. Insectum Tipula dictum.
List. mut. t. 5. *f.* 4.
Bradl. nat. t. 26. *f.* 2. d.
Frisch inf. 7. *t.* 20.
Sulz. inf. t. 11. *f.* 78.
Stoll cimic. 2. *t.* 9. *f.* 63.
Habitat in Europae *aquis pacatis.*

stagnorum. 118. C. teretiusculus niger, thorace medio punctis duobus globosis. *Fn. suec.* 9715. *Scop. ent. carn.* 395. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 376. *n.* 228. *mant. inf.* 2. *p.* 308. *n.* 296.
Degeer inf. 3. *p.* 322. *n.* 40. *t.* 15. *f.* 24. Cimex Acus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 463. *n.* 60.
Petiv. gazoph. t. 9. *f.* 12.
Sulz. hist. inf. t. 10. *f.* 17.
Habitat in Angliae *lacubus frequens.*

rivulorum. 528. C. niger, albo punctatus, abdomine fulvo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 376. *n.* 229. *mant. inf.* 2. *p.* 308. *n.* 297.
Habitat in Alsatiae *rivulis montosis, lacustri quadruplo minor.*

529. C.

pallipes. 529. C. niger, pedibus pallidis, pectore bispinoso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 376. *n.* 230. *mant. inf.* 2. *p.* 308. *n.* 298.
Habitat in Italia, *statura lacustris.*

culiciformis. 530. C. griseus, thorace multispinoso, elytris lituris nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 376. *n.* 231. *mant inf.* 2. *p.* 308. *n.* 299.
Habitat in Americae *aquis.*

angustus. 531. C. supra griseus subtus flavescens, antennis pedibusque subtestaceis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 308. *n.* 300.
Habitat in Sina, *statura culiciformis.*

Filum. 532. C. fuscus, alis abbreviatis, pedibus longissimis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 376. *n.* 232. *mant. inf.* 2. *p.* 308. *n.* 301.
Degeer inf. 3. *p.* 352. *n.* 26. *t.* 35. *f.* 16? Cimex longipes.
Habitat in India.

macropus. 533. C. ater, thoracis margine elytrorumque fascia sanguinea. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 377. *n.* 233. *mant. inf.* 2. *p.* 308. *n.* 302.
Habitat in America.

cursitans. 534. C. supra fuscus subtus cinerascens, pedibus longissimis, ano bidentato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 377. *n.* 234. *mant. inf.* 2. *p.* 308. *n.* 303.
Habitat in nova Hollandia.

vagabundus. 119. C. griseus, pedibus pallidis: anterioribus brevissimis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 377. *n.* 236. *mant. inf.* 2. *p.* 308. *n.* 305.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 732. *n.* 119. *Fn. suec.* 972.* Cimex linearis variegatus, pedibus anticis brevissimis crassis inflexis.
Fn. suec. 1. *n.* 683. Cimex linearis, pedibus quatuor longioribus, antennis longissimis albo fuscoque variis.
Degeer inf. 3. *p.* 323. *n.* 41. *t.* 17. *f.* 1. 2. Cimex culiciformis.
Frisch inf. 7. *p.* 11. *t.* 6. Cimex arborum oblongus, alarum signatura alba.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 462. *n* 58.
Habitat in Europae *muscis.*

linearis. 535. C. viridis, antennis antrorsum porrectis. *Fuessli inf. helv. p.* 26. *n.* 519.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 458. *n.* 47.
Habitat in Valesia.

denigratus. 536. C. albidus, oculis fuſcis, ſcutello macula nigra. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 458. *n.* 48.
Habitat in Gallia.

hortorum. 537. C. viridis, oculis fuſcis, antennarum articulo ſecundo baſi albo, tibiis pallidis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 109. *n.* 1248.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 456. *n.* 43.
Degeer inſ. 3. *p.* 293. *n.* 31.
Habitat in Europae *hortis; an forſan ad praecedentem tribum relegandus ob antennas?*

tipuloides. 538. C. griſeus, antennis rubro maculatis, femoribus apice rubris, pedibus omnibus ſubaequalibus. *Degeer inſ.* 3. *p.* 354. *n.* 27. *t.* 35. *f.* 18.
Habitat in Surinamo.

meridionalis. 539. C. nigro-fuſcus, pedibus teſtaceis, femoribus craſſis, elytris abdomine brevioribus. *Degeer inſ.* 3. *p.* 355. *n.* 29. *t.* 35. *f.* 21.
Habitat in Surinamo.

tetragrammos. 540. C. nigricans, abdomine atro: lineis quatuor albis obliquis. *Schaeff. icon. t.* 43. *f.* 7. 8.
Habitat in Germania, *antennarum articulis quatuor.*

araneoides. 541. C. luteus, pedibus longiſſimis.
Schaeff. icon. t. 169. *f.* 7.
Habitat in Germania, *antennarum articulis quatuor.*

III antennis clavatis.

triſpinoſus. 542. C. griſeo fuſcus, antennis longis, ſpinis dorſalibus tribus erectis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 354. *n.* 28. *t.* 35. *f.* 19.
Habitat in Surinamo.

IIII antennis biclavatis.

ſuecicus. 543. C. cinereus, femoribus clavatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 377. *n.* 237. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 306.
Habitat in Suecia.

IIIII antennis bicaudatis.

tipularius. 120. C. exalbidus, pedibus omnibus longiſſimis, femoribus clavatis. *Fn. ſuec.* 973.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 377. *n.* 234. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 304.

Friſch

Frisch inf. 7. p. 28. f. 20. Cimex arboreus culiciformis.
Habitat in Europae *borealis musceis.*

** *antennis supra oculos insertis, rostro arcuato.* Reduvii.

Gigas. 544. C. niger, thoracis margine elytrorumque fascia obsolete flexuosa rufis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 377. n. 1. mant. inf. 2. p. 309. n. 1.*
Habitat in India.

Acantharis. 38. C. thorace spinoso, abdomine spinis ciliato. *Fabr. sp. inf. 2. p. 382. n. 29. mant. inf. 2. p. 314. n. 45.*
Brown jam. p. 434. t. 44. f. 11. Acantharis.
Sulz. hist. inf. t. 10. f. 8.
Habitat in Jamaica.

Guttula. 545. C. ater nitidus, elytris pedibusque sanguineis, alis puncto albo. *Fabr. mant. inf. 2. p. 314. n. 46.*
Habitat in Germania, *mediae magnitudinis.*

elongatus. 546. C. elongatus rufus, antennis pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 383. n. 30. mant. inf. 2. p. 314. n. 47.*
Habitat in Africa *aequinoctiali, reliquis hujus tribus angustior.*

cristatus. 62. C. corpore fusco-ferrugineo, scutello cristato. *Amoen. acad. 6. p. 399. n. 42.**
Fabr. sp. inf. 2. p. 381. n. 23? mant. inf. 2. p. 313. n. 36? Reduvius (serratus) niger, elytris ferrugineis, rostro antennis tibiisque flavis, scutello cristato serrato.
Forster nov. inf. sp. 1. p. 72. n. 72? Cimex carinatus.
Sulz. hist. inf. t. 10. f. 12.
Drury inf. 2. t. 36. f. 6.
Stoll cimic. 2. t. 1. f. 6.
Habitat in America *meridionali.*

leucopus. 547. C. fuscus, antennarum annulis, tibiis abdominisque punctis lateralibus albis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 382. n. 24. mant. inf. 2. p. 313. n. 37.*
Habitat in Europa *media, statura aegyptiaci, at paulo major.*

tessulatus. 548. C. thorace elytrisque obscure ferrugineis, abdomine atro: margine albo vario. *Fabr. mant. inf. 2. p. 313. n. 38.*
Habitat Monspelii, *statura albipedis.*

aegyptiacus. 549. C. corpore villoso grisco, abdominis margine nigro variegato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 382. *n.* 25. *mant. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 39.
Habitat in Aegypto.

Diadema. 550. C. niger, capite thoraceque spinosis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 382. *n.* 26. *mant. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 40.
Habitat in America *boreali.*

quinquespinosus. 551. C. thorace nigro, posterius spinis quatuor flavis, scutello apice recurvo spinoso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 382. *n.* 27. *mant. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 41.
Habitat in India, *capite posterius attenuato, antennis rostroque pallidis.*

scutatus. 552. C. niger, elytris apice alisque medio puncto albo, scutello apice recurvo spinoso. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 42.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

zonalis. 553. C. capite thoraceque nigris, elytris flavescentibus: fascia, alis apice nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 43.
Habitat in Cayenna, *parvus, magis elongatus.*

mauritanicus. 554. C. ferrugineus, abdominis margine nigro maculato, thorace anterius subspinoso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 382. *n.* 28. *mant. inf.* 2. *p.* 314. *n.* 44.
Habitat in Mauritania.

personatus. 64. C. antennis apice capillaribus, corpore subvilloso fusco. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 377. *n.* 2. *mant. inf.* 2. *p.* 309. *n.* 2. *Fuessli inf. helv. p.* 26. *n.* 499.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 724. *n.* 64. *Fn. suec.* 942. *Scop. ent. carn.* 379. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 397. *n.* 38. Cimex rostro arcuato, antennis apice capillaceis, corpore oblongo subvilloso fusco.
Degeer inf. 3. *p.* 281. *n.* 25. *t.* 15. *f.* 7. Cimex quisquilius.
List. scar. angl. p. 397. *n.* 38. Cimex maximus pullus, alis nudis ex toto membranaceis.
Frisch inf. 10. *t.* 10. Cimex stercorarius major oblongus.
Raj. inf. 56. Musca cimiciformis graviter volans.
Sulz. inf. t. 11. *f.* 74?
Schaeff. ic. t. 13. *f.* 6. 7. *et t.* 57. *f.* 9.
Habitat in Europae *quisquiliis.*
Larva *horrida consumit lectularium.*

555. C.

barbicornis. 555. C. niger, thorace abdominisque basi olivaceis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 378. *n.* 3. *mant. inf.* 2. *p.* 309. *n.* 3.
Drury inf. 3. *t.* 45. *f.* 1.
Habitat in Sierra Leon Africae, *thorace rarius nigro, antennis alterius sexus barbatis.*

afer. 556. C. rufus, thorace maculis quatuor, elytris tribus nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 378. *n.* 4. *mant. inf.* 2. *p.* 309. *n.* 4.
Habitat in Africa *aequinoctiali, annulato minor.*

stridulus. 557. C. glaber niger, elytris fuscis nigro maculatis: margine rufo. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 309. *n.* 5.
Habitat Monspelii, *parvus, primo vere agilis, antennas continuo motitans, thoracis attritu stridens.*

nitidulus. 558. C. ater, thorace olivaceo, femoribus anterioribus rufis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 378. *n.* 5. *mant. inf.* 2. *p.* 309. *n.* 6.
Habitat in Africa *aequinoctiali, nitidus, barbicorni affinis.*

pilipes. 559. C. ater, thorace elytrorumque apice villosis cinereis, pedibus hirtis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 309. *n.* 7.
Habitat in Cayenna, *capite posterius attenuato, alis albis.*

longipes. 65. C. ruber, elytris nigris basi fasciaque rubris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 378. *n.* 6. *mant. inf.* 2. *p.* 309. *n.* 8. *Gron. zooph.* 709.
Habitat in insula S. Thomae oceani americani, *magnitudine personati.*

Banksii. 560. C. supra rufus, alis nigris, abdomine atro: margine rufo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 379. *n.* 7. *mant. inf.* 2. *p.* 309. *n.* 9.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

erythropus. 561. C. ater, elytris griseis nigro venosis, abdominis margine pedibusque posterioribus rufis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 309. *n.* 10.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

binotatus. 562. C. supra niger, elytris puncto apicis rufo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 379. *n.* 8. *mant. inf.* 2. *p.* 310. *n.* 11.
Habitat in Surinamo, *statura annulati.*

sacer. 563. C. flavescens, thoracis cruce impressa, elytris abdominisque medio nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 310. *n.* 12.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

guineensis. 670. C. niger, thorace scutelloque acute spinosis, elytris puncto albo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 381. *n.* 22. *mant. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 35.
Stoll cimic. 2. *t.* 11. *f.* 64.
Habitat in Guinea, *magnitudine valgi.*

annulatus. 71. C. antennis apice capillaribus, corpore nigro subtus sanguineo maculato. *Fn. suec.* 943.* *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 437. *n.* 5. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 379. *n.* 9. *mant. inf.* 2. *p.* 310. *n.* 13. *Fuessli inf. helv. p.* 26. *n.* 500.
Degeer inf. 3. *p.* 286. *n.* 26. Cimex niger rufipes.
Sulz. hist. inf. t. 10. *f.* 13.
Schaeff. icon. t. 5. *f.* 9-11.
Habitat in Europae *corylo.*

monspeliensis. 564. C. rufus, capite, pectore abdominisque striis macularibus rufis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 310. *n.* 14.
Schaeff. icon. 1. *t.* 5. *f.* 9. 10.
Habitat Monspelii, *statura et magnitudine annulati.*

praecinctus. 565. C. rufescens, antennis pedibusque flavo nigroque annulatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 379. *n.* 10. *mant. inf.* 2. *p.* 310. *n.* 15.
Habitat in America *boreali.*

obscurus. 566. C. ater, thorace posterius, elytris abdominisque margine obscure pallidis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 379. *n.* 11. *mant. inf.* 2. *p.* 310. *n.* 16.
Habitat in Africa *aequinoctiali, parvus.*

cayennensis. 567. C. obscure fuscus antennarum apice elytrorumque litura media albis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 310. *n.* 17.
Habitat in Cayenna, *parvus.*

attelaboides. 568. C. testaceo nigroque varius, thorace anterius testaceo, dentibus duobus nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 379. *n.* 12. *mant. inf.* 2. *p.* 311. *n.* 18.
Habitat in nova Hollandia.

pilicornis. 569. C. ater, thorace posterius, scutello, elytrorum margine, abdomine femoribusque basi rufis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 311. *n.* 19.
Habitat Tranquebariae, *mediae magnitudinis, antennis hirtis.*

570. C.

quadridentatus. 570. C. fuſcus, capite, abdominis margine pedibusque olivaceis, thorace anterius quadridentato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 380. *n.* 13. *mant. inſ.* 2. *p.* 311. *n.* 20.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *mediae magnitudinis.*

nigripes. 100. C. elytrorum baſi, antennis pedibusque rubris, tibiis anterioribus hirſutiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 380. *n.* 14. *mant. inſ.* 2. *p.* 311. *n.* 21.
Degeer inſ. 3. *p.* 344. *n.* 20. *t.* 35. *f.* 1. Cimex hirtipes.
Habitat in America *meridionali.*

unicolor. 571. C. ater, immaculatus, thorace ſubſpinoſo, tibiis cylindricis hirſutiſſimis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 311. *n.* 22.
Habitat in Cayenna, *ſtatura nigripedis.*

barbaricus. 572. C. niger, thorace elytrisque obſcure ferrugineis, ſcutello lineola media alba. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 311. *n.* 23.
Habitat in Barbaria, *ſtatura nigripedis.*

Rohrii. 573. C. ater, thorace ſubſpinoſo, elytris lineola, abdominis margine femorumque articulatione ſanguineis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 311. *n.* 24.
Habitat in Cayenna, *ſtatura nigripedis.*

carbonarius. 574. C. ater, elytris poſterius albis, capite poſterius attenuato cylindrico. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 380. *n.* 15. *mant. inſ.* 2. *p.* 312. *n.* 25.
Habitat in India, *ſtatura attelaboidis.*

pacificus. 575. C. rufo nigroque varius, abdominis margine dente medio erecto obtuſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 380. *n.* 16. *mant. inſ.* 2. *p.* 312. *n.* 26.
Habitat in nova Hollandia.

Edleri. 576. C. niger, thorace ſubſpinoſo, elytris maculis tribus albis. *Fabr. ſp. inſ* 2. *p.* 380. *n.* 17. *mant. inſ.* 2. *p.* 312. *n.* 27.
Habitat in India.

octomaculatus. 577. C. thorace poſterius teſtaceo, elytris alisque atris: maculis quatuor lacte flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 380. *n.* 18. *mant. inſ.* 2. *p.* 312. *n.* 28.
Habitat in India, *reliquis hujus tribus minor.*

ſtigma. 578. C. thorace teſtaceo, elytris alisque nigris: macula media flava. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 381. *n.* 19. *mant. inſ.* 2. *p.* 312. *n.* 29.
Habitat in India, *octomaculato proxime affinis.*

579. C.

curtipes. 579. C. niger, elytris pallidis: puncto atro, abdomine rufo: ano atro. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 312. *n.* 30.
Habitat in India, *parvus, pedibus anterioribus brevibus.*

uncinatus. 580. C. niger, elytris basi pallidis, alis macula communi rufa, pectore spinoso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 381. *n.* 20. *mant. inf.* 2. *p.* 312. *n.* 31.
Habitat in America *meridionali, mediae magnitudinis.*

iracundus. 581. C. niger, thorace abdominisque marginibus rubro maculatis, elytris rufis. *Scop. ent. carn.* 378. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 381. *n.* 21. *mant. inf.* 2. *p.* 312. *n.* 32.
Schranck Beytr. p. 81. *n.* 37. *t.* 3. *f.* 17. Cimex sanguineus.
Poda mus. p. 58. *n.* 17.
Habitat in Germania *superiori.*

fuscipes. 582. C. rufus, thoracis fascia, elytrorum margine interiori pedibusque fuscis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 312. *n.* 33.
Habitat in India, *statura iracundi, at paulo minor.*

bifidus. 583. C. ater, elytris fascia rufa, scutello spina erecta apice bifida. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 312. *n.* 34.
Habitat in Sina, *magnus.*

membranaceus. 684. C. niger, abdominis apice membranisque duabus ovatis rufis. *Mus. Lesk. p.* 124. *n.* 202.
Habitat extra Europam.

superbus. 685. C. niger, abdomine rufo basi nigro, elytris in medio ad marginem anticum puncto coccineo notatis, femoribus apice tibiisque rufis. *Mus. Lesk. p.* 124. *n.* 203.
Habitat extra Europam.

naevius. 686. C. griseus abdomine elytris dimidio longiore: dorso nigro, margine elevato rufo fuscoque vario. *Mus. Lesk. p.* 124. *n.* 207.
Habitat in Europa.

quinquemaculatus. 687. C. niger, elytris abbreviatis, abdominis margine elevato: maculis quinque albis inverse conicis, pedibus griseis fusco annulatis. *Mus. Lesk. p.* 124. *n.* 208.
Habitat in Europa.

staphylinus. 688. C. apterus niger, elytris abbreviatis pedibusque rubris: femoribus quatuor anticis compressis. *Mus. Lesk. p.* 125. *n.* 209.
Habitat in Europa, *staphylinis affinis.*

MA-

MACROCEPHALUS. *Rostrum* inflexum: vagina univalvi triarticulata setis tribus, maxillis palpis labioque nullis.

Antennae porrectae, brevissimae, submoniliformes, clavatae.

Caput oblongum, supra cylindricum.

Scutellum longitudine abdominis, depressum, membranaceum.

cimicoides. 1. M. griseo-ferrugineus, scutello cinerascente: macula coleoptrata flava, alis purpurascenti-violaceis, tibiis anterioribus incrassatis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. *t.* 8. *f.* 1.
Habitat in Georgia Americae, *cimice eroso paulo minor.*

227. APHIS. *Rostrum* inflexum, vagina articulorum quinque: seta unica.

Antennae setaceae, thorace longiores.

Alae quatuor erectae aut nullae.

Pedes ambulatorii.

Abdomen saepius posterius bicorne.

longirostris. 34. Aph. cinerea, rostro corpore triplo longiore. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 314. *n.* 1.
Habitat Dresdae, *sub arborum corticibus, formicarum larvis victitans, mediae magnitudinis.*

ribis. 1. Aph. Ribis rubri. *Fn. suec.* 975.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 385. *n.* 6. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 7.
Leeuwenh. arc. epist. 90. *p.* 545. *t.* 548.
Blank. inf. 164. *t.* 14. *f.* D. E.
Frisch inf. 11. *p.* 9. *t.* 14.

Reaum.

Reaum. inf. 3. *t.* 22. *f.* 7-10.
Habitat sub ribis *rubri foliis monstrosis pustulatis frequens.*

arundinis. 35. Aph. arundinis epigeios. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 385. *n.* 7. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 8.
Habitat in arundinis epigeios *foliis.*

ulmi. 2. Aph. ulmi campestris. *Fn. suec.* 976.* *It. scan.* 203. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 387. *n.* 32. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 37.
Degeer inf. 3. *p.* 81. *n.* 13. *t.* 5. *f.* 7-18. Aphis (foliorum ulmi) nigricans tuberculata foliorum convolutorum ulmi.
Reaum. inf. 3. *t.* 25. *f.* 4-7.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 494. *n.* 1. *t.* 10. *f.* 3.
Habitat in ulmo *campestri.*

papaveris. 36. Aph. papaveris somniferi. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 388. *n.* 33. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 38.
Habitat in Holsatiae *papavere somnifero.*

pastinacae. 3. Aph. pastinacae sativae. *Fn. suec.* 977.* *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 13.
Habitat in pastinaca *sativa.*

pruni. 37. Aph. pruni domesticae. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 385. *n.* 12. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 14.
Degeer inf. 3. *p.* 49. *n.* 5. *t.* 2. *f.* 1 – 8. Aphis dilute viridis albo farinosa, corniculis brevibus, pruni.
Reaumur inf. 3. *t.* 23. *f.* 9. 10.
Habitat in pruni *domesticae foliis.*

sambuci. 4. Aph. sambuci nigrae. *Fn. suec.* 978. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 384. *n.* 3. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 4.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 495. *n.* 3. Aphis sambuci tota caerulea atra.
List. angl. p. 397. *n.* 40. Cimex exiguus nunc niger nunc viridis, cui alae ex toto membranaceae, praegrandis.
Frisch inf. 11. *p.* 14. *t.* 18.
Reaum. inf. 3. *t.* 8. *f.* 5-15.
Habitat in Sambuci *nigrae ramis.*

solidaginis. 38. Aph. solidaginis virgaureae. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 384. *n.* 4. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 5.
Habitat in Norwegiae *solidaginis virgaureae caulibus, majuscula, junior testacea, alias fusca, anterius angustata, fronte emarginata, pedibus pallidis: geniculis nigris, corniculis elongatis setaceis, stilo duplo longioribus.*

39. C.

cerasi. 39. Aph. pruni cerasi. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 384. *n.* 5. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 6.
Müll. zool. dan. prodr. p. 110. *n.* 1256.
Habitat in pruni *cerasi foliis.*

rumicis. 5. Aph. rumicis lapathi. *Fn. suec.* 979.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 385. *n.* 11. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 12.
Habitat in rumice *acuto.*

acetosae. 6. Aph. rumicis acetosae. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 389. *n.* 43. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 48.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 496. *n.* 9. Aphis (acetosae) atra, fascia transversa viridi.
Reaum. inf. 3. *p.* 286.
Habitat in rumice acetosa, acetosella.

ligustici. 40. Aph. ligustici scotici. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 389. *n.* 44. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 49.
Habitat in Norwegiae *ligustico scotico, nigra, antennis tibiarumque basi pallida.*

lychnidis. 7. Aph. lychnidis divicae. *Fn. suec.* 980.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 384. *n.* 1. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 2.
Fn. suec. 719. Aphis cucubali.
Habitat frequens in lychnidis divicae *caulibus.*

capreae. 41. Aph. salicis capreae. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 384. *n.* 2. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 3.
Habitat in Europae *salice.*

padi. 8. Aph. pruni padi. *Fn. suec.* 981. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 389. *n.* 45. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 50.
Reaum. inf. 3. *t.* 23. *f.* 9. 10.
Habitat in pruno pado.

9. Aph.

Aphides *a vere in serum auctumnum vivos pariunt foetus, auctumno post copulam ova; post quartam demum metamorphosin pariunt, alisque instruuntur; a copula parentum nascuntur filiae, neptes, proneptes, abneptes; aliae apterae, aliae alatae, absque sexus discrimine in eadem specie; plurimae cornubus duobus posterioribus abdominis excernunt rorem melleum, qui formicas allicit; ab ichneumonis specie quadam infestatae. Species difficile distinguuntur, difficilius definiuntur, nec semper in diversis plantis diversae species, adeoque pauciores aphides, quam plantae aphidiferae.*

rosae. 9. Aph. rosae. *Fn. suec.* 982.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 387. *n.* 25. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 30.
Degeer inf. 3. *p.* 65. *n.* 10. *t.* 3. *f.* 10. Aphis viridis, corniculis longissimis, rosae.
Reaum. inf. 3. *t.* 21. *f.* 1-4.
Lederm. microgr. 53. *t.* 25.
Sulz. inf. t. 12. *f.* 79.
Habitat in rosae *pedunculis.*

hortensis. 42. Aph. atriplicis hortensis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 387. *n.* 26. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 31.
Habitat in atriplicis hortensis *summitatibus.*

picridis. 43. Aph. picridis hieracioidis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 387. *n.* 27. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 32.
Habitat in picridis hieracioidis *caulibus.*

aegopodii. 44. Aph. aegopodii podagrariae. *Scop. ent. carn.* 399. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 387. *n.* 28. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 33.
Habitat in aegopodii podagrariae *foliis.*

dauci. 45. Aph. dauci carotae. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 387. *n.* 29. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 34.
Habitat in dauci carotae *umbella.*

urticata. 46. Aph. urticae dioicae. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 387. *n.* 30. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 35.
Habitat in urticae dioicae *caulibus*, *foliis.*

nymphaeae. 10. Aph. plantarum aquaticarum. *Fn. suec.* 983. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 17.
Habitat in nymphaeis, potamogetonibus.

corni. 47. Aph. corni sanguineae. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 385. *n.* 15. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 18.
Habitat in corni sanguineae *foliis.*

tiliae. 11. Aph. tiliae europaeae. *Fn. suec.* 984. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 388. *n.* 34. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 39.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 495. *n.* 6. Aphis alis antennis pedibusque nigro punctatis.
Degeer inf. 3. *p.* 77. *n.* 12. *t.* 5. *f.* 1-5. Aphis (tiliae nigropunctata) flavo-viridis lineis punctisque nigris, alis nigro maculatis, corniculis brevioribus.
Frisch inf. 11. *p.* 1. *n.* 3. *t.* 17. Pediculus arboreus tiliae.

Reaum.

Reaum. inf. 3. *t.* 23. *f.* 1-8.
Habitat in Europae *tilia.*

juniperi. 48. Aph. juniperi communis. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 388. *n.* 35. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 40.
Degeer inf. 3. *p.* 56. *n.* 7. *t.* 4. *f.* 7. 8. Aphis obſcure fuſca cinereo maculata, corniculis brevioribus groſſis, juniperi.
Habitat in juniperi communis *foliis.*

braſſicae. 12. Aph. braſſicae oleraceae. *Fn. ſuec.* 985. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 388. *n.* 36. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 41.
Friſch inf. 11. *p.* 10. *t.* 3. *f.* 15. Pediculus braſſicae.
Habitat in braſſicae oleraceae *foliorum pagina inverſa, unde tabeſcunt.*

craccae. 13. Aph. viciae craccae. *Fn. ſuec.* 986. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 390. *n.* 46. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 51.
Degeer inf. 3. *p.* 58. *n.* 8. *t.* 2. *f.* 14. 15. Aphis nigra caeruleſcens albo farinoſa, corniculis brevioribus, viciae craccae.
Habitat in viciae craccae *foliis.*

lactucae. 14. Aph. lactucae oleraceae. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 390. *n.* 47. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 52.
Reaum. inf. 3. *t.* 22. *f.* 3-5.
Habitat in lactuca oleracea.

ſonchi. 15. Aph. ſonchi oleracei. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 390. *n.* 48. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 53.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 497. *n.* 13.
Reaum. inf. 3. *t.* 22. *f.* 3-5.
Habitat in ſoncho oleraceo.

cirſii. 16. Aph. ſerratulae arvenſis. *Fn. ſuec.* 987.* *It. wgoth.* 307.
Habitat in ſerratula arvenſi.

cardui. 17. Aph. cardui. *Fn. ſuec.* 988.* *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 385. *n.* 13. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 15.
Habitat in carduorum *caulibus.*

achilleae. 49. Aph. flaveſcens, abdomine viridi, antennis pedibusque albidis. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 385. *n.* 14. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 16.
Habitat frequens Kilonii *in achillea millefolio.*

tanaceti. 18. Aph. tanaceti vulgaris. *Fn. ſuec.* 989.* *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 387. *n.* 31. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 36.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 496. *n.* 8. Aphis tanaceti fusca, abdomine nigro caeruleo, antice viridi.
Habitat in tanaceti vulgaris *caulibus.*

absinthii. 19. Aph. artemisiae absinthii. *Fn. suec.* 990.* *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 19.
Habitat in artemisia absinthio.

millefolii. 50. Aph. fusca, abdomine virescente, antennis pedibus corniculisque nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 386. *n.* 16. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 20.
Degeer inf. 3. *p.* 60. *n.* 9. *t.* 4. *f.* 1-5. Aphis millefolii.
Habitat in achillea millefolio.

euonymi. 51. Aph. euonymi europaei. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 386. *n.* 17. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 21.
Habitat in euonymi europaei *foliis.*

avenae. 52. Aph. avenae sativae. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 386. *n.* 18. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 22.
Habitat in Europae avena sativa.

fraxini. 53. Aph. fraxini excelsioris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 386. *n.* 19. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 23.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 494. *n.* 2. Aphis fraxini nigro viridique variegata.
Habitat in fraxini excelsioris *ramis.*

jaceae. 20. Aph. centaureae jaceae. *Fn. suec.* 991.*
Habitat in centaurea jacea.

betulae. 21. Aph. betulae albae. *Fn. suec.* 992.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 386. *n.* 20. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 25.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 496. *n.* 7. Aphis marginibus incisurarum abdominis punctis nigris.
Degeer inf. 3. *p.* 45. *n.* 3. Aphis nigro punctata corniculata viridis, dorso tuberculis nigris, betulae.
Reaum. inf. 3. *t.* 22. *f.* 2.
Habitat in betulae *albae foliis.*

alni. 54. Aph. betulae alni. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 386. *n.* 21. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 26.
Degeer inf. 3. *p.* 47. *n.* 4. *t.* 3. *f.* 15-17. Aphis flavescenti-alba tuberculata, alni.
Habitat in betulae alni *foliis.*

22. Aph.

roboris. 22. Aph. nigra, corniculis obsoletis atris medii abdominis. *Fn. suec.* 993. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 388. *n.* 37. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 42.
Habitat in Quercu robore.

fagi. 23. Aph. fagi sylvaticae lanata. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 24.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 497. *n.* 2.
Reaum. inf. 3. *t.* 26. *f.* 1.
Habitat in fago sylvatica.

quercus. 24. Aph. quercus roboris proboscide longissima. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 388. *n.* 38. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 43.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 498. *n.* 14. Aphis fusca proboscide corpore triplo longiore.
Reaum. inf. 3. *t.* 28. *f.* 5-14.
Habitat in Galliae *potissimum* quercu, *atra, inter maximas, alis hyalinis: margine exterius atro, antennarum pedumque articulis basi ferrugineis, abdomine mutico.*

pini. 25. Aph. pini sylvestris ramulorum. *Fo. suec.* 994. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 389. *n.* 39. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 44.
Degeer inf. 3. *p.* 27. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 9-16. Aphis (nuda pini) fusca tuberculata, pedibus nudis, pini.
Habitat in pini sylvestris *ramis junioribus.*

pineti. 55. Aph. pini sylvestris foliorum. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 389. *n.* 40. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 45.
Degeer inf. 3. *p.* 39. *n.* 2. *t.* 6 *f.* 19. 33. Aphis (tomentosa pini) nigra albo farinosa tuberculata, pedibus villoso tomentosis.
Habitat in pini sylvestris *foliis, pedibus posterioribus elongatis ciliatis.*

salicis. 26. Aph. salicis. *Fn. suec.* 995.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 389. *n.* 41. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 46.
Reaum. inf. 3. *t.* 22. *f.* 2.
Habitat in salicibus *variis.*

vitis. 56. Aph. vitis viniferae. *Scop. ent. carn.* 398. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 390. *n.* 49. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 54.
Habitat in Europae *magis australis* vite vinifera.

populi. 27. Aph. populi tremulae foliorum. *Fn. suec.* 996.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 386. *n.* 22. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 27.
Habitat sub populi tremulae *foliis convolutis fornicatis.*

tremulae. 28. Aph. populi tremulae ramulorum. *Fn. suec.* 997.*
Degeer inf. 3. *p.* 94. *n.* 15. *t.* 7. *f.* 1-7. Aphis caerulea nigro-tomentosa, corniculis nullis, populi tremulae ramulorum.
Habitat in populi tremulae *ramulis, ubi foliis approximatis conteguntur.*

viburni. 57. Aph. viburni opuli. *Scop. ent. carn.* 396. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 386. *n.* 23. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 28.
Sulz. hist. inf. t. 11. *f.* 1. 2.
Habitat in viburni opuli *foliis et caulibus.*

mali. 58. Aph. pyri mali. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 387. *n.* 24. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 29.
Degeer inf. 3. *p.* 53. *n.* 6. *t.* 3. *f.* 20. Aphis pomi flavo-viridis, corniculis longioribus pedibus antennisque nigrescentibus.
Habitat sub pyri mali *foliis.*

bursaria. 29. Aph. populi nigrae. *Fn. suec.* 998.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 385. *n.* 8. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 9. *it. scan.* 311.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 497. *n.* 11. Aphis populi nigra lanata.
Hofm. altd. hort. 51.
Seb. mus. 1. *t.* 38. *f.* 8.
Jung verm. 161. 162.
Rupp jenens. 3. *p.* 333.
Swammerd. bibl. 45. *f.* 22-25.
Reaum. inf. 3. *t.* 26. *f.* 7-11.
Hort. amb. t. 96.
Merian. inf. europ. 1. *p.* 15. *t.* 42.
Habitat in populi nigrae *foliis saccatis, petiolorumque utriculis coloratis.*

aparines. 59. Aph. galii aparines. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 385. *n.* 9. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 10.
Habitat in galio aparine.

urticae. 30. Aph. urticae alba lanata posterius truncata.
Frisch inf. 8. *p.* 34. *t.* 17.
Habitat in Germaniae *urtica, inter maximas sui generis, setis, subtus lana obtecta.*

aceris. 31. Aph. aceris platanoidis. *Fn. suec.* 999.*
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 385. *n.* 10. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 11. Aphis aceris campestris.

Geoffr.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 495. *n.* 5. Aphis (aceris) viridis maculis nigris.
Reaum. inf. 3. *t.* 22. *f.* 6-10.
Habitat in aceris campestris *et* platanoidis *foliis.*

atriplicis. 32. Aph. atriplicis. *Fn. suec.* 1000.
Habitat sub atriplicis, *inprimis* littoralis, *foliis, intra cylindrum ex foliis revolutis confectum obambulans.*

pistaciae. 33. Aph. nigra, alis albidis, tibiis longissimis, thorace verrucoso.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 389. *n.* 42. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 47. Aphis pistaciae lentisci.
Siml. vit. ges. 49.
Camer. epit. 51.
Lob. ic. 100.
Dodon. pempt. 780.
J. Bauh. hist. 1. *p.* 279.
Theodor. hist. 1439.
Habitat in pistacia vera, terebintho, lentisco, *antennis moniliformibus, oculis nigricantibus, abdomine posterius mutico, lanugine alba globulis mista tecto, alis interdum erectis, in folliculo, e foliorum basi enascente, ventricoso, utrinque attenuato, spithameo, pollice crassiore, primo viridi, post exitum aphidis incarnato.*

persicae. 60. Aph. amygdali persicae.
Sulz. hist. inf. p. 105. *t.* 11. *f.* 3.
Habitat in amygdalo persica, *inter majores, viridis, capite thorace tibiisque nigris, alis longissimis, antennis corpore longioribus, rostro brevi.*

polyanthis. 61. Aph. polyanthis tuberosae.
Sulz. hist. inf. p. 105. *t.* 11. *f.* 4. 5.
Habitat in polyanthe tuberosa, *fusca, globosa, antennis corpori aequalibus; mare minore, dorso griseo, utplurimum alato.*

saligna. 62. Aph. griseo-fusca, rostro longissimo, antennis breviori-bus, corniculis nullis.
Sulz. hist. inf. t. 11. *f.* 6.
Habitat in salice.

plantaginis. 63. Aph. plantaginis. *Bonnet insectol.* 1. *p.* 56.
Habitat in plantaginum *caulibus.*

archangelicae. 64. Aph. angelicae archangelicae. *Scop. entom. carn. p.* 137. *n.* 400.
Habitat in angelica archangelica, *nigra, roſtro et abdomine virentibus.*

leucanthemi. 65. Aph. chryſanthemi leucanthemi. *Scop. ent. carn. p.* 138. *n.* 404.
Habitat in chryſanthemo leucanthemo, *nigra, abdomine roſtroque vireſcentibus, hoc apice fuſco.*

ſcabioſae. 66. Aph. ſcabioſae. *Scop. ent. carn. p.* 138. *n.* 405.
Habitat in ſcabioſis.

fabae. 67. Aph. viciae fabae. *Scop. ent. carn. p.* 139. *n.* 406.
Habitat in vicia faba, *quam ſterilem reddit.*

geniſtae. 68. Aph. geniſtae tinctoriae. *Scop. ent. carn. p.* 139. *n.* 409.
Habitat in geniſta tinctoria, *nigra, alis puncto fuſco.*

coryli. 69. Aph. coryli avellanae. *Goeze entom. Beytr.* 2. *p.* 311.
Habitat in coryli avellanae *foliorum pagina inferiori, albida, minor.*

juglandis. 70. Aph. juglandis regiae.
Friſch inſ. 11. *p.* 12. *n.* 10. *t.* 16.
Habitat in juglande regia, *flavo-viridis, antennis brevioribus, corpore ſegmentis quinque ſupra nigris conſtante.*

balſamitae. 71. Aph. tanaceti balſamitae. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 109. *n.* 1252.
Habitat in tanaceto balſamita, *nigra, abdomine viridi, oculis rubris.*

gallarum. 72. Aph. gallarum ulmi. *Degeer inſ.* 3. *p.* 89. *n.* 14. *t.* 4. *f.* 15.
Reaum. inſ. 3. *p.* 299. *t.* 25. *f.* 4-7.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 494. *n.* 1. *t.* 10. *f.* 3.
Habitat in folliculis foliorum ulmi, *nigricans, corniculis nullis.*

farinoſa. 73. Aph. ſalicis farinoſa. *Degeer inſ.* 3. *p.* 76. *n.* 11.
Habitat in ſalice, *obſcure viridis, tuberculis lanuginoſis albis, corniculis longioribus.*

xyloſtei. 74. Aph. lonicerae xyloſtei. *Degeer inſ.* 3. *p.* 96. *n.* 16. *t.* 7. *f.* 8.
Habitat in lonicera xyloſteo, *tomentoſa, corniculis nullis.*

75. Aph.

Mayeri. 75. Aph. rubra, antennis thorace brevioribus, abdomine extenuato, tibiis brevioribus. *Mayer Abh. boehm. Ges.* 4. *p.* 183.
Habitat in Bohemiae *foliis* tanaceti vulgaris, *aptera.*

228. CHERMES. *Rostrum* vagina pectorali: setis tribus inflexis.
Antennae cylindricae, thorace longiores.
Alae quatuor deflexae.
Thorax gibbus.
Pedes saltatorii.

graminis. 1. Ch. airae flexuosae. *Fn. suec.* 1001.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 390. *n.* 1. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 1.
Habitat in Europae *graminibus*, *inprimis* aira flexuosa.

ulmi. 2. Ch. ulmi campestris. *Fn. suec.* 1002.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 390. *n.* 2. *mant. inf. p.* 317. *n.* 2.
Habitat intra ulmi campestris *folia revoluta.*

cerastii. 3. Ch. cerastii viscosi. *Fn. suec.* 1003. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 390. *n.* 4. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 4.
Habitat in cerastii viscosi *foliis*, *in capitulum conniventibus.*

pyri. 4. Ch. pyri communis. *Fn. suec.* 1004.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 390. *n.* 3. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 3.
Degeer inf. 3. *p.* 141. *n.* 2. *t.* 9. *f.* 2. Chermes (pyri) viridi-fusca maculis fasciisque obscuris, alis fusco maculatis.
Habitat in pyri communis *foliis.*

sorbi. 5. Ch. sorbi aucupariae. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 391. *n.* 7. *mant. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 7.
Habitat in sorbo aucuparia, *supra lituris lineisque variis nigris varia*, *subtus virens*, *thorace flavescente*, *anterius punctis duobus*, *posterius lineis quatuor nigris.*

Chermis *larvae pedatae*, *saepius villosae*; *imagines saliunt*, *plantis insident*, *ceterum aphidibus similes.*

perficae. 18. Ch. amygdali perficae. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 391. *n.* 8. *mant. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 8.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 506. *n.* 4. Chermes perficae oblongus.
Reaum. inf. 4. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Habitat in amygdali perficae *ramis.*

calthae. 6. Ch. calthae paluſtris. *Fn. ſuec.* 1005.* *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 391. *n.* 9. *mant. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 9.
Habitat in calthae paluſtris *floribus.*

buxi. 7. Ch. buxi ſempervirentis. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 391. *n.* 5. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 5.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 485. *n.* 2. Pſylla viridis, antennis ſetaceis, alis fuſco-flaveſcentibus.
Reaum. inf. 3. *t.* 19. *f.* 1-14.
Habitat intra Europae *magis auſtralis* buxi *folia ſumma conniventia, Majo interdum* Argentorati *frequentiſſima, excrementa dulcia, cito tamen aceſcentia, et poſica foetida excernens.*

urticae. 8. Ch. urticae dioicae. *Fn. ſuec.* 1006.* *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 391. *n.* 10. *mant. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 10.
Degeer inf. 3. *p.* 134. *n.* 1. *t.* 9. *f.* 17-19. Chermes (urticae) fuſca ſ. vireſcens, abdominis lateribus albo maculatis.
Habitat in urticae dioicae *foliis.*

betulae. 9. Ch. betulae albae. *Fn. ſuec.* 1007.* *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 391. *n.* 11. *mant. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 11.
Habitat in betulae albae *ramis.*

alni. 10. Ch. betulae alni. *Fn. ſuec.* 1008.* *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 391. *n.* 12. *mant. inf. p.* 318. *n.* 12.
Degeer inf. 3. *p.* 148. *n.* 3. *t.* 10. *f.* 8. Chermes alni lanata viridis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 486. *n.* 3. Pſylla viridis, antennis ſetaceis, alis aqueis.
Friſch inf. 8. *p.* 48. *t.* 13. Vermis ſuctorius alni.
Sulz. inf. t. 12. *f.* 80.
Schaeff. elem. t. 39.
Habitant in betulae alni *ramulis larvae, caudis plumoſis tectae.*

quercus. 11. Ch. quercus roboris. *Fn. ſuec.* 1009.*
Habitat in quercus *foliis, ex flavo albicans ad marginem alarum interiorem litura, ad exteriorem quatuor fuſcis.*

12. Ch.

fagi. 12. Ch. fagi ſylvaticae. *Fn. ſuec.* 1010. *it. ſcan.* 65. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 391. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 6.
Reaum. inſ. 3. *t.* 26. *f.* 1-6.
Habitat in fagi ſylvaticae *foliis.*

abietis. 13. Ch. pini abietis. *Fn. ſuec.* 1011.* *fl. lappon.* 218. *p.* 347. E. *it. gotl.* 180. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 392. *n.* 13. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 13.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 487. *n.* 5. Pſylla pallide flaveſcens, oculis fuſcis, alis aqueis.
Degeer inſ. 3. *p.* 99. *n.* 17. *t.* 8. *f.* 1-3. Aphis (gallarum abietis) tomentoſa, corniculis nullis.
Friſch inſ. 12. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 3. Inſectum tuberculi muricati arboris taxi.
Cluſ. pannon. 20. 21. Picea pumila.
Habitat frequens in turionum abietis *gallis ſtrobiliformibus, ſquamatis, imbricatis.*

ſalicis. 14. Ch. ſalicis. *Fn. ſuec.* 1012. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 392. *n.* 14. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 14.
Habitat in Europae *ſalicibus.*

fraxini. 15. Ch. fraxini excelſioris. *Fn. ſuec.* 1013. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 392. *n.* 15. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 15.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 486. *n.* 4. Pſylla nigro luteoque variegata, alarum ore in apicibus fuſcis.
Habitat in fraxino.

aceris. 16. Ch. aceris platanoidis. *Fn. ſuec.* 1014. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 392. *n.* 16. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 16.
Habitat in aceris platanoidis *racemis.*

ficus. 17. Ch. ficus caricae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 392. *n.* 17. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 17.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 484. *n.* 1. Pſylla fuſca, antennis craſſis piloſis, alarum nervis fuſcis.
Reaum. inſ. 3. *t.* 29. *f.* 17-24.
Habitat in Europae *magis auſtralis* ficu carica.

pini. 19. Ch. pini lanata. *Fn. ſuec.* 1. *n.* 699.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 488. *n.* 6.
Habitat in pinu; *an eadem cum ch. abietis?*

20. Ch.

lichenis. 20. Ch. fusca nigro punctata, antennis corpore longioribus, alis nervosis fusco maculatis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 88. *n.* 7.
Habitat in lichenibus.

castanea. 21. Ch. fusca, antennis setaceis laevibus, alis nervosis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 489. *n.* 8.
Habitat in variis plantis.

rubra. 22. Ch. rubra, alis nervosis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 489. *n.* 9.
Habitat in variis plantis.

pruni. 23. Ch. pruni domesticae. *Scop. ent. carn. p.* 140. *n.* 414.
Habitat in pruno domestica, *abdomine rubro: punctis fasciisque lateralibus fuscis.*

crataegi. 24. Ch. crataegi oxyacanthae. *Scop. ent. carn. p.* 139. *n.* 412.
Habitat in crataego oxyacantha; *larva ex plumbeo virente: plica abdominis longitudinali media.*

euonymi. 25. Ch. euonymi europaei. *Scop. ent. carn. p.* 139. *n.* 411.
Habitat in euonymo europaeo, *nigra, pedibus pallidis.*

senecionis. 26. Ch. senecionis vulgaris. *Scop. ent. carn. p.* 140. *n.* 413.
Habitat in senecione vulgari, *ex flavo virens, antennarum articulo ultimo crassiore, duobus pilis terminato.*

229.

229. COCCUS. *Rostrum* vagina setisque pectoralibus.

Antennae filiformes.

Abdomen posterius setosum.

Alae duae erectae masculis; *feminae* apterae.

hesperidum. 1. C. hybernaculorum. *Fn. suec.* 1015.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 393. *n.* 1. *mant. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 1. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 19. §. 8.
Fn. suec. 722. Coccus hesperidum.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 505. *n.* 2. Chermes hesperidum.
Act. Paris. 1692. *p.* 14. *t.* 14.
Reaum. inf. 4. *t.* 1.
Frisch inf. 12. *p.* 12.
Sulz. inf. t. 12. *f.* 81.
Schaeff. elem. t. 48.
Habitat in hybernaculorum *arboribus sempervirentibus*, *frequentissimus*, e. g. citro, lauro, quassia, *spadiceus*, *ovato-oblongus*.

Aonidum. 2. C. indarum arborum. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 393. *n.* 2. *mant. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 2. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 30. §. 26.
Habitat in Asiae *arboribus sempervirentibus*, Camellia *&c.* *cocco hesperidum minor*, *apterus*, *flavescens*, *oblongus*, *vel suborbicularis*, *antennis longitudine fere thoracis*, *testa orbiculata*, *planiuscula*, *atro-purpurascente*: *centro s. vertice tuberculato*, *rotundo*, *rubro*, *in senescentibus aperto*.

capensis. 3. C. ovalis subtomentosus conico-gibbus: apice operculato. *Amoen. acad.* 6. *p.* 401. *n.* 47.* *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 3. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 31. §. 28.
Habitat ad caput bonae spei *in* gnaphalio muricato.

Adonidum. 4. C. rufus farinaceus pilosus. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 393. *n.* 3. *mant. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 4. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 48. §. 34.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 511. *n.* 1. Coccus adonidum, corpore roseo farinaceo, alis setisque niveis.
Fn. suec. 1. *n.* 1169. Pediculus adonidum.

β) *Lederm.*

β) *Lederm. microſc.* 1762. *t.* 9. Pediculus coffeae.
Habitat in Americae, Africae, *nunc in* Europae *calidioris arboribus, corpore ovato oblongiuſculo albo, antennis pedibusque fuſcis; linea dorſali longitudinali elevata, cum puncto elevato in ſingulis ſegmentis, laterum marginibus acutis, cum inciſuris punctisque prominentibus* 14, *area inter lineam dorſalem et marginem totidem punctis ſecundum longitudinem diſpoſitis conſperſa, cauda bifida: Senior folliculum ſtruit, ſe ſexies majorem, in quo ſe ſuaque ova flava condit.*

quercus. 5. C. quercus roboris. *Fn. ſuec.* 1016. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 393. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 5.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 508. *n.* 13. Chermes quercus reniformis.
Reaum. inſ. 4. *t.* 6. *f.* 1-4.
Habitat in Quercu Robore.

ilicis. 6. C. quercus cocciferae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 393. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 6. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 24. §. 19.
Garid. aixenſ. 250. *t.* 53.
Reaum. inſ. 4. *t.* 5.
Geoffr. mat. med. 2. *p.* 782.
Lederm. microſ. 72. *t.* 36.
Habitat in Galloprovinciae quercu coccifera, *nitens fuſcus albo-villoſus, aceto immerſus et ſupra lintea exſiccatus tinctorius.*

betulae. 7. C. betulae albae. *Fn. ſuec.* 1017. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 394. *n.* 8. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 10. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 23. §. 16.
Habitat in Europae betula alba, *teres, ſpadiceus.*

carpini. 8. C. carpini betuli. *Fn. ſuec.* 1018. *Fabr. ſp. inſ* 2. *p.* 394. *n.* 9. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 11. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 29. §. 24.

Habitat

Cocci, *hybernaculorum peſtis, juniores in ramis foliiſque arborum decurrunt, volandoque ſaliunt, aliquas ſubeunt metamorphoſes, ut tamen Adonidum, polonicus, ſpurius, cacti phalaridis, piloſellae, uvae urſi et alni faciem vix mutent; adultiores, feminae praeſertim moribus multoties majores, oculis nigris antennis pedibusque minimis inſtructae, fertiliſſimae, ut ſingulae per rimam caudalem foecundatae ad* 1000 *ova contineant, tardi, adhaerent plantis, ſaepe ramis, alii radicibus, fere immobiles.*

Habitat in carpino betulo, *subsphaericus, pallide rubescens, stria ad latus elevata.*

ulmi. 9. C. ulmi campestris. *Fn. suec.* 1019. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 393. *n.* 6. *mant. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 8. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 27. §. 21.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 507. *n.* 8. Chermes ulmi rotundus.

Degeer inf. 6. *p.* 436. *n.* 1. *t.* 28. *f.* 7. Coccus ovatus albus fusco transverse striatus, ulmi.

Habitat in ulmo campestri, *brunneus; fasciis transversis fuscis.*

coryli. 10. C. coryli avellanae. *Fn. suec.* 1020. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 394. *n.* 7. *mant. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 9. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 29. §. 23.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 507. *n.* 10. Chermes coryli hemisphaericus.

Reaum. inf. 4. *t.* 3. *f.* 4-10.

Habitat in corylo avellana, *citreus, rubro maculatus.*

tiliae. 11. C. tiliae europaeae. *Fn. suec.* 1021. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 394. *n.* 10. *mant. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 12. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 30. §. 25.

Geoffr. inf. par. 1. *p. p.* 507. *n.* 9. Chermes tiliae hemisphaericus.

Reaum. inf. 4. *t.* 3. *f.* 1-3.

Habitat in tilia europaea.

rusci. 12. C. rusci, testa octo clypeolis cincta. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 394. *n.* 11. *mant. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 13. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 31. §. 29.

Column. purp. 16. *t.* 17. Lepas nova s. myrti morbus.

Ginann. adr. 1. *p.* 60. *t.* 3. *f.* 27. Balanus terrestris compositus e multis testis.

Klein ostr. 116. Lepas tessellata.

Bocc. mus. t. 107. *f.* XXIII. h. h.

Habitat in Apuliae myrto, rusco; *testa truncata, octogona, perforata, clypeolis, praeter duos laterales oppositos, in medio granulo notatis.*

myricae. 13. C. myricae quercifoliae. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 14. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 31. §. 27.

Habitat ad caput bonae spei, *in* myrica quercifolia, *pisi minoris magnitudine, semiovatus, pallide incarnatus, vertice*

vertice obtuſe acuminato cum poro tenuiſſimo; poro alio poſterius ſupra marginem cartilagineum craſſiorem, album, utrinque ſeptem circiter torulis protuberantem.

capreae. 14. C. ſalicis cinereae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 394. *n.* 12. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 15. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 22. §. 15. *Degeer inſ.* 6. *p.* 440. *n.* 2. *t.* 28. *f.* 13. Coccus ſubrotundus fuſcus, linea dorſali nigra, ſalicis.

Habitat in Europae ſalicibus, *quibus folia hirſuta, piſi majoris magnitudine, ſemiamplexicaulis, ovatus, anterius obtuſus et bifidus, colore ſeminis ſtaphyleae, linea media nigra, nitens, glaber.*

ſalicis. 15. C. ſalicis hermaphroditae. *Fn. ſuec.* 1022.* *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 21. §. 12.

Habitat in ſalicis hermaphroditae *cortice, minimus, depreſſiuſculus, cinereus.*

vitis. 16. C. vitis viniferae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 395. *n.* 18. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 25. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 20. §. 9. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 506. *n.* 6. Chermes vitis oblongus. *Act. bonon.* 2. *p.* 279. *t.* 284. *Reaum. inſ.* 4. *t.* 6. *f.* 5-7.

Habitat in vitis viniferae *ramis, cinnamomeus.*

ficus. 23. C. ficus religioſae et indicae. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 7. *Kerr act. angl.* 1781. *p.* 374. *f.* a. b. Coccus Lacca.

Habitat in Indiae ficu religioſa *et* indica, gummilaccam *producens, ruber, antennis ramoſis, cauda biſeta.* Swagermann.

poloni-cus. 17. C. radicis ſcleranthi perennis. *Fn. ſuec.* 1023. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 395. *n.* 20. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 23. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 34. §. 31. *Fn. ſuec.* 720. Coccus radicum purpureus. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 504. *n.* 1. Chermes radicum purpureus. *Breyn act. phyſ. med.* 6. 3. *app.* 5. *t.* 1. Coccus tinctorius radicum. *Camer. epit.* 691. Polygonum cocciferum. *Bauh. pin.* 281. *Rupp. jen.* 86. *Raj. hiſt.* 186. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 378.

Friſch

Frisch inf. 5. *p.* 6. *t.* 2.
Act. upf. 1742. *t.* 1.
Reaum. inf. 4. *p.* 1.
Habitat in scleranthi perennis *radicibus, oblongo-ovatus, purpureus aut spadiceus olim,* Cosaccis *adhuc tinctorius.*

fragariae. 24. C. fragariae vescae. *S. G. Gmelin it.* 1. *p.* 205. 3. *p.* 312.
Act. angl. 1765. *p.* 91. *t.* 10.
Mayer act. soc. priv. boh. 4. *p.* 152. 184. Coccus potentillae.
Habitat in Europa *et* Sibiria *ad* fragariae vescae, potentillae vernae, reptantis, albae *radices, rusticis Russis ad tingenda colore kermesino lintea usitatus, rostro nigro, thorace trirugi, ano pilis nigrescentibus cincto.*

hyperico-nis. 25. C. hypericonis perforati. *Pallas it.* 1. *p.* 21.
Habitat in Russiae hypericone perforato.

pilosellae. 18. C. radicis hieracii pilosellae. *Fn. suec.* 1024. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 394. *n.* 13. *mant. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 16. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 49. §. 36.
Sim. Paul. quadr. 113.
Act. upsal. 1742. *p.* 54. *t.* 2.
Habitat in hieracii pilosellae *radicibus.*

u ae ursi. 19. C. radicis arbuti uvae ursi. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 394. *n.* 14. *mant. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 17. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 49. §. 37.
Habitat sub muscis ad radices arbuti uvae ursi, *tinctorius, spadiceus.*

phalaridis. 20. C. radicum phalaridis. *Fn. suec.* 1026. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 395. *n.* 15. *mant. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 18. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 48. §. 35.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 512. *n.* 2. *t.* 10. *f.* 5. Coccus graminis, corpore roseo.
Habitat ad graminum, *praesertim* phalaridis canariensis, *radices, oblongo-ovatus, albidus vel pallide rubescens.*

oxyacanthae. 21. C. crataegi oxyacanthae. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 395. *n.* 16. *mant. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 19. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 20. §. 10.
Reaum. inf. 4. *t.* 6. *f.* 11. 12.
Habitat in crataego oxyacantha, *oblongus, spadiceus.*

ferratulae. 26. C. ferratulae arvensis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 395. *n.* 17. *mant. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 20.
Habitat in Angliae ferratula arvensi.

zosterae. 27. C. zosterae marinae. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 395. *n.* 19. *mant. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 22.
Habitat in maris balthici zostera marina.

cacti. 22. C. cacti coccinelliferi. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 395. *n.* 21. *mant. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 24. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 44. §. 33.
Brown jam. 435. Coccinella alis destituta, corpore rugoso.
Degeer inf. 6. *p.* 447. *n.* 1. *t.* 80. *f.* 12-14. Coccus cacti coccinelliferi.
Act. angl. 1762.
Hernand. mex. 78.
Sloan. jam. 2. *p.* 153. *praef. t.* 9.
Pet. gazoph. 3. *t.* 1. *f.* 5.
Reaum. inf. 4. *t.* 7. *f.* 11. 12.
Rausch hist. nat. de la cochinille. t. 1. *f.* 1-5.
Habitat in Americae cactis opuntiis, *depressus, tomentosus, transverse rugosus, dorsi margine laterali utrinque duplici: superiore breviore, abdomine purpurascente, pedibus brevibus nigris, antennis subulatis, corpore tertia parte brevioribus, eximie tinctorius.*

liriodendri. 28. C. liriodendri tulipiferae. *Hamburg. Magaz.* 12. *p.* 1-24.
Habitat in liriodendro tulipifera.

farinosus. 29. C. ovatus tomentosus pallide fuscus albo-farinosus. *Degeer inf.* 6. *p.* 442. *n.* 3. *t.* 38. *f.* 16. 17. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 50. §. 38.
Habitat in betula alno, *depressiusculus.*

clematidis. 30. C. clematidis oblongus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 506. *n.* 1.
Habitat in clematidibus.

persicae. 31. C. persicae rotundus. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 28. §. 22.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 506. *n.* 5.
Reaum. inf. 4. *t.* 2. *f.* 4. 5.
Habitat in amygdala *persica, nitens, rubicundus, spadiceus aut niger.*

32. C.

abietis. 32. C. abietis rotundus. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 27. §. 20.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 507. *n.* 7.
Habitat in pinu abiete; *badius.*

fuſcus. 33. C. quercus fuſcus. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 24. §. 18.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 507. *n.* 11.
Reaum. inf. 4. *t.* 5. *f.* 2.
Habitat in quercu robore, *albo tomento obductus.*

variegatus. 34. C. quercus rotundus ex albo, flaveſcente nigroque varius.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 508. *n.* 12.
Reaum. inf. 4. *t.* 5. *f.* 3. a.
Habitat in quercu robore.

lanatus. 35. C. quercus oblongus: ſerico albo.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 508. *n.* 14.
Habitat in quercu robore; *nonne mera varietas fuſci?*

meſpili. 36. C. meſpili: ſerico albo.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 508. *n.* 16.
Habitat in meſpilis.

conchiformis. 37. C. arborum linearis. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 22. §. 14.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 509. *n.* 17.
Reaum. inf. 4. *t.* 5-7.
Habitat in ulmo, *anguſtus, fuſcus.*

aceris. 38. C. aceris ovatus. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 21. §. 13.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 509. *n.* 18.
Habitat in acere, *ovato-depreſſus, ſtriis ad latera longitudinalibus albis aut cinereis.*

laniger. 39. C. fuſcus: ſerico albo.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 512. *n.* 3.
Reaum. inf. 4. *t.* 7. *f.* 1. 2. 6. 9.
Habitat in ulmo campeſtri.

dioſmatis. 40. C. dioſmatis crenatae. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 21. § 11.
Habitat in capitis bonae ſpei dioſmate crenato *et* pulchello, *ovato-oblongus.*

alni. 41. C. betulae alni. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 23. §. 17.
Habitat in betulae alni *dichotomia ramorum, oblongo-ovatus, rubeſcens.*

Uva. 42. C. testa fusca sphaerico-gibba, subflavescente. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 32. §. 30.
Habitat in Suecia *sub lapidibus.*

spurius. 43. C. ovatus hinc inde pilosus spadiceus subtus pallide flavus. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 43. §. 32.
Habitat in ulmi *ramorum dichotomia.*

230. THRIPS.

Rostrum obsoletum, intra os absconditum.

Antennae filiformes longitudine thoracis.

Corpus lineare; *abdomen* sursum reflexile.

Alae quatuor rectae, dorso incumbentes, longitudinales, angustae, subcruciatae.

paradoxa. 1. Thr. fusca, alis abbreviatis, antennis pectinatis fissilibus aliformibus. *Amoen. acad.* 6. *p.* 401. *n.* 48.*
Habitat in Sina, *an hujus generis?*

physapus. 2. Thr. elytris glaucis, corpore atro. *Fn. suec.* 1027.* *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 485. *n.* 2. *Scop. ent. carn.* 418. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 396. *n.* 1. *mant. inf.* 2. *p.* 320. *n.* 1.
Degeer inf. 3. *p.* 6. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1. Thrips atra, alis albis, antennis sexnodiis.
Degeer act. Stockh. 1744. *p.* 3. *t.* 4. *f.* 4. Physapus ater, alis albis.
Schaeff. elem. t. 127.
Habitat frequens in Europae floribus compositis, *loti corniculatae flores clausos tumidosque reddens, secalis spicas exinaniens.*

minutissima. 3. Thr. elytris corporeque glauco, oculis fuscis. *Fn. suec.* 1028.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 396. *n.* 4. *mant. inf.* 2. *p.* 320. *n.* 4.
Habitat in Europae *floribus.*

4. Thr.

juniperina. 4. Thr. elytris niveis, corpore fusco. *Fn. suec.* 1029.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 396. *n.* 2. *mant. inf.* 2. *p.* 320. *n.* 2.
Degeer inf. 3. *p.* 10. *n.* 2. *t.* 1. *f.* 5. Thrips griseo-fusca, oculis nigris, alis albescentibus.
Degeer act. Stockh. 1744. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 2. Physapus fuscus, alis albicantibus.
Habitat in juniperi *gallis.*

ulmi. 6. Thr. nigra, alis niveis ciliatis, ano acuminato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 396. *n.* 3. *mant. inf.* 2. *p.* 320. *n.* 3.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 384. *n.* 1. *t.* 7. *f.* 6. Thrips elytris albidis, corpore nigra abdominali seta.
Degeer inf. 3. *p.* 11. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 8-13. Thrips (corticis) nigra, alis hyalinis niveis, barbis longissimis, antennis octonodiis.
Habitat gregaria in ulmi *cortice.*

urticae. 7. Thr. flava, elytris albidis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 397. *n.* 5. *mant. inf.* 2. *p.* 320. *n.* 5.
Schranck Beytr. zur Naturg. 31. *t.* 1. *f.* 25. 26.
Habitat in urticae, vitis, coryli *aliorumque foliorum pagina inferiori, solitaria.*

fasciata. 5. Thr. elytris albo nigroque fasciatis, corpore fusco. *Fn. suec.* 1030.* *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 385. *n.* 3. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 397. *n.* 6. *mant. inf.* 2. *p.* 320. *n.* 6.
Degeer inf. 3. *p.* 18. *n.* 4. Thrips atra, alis fasciis transversis tribus albis, antennis annulo albo.
Sulz. inf. t. 7. *f.* 48. b.
Habitat in Europae *floribus compositis.*

fusca. 8. Thr. nigricans, elytris glaucis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 96. *n.* 1083.
Habitat in Dania, *an forsan femina fasciatae?*

obscura. 9. Thr. flavescens, elytris pallidis, oculis abdominisque annulis nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 96. *n.* 1084.
Habitat in Dania.

Thripes *in floribus frequentes agilissimae fere subsiliunt, abdomine saepius sursum flexo, tarsi vesiculosi; larvae aeque agiles currunt, saepius rubrae.*

rufa. 10. Thr. rufa. *v. Gleichen Neueſtes im Reich der Pflanz. t.* 16. *f.* 6. 7.
Habitat in tritici *ſpicis, an forſan larva minutiſſimae?*

variegata. 11. Thr. variegata. *v. Gleichen Neueſtes im Reich der Pflanz. p.* 22. *t.* 21. *f.* 6. 7.
Habitat in linaria.

---

anz.

anz.