B. Stamina hypogyna vel epipetala.
1) Pistillum simplex, 1-loculare, 1-ovulatum.
a) Stam. epipetala; embr. rectus, exalbum. Thymelaeae.
b) Stam. hypogyna; embr. periphericus . Amarantaceae.
2) Pistillum multiplex, carpellis 1-polyspermis Ranunculaceae.

Subcl. X. Perigoniata epantha.

Aristolochieae *Jussieu.*

Herbae vel frutices, plque scandentes, rhizomate repente vel tuberibus instructae; fol. alterna, simplicia, interdum stipulata; flor. plque monoclini; perigonium epigynum; stam. 6 vel 12, epigyna, antheris extrorsis; germen 6-loculare, inferum, rarius semisuperum; ovula axi centrali affixa, anatropa; styl. 1, stigma 6-partitum; sem. albuminosa; embr. minimus, ad basin albuminis cartilaginei, indivisus.

Asárum*) *Tournef.* (Haselwurz). Dodecandr. Monog. *L.* (tab. 25. 206). Perigonium regulare, 3-fidum, persistens; stam. 12, disco epigyno inserta, libera, filamentis supra loculos elongatis; germen ovulis biseriatis; capsula 6-locularis, dissepimentis ab axi solutis et discretis; sem. pauca, adscendentia.

A. europáeum *L.* Caulis repens, ramosus, subterraneus, ramis brevibus, adscendentibus, basi squamatis; fol. petiolata, bina, renata, obtusissima; flos terminalis, solitarius, interpetiolaris; Im mittl. Europa. Giebt Rad. Asari.

Aristolochía**) *Tournef.* (Osterluzei). Gyn. Hex. *L.* (tab. 25. 207). Flores herm.; perigon. tubulosum, irregulare, deciduum. basi ventricosum, limbo obliquo, ligulato; antherae 6, columnae brevi, sub stigmate 6-lobo affixae; caps. septicido-6-valvis; sem. 1-seriata.

A. Clematítis***) *L.* Caulis subterraneus repens, superne plque simplex, erectus; fol. reniformi-cordata, glabra; flor. axillares, fasciculati, tubo recto, limbo oblongo. Im mittl. Europa. Rad. Aristoloch. vulgaris seu tenuis.

---

*) *τὸ ἄσαρον*, Haselwurzel.

**) *ἡ ἀριστολοχία* von *ἄριστος*, *λοχεία*; gut zur Beförderung der Geburt.

***) *κληματῖτις*, eine Pflanze mit Ranken.

A. rotúnda *L.* Rad. tuberosa, subglobosa; caul. erectus, ramosus; fol. cordata, brevissime petiolata; petiolus pedunculo multo brevior; flor. solitarii, limbo oblongo, tubum aequante. Im südl. Europa. Rad. Aristolochiae rotundae.

A. lónga *L.* Rad. tuberosa, fusiformis; caul. ramosus, flexuosus, subscandens; fol. petiolata, 3-angulari-cordata, acuta; flor. solitarii, limbo lanceolato, acuto, tubum aequante. Im südl. Europa. Rad. Aristolochiae longae.

A. Serpentária *L.* Caul. simplex, flexuosus, debilis; fol. petiolata, cordata; flor. longe pedunculati, solitarii e basi caulis; perigon. subcircinato-incurvatum, labio reflexo. In Virginien. Rad. Serpentariae virginianae.

A. Pistolochía *L.* Caul. basi ramosus, flexuosus, erectus; fol. cordata, acuta, scabra, subtus reticulata; perigon. subbilabiatum, labio altero brevissimo, altero elongato, obtuso, recto. Im südl. Europa. Rad. Pistolochiae.

Santalaceae *Brown.*

Arbores, frutices, rarius herbae; fol. alterna, exstip., integra; flor. parvi, rarius diclini; perigonium epigynum, 4—5-fidum, intus coloratum, praeflor. valvacea; stam. 4—5 perigyna, margini hypanthii inserta, perigonii laciniis opposita; germen inferum, 1-loculare, 2—4-ovulatum; ovula pendula, anatropa; styl. 1; fruct. nucaceus vel drupaceus, 1-spermus; sem. inversum; embryo teres, in axi albuminis carnosi inversus, radic. supera.

Sántalum*) *L.* (Sandelbaum). Tetrandr. Monog. *L.* (tab. 25. 208). Flor. herm.; perig. ventricosum, semisuperum, 4-fidum, limbo deciduo, fauce glandulis 4, cum staminibus alternis; stig. 3—4-fidum; drupa baccata.

S. álbum *Rumph.* Fol. oppos., ovalia, glabra; racemi axillares et terminales. Auf Malabar. Lignum santalum album.

Subclassis XI. Perigoniata hypantha.

Chenopodeae *Ventenat.*

Herbae, rarius frutices; folia alterna, rarius opposita, exstipulata; flor. parvi, monoclini, rarius diclini, glomerati, plque ebracteati; perigonium inferum, rarius semisuperum, plque 5-partitum, praeflor. imbricata, persistens; stamina hypanthio brevi inserta,

*) *τὸ σάνταλον,* der Sandelbaum.