# PHARMACOPŒIÆ
## CHIRURGICÆ,
### SECTIO PRIMA,
SISTENS
### MEDICAMENTA PRÆPARATA.

## ACIDA.

ACIDUM ACETICUM concentratum et dilutum.

Usus *concentrati* : Hæmorrhœa gingivarum aut faucium scorbuticorum; hæmorrhagia alveoli post dentem evulsum. — *Forma vaporis* : Ad aërem noxium et effluvia putrida et contagiosa corrigenda. — *Naribus adplicando* : Ad refocillandos ægros sub operationibus chirurgicis. — *Diluti* : Ad gargarismata, lotiones, injectiones, enemata et fotus varios.

ACIDUM CITRICUM.

Usus : Gingivarum laxitas; ulcera oris et faucium putrida, scorbutica, etc.

## ACIDUM MURIATICUM.

Usus eximius *forma vaporis* : Ad corrigenda et destruenda effluvia morbosa putrida et contagiosa varia (Guyton-Morveau). ( Vide *Liquor Alexiterius* ). *Penicillo adplicando* : Ulcera scorbutica; aphthæ; verruca aut callositas cutis. — *Aqua multa diluti forma injectionis* : Stranguria habitualis. — *Forma pediluvii* : Podagra atonica, retrocedens, aberrans.

## ACIDUM MURIATICUM OXYGENATUM.

Virtus : Antiseptica; miasmata morbosa nosocomiorum et venena narcotica, ac plura venena animalia efficaciter destruens.

Usus : Ulcera cutis vel faucium putrida; vulnus recens ex morsura canis rabidi. — *Forma vaporis* : Ad corrigendum aërem et effluvia morbosa varia nosocomiorum, etc. (Vide *Liquor Alexiterius*).

## ACIDUM NITRICUM.

Virtus : Caustica. — *Diluti* : Antiseptica.

Usus : Verruca. — *Item* pro parandis præ-

paratis variis. — *Forma vaporis*: Ad corrigenda et destruenda effluvia nosocomiorum morbosa, putrida.

ACIDUM PHOSPHORICUM.

Usus *forma lotionis aut fotus*: Arthrodynia podagrica.

ACIDUM SULFURICUM.

Virtus *diluti*: Styptica.

ACIDUM TARTAROSUM.

Usus idem fere ac acidi citrici.

---

## ALCALIA ET SALES SALINI.

### AMMONIACA.

Virtus: Caustica, corrosiva.

Usus *naribus adplicando*: Asphyxia; Syncope. — *Forma lotionis, linimenti, etc.* Vulnus ex morsura canis rabidi, viperæ, ex punctura vesparum, apium, etc.; erythema ex ambustura recenti; tophi; tumores cystici.

(Vide *Linimentum ammoniacale, embrocatio*).

ACETAS AMMONIACÆ LIQUIDUS.

Usus *scopo resolvendi* : Tumores frigidi; orchiocele; ophthalmia.

CARBONAS AMMONIACÆ LIQUIDUS.

Usus idem ac ammoniacæ. — *Aqua diluti* : Tumores lactei; tumores et ulcera scrophulosorum et rhachiticorum.

MURIAS AMMONIACÆ.

Usus *forma fotus aut lotionis frigidæ scopo resolvendi* : Vulnera, tumores, et dolores ex contusura, distorsione, luxatione; ecchymoma; orchiocele.

SUCCINAS AMMONIACÆ.

Gallis *Eau de Luce.*

Usus *naribus adplicando* : Syncope.

---

POTASSA.

Virtus : Caustica.

Usus : Lixivii saponariorum ambustura mox initio; vulnus ex morsura canis rabidi.—*Forma balnei:* Tumores et ulcera scrophulosorum et rhachiticorum. *Forma linimenti* : Tumores varii ex lympha coagulata.

POTASSA FUSA.

Usus : Caro fungosa; excrescentiæ; paralysis extremitatum inferiorum (Pott).

CARBONAS POTASSÆ.

Virtus idem fere ac potassæ sed mitior.

MURIAS POTASSÆ OXYGENATUS.

Usus : Psora; herpes; ulcera syphilitica?

NITRAS POTASSÆ.

Usus forma gargarismatis, aut enematis, etc. Scopo refrigerandi.

TARTRIS POTASSÆ ACIDULUS.

Usus *cum melle*: Ulcera oris, etc. putrida. —Scopo dentifricio ad mundundos dentes.

---

SODA.

Usus idem ac potassæ.

BORAX seu BORAS SODÆ ALCALESCENS.

Usus : Aphthæ.

CARBONAS SODÆ.

Usus idem ac carbonatis potassæ.

### MURIAS SODÆ.

Usus *forma fotus* : Scopo discutiendi *decrepitati in sacculis* scopo resolvendi : Tumores rheumatici ; odontalgia ; otalgia et tonsillitis rheumatica. — *Item forma fotus, balnei* : Tumores scrophulosorum et rhachiticorum ; contusura ; distorsio. — *Forma injectionis* : Cerumen induratum. — *Forma balnei* : Morbi cutis aliive ubi balnea maris conveniunt.

### NITRAS SODÆ.

Usus idem ac nitratis potassæ.

---

## TERRÆ ET SALES TERREI.

### CALX.

Virtus : Caustica.

Usus : Nævi et excrescentiæ. — Item ad parandam *Aquam Calcis* dictam.

### CARBONAS CALCIS.

Lapides cancrorum, testæ ovorum, conchæ ostrearum, aut corallia rubra aqua probe

abluta, dein siccata in pulverem tenuissimum redigantur, qui per linteum trajiciatur.

VIRTUS : Antacida.

USUS *scopo exsiccandi* : Ulcera. — Item ad pulveres dentifricios.

MURIAS CALCIS.

USUS *aqua diluti* : Ulcera phagedænica; tumores aliave vitia scrophulosorum. — Item ad parandam *Aquam marinam artificialem*.

PHOSPHAS CALCIS USTUS.

Frusta cornu cervi aut ossa animalium ad albedinem calcinata in pulverem tenuissimum redigantur.

USUS *inspergendo* : Hæmorrhagiæ; ulcera laxa, humida.

---

ALUMINA.

SYN. *Terræ bolares*.

VIRTUS : Exsiccans.

ALUMEN s. SULFAS ALUMINÆ ACIDUS cum POTASSA vel AMMONIACA.

VIRTUS : Styptico-adstringens.

Usus *forma lotionis, injectionis, etc.* Hæmorrhagiæ; hæmorrhœæ; blennorrhœæ; gingivarum laxitas; Pernio.

### ALUMEN FUSUM seu USTUM.

Virtus : Corrosivo-Styptica.

Usus : Caro luxurians; excrescentiæ; ulcera putrida.

---

## METALLA EORUMQUE OXYDA, ET SALES METALLICI.

### *PRÆPARATA ARGENTI.*

### NITRAS ARGENTI FUSUS.

Syn. *Causticum Lunare; lapis infernalis.*

Virtus : Caustica.

Usus *per se :* Caro luxurians; ulcera callosa; excrescentiæ; tumores indolentes, atonici. — *Aqua diluti forma gargarismatis vel injectionis :* Ulcera oris et faucium ex hydrargyro; cynanche ulcerosa putrida; fistula; blennorrhœa.

Dosis : Grani unius ad grana 500 aquæ.

## *PRÆPARATA ARSENICI.*

### OXYDUM ARSENICI ALBUM.

Usus *aqua soluti* : Carcinoma; ulcera phagedænica.—*Cum oleo triti* : Morbi cutanei rebelles apud Hindous.

## *PRÆPARATA BISMUTHI.*

### OXYDUM BISMUTHI.

Usus : Cosmeticus.

## *PRÆPARATA CUPRI.*

### OXYDUM CUPRI VIRIDE.

Virtus : Corrosiva.

Usus : Ulcera atonica, callosa, cancrosa; excrescentiæ.

### SULFAS CUPRI.

Usus *per se* : Ulcera callosa, fungosa; excrescentiæ. — *Aqua soluti* : Hæmorrhagia; blennorrhœa.

## *PRÆPARATA FERRI.*

### OXYDUM FERRI RUBRUM.

Virtus : Styptica; exsiccans.

MURIAS FERRI.

VIRTUS : Styptica, corrodens.

USUS pro paranda tinctura.

SULFAS FERRI.

USUS *aqua soluti* : Hæmorrhagia; blennorrhœa.

TARTRIS FERRI CUM POTASSA.

USUS *forma fotus, balnei, etc.* : Distorsio; luxatio.

*PRÆPARATA HYDRARGYRI.*

OXYDUM HYDRARGYRI GRISEO-NIGRUM.

USUS *forma unguenti* : Syphilis; ulcera syphilitica; varices ani dolentes; tumores ex lympha coagulata; ophthalmia palpebrarum.

OXYDUM HYDRARGYRI ALBUM.

USUS : Ulcera syphilitica; cutis vitia varia.

OXYDUM HYDRARGYRI RUBRUM.

VIRTUS : Irritans, corrosiva.

USUS *forma pulveris inspergendo* : excrescentiæ et ulcera syphilitica. — *Forma linimenti* : Ophthalmia; ulcera.

MURIAS HYDRARGYRI.

Usus *varia forma* : Ulcera syphilitica. — *Forma frictionum superficiei oris internæ:* Syphilis; ulcera oris, faucium et narium syphilitica. — *Oculo inflati* : Maculæ corneæ.

MURIAS HYDRARGYRI AMMONIACALIS.

Usus : Psora, aliave cutis vitia varia.

MURIAS HYDRARGYRI OXYGENATUS.

Virtus : Corrosiva, caustica; summe venenata.

Usus *aqua soluti* : Syphilis; blennorrhagia syphilitica; psora, aliave cutis vitia varia.

SULFAS HYDRARGYRI LUTEUS cum excessu oxydi.

Virtus : Irritans; corrosiva; emetica.

Usus : Amaurosis. *Vide* PULVIS ERRHINUS.

## *PRÆPARATA MANGANESII.*

OXYDUM MANGANESII NIGRUM.

Usus : Morbi cutis; tinea; herpes?

## *PRÆPARATA PLUMBI.*

OXYDUM PLUMBI ALBUM,
——— PLUMBI SEMIVITREUM,
——— PLUMBI RUBRUM.

VIRTUS : Venenata; sedativa; adstringens; exsiccans.

ACETAS PLUMBI CRYSTALLISATUS.

VIRTUS eadem ac priorum.

ACETAS PLUMBI LIQUIDUS.

SYN. *Extractum Saturni; acetum lithargyrii.*

USUS *varia forma* : Hæmorrhagia; hæmorrhœa; blennorrhœa; phlegmone; erythema; cutis vitia varia; cnesmus localis; varix ani; ophthalmia; ecchymoma; arthrodynia rheumatica.

## *PRÆPARATA STIBII s. ANTIMONII.*

MURIAS STIBII OXYGENATUS.

SYN. *Butyrum antimonii.*

VIRTUS : Caustica, corrosiva, venenata.

USUS : Excrescentiæ; ulcera callosa; tumores indolentes; caries; staphyloma.

TARTRIS STIBII CUM POTASSA.

SYN. *Tartarus emeticus s. antimonialis.*

USUS : Ulcera rebellia.

## *PRÆPARATA ZINCI.*

OXYDUM ZINCI ALBUM.

USUS : Herpes; ophthalmia palpebrarum; fissura papillarum; ulcera.

SULFAS ZINCI.

USUS *forma varia :* Blennorrhœa; ophthalmia; cutis vitia varia; ulcera; varix ani.

---

## SULFURETA.

SULFURETUM CALCIS,
——————— POTASSÆ aut SODÆ.

USUS *internus :* Ptyalismus aliive morbi ex hydrargyro. *Externus forma lotionis, balnei, etc. :* Morbi cutis varii.

SULFURETUM HYDRARGYRI RUBRUM.

USUS *forma fumigationis :* Ulcera; excrescentiæ, aliave vitia syphilitica rebellia.

# OLEA ET OLEOSA.

## *OLEA VOLATILIA.*

VIRTUS *in genere* : Stimulans, resolvens.

### OLEUM VOLATILE BENZOES.

USUS idem fere ac olei camphoræ.

### OLEUM VOLATILE CAMPHORÆ.

USUS: Arthrodynia rheumatica et podagrica; Myodynia.

### OLEUM CAMPHORÆ NITRICATUM.

VIRTUS : Corrosiva.

USUS : Excrescentiæ aut ulcera callosa, fungosa; myodynia aut arthrodynia rheumatica inveterata, rebellis; paralysis.

### OLEUM FLORUM CARYOPHILLI AROMATICI.

VIRTUS : Corrosiva.

USUS : Odontalgia a carie dentis; paralysis linguæ.

### OLEUM FLORUM LAVANDULA-SPICÆ.

USUS : Ganglion; tumores frigidi.

OLEUM FOLIORUM MELALEUCA-LEUCADENDRI.

Usus idem ac olei camphoræ.

OLEUM HERBÆ THYMUS-SERPYLLI.

Usus idem ac olei lavandulæ.

OLEUM THEREBINTHINÆ PINUS-LARICIS.

Usus: Ulcera putrida et verminosa; dolores rheumatici; pernio; tumores atonici.

*NB.* Leniter calefactum est stypticum egregium arteriæ vulneratæ adplicando.

OLEUM RADICIS VALERIANÆ CELTICÆ.

Usus præcipuus pro frictionibus post balnea vaporis.

---

## *OLEA FIXA.*

Virtus *in genere*: Emolliens; involvens; relaxans.

OLEUM AMYGDALARUM.

——— CACAO BUTYRACEUM.

OLEUM CERÆ.

℞. Ceræ flavæ quantum placet.
Arenæ puræ pondus duplum.

Liquefacta simul ex retorta destilla. Post liquorem acidum ( qui seorsim servetur) transit oleum crassum collo retortæ adhærens, quod leni calore admoto fusum cum nova quantitate arenæ semel ac iterum destilletur.

VIRTUS : Summe emolliens.

USUS : Fissura papillarum aut cutis; erythema ex gelu aut igne; contractura.

OLEUM SEMINIS HYOSCIAMI NIGRI.

VIRTUS : Sedativo-emolliens.

USUS idem ac sequentis.

OLEUM SEMINIS LINI USITATISSIMI.

USUS : Ulcera rebellia præcipue NOLI ME TANGERE dictum. — Item ad frictiones, enemata, etc.

OLEUM OLIVARUM.

——— PALMÆ.

OLEUM SEMINIS RICINI.

VIRTUS : Leniter cathartica.

## *OLEA partim VOLATILIA partim FIXA.*

### OLEUM FLORUM MATRICARIA - CHAMOMILLÆ COCTUM.

Usus : Spasmi ; colica flatulenta aut spasmodica ( ventri adfricando ) ; dysuria ; varices ani dolentes.

### OLEUM BACCARUM LAURI NOBILIS EXPRESSUM.

Usus idem fere ac olei chamomillæ cocti.

### OLEUM NUCIS MYRISTICÆ MOSCHATÆ EXPRESSUM.

Usus : Cephalæa aliive dolores nervosi.

## *OLEA EMPYREUMATICA.*

Virtus *in genere* : Stimulans ; resolvens.

### OLEUM ANIMALE.

Usus : Debilitas localis ; paralysis ; tumores frigidi.

### OLEUM PETROLEI.

Usus : Tumores atonici ; ecchymoma ; distorsio.

OLEUM PYRO-TARTAROSUM.

SYN. *Oleum Tartari fœtidum.*

℞. Tartari vulgo venalis quantum opus, Ut retorta terrea ad duas tertias eo repleatur.

Recipiente amplo adaptato leni igne destilla, donec nubeculæ albæ prodire incipiant. Tunc mutato excipulo et juncturis luto probe munitis summo ignis gradu urgeatur destillatio. Oleum cum acido junctum sic in excipulo obtentum ab eodem, ope vitri separatorii, separetur et seorsim denuo cum aqua destilletur.

USUS : Tumores atonici; glandulæ tumidæ et induratæ; tophi; ligamentorum et tendinum contractura.

## *OLEA ANIMALIUM FIXA CONCRETA.*

---

VIRTUS eadem ac oleorum fixorum.

ADEPS SUILLA s. AXUNGIA PORCINA.

BUTYRUM.

SEVUM OVILLUM.

ADIPO-CERA PHYSETERUM, Vulgo *Spermaceti.*

USUS *pro emplastris et unguentis.*

CERA FLAVA ET ALBA.

Usus idem ac priorum. — Item *forma enematis*: Dysenteria; fluxus hæmorrhoidum immodicus.

---

SAPONES.

Virtus *in genere*: Stimulans, resolvens.

SAPO AMMONIACALIS.

Vide *Linimentum ammoniacæ*.

SAPO COMMUNIS.

SAPO TEREBINTHINATUS.

Syn. *Sapo Starkeyanus*.

℞. Potassæ uncias decem.
Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis uncias octo.
Calefacta simul terantur.

Virtus: Leniter stimulans; resolvens.

Usus: Dolores rheumatici; tumores frigidi.

---

ALCOHOL ET ALCOHOLISATA.

ALCOHOL.

——— CONCENTRATUM.

——— DILUTUM.

Virtus: Stimulans; cardiaca; antiseptica; sanguinem coagulans; antiphthiriaca.

Usus *forma fotus, lotionis, gargarismatis, injectionis, etc.* : Erysipelas faciei aliarumve partium; ulcera faucium erysipelatosa, putrida, gangrænosa, atonica; caries; gangræna; ulcera cutis putrida; halitus oris fœtidus; hæmorrhagia narium; vulnera arteriarum; varices ani; hæmorrhoidum fluxus immodicus.—*Forma balnei, fotus, lotionis* : Blechropyræ; asthenia generalis aut localis.

ALCOHOL CAMPHORATUM.

℞. Camphoræ uncias duas.
Alcoholis libram unam. Misce.

Usus : Arthrodynia aut myodynia rheumatica; debilitas localis; ulcera atonica, gangrænosa; erythema ex punctura insectorum; distorsio; ecchymoma. — Item in incipiente panaritio linteo eo madido involvendo digitum.

ALCOHOL COCHLEARIÆ SIMPLEX.
——— ——— COMPOSITUM.

Usus : Gingivarum laxitas et ulcera scorbutica.

ALCOHOL MELISSÆ COMPOSITUM.
—— AROMATISATUM COLONIENSIUM.
———— ROSMARINI.
———— SERPYLLI.

Usus: Ambustura levior; partium debilitas; tumores frigidi; paralysis linguæ et faucium; angina ulcerosa, atonica; maculæ et pustulæ faciei; ecchymoma; distorsio; subluxatio.

ALCOHOL ALCALISATUM.

Syn. *Tinctura Tartari.*

℞. Carbonatis potassæ libram unam.

In crucibulo igne forti funde; dein ab igne remoto et adhuc calido probe contrito affunde

Alcoholis concentrati libras duas.

Digere per quadriduum vase probe clauso, sæpius agitata phiala; dein cola.

Usus idem ac sequentis.

ALCOHOL AMMONIACATUM.
———— AMMONIACATUM aromatisatum.

Syn. *Spiritus salis ammoniaci dulcis et aromaticus.*

Usus *utriusque*: Tumores frigidi; tumores

scrophulosorum et rhachiticorum; tumores lactei. — Linteo aut panno iisdem madido partem involvendo.

---

## ÆTHER ET ÆTHEREA.

### ÆTHER SULFURICUS.

Usus : Cephalalgia, aliive dolores rheumatici et nervosi sæpe subito levantur adplicando parti affectæ linteum eo madidum, moxque palma manus superposita illud arcte premendo per aliquot minuta ita ut aëris accessus arceatur (Ward). — Guttula una alterave gossypio excepta et mox denti carioso, vel auris meatui imposita odontalgiam et otalgiam atrocissimam sæpe levat. — Ambusturam mox initio adplicando curat.

### ÆTHER ALCOHOLISATUS.

Syn. *Liquor anodynus mineralis* Hoffmanni.

Usus idem fere ac ætheris. — *Aqua diluti cum melle :* Vulnera.

## TINCTURÆ.

### TINCTURA ARNICÆ.

℞. Radicis Arnicæ montanæ uncias duas.
Alcoholis diluti libram unam.
Digere per octiduum, sæpius agitato vase; dein cola.

Usus *internus;* Dysenteria. - *Forma lotionis, fotus, gargarismatis:* Ulcera putrida, gangrænosa; ulcera faucium putrida (angina gangrænosa cum scarlatina).

### TINCTURA ASSÆ FŒTIDÆ.

Usus : Ulcera putrida, atonica; caries.

### TINCTURA BALSAMICA.

℞. Balsami Myroxyli Peruiferi unciam unam.
Alcoholis libram unam. Misce.
Digere per triduum et cola.

Usus : Ad vulnera et ulcera laxa exsiccanda et consolidanda.

### TINCTURA BENZOES COMPOSITA.

Usus idem fere ac præcedentis : Ulcera

atonica. — Item ad vulnera ab accessu aëris defendenda.

TINCTURA CATECHU.

Usus : Gingivarum laxitas; ulcera scorbutica ; hæmorrhagia.

TINCTURA CINCHONÆ.

Usus : Gangræna; vulnera aut ulcera putrida.

TINCTURA COSMETICA.

℞. Balsami concreti Styracis-Benzoin uncias sex.

——— ——— Styracis officinalis unciam unam.

Pulverisatis affunde

Alcoholis libram unam.

Digere vase clauso per quatuordecim dies; dein cola.

Usus *præcipuus* pro lotione cosmetica.

TINCTURA EUPHORBIÆ.

Virtus : Corrosiva.

Usus *cautus* : Ad limites cariei ponendos; ulcera sordida, atonica.

TINCTURA GINGIVALIS.

℞. Gummi-resinæ Myrrhæ,

——— ——— Mimosæ cathechu pulv. ana unciam unam.

Balsami Myroxyli Peruiferi drachmam unam.

Simul tritis affunde

Alcoholis,

——— Cochleariæ officinalis, ana uncias tres.

Digere per octiduum, sæpius agitato vase; dein cola.

Usus : Laxitas et ulcera gingivarum vel faucium scorbutica.

TINCTURÆ LITTÆ VESICATORIÆ.

Syn. *Tinctura Cantharidum.*

Usus *internus et externus* : Arthrodynia, aut myodynia rheumatica; debilitas partium; paralysis; enuresis juniorum habitualis; enuresis ex debilitate sphincteris vesicæ; hydarthrus.—*Forma injectionis* Drachmæ tres—quatuor ad libram unam aquæ : Sinus et fistulæ ita ut suppuratio callositatis excitetur.

TINCTURA MURIATIS FERRI.

℞. Oxydi ferri rubri libram unam.
Acidi muriatici concentrati quantum satis.

Ut fiat solutio saturata, sæpius agitato vase, ita ut pars ferri in fundo maneat; dein cola et adde

Alcoholis pondus triplum.

Usus *forma fotus* : Scirrhus mammæ; carcinoma.—Item ad verrucas aliasve excrescentias.—*Internus* : Dosi guttarum decem sæpius repetendo : Dysuria ex coarctatione urethræ spasmodica. Cline.

TINCTURA MYRRHÆ.

Usus : Ulcera atonica, putrida; caries.

TINCTURA ODONTALGIA, Ph. Dan.

℞. Rasuræ ligni Guajaci officinalis,
Corticis Laurus-Sassafras pulv. ana unciam unam.
Radicis Anthemis-Pyrethri drachmas sex.
Foliorum Nicotiana-Tabaci drachmas tre.

Herbæ Thymus-Serpylli,
——— Origani vulgaris, ana drachmas duas.
Camphoræ drachmam semis.
Opii scrupulum unum.
Concisis et contusis affunde
Alcoholis libras duas.

Digere per octiduum, sæpius agitato vase; dein cola.

Usus: Odontalgia cariosa aut rheumatica. (Gossypio exceptam denti carioso imponendo; vel leniter calefactam simpliciter instar collutorii adhibendo) — Paralysis linguæ.

TINCTURA SEDATIVA.

℞. Opii unciam unam.
Alcoholis diluti libram unam.

Digere per octiduum, sæpius agitato vase; dein cola.

Usus: Ulcera syphilitica rebellia; herpes; serpigo; dolores spasmodici in variis corporis partibus; odontalgia; otalgia; ophthalmia.

TINCTURA TURIONUM PINUS-ABIETIS.

℞. Extracti Turionum Pinus-Abietis uncias duas.
Alcoholis Cochleariæ officinalis uncias decem.
Misce ut fiat solutio.

Usus: Scorbutus; hæmorrhœa gingivarum, aliave vitia oris scorbutica.

TINCTURA VULNERARIA COMPOSITA.

℞. Tincturæ Cinchonæ officinalis,
——— Myrrhæ, ana unciam unam.
Misce.
Interdum cum successu additur,
Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis uncia semis.
Digere leni calore.

Usus: Vulnera tendinum aut nervorum; vulnera aut ulcera sordida, cariosa.

TINCTURA VULNERARIA SIMPLEX.

Syn. *Tinctura Mastiches.*

℞. Resinæ Pistacia-Lentisci (vulgo *Mastiche* dicti) unciam unam.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere leni calore per triduum, sæpius agitato vase; dein cola.

Usus : Vulnera membranarum, tendinum aut ligamentorum, sedata inflammatione; denudatio et vulnera ossium.

---

## ACETA.

### ACETUM AROMATICUM.

Usus *præcipuus* : Pro odoratu aut lotione ad effluvia aëris putrida et contagiosa corrigenda; syncope.

### ACETUM CAMPHORATUM.

℞. Camphoræ unciam unam.
Alcoholis quantum satis.
Ut fiat solutio, cui adde terendo,
Aceti vini uncias decem.

Usus : Emphysema putridum; gangræna; ulcera faucium putrida, atonica.

### ACETUM COCHLEARIA-ARMORACIÆ.

℞. Radicis Cochlearia-Armoraciæ recentis rasæ unciam unam.

Aceti vini libram unam.
Macera per octiduum ; dein cola.

Usus præcipue *cosmeticus* ad lentigines faciei ; Ulcera oris scorbutica.

ACETUM VINI vel CEREVISIÆ.

Est acidum aceticum dilutum vulgo venale prostans.

Usus *forma lotionis* : Totius corporis ad pestem arcendam. — Item *pro odoratu, lotione, fotu, etc.* : Ad effluvia putrida et contagiosa corrigenda ; ulcera putrida ; contusura ; distorsio, cephalalgia ; syncope.

ACETUM SCILLITICUM.

Usus *forma gargarismatis* : Tonsillitis aut cophosis pituitosa.

---

## LIQUORES.

LIQUOR ALEXITERIUS ACETATUS (Guyton-Morveau).

℞. Sulfatis potassæ drachmam unam.
Acidi acetici unciam semis.
Immitte in phialam unciæ unius capacem.

LIQUOR ALEXITERIUS OXYGENATUS s. *Acidum muriaticum oxygenatum extemporaneum* ( GUYTON-MORVEAU ).

℞. Oxydi manganesii nigri pulv. drachmam unam.

Immitte in phialam vitream quæ contineat circiter uncias duas, eique affunde Acidi nitro-muriatici (vulgo *Aqua regia* dicti) quantum opus.

Ut phiala ad duas tertias circiter repleatur.

Agita liquorem singula vice, quando opus habes.

LIQUOR ALEXITERIUS OXYGENATUS (CHENEVIX).

℞. Muriatis calcis oxygenati quantum placet.

USUS horum trium liquorum egregius est pro odoratu ad corrigenda effluvia putrida et contagiosa.

Vide etiam infra *Solutiones Alexiterias varias.*

LIQUOR AD APHTHAS.

℞. Boracis pulv. drachmas duas.

Tincturæ Myrrhæ,
Aquæ destillatæ, ana unciam unam.
Mellis rosacei uncias duas. Misce.

Usus : Portio hujus mediante penicillo aut linteo adplicetur aphthæ fricando ter quaterve de die.

LIQUOR AURICULARIS.

℞. Bilis Taurinæ drachmas tres.
Balsami Myroxyli Peruiferi drachmam unam.
Misce.

Usus : Fluxus materiæ fœtidæ ex meatu auditorio. — Instillando guttam unam alteramve bis die (Hugh Smith).

LIQUOR AD CONDYLOMATA (Plenck).

℞. Acidi acetici,
Alcoholis, ana unciam semis.
Muriatis hydrargyri oxygenati drachmam unam.
Aluminis,
Camphoræ, ana drachmam semis.
Misce.

*Vel pro re nata melius :*

℞. Muriatis hydrargyri,
Aluminis, ana uncias duas.
Camphoræ drachmas duas.
Acidi acetici,
Alcoholis, ana libras duas. Misce.

Usus : Condylomata, verrucæ, et rhagades. Penicillo hoc liquore madido semel vel bis die leniter adfricando.

LIQUOR AD DYSECŒAM primus.

℞. Olei Terebinthinæ guttas quadraginta,
Olei Amygdalarum unciam semis.
Misce.

Usus : Dysecœa ex secretione ceruminis impedita. — Instillando quotidie guttulas aliquot meatui auditorio, prævie probe mundato.

LIQUOR AD DYSECŒAM secundus.

℞. Muriatis sodæ drachmam unam.
Aquæ destillatæ quantum satis.
Ut fiat solutio saturata.

Usus : Dysecœa ex cerumine indurato. —

Portio hujus liquoris meatui auditorio instilletur, ibique per aliquot minuta retineatur, perfricando leniter aurem externam; dein auris aqua tepida eluatur; idque bis die repetitur.

### LIQUOR AD ODONTALGIAM.

℞. Resinæ Pistacia-Lentisci quantum placet.
Olei Terebinthinæ quantum satis.
Ut fiat solutio.

Usus : Portio gossypio excepta denti dolenti imponitur.

### LIQUOR AD PERNIONES.

℞. Acetatis plumbi liquidi partem unam.
Alcoholis Rosmarini officinalis partes quatuor. Misce.

Usus : Linteum hoc liquore madidum applicetur parti affectæ omni nocte.

### LIQUOR AD ULCERA ORIS.

℞. Oxymellis cuprati unciam semis.
Tincturæ Myrrhæ unciam unam.

*Vel :*

℞. Sulfatis cupri grana duo.
Aquæ destillatæ uncias quatuor. Misce.

*Vel :*

℞. Nitratis argenti fusi granum unum—duo.
Aquæ destillatæ uncias sex. Misce.

Usus : Portio penicillo applicetur semel vel bis die, cavendo ne pars deglutiatur.

---

## SOLUTIONES.

SOLUTIO AD VAPORISATIONEM ALEXITERIA (GUYTON-MORVEAU).

℞. Muriatis sodæ pulv. libras sex.
Immitte in vas vitreum vel terreum amplum, et adde
Acidi sulfurici concentrati libras duas.
Pone super cineres calidos ut fiat evaporatio.

*Vel melius :*

℞. Muriatis sodæ pulv. libras quinque.
Immitte in vas terreum aut crucibulum Hessiacum amplum et affunde gradatim
Acidi sulfurici concentrati libras quatuor.
Portando vas de loco uno in alterum

cubilis cujus effluvia contagiosa corrigere velis.

SOLUTIO AD VAPORISATIONEM ALEXITERIA (CARM. SMYTH).

℞. Acidi sulfurici,
Nitratis potassæ pulv. ana partes æquales.
Sal gradatim additur acido in vase aperto.

SOLUTIO ALEXITERIA OXYGENATA (GUYTON-MORVEAU).

℞. Oxydi manganesii nigri pulv. drachmas sex (decagrammata duo).
Muriatis sodæ pulv. uncias quatuor (decagrammata decem).
Misce terendo; dein immitte in vas vitreum vel terreum durum, et adde
Aquæ unciam unam semis (decagrammata quatuor),
Dein affunde gradatim,
Acidi sulfurici uncias duas (decagrammata sex).

USUS: Vapor ex hac miscella enatus egregie corrigit aërem et destruit effluvia contagiosa nosocomiorum, carcerum, etc.

*NB.* Proportio ingredientium mox dicta sufficit ad lustrandum cubile quod lectos ægrorum decem continet. — Hæc vaporisatio pro re nata bis terve de die repetenda est.

### SOLUTIO ARSENICATA.

℞. Oxydi arsenici albi subtilissime pulv.,
Carbonatis potassæ, ana grana sedecim.
Aquæ destillatæ uncias quatuor.
Mixta digere balneo arenæ ut fiat solutio.

Usus : Ulcera carcinomatosa. — Miscendo drachmam unam cum aquæ libra una et micæ panis quantum satis.

### SOLUTIO CUPRI AMMONIACALIS.

℞. Oxydi cupri viridis grana viginti quatuor.
Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam unam.
Misce, ut fiat solutio, cui adde
Aquæ destillatæ uncias septem.

Usus *pro injectione, lotione vel linimento cupratis.*

## SOLUTIO CUPRI CAMPHORATA.

SYN. *Aqua camphorata Bateana.*

℞. Sulfatis cupri unciam semis.
Camphoræ drachmas duas.
Aquæ fervidæ libras quatuor.
Misce et refrigerata cola.

USUS *aqua dilutæ pro lotione, injectione aut collyrio.*

## SOLUTIO MURIATIS CUPRI AMMONIACALIS.

SYN. *Aqua saphirina; aqua cœlestis; aqua ophthalmica cœrulea.*

℞. Oxydi cupri viridis grana quinque.
Muriatis ammoniacæ drachmam unam.
Aquæ calcis libram unam.
Misce et facta præcipitatione cola.

USUS: Ulcera rebellia; ophthalmia glandularum palpebræ; maculæ corneæ.

## SOLUTIO MURIATIS HYDRARGYRI OXYGENATI.

SYN. *Liquor Swietenii.*

℞. Muriatis hydrargyri oxygenati grana duodecim.

Alcoholis diluti libras duas.
Misce, ut fiat solutio.

Usus : Syphilis. — Uncia semis continet quartam grani partem.

*NB.* Ut plurimum cito symptomata morbi fugat, sed ad morbum radicaliter curandum non raro fallit et in irritabili corporis habitu sæpe multum nocet.

SOLUTIO MURIATIS POTASSÆ OXYGENATI.

℞. Muriatis potassæ oxygenati drachmam unam.
Aquæ destillatæ uncias duodecim. Misce.

Usus : Ulcera atonica, herpetica. — Portio penicillo aut linteo carpto excepta applicetur semel vel bis die.

SOLUTIO NITRATIS ARGENTI.

℞. Nitratis argenti fusi scrupulum unum.
Aquæ destillatæ unciam semis.

Usus *eximius* : Ulcera lardacea aliave rebellia.—Linteo hac solutione madido marginem ulceris tangendo. — *Aquæ libris tribus dilutæ* : Ulcera oris; Blennorrhœa.

## SOLUTIO SEDATIVA.

℞. Extracti opii drachmas duas—quatuor.
Aquæ fervidæ libram unam.
Misce terendo.

Usus: Ulcera aliave cutis vitia pruriginosa, irritabilia, syphilitica rebellia. — Applicando linteum carptum hac solutione madidum ter quaterve de die.

## SOLUTIO STYPTICA.

Syn. *Aqua styptica; aqua cupri vitriolati composita* Ph. E.

℞. Sulfatis cupri,
Aluminis, ana uncias tres.
Aquæ destillatæ fervidæ libras duas.
Misce, ut fiat solutio; dein cola et adde
Acidi sulfurici unciam unam semis.

Usus: Hæmorrhagiæ; hæmorrhœæ; blennorrhœæ.

## SOLUTIO ZINCI ALUMINOSA.

Syn. *Aqua aluminosa Bateana.*

℞. Sulfatis zinci,
Aluminis, ana unciam semis.

Aquæ fervidæ libras duas.
Misce, ut fiat solutio; dein cola.

Usus *varia forma*: Vulnera aut ulcera immunda; vitia cutis; ophthalmia; blennorrhœæ.

---

## AQUÆ.

### AQUA CALCIS.

Usus *egregius*: Ad exsiccanda ulcera, præsertim scorbutica regionum septentrionalium.—*Forma injectionis*: Ad fistulas.—*Prophylacticus forma lotionis vel injectionis*: Infectio syphilitica, herpetica.

### AQUA CALCIS CINCHONATA.

Est infusum corticis cinchonæ officinalis unciæ unius in libra una aquæ calcis.

Usus *internus et externus*: Ulcera crurum; vitia scrophulosa; aphthæ aliive morbi ex acido ventriculi.

### AQUA CAMPHORATA.

℞. Camphoræ drachmam unam.
Alcoholis quantum opus.

Ut fiat solutio, cui affunde,
Aquæ fervidæ libras duas.
Probe simul agita; dein refrigerata cola.

Usus pro injectionibus.

AQUA MARINA.

AQUA MARINA ARTEFACTA.

Usus frigidæ aut calidæ *forma balnei, fotus, lotionis:* Morbi cutis; tumores et ulcera scrophulosa; debilitas musculorum, ligamentorum.

AQUA ROSÆ.

Usus pro collyriis et lotionibus variis.

AQUA SALVIÆ.

Usus pro collutoriis.

---

## DECOCTA ET INFUSA.

### DECOCTUM ADSTRINGENS.

Usus *forma enematis vel lotionis:* Diarrhœa rebellis; prolapsus. — *Forma injectionis:* Blennorrhœæ.

DECOCTUM FLORUM ARNICÆ.

Usus *internus* : Ischuria paralytica; ecchymoma aliave incommoda ex lapsu aut contusura.

DECOCTUM CORTICIS CINCHONÆ.

INFUSUM CORTICIS CINCHONÆ.

Usus *internus et externus* : Suppuratio ulcerum aut vulnerum profusa; atonia generalis aut localis; ulcera putrida, gangræenosa.

DECOCTUM DRUPÆ IMMATURÆ JUGLANDIS REGIÆ.

Usus *internus et externus* : Vitia cutis varia.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ.

——— SARSAPARILLÆ COMPOSITUM.

Usus : Vitia syphilitica varia.

DECOCTUM FOLIORUM NICOTIANA-TABACI.

℞. Foliorum Nicotiana-Tabaci siccatorum drachmas duas—quatuor.

Aquæ fervidæ libram unam.

Bulliant per aliquot minuta; dein digere calide per horam et cola.

Usus *forma enematis* : Ileus; obstipatio rebellis; ascarides recti.

*NB.* Forma lotionis in tinea laudatur a Justamond, sed in iis casibus ubi illud capiti applicui, nauseam et vomitum molestum causavit et tineam non sustulit.

DECOCTUM VERATRI ALBI.

Usus : Morbi cutis. Vide *Lotiones.*

---

## MUCILAGINES.

MUCILAGO GUMMI ASTRAGALUS-TRAGACANTHÆ, aliarumque Astragali specierum.

MUCILAGO GUMMI MIMOSÆ NILOTICÆ vel SENEGAL.

Vulgo *Gummi Arabicum.*

MUCILAGO Radicis ALTHÆÆ officinalis.

MUCILAGO seminis LINI USITATISSIMI.
——————— — PLANTAGO-PSYLLII.
——————— — PYRUS-CYDONIÆ.

VIRTUS : Involvens ; emolliens.

MUCILAGO CAMPHORATA.

℞. Camphoræ unciam unam.
Mucilaginis cujusvis libram semis.

USUS : Ulcera putrida et gangrænosa ; ulcuscula cutis dolentia ; verruca faciei mali moris , dolens.

---

## GELATINÆ.

GELATINA AMYLI.
——————— ANIMALIS.
——————— ICHTHYOCOLLÆ.

USUS *præcipuus forma enematis:* Dysenteria; irritatio recti, vesicæ partiumque adjacentium a causa quacunque. — Item ad nutriendum corpus in dysphagia.

*NB.* Gelatina animalis nuper ab ARM. SEGUIN ad curandas dialeipyras eximium remedium inventum fuit. *Vide* pag. 459.

## SUCCI.

SUCCUS Foliorum RUMEX-ACETOSÆ.
——————OXALIS-ACETOSELLÆ.

Usus *forma cataplasmatis* : Ulcera scrophulosa.

SUCCUS FRUCTUS CITRI MEDICÆ.

Usus : Vitia scorbutica.

SUCCUS Herbæ COCHLEARIÆ officinalis.
——————SISYMBRIUM-NASTURTII.

Usus : Vitia scorbutica.

## EXTRACTA.

EXTRACTUM ACONITUM-NAPELLI.

Usus *internus* : Arthrodynia rheumatica vel podagrica.

EXTRACTUM BILIS TAURINÆ.

Usus *aqua diluti* : Maculæ corneæ; pterygium.

## EXTRACTUM CONII MACULATI.

Usus *aqua soluti:* Ulcera carcinomatosa. — *Internus:* Scirrhus prostatæ, mammæ etc.

## EXTRACTUM DRUPÆ JUGLANDIS REGIÆ.

℞. Drupæ Juglandis regiæ immaturæ (vulgo *Nuces Juglandis virides* dictæ) versus solsticium æstivum collectæ quantum placet.

In mortario lapideo cum pauxillo aquæ in pulpam contunde; dein succum prelo expressum in balneo aquæ, spatula continue agitando, ad mellis consistentiam evapora.

Usus: Ulcera oris ex hydrargyro; morbi cutis.

## EXTRACTUM HYOSCIAMI NIGRI.
## ——————— OPII.

Usus *utriusque varia forma:* Dolores spasmodici, et morbi externi varii cum irritabilitate morbosa juncti.

## EXTRACTUM TURIONUM PINI.

Usus: Ulcera, aliave vitia scorbutica.

## PULVERES.

### PULVIS ANTISEPTICUS COMPOSITUS.

℞. Pulv. Radicis Arnicæ montanæ,
—— Corticis Cinchonæ officinalis,
Camphoræ alcohole irroratæ et contritæ,
ana partes æquales.
Simul pulverisata misce.

Usus: Ulcera putrida, gangrænosa rebellia.

### PULVIS ARNICÆ.

℞. Radicis Arnicæ montanæ sero automno vel hyeme collectæ, dein siccatæ et pulv. quantum placet.

Virtus eximia antiseptica.

Usus: Ulcera putrida, gangrænosa aliave rebellia.

### PULVIS ARSENICALIS (Justamond.)

℞. Sulfureti stibii nigri unciam unam.
Oxydi arsenici albi unciam semis.

Mixta igni expone in crucibulo ut fluat massa; dein refrigerata teratur in pulverem. Quandoque cum successu additur:

Extracti opii drachma una—tres.

Usus *inspergendo* : Carcinoma ; excrescentiæ ; ulcera fungosa, rebellia.

PULVIS BELLADONÆ.

℞. Foliorum Atropa-Belladonæ in umbra siccatorum et pulv. quantum placet.

Usus *inspergendo* : Carcinoma.

PULVIS CARBONUM.

Virtus eximia antiseptica.

Usus : Halitus oris fœtidus ; ulcera oris, faucium, aliarumve partium fœtida, putrida, gangrænosa et carcinomatosa.

PULVIS ad CARCINOMA (Cosme v. Bernard)

℞. Sulfureti hydrargyri rubri drachmas duas.

Cinerum e soleis calceorum antiquis combustis grana octo.

Resinæ Dracæna-Draconis grana duodecim.

Oxydi arsenici albi scrupulos duos.

Misce fiat pulvis tenuissimus, cujus portio pauxillo aquæ mixta penicillo parti ulceratæ applicetur, quæ dein tegatur linteo carpto.

Usus : Ulcus carcinomatosum, præcipue nasi vel faciei. — Eschara post triduum aut quadriduum decidens ut plurimum ulcus bonum relinquit.

PULVIS AD CARCINOMA (PLUNCQUET).

℞. Ranunculus-flammulæ unciam unam.
Anthemis-Cotulæ unciam semis.
Sulphuris purificati drachmam unam.
Oxydi arsenici albi drachmas duas.

Misce ut fiat pulvis subtilissimus, cujus portio albumine ovi trita parti affectæ applicetur, post 48 horas auferendo escharam.

PULVIS CINCHONÆ.

℞. Pulv. Corticis Cinchonæ officinalis quantum placet.

Usus : Ulcera putrida, gangrænosa, aliave rebellia.

PULVIS RADICIS COLUMBO.

Usus *leviter inspergendo* : Ulcera rebellia (HOME).

PULVIS CORALLIORUM RUBRORUM.

Usus dentifricius.

### PULVIS E CUPRO.

℞. Oxydi cupri viridis pulv. quantum placet.

### PULVIS E CUPRO COMPOSITUS.

℞. Oxydi cupri viridis,
Muriatis hydrargyri, ana drachmam unam. Misce.

Usus : Ulcera genitalium, aliarumve partium rebellia.

### PULVIS DENTIFRICIUS.

℞. Pulv. corticis Cinchonæ officinalis drachmas duas.
— Coralliorum rubrorum drachmam unam.
Gummi-resinæ Myrrhæ,
Tartritis potassæ aciduli, ana drachmam semis. Misce.

### PULVIS ERRHINUS.

℞. Foliorum Asari Europæi,
——— Origanum-Majoranæ,
——— Teucrium-Mari,
Florum Lavandula-Spicæ, ana partes æquales.
Pulverisita misce.

Usus : Otalgia; dysecœa; dolor faciei; cephalœa rheumatica vel nervosa; secretio muci narium impedita; morbi quidam oculorum.

*Vel :*

℞. Sulfatis hydrargyri lutei cum excessu oxydi granum unum.

Radicis Glycyrrhizæ glabræ pulv. grana octo. Misce.

Usus: Amaurosis. Quarta pars hujus pulveris attrahatur naribus semel vel bis de die. (Ware).

PULVIS ESCHAROTICUS.

℞. Aluminis fusi unciam unam.

Oxydi hydrargyri rubri unciam semis. Misce.

Usus : Caro luxurians aut fungosa ulcerum vel vulnerum.

PULVIS AD EXCRESSENTIAS.

℞. Foliorum Juniperus-Sabinæ,

Oxydi cupri viridis (vel oxydi ferri rubri) ana partes æquales.

Misce probe terendo.

### PULVIS AD ALBUGINEM.

℞. Vitri subtilissime pulv. quantum placet.
*Vel :*
℞. Muriatis hydrargyri præcipitatione parati quantum placet.

USUS : Portio infletur oculo semel aut bis die.

### PULVIS E PLUMBO.

SYN. *Trohisci Rhazis ; pulvis è Cerussa compositus.*

℞. Oxydi plumbi albi acido acetico parati drachmas quinque.
Gummi Mimosæ Niloticæ (vel Tragacanthæ) drachmas tres. Misce terendo.

USUS *pro lotione, injectione, collyrio :* Vitia cutis; pruritus; inflammationes locales.

### PULVIS E PLUMBO COMPOSITUS.

℞. Oxydi plumbi albi unciam unam.
Corticis Quercus-Roboris libram unam.
Subtilissime separatim pulverisata.
Misce.

USUS *inspergendo* ad ulcera scrophulosa.

### PULVIS AD PROLAPSUM.

℞. Florum Punica-granati pulv.,

Aluminæ pauxillo oxydi ferri rubri mixtæ ( vulgo *Boli Armenæ* ), ana partes æquales.

Usus *inspergendo* parti prolapsæ, antequam reponatur.

### PULVIS QUASSIÆ.

℞. Ligni Quassiæ amaræ pulv. quantum placet.

Usus *leviter inspergendo* : Ulcera rebellia.

### PULVIS RHEI.

℞. Radicis Rhei palmati pulv. quantum placet.

Usus *leviter inspergendo* : Ulcera rebellia (Home). — *NB.* Si simul valde irritabilia sunt, additur octava pars opii.

### PULVIS SACCHARI.

Usus *inspergendo* : Ulcera.

### PULVIS STIBIATUS.

℞. Phosphatis calcis stibiati grana sex—octo.

*Vel* :

℞. Phosphatis calcis grana triginta duo.
Tartritis potassæ stibiati granum unum.
Misce. Divide in doses quatuor.

Usus *internus*: Dysuria urethralis chronica ex transpiratione impedita aut suppressa, sumendo pulverem unum omni nocte.

### PULVIS STYPTICUS.

℞. Aluminis,
Gummi-resinæ Kino, ana partes æquales.

### PULVIS E SULPHURE.

Usus *internus vel externus forma frictionum per se; vel cum saliva aut axungia mixti*: Psora; vitia oris ex hydrargyro; dolores artuum ex hydrargyro.

### PULVIS AD ULCERA CRURUM.

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ drachmam unam.
Nitratis potassæ drachmas tres. Misce.

Usus *internus*: Tumores crurum et ulcera inflammata præcipue lotricum. — Dosi drachmæ semis bis die.

### PULVIS AD ULCERA TENDINUM.

℞. Resinæ Pistacia-Lentisci,

Gummi-Resinæ Myrrhæ, ana partes æquales.

Usus *inspergendo* : Ossa cariosa, et tendines aut ligamenta denudata et ulcerata.

HERBÆ AROMATICÆ.

℞. Florum Lavandula-Spicæ,
——— Arnicæ montanæ,
Herbæ Origanum-Majoranæ,
——— Thymus-Serpylli,
——— Rosmarini officinalis, ana unciam unam.

Grossiuscule concisa misce et usui serva.

Usus pro embrocatione, fotu aut cataplasmate discutiente.

HERBÆ EMOLLIENTES.

℞. Herbæ Malvæ rotundifoliæ,
Foliorum Verbascum-Thapsi,
Radicis Symphyti officinalis,
——— Althææ officinalis, ana partes æquales.

Concisa misce et usui serva.

# SPONGIÆ, ALIARUMVE SUBSTANTIARUM PRÆPARATIO.

## SPONGIA PRÆPARATA.

Hæc substantia est Nidus mollis elasticus Zoophyti, STIRPS OFFICINALIS dicti.

SPONGIA exsiccata et ab heterogeneis adhærentibus probe purgata eximii usus est per se ad lavanda vulnera post operationes chirurgicas et ad mundanda ulcera; nec non ad ulcera aut abscessus profuse suppurantes, illam superponendo linteo carpto.—Ad hæmorrhagias sistendas applicando frequenter spongiam aqua frigida vel aceto madidam.—Ad prolapsum uteri forma pessarii.—In paralysi sphincteris ani vel vesicæ ad urinam excipiendam vel effluxum fæcum impediendam. Servit etiam ad fotus frigidos vel calidos applicandos, ad collyria oculo applicanda etc.

Humectata dein filo arcte circumdata et sic *per se* siccata; aut ceræ flavæ calidæ

liquefactæ immersa, dein fortiter expressa et sub prelo frigefacta, postea in portiones variæ magnitudinis et formæ concisa egregii usus est pro *Turundis*, quæ vulnerum, ulcerum aut fistularum orificiis angustis immissæ eadem intumescendo dilatant, et sic puri exitum liberum creant.

## BOLETUS LARICINUS.

## ——— IGNIARIUS.

Hi Boleti a cortice externo albo et duro, nec non a substancia fistulosa probe separentur; dein discissi ictibus mallei repetitis contundantur, donec adeo mollescant, ut in portiones minores discindi possint.

Usus : Hæmorrhagiæ ex arteria aut vena majori vulnerata.

## LYCOPERDON BOVISTA.

Parenchyma molle spongiosum ac pulverulentum quod sub cute externa est, separetur et usui servetur.

Usus *inspergendo*: Hæmorrhagia; hæmorrhois; ulcera; intertrigo.

---

## MOXA.

In oriente paratur ex foliis Artemisiæ vulgaris probe in umbra siccatis, quæ dein contusa manibus tamdiu perfricantur, donec species lanæ formetur, quæ addito pauxillo moschi, aut alius substanciæ odoriferæ in conos efformatur. In Europa hodie ut plurimum ex gossypio conficitur, quod solutioni nitratis potassæ saturatæ immersum, dein exsiccatum in cylindros quatuor pollicum longos et unius pollicis diametri formatur. Cylinder talis in tubum ex charta crassiori confectum immittitur, et parti affectæ applicatus accenditur, et durante combustione sic facile digitis applicata tenetur. Postquam gossypium ad ultimam portionem usque consumptum fuerit, pars usta unguento digestivo tegitur.

Usus in omnibus morbis ubi ferrum candens seu cauterisatio utilis inventa fuit, præ-

cipue in doloribus fixis chronicis violentis rheumaticis aliisve variarum corporis partium.—Nuper etiam cum successu in aphonia nervo recurrenti in collo moxam applicavit Dubois.

FINIS PRIMÆ SECTIONIS.