(§. 6. Fig. 1.)

MESEMBRYANTHEMUM SCAPIGER *Haw.*

MESEMBRYANTHEMUM *scapiger;* acaule, foliis distinctis decussatis elongatis erecto-patentibus carinato-triquetris glaucescenti-viridibus laeviusculis parvipunctatis, angulis integris carinali superne valde compresso producto, scapo ancipiti.

M. *scapiger;* subacaule, foliis carinato-triquetris viridibus margine punctisque asperiusculis, scapo valido ancipiti bracteato subpaniculato. *DC. Prod. 3. p. 423.*

M. *scapiger;* foliis carinato-triquetris viridibus margine punctisque asperiusculis: scapo valido subpaniculato ancipiti. *Haw. in Phil. Mag. Decemb. 1824. p. 423.*

RADIX *centralis crassa fusiformis, laterales ramosi, fibrosi.*

CAULIS *nullus.*

FOLIA *10-12 radicalia, distincta, decussatim-opposita, duo juniora sibi adpressa, seniora erecto-patentia, indurata, subrigida, plerumque stricta, poll. 3-4 longa et lin. 5-7 basi lata, supra plana sensim attenuata, subtus carinata lateribus a basi ad medium convexiusculis, et a medio ad apicem valde compressis, glaucescenti-perviridia, opaca, vix rugulosa, punctis minutis creberrimis parum prominulis et ad lucem subpellucidis, ad angulos integra laeviuscula, imo apice cartilaginea, mucronata, inaequalia, uno folio subattenuato recurvulo, altero incurvulo dilatato, angulo carinali producto.*

FLORES *ternati aut quinati, uno alterove saepe abortivo, pedicellati in scapum incidentes, vespere expansi. Scapus poll. 2-3 longus et lin. 3-4 latus, alato-anceps, superne bracteatus, bracteis connatis, maxime compressis, subfoliiformibus, abbreviatis, decurrentibus, e quibus oriuntur pedicelli tres, fere poll. 2 longi, compressi, superne incrassati, intermedio nudo, semper unifloro floreque praecociore, lateralibus quandoque bifloris ad medium bracteis duabus minoribus connatis, carinatis, acutiusculis instructis.*

CALYX *in pedicellum attenuatus, laevis, profunde quinquefidus; laciniis lanceolato-acuminatis, superne carinulatis, expansis, duabus margine submembranaceis.*

PETALA *pluriserialia, lanceolato-acuminata, integerrima, erecto-expansa, laciniis calycinis longiora, intus lutea extus rosea.*

STAMINA *conferta, erecta. Filamenta et Antherae luteae.*

PISTILLUM. *Ovarium obconicum, supra convexiusculum. Styli 5 filiformes erecti, apice recurvuli, staminum longitudine, lutei.*

CAPSULA *5-locularis; maturam non vidi.*

Habitat in Prom. bon. spei. Floret mensibus Julio et Augusto.

Observ. Haec pulcherrima et distinctissima species a *Dom. Bowie* a Promontorio bonae spei in Angliam advecta fuit, anno circiter 1824. A *M. carinanti* et *dolabriformi* valde differre videtur; sed hisce speciebus inflorescentia omnino accedit, et foliorum forma in sectione *Dolabriformium* non characterem praecipuum efficit.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0121-5 DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0122-0
DFG

M. scapiger.

(§. 6. — Fig. 1.)

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0123-6
DFG

62

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0124-2
DFG