(§. 19. Fig. 1.)

MESEMBRYANTHEMUM AEQUILATERALE *Haw.*

MESEMBRYANTHEMUM aequilaterale; caule angulato debili prostrato; foliis connatis confertis glaucescenti-laeteviridibus aequilateri-triquetris elongatis acutis patenti-incurvulis, ad angulos laevissimis; flore pedunculato hexagyno.

M. aequilaterale; caulibus debilibus prostratis, foliis subaequilateraliter triquetris virescentibus, pedunculo angulato superne incrassato, calyce quinquefido, stigmatibus 6 brevibus erectis. *DC. Prod. 3. p. 429.*

M. aequilaterale; foliis subaequilateri-triquetris virescentibus, marginibus laevibus cartilagineis; caulibus debilibus prostratis. *Haw. Rev. p. 120. — Synop. p. 237. — Ait. Kew. ed. 2. vol. 3. p. 239.*

M. aequilaterale; foliis subconnatis acutis glabris arcuatis confertis aequilateri-triquetris, caule angulato repente. *Willd. Spec. pl. 2. p. 1051. — Enum. p. 538.*

M. aequilaterum; foliis confertis subconnatis longis obsolete-punctatis subaequilateri-triquetris integerrimis, caule angulato subradicante prostrato. *Haw. Mesemb. p. 390. No. 128.*

RADIX *lignosa, fibrosa.*

CAULES *prostrati, (nisi suffulti,) pedales, vix crassitie pennae anserinae, flexiles, tortuosi, nodosi, ramosi, juniores ramique herbacei compressi, dein lignosi angulati, cortice ferrugineo.*

FOLIA *subconferta, basi connata, juniora erecta, seniora patentissima, arcuato-incurvula, aequilateri-triquetra, poll. 2-3 longa et vix lin. 3 basi lata, parum attenuata, apice obtusiuscula cum mucronulo saepe rubro, glaucescenti-laeteviridia, maculisque purpureis saepe notata, impunctata, basi intus complanato-gibbosa, ad angulos laevissima.*

FLORES *solitarii, terminales, magni, speciosi, meridie expansi, pedunculati.* ***Pedunculus*** *brevis, obsolete tetragonus, ancipite-compressus, superne dilatatus.*

CALYX *turbinatus, compressus, carnosus, quinquefidus; laciniis duabus elongatis foliiformibus, tribus brevibus acutis, margine membranaceis.*

PETALA *bi vel triserialia, erecto-recurvata, lanceolata, apice erosula, laete purpurea.*

STAMINA *numerosa, pistillum tegentia.* ***Filamenta*** *flavida.* ***Antherae*** *flavae.*

PISTILLUM. ***Ovarium*** *turbinatum, supra depressum.* ***Styli 6*** *breves, subulati, erecti, flavidi.*

CAPSULA 6 *locularis; maturam non vidi.*

Habitat in nova Hollandia. Floret aestate, at rarissime.

Observ. Cl. Jos. Banks anno 1791 hanc speciem e nova Hollandia advexit. Gracillima est in tota sectione, et foliis vix acinaciformibus. In varietate *decagyna* rami et folia paulo sunt robustiora, sed flores non frequentiores; nam longum per tempus in horto Dyckensi jam culta hucusque non floruit, et inde decernere non possum an flores sint decagyni. Capsulas quoque non vidi et in hortis rarissime ad maturitatem perveniunt; pulposae sunt et ruberrimae secundum Cl. Haworth.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0157-5 DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0158-1
DFG

M. aequilaterale.

(S. 19. —— Fig. 1.)

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0159-0
DFG

80

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0160-1
DFG