(§. 19. Fig. 3.)

MESEMBRYANTHEMUM VIRESCENS *Haw.*

MESEMBRYANTHEMUM virescens; caule angulato prostrato, foliis connatis subglaucescenti-viridibus subaequilateri-triquetris elongatis obtusis patenti-incurvulis, ad angulos laevibus, flore pedunculato decagyno.

M. virescens; caulibus decumbenti-prostratis; foliis subaequilateri-triquetris subvirentibus, pedunculis terminalibus solitariis alato-ancipitibus, calyce 4-fido, stigmatibus 8 filiformibus. *DC. Prod. 3. p. 429.*

M. virescens; foliis subaequilateri-triquetris subvirescentibus; caulibus decumbenti-prostratis; pedunculis terminalibus solitariis alato-ancipitibus; stylis octo. *Haw. Synop. p. 236. — Rev. p. 120.*

RADIX *lignosa, ramosa, fibrosa.*

CAULES *prostrati, (nisi suffulti,) bipedales, crassitie pennae anserinae, subrigidi, tortuosi, nodosi, ramosi, juniores ramique herbacei compressi, dein lignosi angulati, cortice cinereo-fusco.*

FOLIA *conferta, basi connata, juniora erecto-, seniora patenti-incurvula, poll. 2 cum lin. 3 longa et lin. 4-5 basi lata, subaequilateri-triquetra, sed propter carinam parum productam fere subacinaciformia, apice subcartilaginea obtusa cum mucronulo, laeteviridia rore glauco laevi obducta, impunctata, quandoque purpureo maculata, basi intus complanato-gibbosa, ad angulos laevia.*

FLORES *solitarii, terminales, magni, speciosi, meridie expansi, pedunculati.* ***Pedunculus*** *brevis, alato-anceps, superne dilatatus.*

CALYX *turbinatus, valde compressus, subundulato-alatus, carnosus, quadri aut quinquefidus; laciniis duabus triquetris carinatis, duabus aut tribus brevioribus acutis, margine membranaceis.*

PETALA *biserialia, erecto-recurvata, lanceolata, apice erosula, laete purpurea.*

STAMINA *numerosa, pistillum tegentia.* ***Filamenta*** *flavida.* ***Antherae*** *flavae.*

PISTILLUM. *Ovarium turbinatum, supra depressum.* ***Styli*** *12-14 breves, subulati, erecti, flavidi.*

CAPSULA *12-14 locularis; maturam non vidi.*

Habitat in nova Hollandia. Floret aestate satis frequenter.

Observ. Hanc speciem communicavit Dom. Kirby Cl. Haworthio anno circiter 1804. Differt praesertim a *M. Rossi* et *aequilaterali* caule foliisque crassioribus et accedit ad maximas species hujus sectionis.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0161-7 DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0162-3
DFG

M. virescens.

(S. 19. — Fig. 3.)

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0163-8
DFG

82

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0164-4
DFG