(§. 47. Fig. 1.)

MESEMBRYANTHEMUM SPINIFORME *Haw.*

MESEMBRYANTHEMUM spiniforme; caule suffruticoso subramoso ramulis erectis substrictis, foliis remotiusculis subconnatis cylindraceo-subulatis incurvato-erectis imo apice vix recurvulis, floribus pedunculatis, pedunculo bracteato; stylis purpureis.

M. spiniforme; caule suffruticoso, ramis erectis, foliis cylindraceis subulatis spiniformibus erectis apicibus subrecurvis, pedunculis carinisque bractearum scabriusculis. *DC. Prod. 3. p. 439.*

M. spiniforme; ramulis foliisque cylindricis subulatis spiniformibus erectis, apicibus subrecurvis pedunculis carinisque bractearum scabriusculis. *Haw. Miscel. nat. p. 87. — Synop. p. 291. — Revis. p. 152. — Ait. Kew. ed. 2. vol. 3. p. 245.*

RADIX *lignosa, ramosa, fibrosa.*

CAULIS *pedalis, lignosus, rigidus, parum ramosus; ramuli substricti, teretes, erecti, laevigati, cortice cinereo-fusco.*

FOLIA *subconnata, subremota, longitudine valde inaequalia, bipollicaria aut semipollicaria, et lin. 1-2 basi lata, fere cylindracea, subulata, acuminata, viridia, laevissima, nitidula, obsolete pellucido-punctata, basi patento-incurvata, erecta, stricta, imo apice vix recurvulo.*

FLORES *terminales, solitarii, parvuli, ante meridiem expansi, pedunculati.* ***Pedunculus*** *pollicem longus, teres, medio bracteis duabus connatis acutis instructus.*

CALYX *parvulus, obconicus, quinquefidus; laciniis subaequalibus, tribus margine membranaceis.*

PETALA *uniserialia, radiatim expansa, obtusiuscula, pallide rubicunda, basi albida.*

STAMINA *collecta, filamentis sterilibus pallide rubicundis circumdata, pistillum tegentia.* ***Filamenta*** *rosea;* ***Antherae*** *flavidae.*

PISTILLUM. *Ovarium obconicum supra planiusculum.* ***Styli*** *5 erecti, subulati, purpurei, filamentis breviores.*

CAPSULA *obconica, 5-locularis; maturam non vidi.*

Habitat in Prom. bon. spei. Floret mensibus Martio et Aprili.

Observ. Cl. Masson hanc speciem anno 1793 in Angliam advexit, quae a congeneribus caule erectiore foliisque longioribus, strictis, remotis, vix apice recurvulis, facile distinguitur. Varietas *subadunca* a cl. Haworth in *Synopsi* et in *Revisionibus M. spiniformi* tributa non constans se praebet, et notatu non digna est.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0201-9
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0202-5
DFG

M. spiniforme

(S. 47. — Fig. 1.)

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0203-0
DFG

102

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0204-6
DFG