(§. 6. Fig. 4.)

ALOE PAPILLOSA *Nob.*

(HAWORTHIA Duval.)

ALOE papillosa; caulescens, foliis erectis ovato-oblongis cuspidatis rigidis, supra planis, utrinque tuberculis remotis turgidis latissimis saepe angulatis et centro depressis. *Nob. Hort. Dyck. p. 319.*

A. papillosa; foliis ovato-lanceolatis erectis undique seriatim depresso-papillosis. *Spreng. Syst. 2. p. 69. (excl. synon. A. erectae Haw.)*

A. papillosa; caule pedali et ultra, foliis dodrantalibus attenuatis erectis, papillis maximis albis saepe centro depressis undique subserialiter ornatis; pedunculo ramoso; bracteis pedicello brevioribus; floribus virescentibus. *Nob. Cat. rais. p. 7. — Schult. Syst. 7. p. 651. — Haw. Suppl. p. 58. (sub Haworthia.)*

APICRA margaritifera maxima; foliis dodrantalibus, papillis magnis. *Willd. Mag. p. 269.*

β. minor; partibus omnibus paulo minor, foliisque supra laevioribus.

HAWORTHIA papillosa β. semipapillosa; foliis supra laevibus sordide viridibus. *Haw. Revis. p. 55.*

RADIX *cylindracea, carnosa, fibrosa.*

CAULIS *in plantis senectis e superpositione foliorum subpedalis, semper simplex, nec dichotome divisus.*

FOLIA *spiraliter suboctofarie disposita, numerosa, conferta, incurvato-erecta, poll. 4-5 longa et sesquipollicem basi lata, sensim attenuata, cuspidata, crassissima, rigida, supra plano-convexa, subtus valde convexa et apice oblique carinulata, glaucescenti-viridia, utrinque tuberculata, tuberculis margaritaceis remotis, in pagina infera maximis, turgidis, angulatis, centro saepe depressis, subfasciatim dispositis, in pagina supera paulo minoribus ac rarioribus, et in var. β. quandoque evanescentibus.*

PEDUNCULUS *floralis bi-vel tripedalis, crassus, nudus, teres, lividus, superne ramosus, ramulis basi bracteis sterilibus instructis.*

FLORES *subspicati, suberecti, pedicellati. Bracteae latiusculae, spurco-purpurascentes basi albido-marginatae, acuminatae, sub anthesi pedicello fere dimidio breviores.*

PERIANTHIUM *ad ½ tubulosum, valde obclavatum, viridulum saturatius striatum, limbo bilabiato subrevoluto; laciniae obtusulae, albidae, medio linea viridi notatae, interioribus (suprema latissima excepta) canaliculatis, undulatis.*

STAMINA *perianthii tubo breviora, alternatim inaequalia. Filamenta subulata, viridula. Antherae luteae.*

PISTILLUM. *Ovarium cylindraceo-trigonum. Stylus filamentis brevior. Stigma obtusum.*

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-14083-p0042-5
DFG

CAPSULA matura orbiculato-trigona, transverse rugosa.

Habitat in Prom. b. spei? Floret aestate.

Observ. Hujus antiquae plantae, jam ante annum 1750 in Horto Bruehlensi cultae, patria non satis constat; nam veteribus botanicis, quamvis forte jam Commelini tempore a Promontorio bonae Spei advecta, incognita remansit. Ab omnibus congeneribus caule altiore recedit, foliisque longe cuspidatis; ad *A. semimargaritiferam* tuberculorum respectu proxime accedit, sed tubercula sunt latiora, rariora, et ad carinam semper distincta. Nunquam caulis dichotomus evadit aut soboles profert; quare in hortis hucusque rarissime occurrit.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-14083-p0043-0
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-14083-p0044-6
DFG

A. papillosa.

(S. 6. — Fig. 4.)

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-14083-p0045-2
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-14083-p0046-7

137

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-14083-p0047-3
DFG