(§. 34. Fig. 1.)

MESEMBRYANTHEMUM PULCHELLUM *Haw.*

MESEMBRYANTHEMUM pulchellum; caule ramisque gracilibus decumbentibus tortuosis, foliis parvulis subconnatis triquetris aristato-mucronatis grosse punctatis glaucis, angulo carinali convexiusculo apice ciliolato.

M. pulchellum; caulibus decumbentibus, foliis acute aequilateri-triquetris subcymbiformibus canis obsolete punctatis ad angulos et praecipue carinam ciliato-pubescentibus, mucronulo recurvo. *DC. Prodr. 3. p. 434.*

M. pulchellum; foliis triquetris connatis pellucido-punctatis mucronatis, carina sub apice ciliata, caule ancipiti decumbente, floribus lilacinis. *Spreng. Syst. 2. p. 522.*

M. canescens; foliis acute aequilateri-triquetris subcymbiformibus canis obsolete punctatis ciliato-pubescentibus, mucronulo recurvo: caulibus decumbentibus. *Haw. Revis. p. 135.*

M. pulchellum; foliis triquetris connatis pellucido-punctatis mucronatis, carina sub apice ciliata caule ancipiti decumbente. *Willd. Enum. H. Berol. p. 537.*

M. pulchellum; foliis connatis valde confertis glaucis acute triquetris cuspidatis, marginibus ciliato-pubescentibus, caulibus procumbentibus. *Haw. Synop. p. 298. — Miscel. nat. p. 72. — Ait. Kew. ed. 2. Vol. 3. p. 237.*

RADIX *sublignosa, ramosa, fibrosa.*

CAULIS *decumbens nisi suffultus, pedalis, valde ramosus ramique sublignosi, lenti, teretiusculi, tortuosi, retroflexi, graciles vix crassitie pennae columbinae, nodulosi internodiis brevissimis, cortice cinereo foliorumque rudimentis canescentibus onusti.*

FOLIA *in apice ramorum valde conferta, vix connata, erecto-patula, aristato-mucronata, lin. 4-5 longa et sesquilineam basi lata, triquetra, lateribus convexiusculis, angulo carinali producto superne subcartilagineo tenuissime ciliato, glaucescentia, grosse ac pellucide punctata, marcescentia et post desiccationem persistentia.*

FLORES *in ramulis floriferis terminales, solitarii, meridie expansi, pedunculati. Pedunculi breves, superne dilatati.*

CALYX *turbinatus, quinquefidus, laciniis subaequalibus, duabus carnosulis acutis, tribus margine membranaceis sub apice mucronatis.*

PETALA *subuniserialia, radiatim expansa, lanceolata, acuta, pallide rosea apice saturatiora, laciniis calycinis duplo longiora.*

STAMINA *collecta, filamentis sterilibus albidis apice rubicundis circumdata. Filamenta albida. Antherae flavidae.*

PISTILLUM. *Ovarium turbinatum supra convexiusculum. Styli 5 erecti filiformes, viridiusculi, staminibus paulo longiores.*

CAPSULA *obconica, quinquelocularis; maturam non vidi.*

Habitat in Prom. bon. spei. Floret mense Aprili et Majo; at rarins.

Observ. Dom. Fr. Masson hanc speciem anno 1793 in Angliam introduxit, et eam descripsit cl. Haworth primo sub nomime *M. pulchelli.* Recenter alium, nempe *canescentis* nomen proposuit; sed prioritatis causa, et quia generaliter admissum primum servare oportet. Varietas *β. revoluta*, paulo solum a specie differt.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-14083-p0169-4

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-14083-p0170-6
DFG

M. pulchellum.

(§. 34. _ Fig. 1.)

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-14083-p0171-1
DFG

199

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-14083-p0172-7
DFG