1. Acid. carbol. 1,0—4,0
Aq. font. (dest.) 200,0
Zu Waschungen und Verbänden.

2. Merc. subl. corros. 0,1—0,2
Aq. font. (dest.) 200,0
Wie Nr. 1.

3. Kali chloric. 2,0—4,0
Aq. font. 200,0
Wie Nr. 1 und als Mund- und Gurgelwasser.

4. Zinc. sulfocarbol. 5,0
Divide in part. aeq. No. 5
Ein Pulver in $^1/_2$ Liter aufgelöst.
Wie Nr. 3.

5. Natrii borac. 10,0—25,0
Divide in part. aeq. No. 5
Wie Nr. 4.

6. Zinc. sulfocarbol. 1,0
Aq. font. (dest.) 250,0
Tinct. myrrh. 1,0
Mit dem 2—5fachen Wassers verdünnt, als Mund- und Gurgelwasser.

7. Zinc. sulfocarbol. 1,0—2,0
Aq. font. (dest.) 250,0
— menth. pip. 50,0
Wie Nr. 6.

8. Tinct. jodin. (oder gallar. oder ratanh.) 10,0
Aq. font. 500,0
Mund- und Gurgelwasser. Auch wie Nr. 16.

9. Tinct. opii 5,0
Aq. font. 500,0
Wie Nr. 8.

10. Chloral. hydrat. 5,0—10,0
Aq. font. (dest.) 500,0
Wie Nr. 3.

11. Tinct. ratanh.
— gallar. (od. jodin.) aa 20,0
— myrrh. 10,0
Bepinselung bei Gingivitis, Stomacace.

12. Carbon. veget. praep. 50,0
Zinc. sulfocarbol. 1,0—2,0
Pulv. rad. ireos flor. 5,0
Zahnpulver.

13. Acid. hydrobromic. 20,0
Bepinselung bei ulceröser Stomatitis.

14. Acid. lact. 0,2—1,0
Aeth. sulf. 15,0
Spir. vini rectif. 5,0
Bepinselung bei Leukoplakie und Lingua geographica.

1

1

1

1

1

2

15. Balsam. peruvian.
Alcoh. absol. aa 10,0
Aeth. sulf. 20,0
Wie Nr. 14.

16. Bichloret. hydrarg. 0,05—0,2
Aq. dest. 200,0

Bei Laryngitis 20—40 Gramm vermittelst Zerstäubers zu inhaliren, täglich oder 2—3mal wöchentlich. Im letzteren Falle sind an den anderen Tagen als Inhalation Nr. 93, 95 oder 97—100 zu benützen.

17. Calomelanos 1,0—4,0
Talc. venet. (oder Magnes. carbon.) 20,0

Als Staub bei Hyperhidrosis pedum, Intertrigo, nässenden Papeln anzuwenden.

18. Pulv. amyli 20,0
Acid. salicyl. 1,0—2,0
(oder Zinc. oxydat. od. Dermatol. 1,0—4,0)
Wie Nr. 17.

19. Pulv. amyli oryzae 30,0
Talc. venet. 20,0
Pulv. rad. ireos flor. 2,0
(Calomel. oder Flor. zinci oder Acid salicyl. 1,0—5,0)
Als Poudre.

20. Acid. chromic. 2,5
Aq. font. (dest.) 50,0
Einpinselung gegen Fusschweisse.

21. Agaricin. 0,5—1,0
Spir. vini gall. 50,0
Wie Nr. 20.

22. Plumb. acet. bas. 10,0
Aq. dest. 500,0
Als Umschlag oder Waschung bei acutem Ekzem, acuter Dermatitis überhaupt.

23. Alum. crud. 5,0
Plumb. acet. 25,0
Aq. dest. 500,0
Filtretur. Frisch bereitet als Waschung oder Umschlag gegen Pruritus und stark juckende Ekzeme.

24. Acid. carbol. 1,0
Spir. vini 150,0
Aq. coloniens. 50,0
Gegen papulöses oder squamöses Ekzem; sodann einzupudern (Nr. 17—19).

25. Acid. carbol. 2,5—5,0
Spir. vini
Glycerini aa 20,0—50,0
Aq. font. 100,0
Waschung bei Pruritus oder Ekzem; sodann einzustäuben (Nr. 17—19).

26. Ol. rusci
Aeth. sulf. aa 15,0
Spir. vini 40,0
Bepinselung wie Nr. 25.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

27. Hydrarg. bichlorat. corros. 0,1—0,2
Spir. vini (gallici) 50,0
Aq. font. (dest.) 150,0

Waschung bei Akne, Sycosis, Seborrhoe, Pityriasis, Alopecia areata, Dermatomykosen.

28. Hydrarg. bichlor. corros. 0,05—0,1
Aq. coloniens. 20,0—50,0
Aq. dest. 100,0

Wie Nr. 27.

29. Acid. lactic. 0,5—1,0
Aq. dest. 150,0
— coloniens. 50,0

Wie Nr. 27.

30. Ammon. p. 3,0
(Acid. salicyl. 0,1)

Nach Insecten- (Gelsen-) Stichen einen Tropfen vermittelst eines Stiftstoppels aufzutragen.

31. Creolini 2,0
Aq. font. 100,0

Waschung bei Pediculi pubis.

32. Acid. carbol. 1,0—2,0
Ol. olivar. 100,0

Bei Psoriasis, Pityriasis und sonstigen squamösen Zuständen behaarter Stellen, Ichthyosis, trockenem Ekzem anzuwenden.

33. Acid. carbol.
Bals. peruvian. aa 1,0—2,0
Ol. oliver. 100,0

Wie Nr. 32.

34. Kalii caust. 0,5—1,0
Aq. font. (dest.) 500,0—1000,0

Als Fuss- oder Handbad bei Sommerekzem (nach dem Abtrocknen einzustäuben — Nr. 17—19); Waschung bei trockenem Ekzem, Pityriasis capitis.

35. Natr. carbon. 10,0
Divid. in part. 5—10

Ein Stück für $^1/_2$ Liter Wasser; wie Nr. 34.

36. Ol. olivar. 50,0
(Ol. lavandul. 2,0)

Wenige Tropfen einem halben Liter Wasser zugesetzt, als Waschung bei Sprödigkeit und Brüchigkeit der Haare; 2—3mal wöchentlich anzuwenden, an den übrigen Tagen ev. Nr. 35 zu gebrauchen.

37. Ax. porc. recent. (Vaselini) 40,0
Lanolini 20,0
Flor. zinci
Talc. venet. aa 10,0—30,0

Gegen Ekzem, Intertrigo.

38. Mag. bismuthi 1,0—2,0
Lanolini 20,0
Vaselini 30,0

Wie Nr. 37.

39. Merc. pp. albi 5,0
(Zinci oxydat. 10,0)
Ax. porc. recent. 50,0

Wie Nr. 37; auch bei Akne und syphilitischen Infiltraten mit Ekzem combinirt.

4

4

42

43

44

45

40. Ol. olivar. 100,0
Lithargyr. q. s. u. f.
Ung. molle.

Wie Nr. 37. (Ist, frisch bereitet, dem officinellen Präparate vorzuziehen.)

41. Oxyd. zinci
Gelatinae aa 15,0
Glycerini 25,0
Aq. dest. 45,0

Zinklein gegen Ekzem.

42. Vaselini (Ax. porc. recent.) 50,0
Lanolini 25,0
Ol. rusci
Flor. zinci aa 10,0—25,0
Bals. peruvian. 2,0

Gegen trockene Ekzeme, Psoriasis.

43. Vaselini 50,0
Thioli
Flor. zinci
Pulv. amyli aa 10,0—25,0

Wie Nr. 42.

44. Ol. cadini
Kaolini aa 25,0
F. pasta mollis.

Bei Psoriasis, Dermatomykosen, trockenem Ekzem.

45. Merc. praecipit. alb. 2,0—5,0
Flor. zinci
Flor. sulf. aa 10,0

Ax. porc. recent.
Vaselini aa 25,0
Bals. peruvian. 2,0

Gegen Akne, Psoriasis, Scabies mit Ekzem combinirt.

46. Collod.
Aether. sulf. aa 10,0
Chrysarobini 2,0

Gegen Psoriasis und Dermatomykosen.

47. Flor. sulf.
Ol. rusci aa 25,0
Ax. porc. recent. 100,0
(Kali carbon. oder Cretae 20,0)
Bals. peruviani 5,0

Gegen Scabies, Prurigo, Dermatomykosen.

48. Tragacanthae 5,0
Glycerini 2,0
Aq. dest. 100,0
(Zinc. oxyd., Ol. rusci, Dermatol. .... 5,0)
F. l. a. linimentum

Gegen Ekzem, Psoriasis.

49. Naphtholi
Flor. sulf.
Caolini (od. Cret.)
Sapon. virid. aa 20,0
Ax. porc. 60,0
Lanolini 40,0
Bals. peruviani 5,0

Wie Nr. 47.

50. Merc. praecip. alb. 5,0
Ung. spl. 50,0

Gegen Dermatomykosen, syphilitische Infiltrate, Ekzem.

51. Merc. praecip. alb.
Mag. bismuthi aa 2,0—5,0
Ax. porc. recent. 30,0
Lanolini 20,0

Gegen Pigmentationen.

52. Acid. lactic. 1,0—3,0
Lanolini 50,0
Vaselini 100,0

Bei Pityriasis, Ichthyosis, Lichenes anzuwenden.

53. Tinct. jodin. 20,0
(oder Tinct. gallar. aa 10,0)

Gegen nicht offene Pernionen. Auch wie Nr. 83.

54. Alum. crud.
Acid. tannic. aa 2,0—5,0
Lanolini
Ax. porc. recent. aa 25,0

Als Verband für verschwärende Frostbeulen.

55. Empl. plumbi oleinicum:
Oleini crudi 180,0
Plumb. oxydat. 100,0
F. l. a. Emplastrum

Bei Schwielen, trockenen Ekzemen, singulären Psoriasisplaques (mit Acid. salicyl. oder anderen Zusätzen) durch längere Zeit liegen zu lassen. Als reizloses Deckmittel bei Furunkeln, Pusteln,

die an schwer zu verbindenden Stellen sich befinden.

56. Empl. plumbi olein. (Nr. 55) 50,0
Acid. arsenicos. 2,0—3,0

Gegen Warzen an den Händen.

57. Lanolini 20,0
Ax. porc. recent. 30,0
Acid. arsenicos. 1,0—2,0

Wie Nr. 56, abends anzuwenden und mit Handschuhen zu decken. Auch wie Nr. 58.

58. Tinct. Fowleri 20,0

Äusserlich gegen venerische Papillome und bei circumscriptem Pruritus; auch wie Nr. 59.

59. Tinct. Fowleri
Aq. naphae aa 5,0

Von 5 Tropfen ansteigend bis 30 und mehr täglich bei Psoriasis, Lichen ruber, hartnäckigem Ekzem, Mykosis fungoides, Pigmentsarcom und anderen schweren Dermatosen; ferner bei Anämie, Neurosen.

60. Tinct. Fowleri 5,0
Tinct. ferri pomat. 20,0
Aq. dest. 150,0

Täglich 1—2 Esslöffel zu nehmen bei den unter Nr. 59 genannten Zuständen.

61. Font. Roncegno (Levico) lagenam.

Anämischen täglich etwa 3 Kinder- oder Esslöffel unmittelbar vor oder nach den Mahlzeiten zu reichen.

62. Font. Guber lagenam.

Wie Nr. 61.

6

6

6

6

6

6

63. Jodi p. 0,1
Ol. jecor. aselli 100,0

1—2 Thee- oder Esslöffel für anämische scrophulöse Individuen.

64. Tinct. Fowleri 2,0
Aq. dest. 10,0

Von 0,2—1,0 cm^3 ansteigend subcutan zu injiciren bei unter Nr. 59 genannten Erkrankungen.

65. Merc. subl. corros. 1,0—5,0
Spir. vini 20,0

Zur einmaligen Ätzung nach Anwendung des scharfen Löffels bei Lupus und ulcerösen Processen. — Bei Ätzung grösserer Flächen verliere man die Gefahr einer acuten Quecksilberaufnahme nicht aus den Augen. Auch wie Nr. 68.

66. Acid. pyrogall. 5,0
Lanolini 20,0
Vaselini 30,0

Die geschabten und geätzten (Nr. 65) Lupusflächen im Granulationsstadium alle 3—6 Stunden zu bedecken, um etwa zurückgebliebene Lupusknötchen zu zerstören.

67. Morph. hydrochlor. 0,12
Zinc. chlorat. 1,0
Kali nitr. 2,0—4,0

In Stäbchen zu giessen und in Stanniol zu hüllen. Ätzmittel. Wie Nr. 68.

68. Zinc. chlorat. 1,0
Aq. dest. 5,0—10,0

Ätzmittel, bei Phagedän, Diphtheritis und venerischen Geschwüren anzuwenden.

69. Acid. carbol. 2,0—5,0
Spir. vini 20,0
Ätzmittel.

70. Nitr. arg. 2,0—4,0
Spir. vini (Aq.) 20,0
Wie Nr. 69. (Weingeistige Lösungen dringen oft besser ein, als wässerige.)

71. Hydrat. chloral. 5,0
Aq. font. (dest.) 20,0
(oder Alcoh. aa 10,0)
Unreine Geschwüre zu bepinseln.

72. Jodoform. pulver. 10,0
Auf venerische Geschwüre, exulcerirte Sclerosen, mit dem scharfen Löffel behandelte gummöse, lupöse und scrophulöse Herde, in Höhlen nach Lymphadenitis-Operationen zu stäuben.

73. Jodoli 10,0
Wie Nr. 72. Hat vor dem Jodoform den Vorzug der Geruchlosigkeit, ist jedoch nicht immer so wirksam.

74. Dermatoli 10,0
Wie Nr. 73.

75. Jodoform. 2,0
Aeth. sulf. 20,0
Auf Spaltgeschwüre zu pinseln oder zu stäuben.

76. Jodoli 2,0—5,0
Aeth. sulf. 20,0
Wie Nr. 75.

ft

n,
e,
h

g
o

n.

77

78

79

80

81

77. Carbolgaze:

Fünf bis sechs Meter durch Kochen in Sodalösung gereinigter Gaze werden nach erfolgter Trocknung imbibirt in:

Alcohol 500,0
Glycerin. 250,0
Acid. carbol. 25,0

Als Verband und bei Vaginalsecretion einzulegen. (Als Einlage in die Vagina soll ein ca. 400 cm^2 grosser Gazelappen verwendet werden.)

78. Jodoformgaze (Jodolgaze):

Ähnlich bereitet wie Nr. 77, nur dass statt Carbolsäure 75,0 Jodoform (Jodol) genommen wird. Bei Intolerabilität der Haut gegen Jodoform wird das (überdies geruchlose) Jodol sehr wertvoll. Wie Nr. 77.

79. Dermatolgaze:

75,0 Dermatol werden in einem grösseren Gefässe (Lavoir) mit 250,0 Glycerin gut verrührt, 500,0 Alcohol absolutus allmälig zugesetzt, sodann 5 Meter Gaze mit dem Gemenge sorgfältig imprägnirt. Wie Nr. 78.

80. Jodoform. pulver. (Jodoli od. Dermatoli) 10,0
Gummi arab.
Amyl.
Glycerin. aa 1,0
F. bacilli diversae crassitudinis.

Bei Geschwüren der Urethra, des Anus u. s. w. und bei sinuösen Geschwüren anzuwenden.

81. Jodoform. pulver. (Jodoli od. Dermatoli) 8,0
Butyr. cac. 1,0

Gummi arab. 1,0
(Solut. in Aq. dest. 0,5)
F. bacilli.

Weichere Stifte. Wie Nr. 80.

82. Jodoform. pulver. (od. Jodoli) 10,0
Butyr. cacao 5,0
F. bacilli.

Wie Nr. 80.

83. Jodoformii 1,0
Collod. (od. Aeth. sulf.) 10,0

Zum Bepinseln von Bubonen und Infiltraten und wie Nr. 53.

84. Jodi p. 0,2
Kalii jodat. 2,0
Aq. dest. 20,0

Subcutane Injection von 0·1—0·2 cm^3 in die Nähe von derben Lymphdrüsenschwellungen, Epididymitis- und Funiculitisresten, syphilitischen Infiltraten.

85. Jodoform. 2,0
Vaselini liquid. (oder Glycerini) 20,0

Ausgiessen von Abscesshöhlen; Injection von 0·1—0·2 cm^3 in das Cavum der punktirten Hydrocele und wie Nr. 84.

86. Plumbum causticum:
Solution. Kali caust. (30%) 7·5
Lithargyri 0·25

Mit einem feinen Wattabäuschchen oder mit einem zugespitzten Holzstäbchen auf kleine und breit aufsitzende venerische Papillome genau begrenzt

87

88

89.

90.

91.

92.

aufzutragen, beziehungsweise einzureiben, bis die Basis der Warzen im Niveau der Umgebung (oder etwas tiefer) verschorft ist; sodann Bedecken mit Verbandgaze (Nr. 77—79).

87. Acid. lact. 5,0
Aeth. sulf. 8,0
Collod. 2,0

Auf venerische Papillome 1—2mal täglich aufzutragen nach Wegwischen der obersten Schichten.

88. Resorcini 8,0
Sacch. alb. 1,0

Auf venerische Papillome aufzutragen.

89. Resorcini 2,0—6,0
Aq. dest. 100,0

Umschläge bei venerischen Papillomen.

90. Ferri sesquichlor. crystallis.
Spir. vini dil. aa 10,0

Zur Bepinselung dünn gestielter venerischer Papillome.

91. Acid. arsenicos.
Morph. muriat. aa 0,25
Calomel. 2,0
Gummi arab. pulver. 12,0

Wie Nr. 88.

92. Solutio arsenicalis alcoholica:

Arsenige Säure in Überschuss wird in Weingeist gekocht (in einem Kolben mit aufwärts gekehrtem Kühler), nach dem Erkalten längere Zeit stehen gelassen und filtrirt; bei gewöhnlicher Zimmer-

temperatur enthält die Flüssigkeit beiläufig 1% arsenige Säure.

In dieser Concentration oder zur Hälfte mit Alcohol verdünnt 1—2mal im Tag mit einem Holzstäbchen oder Zahnstocher auf venerische Papillome aufzutragen.

93. Acid. tannic. 2,0
Aq. font. (dest.) 200,0

Wie Nr. 8 und zu Injectionen in Harnröhre oder Blase.

Blaseninjectionen sind nicht nur bei Cystitis, sondern auch bei Urethritis posterior angezeigt. — Nach dem Uriniren wird ein Nélaton eingeführt, circa 200,0 der Lösung vermittelst Spritze oder Irrigator injicirt, sodann der Katheter entfernt, worauf der Kranke durch Action der Blase die Flüssigkeit entleert.

Urethraleinspritzungen sollen gleichfalls nur nach dem Harnen vorgenommen werden.

94. Kalii hypermang. 0,02—0,2
Aq. font. (dest.) 200,0

Wie Nr. 93.

95. Zinc. sulfocarbol. 0,5—2,0
Aq. font. 200,0

Wie Nr. 93.

96. Decoct. carraghen. 2,0—200,0
Zinc. sulfocarbol. 0,05—2,0

Wie Nr. 93.

97. Arg. nitr. 0,01—0,05
Aq. dest. 200,0
Detur ad vitr. flavum.

Injectionen bei Urethritis oder Cystitis.

98. Cupr. sulf. 0,2—2,0
Aq. dest. 200,0
Wie Nr. 97.

99. Sulf. cupri
Alum. aa 0,2—2,0
Aq. dest. 200,0
Es ist zu empfehlen, jedes Salz für sich aufzulösen und dann die Lösungen zu mengen. Wie Nr. 97.

100. Zinc. sulfocarbol.
Alum. aa 0,5—2,0
Aq. dest. 200,0
Wie Nr. 97.

101. Jodoform. 20,0
Ol. Vaselini (Glycerini) 200,0
Blaseninjection bei ulceröser Cystitis, bei Vesiculitis, Prostatitis, Prostataabscess mit Durchbruch gegen die Urethra. (Jodoform, in Vaselin suspendirt, senkt sich schneller als in Glycerin und haftet darum besser an der Schleimhaut; nur muss diese Suspension an einem dunkeln Orte aufbewahrt werden, weil im Lichte Jodoform an Vaselin freies Jod abzugeben scheint.

102. Plumb. acet. 0,5—2,0
Aq. dest. 200,0
Injectionen in die Harnröhre.

103. Bismuth. subnitr. 1,0—5,0
Aq. dest. 100,0
Wie Nr. 102.

104. Acid. tannic. (oder Alum.) 5,0—10,0
Aq. font. (dest.) 250,0

Bei Blutungen in Blase oder Harnröhre zu injiciren.

105. Liquor. ferri sesquichlor. 2,5—5,0
Aq. font. (dest.) 250,0

Wie Nr. 104. Kann auch kaffeelöffelweise innerlich verabreicht werden.

106. Jodi p. 0,5
Kalii jodat. 5,0
Lanolini
Vaselini aa 25,0

Bei chronischer (erosiver) Urethritis vermittelst canellirter Sonden einmal in 3—8 Tagen anzuwenden. (Je nach Ausdehnung des Krankheitsherdes ist die Sonde theilweise oder ganz mit der Salbe zu bestreichen; im ersten Falle wird der übrige Theil des Instrumentes mit gewöhnlichem Vaselin besalbt.)

107. Arg. nitr. 1,5—2,5
Lanolini
Vaselini aa 25,0

Wie Nr. 106.

108. Nitrat. arg. 0,1
Butyr. cac. q. s. u. f. suppos. longit. 2 *cm*, crassit. 3 *mm*.

Vermittelst des Dittel'schen Porte remède's bei circumscripter Urethritis jeden 3.—8. Tag anzuwenden.

109. Arg. nitr. 1,0
Aq. dest. 20,0

Vermittelst des Ultzmann'schen Capillarkatheters 1—2 Theilstriche bei Urethritis posterior einmal in 3—8 Tagen zu injiciren.

110. Extr. Belladonnae (Morph. muriat.) 0,05-0,1
Butyr. cac. q. s. u. f. suppos. Nr. 5.

Bei Blasenkrämpfen 2—3 Stück täglich einzuführen.

111. Cocain. muriat. 0,05—0,5
Butyr. cac. q. s. u. f. suppos. Nr. 5.

Wie Nr. 110.

112. Cocain. muriat. 1,0
Aq. sublimat. 20,0

Bei Blasenkrämpfen 0·5—1 cm^3 der Lösung vermittelst des Capillarkatheters in die Gegend des Blasenhalses zu instilliren.

113. Kalii bromati (Natrii brom.) 5,0—7,5
Divid. in dos. aeq. Nr. 5.

Abends 1—2 Stück gegen Erectionen bei Urethritis zu verabreichen.

114. Kalii bromati 5,0—7,5
Antipyrini 2,5—5,0
Divid. in dos. aeq. Nr. 5.

Wie Nr. 113.

115. Kalii bromat.
Tinct. ferri muriat. aa 20,0
Aq. dest. 60,0

3mal täglich 1—2 Theelöffel gegen Pollutionen bei nervösen anämischen Individuen.

116. Balsam. copaivae in caps. gelatinos. singul. guttas 5—10. Nr. 50

Gegen Gonorrhoe täglich 3—6 Stück zu nehmen.

117. Ol. ligni Santali in caps. gelatinos. singul. gutt. 5—10. Nr. 50

Wie Nr. 116.

118. Balsam. copaiv. (oder Ol. ligni Santali) Tinct. amar. aa 20,0

Gegen Gonorrhoe 3mal täglich 20—30 Tropfen zu nehmen.

119. Balsam. copaiv. (oder Ol. ligni Santali) 20,0

Gegen Gonorrhoe 3mal täglich 10—15 Tropfen (in Madeira, Wermuth oder Wachholderbranntwein) zu nehmen.

120. Pulv. cubebar. recent. tusi 4,0
Bals. copaiv. 2,0
Magn. ust. 1,0
F. pill. Nr. 30.

Bei Gonorrhoe täglich 10—30 Stück zu nehmen.

121. Pulv. cubebar. recent. tusi 6,0—10,0—15,0 etc.
Divid. in dos. aeq. Nr. 3.

Bei Gonorrhoe täglich 3mal zu zwei Gramm in steigenden Gaben bis zur erzielten Wirkung und dann in absteigenden Dosen zu reichen.

12

12

12

12

12

12

12

122. Creosot. 0,5—1,0
Bals. Tolut. 6,0
Extr. et plv. liq. q. s. u. f. p. Nr. 100.

Tuberculösen Gonorrhoikern 10—30 Stück 2—3mal täglich zu reichen.

123. Natr. bicarbon. 30,0

Messerspitzweise bei Urethritis, Cystitis, Pyelitis.

124. Natr. salicyl. 10,0—25,0
Divid. in dos. aeq. Nr. 10.

2—3 Stück in Oblaten zu nehmen wie Nr. 123 und bei Arthritis gonorrhoica.

125. Saloli 10,0—25,0
Divid. in dos. aeq. Nr. 10.

Täglich 1—2 Stück bei Urethritis, Cystitis, Pyelitis.

126. Methylenblau
Sacch. lactis aa 2,0
Divid. in dos. aeq. Nr. 10, includ. in nebul.

Täglich 2—4 Stück bei Pyelonephritis, ulceröser Cystitis.

127. Herb. Herniarae (Fol. Bucco)
Fol. uvae ursi aa 15,0

Thee; gegen Cystitis.

128. Acid. phosphor. (oder Acid. lact.) 10,0

Einige Tropfen auf ein Glas Wasser als säuerliches Getränk bei Phosphaturie.

129. Aq. Bilin (Vichy, Giesshübel, Stainz, Luhatschowitz, Selters u. ä.)

Mit oder ohne Milch zu trinken bei Pyelonephritis, Cystitis.

130. Zinc. sulfocarbol. 50,0—100,0
Glycerin. 50,0
Aq. f. (dest.) 200,0

Zur Imprägnirung von Wattatampons oder Gaze; bei starker Vaginalsecretion 1—2mal in der Woche für $^1/_4$—$^1/_2$ Stunde einzulegen.

131. Alaungaze:
5 Meter Gaze werden (wie Nr. 79) imprägnirt mit:
Spir. vini 500,0
Glycer. 250,0
Alum. 100,0

Wie Nr. 130 anzuwenden.

132. Tanningaze:

Analog dargestellt und angewendet wie Nr. 131.

133. Perchlorid. hydrargyr. 0,05—0,2
Spir. vini (Aeth. sulf.) 20,0
(oder Spir. vini und Aeth. sulf. aa 10,0)

Zum Bepinseln von syphilitischen Infiltraten an Schleimhäuten und dünnen Hautpartien.

134. Bichloret. hydrarg. 0,05—0,2
Collodii
Aether. sulf. aa 10,0
Ol. olivar. 0,2

Wie Nr. 133 und bei Psoriasis plantarum et palmarum anzuwenden.

13

13

13

13

13

135. Emplastrum hydrarg. oleinicum:
Empl. plumbi olein. (Nr. 55) 280,0
Hydrarg. depur. 60,0
F. l. a. Emplastrum.

Irritirt weniger als manches andere Pflaster, weil ohne Terpentin hergestellt. Für syphilitische Geschwüre, Infiltrate und zur Allgemeinbehandlung.

136. Emplastrum hydrarg. oleinicum mite:
Empl. plumbi olein. (Nr. 55) 280,0
Hydrarg. depur. 30,0

Für Kinder; wie Nr. 135.

137. Empl. hydrarg. olein. (Nr. 135)
— cerussae aa 10,0
F. l. a. Emplastrum.

Wie Nr. 136.

138. Ung. hydrarg. 50,0

Bohnengross einzureiben, um Infiltrate (Lymphdrüsen) zur Resorption zu bringen; zum Einstreichen in den Vorhautsack bei versteckt sitzenden Sklerosen; auch als Verband für syphilitische Geschwüre.

139. Chloret. hydrargyri 5,0—10,0
Lanolini
Axung. porc. recent. aa 25,0

Bei oberflächlichen syphilitischen Infiltraten anzuwenden.

140. Ung. hydrarg. 5,0
Butyr. cacao 10,0
F. globi Nr. 10.

Bei Sklerosen und Gummen des Cervix in die Vagina einzulegen; wird auch von Schwangeren gut vertragen.

141. Ung. hydrarg. 10,0
Butyr. cacao 20,0
F. Suppositoria Nr. 15.

Bei Papeln und Geschwüren im Rectum.

142. Hydrarg. ammoniat.
(Chloreti Hydrarg.) 0,5—4,0
Butyr. cacao 20,0
F. Suppositoria Nr. 10.

Wie Nr. 141.

143. Ung. hydrarg. 1,0
Butyr. cacao 2,0
F. Supposit. urethr. huj. formae

Für Sklerosen in der Harnröhre. Das Zäpfchen wird durch einige Minuten in kaltes Wasser gelegt (bez. starr gemacht), sodann in die Urethra geschoben und Empl. hydrarg. vor die Mündung geklebt.

144. Ung. hydrarg. 2,0
Butyr. cacao 10,0
F. bacilli crassitud. 5—7 *mm*
longitud. 2—3 *cm*

Für syphilitische Geschwüre und Infiltrate der Nasenhöhle und anderer Cavitäten.

145. Merc. pp. alb. (Calomel.) 1,0
Butyr. cacao 10,0
F. bacilli wie Nr. 144.

146. Quecksilberoxydulgaze:
5 Meter Gaze werden (ähnlich wie Nr. 79) imprägnirt in:
Hydrarg. oxydulat. Hahnemanni 25,0
Alcohol. 300,0
Glycerini 150,0

Zu Verbänden bei syphilitischen (gummösen) Geschwüren, Adenitiden etc.

147. Bichloret. hydrarg.
Chloreti ammonii
(oder Natrii chlorati) aa 15,0—20,0
Aq. font. 200,0

Zu einem Vollbade als Allgemeinbehandlung für Erwachsene. (In einer Holz- oder Porzellanwanne zu verabfolgen.)

148. Elektrisches Bad:
Bichloret. hydrargyri 12,0—15,0
Aq. font. 200,0

Für ein elektrisches Vollbad. — Der Patient wird in eine entsprechend gebaute zweizellige Wanne gesetzt, die mit einer Batterie verbunden ist. Allmäliges Einschleichen in den Strom, den man durch $^1/_4$ Stunde in der Stärke von 100—200 Milliampère einwirken lässt; sodann Ausschleichen, Polwechsel, neuerliches Einschleichen und Einwirken der Elektricität durch 15 Minuten bei 100—200 M.-A. und endlich Ausschleichen.

149. Perchloridi hydrargyr.
Chloreti Ammonii (oder Natrii chlorati) aa 1,0—5,0
Aq. font. 200,0

Wie Nr. 147; für Kinder.

150. Ung. hydrarg. 1,0—2,0—5,0 und mehr.

10, 20—40 solcher Dosen und darüber in Ceratpapier oder Kapseln zu verabfolgen. Jeden 2. Tag, täglich oder Vor- und Nachmittag 1 Stück im Turnus einzureiben; als Allgemeinbehandlung.

151. Ung. hydrarg. 0,2—1,0

Wie Nr. 150; für Kinder.

152. Unguent. ciner. lanolinat. fort.*) 9,0
Ol. amygdal. optimi
(Sive Ol. olivar. rec., sive Ol. vaselini) 3,0

Adde Oleum unguento sensim sensimque inter assiduam agitationem, ut fiat oleum plane aequale, serva in vitro amplo epistomeo vitreo clauso. Signa: Oleum cinereum 50%.

Eine Injectionsdose dieses meist gebrauchten Präparates beträgt 0·05 cm^3 und enthält 0·04 metallisches Quecksilber. Wünscht man die doppelte Dose grauen Öls, etwa 0·1 cm^3, auf einmal zu appliciren, so injicire man an zwei Stellen je

*) Die Apothekerformel für die Bereitung des Unguentum cinereum lanolinatum forte lautet:

Lanolini anhydrici 15·0; solve in Chloroform. quantum satis ad perfectam solutionem (50·0); evapora Chloroformium in mortario amplo perpetua agitatione tamdiu, ut sit pondus remanentiae 30·0; tum adde: Hydrargyri vivi depur. 30·0; conteratur lente usque ad evaporationem Chloroformii et perfectissimam extinctionem hydrargyri.

0·05 cm^3. Die Allgemeinbehandlung ist recht wirksam, wenn man jede Woche 2mal zu 0·05 cm^3 injicirt bis zum Schwinden der Symptome und dann als Überdispensation einmal in 8—14 Tagen 0·05 cm^3 verabfolgt. Oder man injicirt in den ersten 8 Tagen 2—4mal zu 0·05 cm^3, in den folgenden 8, später 14 Tagen (nach Schwinden der Erscheinungen) einmal 0·05 cm^3 tief subcutan unter die Rückenhaut. Behufs Localbehandlung injicire man zu 0·02 cm^3; bei Scleradenitis inguinalis die gleichen Mengen an 2—3 Stellen in der Mitte des Oberschenkels.*)

153. Ung. ciner. lanolinat. fort. 4,5
Ol. amygdal. opt.
(oder Ol. olivar., oder Ol. vaselini) 5,5

Bereitung wie bei Nr. 152; Signa: Ol. ciner. 30%. (1 cm^3 enthält 0·366 Hg.)

Die doppelten Mengen (also p. dosi 0·1 cm^3) anzuwenden wie bei Nr. 152.

154. Ung. ciner. lanolinat. mit.**) 6
Ol. amygdal. opt.
(oder Ol. olivar. recent., oder Ol. vaselini) 4,0

S.: Ol. cinereum 30%. (1·0 cm^3 enthält 0·369 Hg.) Wie Nr. 153.

---

*) Geaichte Spritzen zu Injectionen von grauem Öl sind vorräthig in Wien bei H. Reiner, IX., van Swietengasse 11, und J. Leiter, IX., Mariannengasse 11.

**) Apothekervorschrift für Darstellung des Unguentum hydrargyri lanolinatum mite:

Lanolini anhydrici
Hydrarg. vivi aa 50,0

Conterantur in mortario porcellaneo ope Chloroformii usque ad planam extinctionem hydrargyri; servetur in vitro epistomeo vitreo clauso.

155. Calomel.
Ol. vaselini aa 4,5
Lanolini 4,0
(1 cm^3 enthält 0·371 Hg.)
Zur Allgemeinbehandlung wie Nr. 153 zu gebrauchen; nur sollten wegen der rascher erfolgenden Quecksilberaufnahme von diesem Präparate in der ersten Woche nicht mehr als 2—3mal 0·1 cm^3 injicirt werden.

156. Hydrargyr. oxyd. flav. 4,0
Ol. vaselini 4,5
Lanolini 3,5
(1 cm^3 enthält 0·392 Hg.)
Wie Nr. 155.

157. Hydrarg. salicyl. 7,0
Ol. vaselini 4,0
Lanolini 2,0
(1 cm^3 enthält 0·422 Hg.)
Wie Nr. 155.

158. Hydrarg. oxydul. nigr. 4,7
Ol. vaselini 6,2
Lanolini 3,1
(1 cm^3 enthält 0·39 Hg.)
Wie Nr. 155.

159. Hydrargyr. thymoloacet. 7,0
Ol. vaselini 5,0
Lanolini 2,5
(1 cm^3 enthält 0·36 Hg.)
Wie Nr. 155.

16

16

16

16

16

16

160. Hydrarg. diphenylic. 7,0
Ol. vaselini 4,0
Lanolini 2,0
(1 cm^3 enthält 0·357 Hg.)
Wie Nr. 155.

161. Hydrargyr. sozojodol. 0,8
Kalii jodat. 1,6
Aq. dest. 10,0
Wöchentlich eine subcutane Injection zu ertheilen (1·0 cm^3 der Lösung); als Allgemeinbehandlung.

162. Hydrargyr. bichlorat. corros. 0,2
Natr. chlorat. 2,0
Aq. dest. 20,0
Täglich 1 Gramm der Lösung subcutan zu injiciren; als Allgemeinbehandlung.

163. Hydrarg. formamidat. 0,2—0,4
Aq. dest. 20,0
D. ad vitr. nigr.
Täglich oder jeden 2. Tag eine Spritze voll (1·0 cm^3) zu injiciren.

164. Hydrargyr. succinimid.
Cocaini muriat. aa 0,2
Aq. dest. 20,0
Wie Nr. 162.

165. Unguent. hydrarg. lanolinati (50%) 6,0
Opii 0,5
Sacch. lactis 14,0
F. pill. Nr. 120. Consperg. Sacch. lact. 3 bis 9 Stück täglich zu nehmen.

166. Hydrarg. oxydul. tannic. 0,1
Sacch. lact. 0,4
Includ. nebul. pressione. D. tal. dos. 10—20.
Täglich 2 bis 3 Stück zu nehmen.

167. Hydrarg. oxydul. tannic. 0,2
Sacch. lact. 5,0.
D. in dos. 10.
Wie Nr. 166; für Kinder.

168. Calomel 2,5
Resin. Guajac. 5,0
(Opii p. 0,25)
Mucil. g. a. q. s. u. f. p. No. 50. Consp.
2—4 St. täglich zu nehmen.

169. Calomel. 0,5
(Opii 0,05)
Sacch. albi 5,0
D. in dos. 10.
2—3 Stück täglich zu nehmen.

170. Calomel. 0,2
Sacch. alb. 10,0
D. in dos. 20.
Wie Nr. 167.

171. Calomel. 0,2
Ferr. lact. 0,4
Sacch. lact. 10,0
D. in dos. 20.
Wie Nr. 167.

172. Protojoduret. hydrarg. 1,5
(Opii p. 0,5)

Plvr. et Extr. rad. acor. q. s. u. f. pill. No. 50. Consp.

Wie Nr. 168.

173. Mercur. subl. corros. 0,25
Solv. in pauxill. Aeth. sulf. et adde
Plv. et Extr. rad. acor. q. s. u. f. pill. Nr. 50. Consp.

1—3 Stück täglich zu nehmen.

174. Merc. subl. corros. 0,1
Aq. dest. (font.) 200,0

1—3 Esslöffel täglich zu nehmen.

175. Merc. subl. corros. 0,1
Spir. vin. rectif. 15,0
Aq. font. (dest.) 150,0

Täglich 1—3 Esslöffel in einem Glase Wasser zu nehmen.

176. Merc. subl. corros. 0,1
Rhum optimi. 100,0

1—3mal täglich $^1/_2$ Löffel (= 10,0) in russischem Thee zu nehmen.

177. Jodoli 10,0
Divide in dos. aeq. Nr. 20 include nebul. pressione.

1—4 Stück täglich zu nehmen.

178. Kalii jodat. (Natrii jod.) 5,0—10,0
Aq. font. (dest.) 200,0

1—3 Esslöffel (zu 20,0) täglich zu nehmen. (Bei manchen verursacht das Jodsalz Obstipation, bei anderen Diarrhoe; man setzt dann

eine entsprechende Menge Syrup. mannat., bezw. Diacodii hinzu.)

179. Kalii jodat. 5,0—10,0
Extr. et plvr. rad. acor. q. s. u. f. p. Nr. 50. Consp.
2—10 Stück täglich zu nehmen.

180. Pillul. Blancardi lagenam.
3—6 Stück täglich zu nehmen.

181. Ferri pulverati 2,0
Jodi 4,0
Sacch. 3,5
Plv. rad. liquir. 7,0
Aq. dest. 2,5
M. f. l. a. pill. Nr. 100. Consp.
Wie Nr. 180.

182. Syr. ferri jodat. 1,0—5,0
Syr. mororum (simpl.) 20,0
Für einen Tag (täglich frisch zu bereiten).

183. Radicis Sassapar. consciss. 300,0
post macerat. p. duas horas cum
Aq. font. 2000,0
f. Decoct. inspissat. Colaturae 150—200,0
Saccharini (Fahlberg) 0,01
Täglich 2—3 Esslöffel zu nehmen. Für Kinder ebensoviel Kaffeelöffel. (Ist dem Decoctum Zittmanni vorzuziehen.)

Druck von Leopold Karafiat in Brünn.

0

ir
m

JO

V

D

B

D

E

Di