Anwend. Bei syphilitischem Herpes.

Polya.

606. Rec. Anthrakokali simpl. v. sulphurat. gr. ij
Sulphur. antim. aurat. gr. ß
Magnes. carb. v. pulv. rad. liquirit. gr. iij.
M. f. tales pulveres iij.
D. S. In einem Tage zu nehmen.

Anwend. Bei leprosem Herpes.

Polya.

Pilulae.

607. Rec. Anthrakokali ʒj
Extr. stipit. dulcamar.
Pulv. stipit. dulcam. aa ʒij.
M. f. pilul. pond. gr. ij. Dent. ad vitrum bene munitum.
S. Früh und Abends 6 Stück zu nehmen.

Clarus.

608. Rec. Anthrakokali
Gummi arab. aa ʒij
Pulv. rad. althaeae ℈iv
Aquae commun. s. q.
ut fiant pilul. pond. gr. ij. Dent. in vitro bene obturato.
D. S. Täglich drei- bis viermal 5 Stück.

Clarus.

609. Rec. Ferri iodati ʒß
Anthrakokali ʒj
Extr. stipit. dulcam. ʒiß
Pulv. stipit. dulcam. ʒj
M. f. pilulae pond. gr. ij. Dent. ad vitr. bene munit.
S. Früh und Abends 6 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei Eczema impetiginosum.

Clarus.

LX. Antimonii chlorati liquor.
Salzsaure Spiessglanzflüssigkeit.

Liquor stibii muriatici, Murias stibii s. antimonii, Liquor chloreti stibii, Butyrum antimonii, Oleum antimonii, Cauterium antimoniale, Antimonium causticum. Chlorstibiumflüssigkeit, Antimonchlorid, Spiessglanzbutter, Spiessglanzöl.

Wirk. u. Anwend. Es ist ein heftiges und schnell wirkendes Aetzmittel und wird häufig zum Cauterisiren enger und sinuöser Wunden, der Bisswunden toller Thiere, zur Zerstörung verschiedener Afterorganisationen, wie der polypösen und sarkomatösen Auswüchse, der Condylome und der Warzen, so wie in der Augenheilkunde gegen Pannus, Pterygium und Staphylom angewandt.

Gabe u. Form. Man trägt die Spiesglanzbutter für sich mittelst eines Pinsels auf, indem man zuvor sorgfältig die zu ätzende Stelle vom Blute, Eiter etc. reinigt, weil diese die Spiessglanzbutter sehr leicht zersetzen und deren Ausbreitung auf gesunde Theile begünstigen. Auch in Salbenform hat man sie angewandt, zu 2—4 Tropfen auf ʒij Fett als Augensalbe.

Unguenta.

610. Rec. Liquor. antimon. chlorat.
Hydrarg. muriat. corros. aa ʒj
Pulv. herbae sabinae ʒij
Axungiae porci
vel
Unguent. rosati ʒvj.
M. f. unguent.
S. *Auf Charpie zu streichen.*
Anwend. Gegen Feigwarzen.

Neumann.

611. Rec. Hydrarg. muriat. corros. ʒß
Pulv. cantharid. ℈ß
Liquor. stibii muriat. ℈j
Adip. suill. ʒij.
M. D. S. *Auf Leinwandstreifen gestrichen aufzulegen.*
Anwend. Gegen Condylome.

Horn.

612. Rec. Butyr. antimon. ʒjß
Camphor. trit. ʒij
Opii puri gr. xv
Adipis porcin. ℥j.
M. f. unguent.
Anwend Gegen fungöse und callöse Geschwüre.

613. Rec. Butyr. antimon.
Muriat. hydrarg. corros. aa ʒß
Pulv. cantharid. gr. xxv
Unguent. basilicon. ʒij.
M. f. unguentum.

S. *Würzburger Zug- oder Brennsalbe.*

Anwend. Sie dient zur Verschärfung der Zugsalben, röthet die Haut ohngefähr ½ Stunde nach ihrer Anwendung, worauf sich sogleich solche Schmerzen einstellen, als wenn die Haut gebrannt worden wäre. Gleich darauf erhebt sich eine Blase.

LXI. Antimonium hydrosulphuratum luteum. Orangenfarbener Spiessglanzschwefel.

Sulphur stibiatum aurantiacum, Oxydulum stibii hydrosulphuratum aurantiacum, Hydrosulphuretum antimonii luteum, Sulphuretum oxyduli stibii hydrogenati, Oxydum stibii hydrosulphurati praecipitatum, Sulphuretum antimonii praecipitatum, Subbisulphuretum stibii. Spiessglanzgoldschwefel, pomeranzenfarbenes Schwefelspiessglanz, pomeranzenfarbiges schwefelhaltig- hydrothionsaures Antimonoxydul.

Wirk. u. Anwend. Der Goldschwefel ist eins der kräftigsten Antimonialpräparate, das auf die Absonderung der Schleimhäute und der äussern Haut, auf das lymphatische und Drüsensystem wirkt und leicht Brechen und Durchfall erregt. Man bedient sich desselben gegen remittirende und intermittirende Fieber, bei Anschwellungen und Verhärtungen im Lymph- und Drüsensysteme, Leber- und Milzverstopfung, daher rührenden Wassersuchten, chronischen Hautkrankheiten, rheumatischen und gichtischen Affectionen, ferner vorzüglich bei Brustbeschwerden, wenn die absondernde Thätigkeit in den Lungen zu befördern ist, bei chronischen Katarrhen, Asthma, Brustbräune, Keuchhusten u. s. w.

Gabe u. Form. Man giebt den Goldschwefel innerlich von ¼—1 Gran mehrmals täglich in Pulver oder Pillen, seltener in Linctus, Latwerge oder Mixtur. Die Spiessglanzseife, sapo antimonialis s. Sulphur auratum saponatum, verordnet man zu 4—10 Gran einigemal täglich in Pillenform, und den Liquor saponis stibiati s. Sulphur auratum liquidum zu 10—30 Tropfen rein oder in Mixturen.

Mixturae.

614. Rec. Sulphur. antim. aurat. gr. viij
Elixir. e succo liquirit.
Aquae laurocerasi
Mucilag. gumm. arabic. aa ℥ß
Aquae foeniculi ℥v
Syrup. de althaea ℥ß.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel voll wohl umgeschüttelt.

Vogt.

615. Rec. Sulphur. stibiat. aurat. gr. vj
Syrupi senegae ℥j
Aquae melissae ℥iij.
M. D. S. Wohl umgeschüttelt zweistündlich einen Esslöffel.

Hecker.

616. Rec. Liquor. sapon. stibiat.
Tinct. guajac. ammoniat. aa ℥ß.
M. S. Viermal täglich 20 Tropfen.
Anwend. In atonischer Gicht.

617. Rec. Tinct. antim. saponati ʒvj
Tinct. colocynthidis ʒij.
M. D. S. Alle 3 Stunden 20 Tropfen.
Anwend. Gegen Flechten.

Heim.

618. Rec. Sapon. antimonial. ʒij
Tinct. kali caust.
Aquae destill. aa ʒiij.
Dissolve in aquae balneo tepido et filtra.
D. S. 30 — 60 Tropfen in schleimigem Tranke mehrmals täglich.
Anwend. Ist reizend, auflösend, schmelzend, Harnabsonderung und Ausdünstung befördernd, bei Asthma, Unterleibsstockungen, chronischem Rheumatismus, Gicht.

Van Mons.

Tinctura Asae foetidae stibiata.

619. Rec. Tinct. asae foet. ʒvj
Sulph. aurat. liquid. ʒijß
Essent. terebinth. ʒij.
M. D. S. Alle 4 Stunden 30 Tropfen.
Anwend. Bei Icterus.

Augustin.

Linctus.

620. Rec. Sulphur. aurat. antimon. ʒß
Oxymell. scillit. ℥j
Extr. marrubii albi ʒij
Syrupi althaeae ℥jj.
Misce bene.

S. 3 — 4*mal täglich einen Kaffeelöffel.*

Anwend. Den Auswurf zu befördern.

Dispensat. Fuld.

621. Rec. Sulphur. antim. aurat. gr. iij
Liquor. ammon. anisat. gtt. xxiv
Extr. hyoscyami gr. iij
Aquae foeniculi ℥ß
Syrupi liquiritiae ℥iß.
M. D. S. Alle 2 Stunden 1 Theelöffel voll.

Anwend. Bei asthenischen Brustfiebern.

Vogt.

622. Rec. Gummi ammoniaci ʒj
Sulphur. stibiat. aurant gr. vj
Syrupi althaeae ℥iij.
M. f. linctus.
D. S. Wohl umgeschüttelt 2stündlich 2 Theelöffel.

Anwend. Als Expectorans.

J. A. Schmidt.

Pulveres.

623. Rec. Sulph. aurat. antim. gr. iij
Magnes. carbon.
Sacch. albi na ʒß.
M. f. pulvis. Divid. in part. vj aequal.
S. Alle drei Stunden ein Pulver.

624. Rec. Sulph. aurat. antimon.
Pulv. Doveri aa gr. vj
Elaeosacch. foenic. ʒj.
M. f. pulvis. Divid. in part. vj aequal.
S. Täglich 2 — 3mal 1 Pulver.

625. Rec. Sulph. antim. aurat. gr. iv
Extr. hyoscyami gr. viij
Pulv. lapid. cancror. ℈viij.
M. f. pulvis. Divid. in part. viij aequal.

Anwend. Von ausgezeichneter Wirksamkeit bei reinem Brustkrampfe.

Urban.

626. Rec. Sulphur. aurat. antim.
Pulv. rad. ipecac. aa gr. vj
Camphorae gr. xviij
Sacch. albi ʒiij.
M. f. pulvis. Divid. in part. vj aequal.

S. *Alle 2 Stunden 1 Pulver.*

Anwend. In der Peripneumonie, wenn der Auswurf unter Sinken des Pulses, grosser Entkräftung und Röcheln stockt oder ganz aufhört. 631.

Mursinna.

627. Rec. Sulphur. aurat. antim.
Calomel.
Opii puri
Rad. squillae aa gr. viij
Sacch. albi ℈iv.
M. f. pulv. Divid. in viij part. aequal.
S. *Früh und Abends 1 Pulver.*

Anwend. In der Brustwassersucht. 632.

Richter.

628. Rec. Sulph. antim. aurat. j
Calomel. aa gr. j
Pulv. herb. cicut. gr. vj
Sacchari albi ℈j.
M. f. pulvis. Dispens. dos. viij.
S. *Früh und Abends 1 Pulver.*

Anwend. In der Leberentzündung, wenn der Kranke nach hinlänglichen Aderlässen noch immer etwas Gallsüchtiges, verbunden mit stumpfen Schmerzen in der Lebergegend behält, die Lebergegend etwas aufgetrieben und der Stuhlgang träge ist. 633.

Richter.

629. Rec. Sulph. antim. aurat. gr. vj
Kali nitrici ʒj
Camphorae gr. iij
Opii puri gr. iß.
M. f. pulvis. Divid. in vj part. aequal. 634.
S. *Täglich 3—4mal ein Pulver zu nehmen.*

Anwend. Im spätern Zeitraume fieberhafter Brustkatarrhe, wenn der Husten sehr angreifend und der Auswurf mühsam wird.

Jahn.

630. Rec. Sulphur. antim. aurat. gr. viij
Opii puri gr. ij
Pulv. cort. peruv.
— flor. chamomill. aa ℈iv
M. f. pulvis. Divid. in part. viij aequal.
S. *Während der fieberfreien Zeit zu verbrauchen.*

Anwend. Gegen Wechselfieber.

Hufeland.

631. Rec. Sulphur. antim. aurat.
Hydrarg muriat. mit.
Extr. aconiti aa gr. ij
Pulv. stipit. dulcam.
Sacch. albi aa ℈j.
M. f. pulvis. Dent. tal. dos. No. viij.
S. *Früh und Abends 1 Pulver.*

Anwend. Gegen chronische Gicht.

Richter.

Trochisci.

632. Rec. Pulv. subtiliss. rad. althaeae
— — semin. foeniculi aa ʒij
Sulph. stibiat. aurant. gr. iv
Succi liquiritiae depurat. ʒj
Syrup. simpl q. s.
ut fiant trochisci No. 15.
S. *Täglich 3—4mal ein solches Küchelchen im Munde zergehen zu lassen.*

Vogt.

Boli.

633. Rec. Extr. aconiti
Sulph. stibiat. aurant. aa gr. ij
Lapid. cancror. ℈j
Mellis crudi s. q.
ut f. boli duo.
S. *Früh und Abends einen Bissen.*

J. A. Schmidt.

634. Rec. Extr. aconiti
Flor. zinci aa gr. iv
Sulph. aurat. antim. gr. ij.
Misce et cum
Mellis et liquirit. s. q.
fiant boli iv.
S. *Aller 2 Stunden 1 Stück.*

Anwend. Bei irritativ-nervösen Leiden, als beim Hüftweh, bei der Epilepsie, wo diese vorzüglich ihren Grund in einer Hautstörung hat, so auch beim Veitstanz, bei der Hysterie, chronischem Rheumatismus und Gicht.

Brera.

Pilulae.

635. Rec. Sulph. aurat. antim.
Extr. arnicae aa ʒj
Sulph. depurat. ℥ß
Syrupi fumariae q. s.
ut f. pilul. gr. ij.
D. S. Morgens und Abends 10 *Stück.*
Anwend. In der Gicht.

Stoll.

636. Rec. Sulph. antim. aurat. ℈ß
Pulv. rad. liquirit. ℈iv.
M. f. c. s. q. aquae destill. pilul. No. 40. Consperg. pulv. rad. irid. florent.
S. Früh und Abends 2—4 *Stück.*

637. Rec. Sulph. antim. aurat.
Calomel.
Camphor.
Pulv. rad. senegae aa ʒj
Gummi guajaci ℥j
Sapon. hispan. ℥ß.
M. f. pilul. gr. ij.
S. Abends und Morgens 8—12 *zu nehmen.*
Anwend. Gegen Verstopfung der Drüsen.

Selle.

638. Rec. Sulph. aurat. antim.
Pulv. rad. ipecac. aa ʒj
Sal. ammoniac. dep. ʒij
Pulv. rad. rhei
Extr. gentian. aa ʒiij
Sapon. medic. ʒvj.
M. f. l. a. pilul. pond. gr. ij. Consperg. pulv. rad. ireos florent.
D. S. Täglich 2mal 8—10 *Stück.*
Anwend. Gegen Lungenkatarrh.

Siemerling.

639. Rec. Sulphur. aurat. antim.
Mercur. dulc.
Extr. aconiti aa ʒß
Resin. guajaci
Succ. liquirit. aa ʒiij
Extr. dulcamar. ʒv.
M. f. pilul. pond. gr. ij. Consp. pulv. cinnam.
S. Täglich viermal 8 *Stück.*

Anwend. In der Gicht. Besonders für schleimige, schlaffe, reizlose Constitutionen, für alte Gichtkranke, die zugleich eine schleimige Brustconstitution haben, und wenn man sehr entschieden auf die Haut wirken will.

Richter.

640. Rec. Pulv. rad. seneg. ʒij
Ammoniac. depur. ʒiß
Sulph. stibiat. aurat. ʒß
Pulv. rad. squill. gr. xv
Extr. taraxaci liquid. s. q.
ut f. pilul. 150. Consperg. pulv. irid. florent.
D. S. Dreimal täglich 5—6 *Stück.*

Anwend. Um kräftig aufzulösen und die Expectoration zu befördern.

Berends.

641. Rec. Sulphur. antim. aurat.
Extr. putamin. jugland. aa ℥ß
Opii ʒß
Tinct. guajaci s. q.
ad formandas pilulas gr. ij.
D. S. Drei bis vier Stück Morgens und Abends.

Anwend. Gegen Hautkrankheiten.

Swediaur.

642. Rec. Sapon. stibiat.
Resin. guajaci aa ʒiij
Extr. aconiti gr. vj.
M. f. pilul. gr. ij.
D. S. Dreimal täglich 13 *Stück.*

Anwend. In atonischer Gicht.

Richter.

643. Rec. Gummi ammoniac.
Saponis antimonii aa ʒj
Extr. bardanae ʒij.
M. f. pilul. gr. ij.
S. Abends und Morgens 12 *Stück.*

Anwend. Gegen Skropheln.

Friedr. Jahn.

644. Rec. Saponis antimonii
Extr. arnicae
Calomel aa ʒj
Camphor.

Croci aa ℈j
Theriacae ʒj.
M. f. pilul. gr. ij.
S. *Dreimal täglich 7 Stück.*

Anwend. Im anfangenden Staar aus Verstopfungen in den Eingeweiden.

Kämpf.

Unguentum.

645. Rec. Sulphur. stibiat. aurant. ʒij
Kali carbon. dep. ʒj
Unguenti rosati ℥j.
M. f. unguent.
S. *Salbe.*

Anwend. Gegen pustulöse Flechten und Krätze.

LXII. Antimonium hydrosulphuratum rubeum. Rother Spiesglanzschwefel.

Kermes minerale, Sulphur stibiatum rubeum, Oxydulum stibii hydro-sulphuratum rubrum, Hydrosulphuretum oxyduli stibii, Stibium oxydulatum hydrothionicum, Pulvis carthusianorum. Rothes, braunrothes oder Schwefelwasserstoff- Spiesglanzoxydul, Mineralkermes

Wirk. u. Anwend. Die Wirkung des Mineralkermes ist ähnlich der des Goldschwefels; sie erfolgt aber schneller und ausgebreiteter, und erregt leichter Erbrechen und Durchfall. Man wendet ihn im letzten Stadium acuter Pneumonieen, in chronischen Katarrhen, im Asthma humidum, im Croup, Keuchhusten etc., ferner in Hautkrankheiten, in chronischen Rheumatismen, in der Gicht etc. an.

Gabe u. Form. Innerlich als Brechmittel giebt man den Mineralkermes zu gr. vj-x mit einem schleimigen Vehikel, in den übrigen Fällen zu gr. ¼-j einige male täglich, in Pulver, Trochisken, Morsellen, Pillen, Mixturen und Linctus.

Mixturae.

646. Rec. Pulv. fol. digital. purp. ʒß.
Infund. in:
Aquae fontan. fervid. s. q.
Colat. ℥iv adde:
Emulsion. gumm. arab. ℥iij
Kermetis mineralis gr. vj
Syrupi althaeae ℥j.
M. S. *Allmälig in einem Tage zu verbrauchen.*

Anwend. Ist passend bei Peripneumonieen und Pleuritis, wenn es erforderlich ist, den Auswurf zu befördern, und wobei doch die hervortretende übermässige Kraft des Herzens und der Schlagadern fortdauert.

Brera.

647. Rec. Kermet. miner. gr. j
Gummi tragacanth. gr. x
Aquae ℥ß.
M. S. Löffelweise als Expectorans.

Hôp. milit.

648. Rec. Kermet. mineral. gr. iv
Mellis albi ℥j
Emulsion. simpl. libr. j.
M. S. Löffelweise zu nehmen.

Ital. Hosp.

Potio emetica.

649. Rec. Kermet. mineral. gr. ij
Oxymell. scillit. ℥j
Aquae commun. ℥iv.
M. S. Löffelweise zu nehmen.

Bories.

Potio purgans.

650. Rec. Kermet. mineral. gr. j.
Solve in
Infusi boraginis ℥xiv
antea cum
Semin. anisi pugill. j
digesti, et in quo solutae sunt
Mannae ℥ijß.
D. S. In kurzen Intervallen Tassenweise und umgeschüttelt zu nehmen

Bories.

Emulsio emetica.

651. Rec. Kermet. mineral. gr. j
Oxymell. scillit. ℥ß
Olei amygdal. dulc.
Syrup. ipecacuanh. aa ℥j
Aquae commun. ℥ij.
M. f. emulsio.
S. Löffelweise zu nehmen, bis Erbrechen erfolgt.

Bories.

Marmelada expectorans.

652. Rec. Kermet. mineral. gr. iv
Mannae in lacrymis ʒvj
Olei amygdal. dulc.
Syrupi scillit.
— polygal. aa ʒij.
M. S. Zweistündlich einen Kaffeelöffel voll zu nehmen.

Zanetti.

Linctus.

653. Rec. Sulphur. stibiat. rubr. gr. iij
Camphorae tritae gr. iv
Mucilag. gumm. mimos. ℥ß
Syrup. althaeae ℥j.
M. terendo.
S. Umgeschüttelt alle 2 Stunden 1—2 Theelöffel voll.

Anwend. Im Croup, wenn sich Gerassel in der Luftröhre einstellt.

654. Rec. Sulph. stibiat. rubei ℈ß
Kali sulphurati ℈j.
Tere cum
Syrup. seneg. ℥ij.
Adde:
Liq. ammon. anisat. ℈j.
D. S. Umgeschüttelt 2stündlich 1 Theelöffel.

Anwend. Gegen Croup, wenn Schwefelleber überhaupt angezeigt ist.

v. Hagen.

Pulveres.

655. Rec. Kermet. miner. gr. vj
Calomel. gr. iij
Sacch. albi ʒj.
M. f. pulvis. Divid. in part. aequal vj.
S. Alle 2 Stunden 1 Pulver.

Anwend. In schweren Fällen von Peripneumonie, wo grosse Dosen dieses Mittels vertragen werden, wird in der Wiener Klinik bis 9—12, selbst bis 18 Gran binnen 24 Stunden gestiegen.

Form. medic.

656. Rec. Kermet. minerai. gr. vj
Camphor. c. sacch. trit. gr. iij
Lapid. cancror. ʒiß.
M. f. pulvis. Divide in part. aeq. No. vj.

S. Alle 3 Stunden 1 Pulver.

Anwend. In der Pleuresie, wenn der Puls schwach und ungleich, oder ein leichtes Geräusch in der Brust verspürt wird; dabei ein erweichendes Decoct mit Flor. sambuc. und Vesicantien.

Quarin.

657. Rec. Kermet. mineral. gr. ij-iv
Flor. sulphur. ʒj
Gumm. tragacanth. — arab. aa ʒiß
Pulv. rad. liquirit.
Sacch. albi aa ʒij.
M. exact. f. pulvis.

S. Aller 3—4 Stunden 1—2 Kaffeelöffel.

Anwend. Im Keuchhusten.

Quarin.

658. Rec. Sulph. stib. rub. gr. ij-iij
Sacch. lactis ℈ß.
M. f. pulvis.

D. S. Auf einmal zu nehmen.

Anwend. Im Anfall des Stickflusses.

Berends.

659. Rec. Kermet. mineral. gr. ij
Ipecacuanh. gr. vj
Sacch. lact. ʒj.
M. Divid. in part. aeq. No. vj.

S. Vierstündlich 1 Pulver zu geben.

Anwend. Gegen tussis convulsiva.

Hôp. de Montp.

660. Rec. Sulphur. stib. rubr. gr. iv
Camphor. c. spirit. vini gtt. aliq. irrorat. gr. xij
Gumm. mimos.
Sacch. lactis aa ℈iv.
M. f. pulvis. Divid. in viij part. aeq.

S. Aller 3 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Bei typhöser Lungenentzündung, wenn sich der Auswurf schwer löset.

Andr. Haase.

Pulvis Guarinii.

661. Rec. Kermet. mineral. gr. ij-iv
Gummi arab.
— tragacanth. aa ʒß

*

Flor. sulphur. ʒj
Extr. liquirit.
Sacch. albi aa ʒij.
M. f. pulvis.
S. Aller 2 Stunden 1 Kaffeelöffel voll.

Anwend. Gegen convulsivische Zustände gepriesen.

Boli.

662. Rec. Kermet. mineral. gr. viij
Gummi ammoniac. cum vitello ovi triti ℈j
Oxymell. scillit. ʒß
Pulv. liquirit. s. q.
M. fiant boli octo.
S. Alle 2 Stunden 1 Stück.

Anwend. Zur Beförderung der Diaphorese und Expectoration.

Brera.

663. Rec. Kermet. mineral. gr. iv
Pulv. rad. ipecacuanh. gr. ij.
Misce et cum s. q. roob sambuci fiant boli iv.
D. S. Alle 2 Stunden 1 Stück.

Anwend. Werden mit Nutzen angewandt bei hypersthenischen Krankheiten, wo man nöthig hat, auf die Haut zu wirken, weil während des Ekels die Reizung sehr herabgestimmt wird.

Brera.

Pilulae.

664. Rec. Kermet. mineral.
Sulphur. aurat. antim. aa gr. xviij
Extr. opii aquos. gr. xij
— hyoscyami ʒij
F. l. a. pilul. 60.
S. Täglich 2—4 Stück.

Anwend. Bei hartnäckigem sogenannten nervösen Husten.

Dumeril.

665. Rec. Kermet. mineral. gr. viij
Pulv. Doveri gr. xij
Roob. sambuci s. q.
ut fiant pilul. No. vj.
D. S. Alle zwei Stunden ein Stück.

Anwend. Bei gichtischen und rheumatischen Schmerzen.

Brera.

666. Rec. Kermet. mineral.
Mercur. dulcis
Roob sambuci s. q.
Misce et fiant pilulae vj.
S. *Alle 2 Stunden 1 Stück.*

Anwend. Sind vorzüglich nützlich beim Husten der Kinder, bei Verstopfungen der Unterleibseingeweide, bei Würmern.

Brera.

Pomatum antiherpeticum.

667. Rec. Kermetis ʒj
Axungiae porci ℥ß
Pulpae radic. patientiae ℥j.
M. f. unguent.
S. *Abends beim Schlafengehen die Flechten damit einzureiben.*

Pierquin.

LXIII. Antimonium oxydatum album. Weisses Spiessglanzoxyd.

Antimonium diaphoreticum ablutum s. simplex, Acidum stibiosum et stibicum, Oxydum antimonii s. stibii album, Mercurius vitae, Materia perlata Kerkringii, Pulvis Algarothi. Ausgelaugtes weisses Spiessglanzoxyd, schweisstreibender Spiessglanz.

Wirk. u. Anwend. Ehedem wurde dieses Mittel als Sudorificum bei rheumatischen und katarrhalischen Krankheiten, so wie überhaupt da, wo man die Hautausdünstung befördern wollte, angewendet. Später verwarf man diesen Gebrauch, weil man glaubte, dass es sich gegen den Körper indifferent verhalte oder wenigstens sehr schwache Wirkungen äussere. In neuerer Zeit ist es wieder in Aufnahme gekommen, und in fieberhaften Krankheiten, fieberhaften Exanthemen, Pleuresieen, Rheumatismus etc. gebraucht worden.

Gabe u. Form. Man reicht es zu 5—30 Gran p. d. alle 2—4 Stunden, in Pulver, Pillen, Latwerge, Schüttelmixtur etc.

Mixturae.

Potio antipleuritica.

668. Rec. Antimon diaphoret. ʒß
Kali nitrici ʒj
Tisanae pectoral. ℥iv
Syrup. rhoeados ℥j.

M. S. Löffelweise zu nehmen.

Pierquin.

669. Rec. Aquae sambuci ℥v
Antimonii diaphoret. ʒß
Oxymell. scillit. ℥j.

M. S. Alle zwei Stunden ein halbes Theeköpfchen voll.

Anwend. In rheumatischen und katarrhalischen Fiebern.

Tissot.

Pulveres.

670. Rec. Antimon. oxydat. alb.
Crystallor. tartar. aa ℈j
Diagrydii sulphurat. gr. xij
Croci gr. iij.

M. S. Acht Stunden vor dem Anfall eine solche Gabe zu nehmen.

Anwend. Gegen hartnäckige kalte Fieber, und dabei einen Trank von bittern Kräutern und Wurzeln.

Fordyce.

Pulvis febrifugus Mortonii.

671. Rec. Flor. chamom. ℈j
Antimon. diaphoret.
Kali carbonic. aa ℈ß.

M. S. Alle 5—6 Stunden eine solche Gabe zu nehmen.

Pulvis resolvens Stahlii.

672. Rec. Antimonii diaphoret.
Kali nitrici
Testar. ostreae praeparat. aa ℥j.
Misce triturando.

Anwend. Wirkt einschneidend, schmelzend und auflösend, und wurde ehedem in den meisten schweren Krankheiten verschrieben.

673. Rec. Pulv. resolv. Stahlii ℥iß
— cort. cascarill. ℥ß.

M. S. ℈ß — ʒß *und mehr zu geben*

Anwend. In Brustkrankheiten, Durchfall und Ruhr empfohlen.

Pharm. Wirtemb.

Pilulae tonicae et antispasmodicae.

674. Rec. Antimon. diaphoret. lot. ʒß
Croci mart. aperit ℈iv

Pulv. scillae ℈j
Gummi ammoniaci ʒij
Extr. dulcamar. ℥ß
— juniperi s. q.
ut. fiant pilulae pond. gr. v.

Anwend. Gegen Wassersucht.

Dumas.

LXIV. Antimonium sulphuratum nigrum. Schwarzes Schwefelspiessglanz.

Antimonium crudum s. nativum, Sulphuretum antimonii crudum, Stibium sulphuratum nigrum, Antimonii sesquisulphuretum. Rohes, natürliches Spiessglanz, roher Schwefelspiessglanz, graues Spiessglanzerz.

Wirk. u. Anwend. Es ist das mildeste, aber auch das unverdaulichste Spiessglanzpräparat, und erregt desshalb leicht Verdauungsbeschwerden und Ekel, weil es sich im Magen leicht oxydirt, daher es mit absorbirenden Mitteln gegeben werden muss. Es ist ein gutes Präparat gegen Verschleimungen, veraltete Katarrhe, schleimiges Asthma, chronische Hautkrankheiten, Krätze, Flechten, Kopfgrind, Milchborke, Weichselzopf, alte Geschwüre, chronische Gicht und Rheumatismus und solche Leiden, die auf den Missbrauch des Arseniks, Quecksilbers, Bleies u. s w. erfolgen. Aeusserlich braucht man es als zertheilendes Pflaster gegen Gichtknoten, Balggeschwülste etc

Gabe u. Form. Man giebt es zu 5—10 Gran in Pulver-, Morsellen-, Bissen- und Latwergenform, selten in Abkochung, ausser etwa noch in einigen alten Compositionen, wie in den Decocten von Fels und Pollin.

Pulveres.

675. Rec. Antimonii sulphurat. nigri alcoh. ʒß
Magnes. subcarb. gr. v
Cinnamom. gr. iv
Sacch. albi ʒß.
M. f. pulvis.
S. *Früh und Abends die Hälfte zu nehmen.*

Anwend. Gegen Skropheln, Flechten, Gicht.

Hufeland.

676. Rec. Antimon. sulph. nigr. alcoh.
Spongiae combustae
Sulphur. depurat.
Herb. cicutae

Conchar. praep. aa ℥ß.
M. f. pulvis.
S. Früh und Abends einen mässigen Theelöffel voll.
Anwend. Gegen Kropf.

Kortum.

677. Rec. Antimonii crudi ℥ß
Sacchari albi ʒv
Magnesiae ʒj
Flor. cassiae ʒß.
M. f. pulvis.
D. S. Alle 3 — 4 Stunden 1 Theelöffel.
Anwend. Gegen Krätze.

Fried. Jahn.

682.

Pulvis psoricus Pideriti.

678. Rec. Antimonii crudi
Sulphuris citrini aa ℥ß
Arcani duplicati ℥j
Rad. jalapae
Flor. cassiae aa ʒij.
M. f. pulv. subtiliss.
S. Einem Erwachsenen ʒß — j täglich 2 — 3mal, Kindern von 8 — 10 Jahren ℈j — ʒß, und nebenbei die weisse Präcipitatsalbe von Zeller einzureiben.

Pulvis purificans Jasseri.

683.

679. Rec. Antimon. crudi
Flor. sulphuris
Nitri depurat.
Rad. irid. flor. aa gr. x.
M. f. pulv. subtiliss. Dent. tal. dos. q. l.
S. Früh und Abends ein solches Pulver in einem halben Glase Zuckerwasser zu nehmen, und lange fort zu brauchen.
Anwend. Bei impetiginösen Krankheiten empfohlen.

Pulvis antimonialis s. purificans Kämpfii.

684.

680. Rec. Stibii sulphurat. nigr. laevig. ℥ß
Magnes. carb. ʒiij
Cort. aurant. sicc. ʒj
Sacchari albi ʒv.
M. f. pulv.
D. S. Täglich 2mal 1 Theelöffel voll.

681. Rec. Hydrargyri oxyd. rubri gr. ij

Stibii sulphurat. nigr. ℈viij
Sacchari albi ℈ij.
Conterantur exactissime. Divid. in xvj part. aeq.
S. Morgens und Abends ein Pulver.

Anwend. Gegen hartnäckige eingewurzelte Syphilis. Bei der jedesmaligen Wiederholung werden der ganzen Formel zwei Gran rothes Queksilberoxyd hinzugesetzt, bis die ganze Formel sechszehn Gran desselben enthält.

Berg.

Morsuli antimoniales Kunkelii.

682. Rec. Amygdal. dulc. excort. ℥j
Sacch. albi ℥vj.
Contundantur simul in massam molliorem; dein adde:
Pulv. cardamom. minor. ℥ß
— cinnamom. ʒij
Stibii sulph. nigr. laev. ℥j
Conchar. praeparat. ʒj
Mucilag. gumm. tragacanth. s. q.
ut f. tabellae pond. gr. xxiv.
Jede Morselle enthält etwa 2 gr. Antimon.

Anwend. Gegen Skropheln, Flechten etc.

Rotulae.

683. Rec. Stibii sulphurat. nigri ʒvj
Resin. guajaci nativ. ʒiij
Extr. aconit. ʒj
Mucilag. tragacanth. s. q.
ut. fiant rotulae No. xx vel. xl.
D. S. Viermal täglich ein Stück.

Weikard.

Trochisci.

684. Rec. Pulv. antimon. crudi ℥ß
Elaeosacch. citri ℥j
Pulv. flor. cassiae ʒß
Mucilag. gumm. tragacanth. s. q.
ut f. trochisci No. 48.
D. S. 2—4 Stück täglich.

Anwend. Gegen Skropheln, Hautausschläge etc. Jedes Küchelchen enthält 3 Gran Antimon.

Fleisch.

Pilulae.

685. Rec. Stibii sulph. nigr. laevig. ℥ß
Asae foetid. ʒiß
Extr. conii maculat. ʒj
— aconiti ʒß.
M. f. pilul. gr. ij.
D. S. Täglich 8 Stück.
Anwend. In der Gicht.

Stoll.

Pilulae antimoniales Kleinii.

686. Rec. Stibii sulphurat. nigr. ℥j
Resinae guajaci ʒij
Extr. fumariae
vel
Extr. dulcam. s. q.
ut fiant. pilul. gr. ij.
D. S. Täglich viermal 5—6 Stück.
Anwend. Gegen Gicht, chronische Hautausschläge.

687. Rec. Antimoni crudi ʒß
Gummi guajaci nat.
Extr. dulcam. aa ʒj
— tarax. q. s.
Fiant pilul. gr. iij. Consp. pulv. cinnam.
D. S. Aller 2 Stunden 2 Stück zu nehmen.
Anwend. Gegen rheumatische Gelenkschmerzen.

v. Hildenbrand.

LXV. Antimonium tartarisatum.
Spiesglanzweinstein.

Tartarus emeticus s. stibiatus, Tartras lixiviae stibiatus, Tartras stibii, Tartarisatum antimonii, Tartras potassae stibiatus, Kali stibioso-tartaricum, Deutotartras potassii et stibii. Brechweinstein, weinsteinsaures Spiesglanzoxyd-Kali.

Wirk. u. Anwend. Der Brechweinstein erzeugt vorzüglich schnell und leicht die Antimonialwirkungen. Innerlich genommen wirkt er zunächst auf den Magen und obern Theil des Darmkanals, von wo aus sich seine Wirkung weiter und über das ganze Hautsystem ausbreitet. In übermässiger Gabe wirkt er als Gift, indem er eine Magenentzündung hervorruft. In grossen Gaben erregt er Ekel, Erbrechen und Laxiren. In kleinen Ga-

ben bethätigt er die Absonderung auf den Schleimhäuten, vermehrt die Transspiration und wirkt eigenthümlich umstimmend auf die Nerven des Unterleibes und der Brust. Man wendet ihn zunächst als Brechmittel überall da an, wo die brechenerregende Methode angezeigt ist, besonders in Fiebern, wo man nicht nur den Magen, sondern auch den Darmkanal von Unreinigkeiten zu befreien hat. In kleiner, gebrochener Gabe reicht man ihn in katarrhalischen, rheumatischen, exanthematischen, noch mehr in gastrischen und leichten Gallenfiebern, bei innern Entzündungen des Gehirns und seiner Häute, Pneumonie, Pleuritis, gegen metastatische und solche Wechselfieber, denen Abdominalstockungen zum Grunde liegen, ferner bei Verschleimungen und Verhärtungen der Unterleibsorgane und anderer drüsigen und parenchymatösen Theile, bei Skrophelsucht, Tuberkelbildung, Hodenanschwellung, veralteten Katarrhen und Blennorrhöen, bei Wassersuchten von unterdrückter Transpiration oder Exanthemen, eingewurzelten rheumatischen und gichtischen Beschwerden, Gelbsucht, Flechten, chronischen Nervenkrankheiten, Epilepsie, Veitstanz, beginnender Amaurose und Taubheit, Lähmung u. s. w., und endlich als Nauseosum bei Geistes- und Gemüthskrankheiten, Wahnsinn, Säuferwahnsinn, Tobsucht, Blödsinn etc. — Aeusserlich auf die Haut gebracht, erregt der Brechweinstein einen papulösen Ausschlag, welcher in Pusteln und tiefe, mit eiterartiger Flüssigkeit sich anfüllende Geschwüre übergeht. Man bedient sich daher desselben, wenn man unterdrückte Hautausschläge und veraltete Geschwüre wieder hervorrufen, rheumatische und gichtische Leiden innerer Theile auf die Oberfläche des Körpers zurückführen, schleichende Entzündungen heben und Eiterungen innerer Organe mässigen will.

Gabe u. Form. Man reicht den Brechweinstein innerlich häufiger in Auflösung als in Pulver- und Pillengestalt. Um Brechen zu erregen, genügen für einen Erwachsenen meistens 4 Gran. Will man eine Ekel erregende Wirkung, so giebt man in den gewöhnlichen Fällen $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ Gran, bei tief gesunkener Empfindlichkeit des Gangliensystems aber 2 Gran und darüber, aller 2—3 Stunden. Zur äusserlichen Anwendung verordnet man ihn ebenfalls in Auflösung, oder in Salben- und Pflasterform.

Mixturae.

Emetica.

688. Rec. Tart. stibiat. gr. iij-vj.
Solve in
Aquae destillat. ℥ij.
S. Anfangs 2 Esslöffel, dann alle 10 Minuten 1 Esslöffel, bis Erbrechen erfolgt.

689. Rec. Tart. stibiat. gr. iij-iv.
Solve in
Aquae destillat. ℥iß.
Adde
Oxymell. scillit. ℥ß.
M. D. S. Alle 10—15 Minuten einen Esslöffel, bis etwa dreimal Erbrechen erfolgt.

690. Rec. Tartar. stibiat. gr. j
Pulv. rad. ipecac. ʒj
Aquae. flor. tiliae ℥j
Oxymell. scillit. ℥ß.
M. D. S. Theelöffelweise bis Wirkung erfolgt.
Anwend. Zum Brechen für Kinder.

Hufeland.

691. Rec. Tartar. stibiat. gr. j.
Solve in
Aquae rubi idaei ℥j
Adde:
Oxymell. scillit. ʒij
Syrup. rubi idaei ℥vj.
D. S. Brechmittel. Alle 5—8 Minuten zwei Theelöffel voll, bis dreimaliges Erbrechen erfolgt ist. Für ein Kind von einem Jahre.

Vogt.

692 Rec. Pulv. rad. ipecac. ʒß
Tart. stibiat. gr. j
Oxymell. scillit.
— simpl. aa ℥ß
Aquae flor. chamomill. ℥ijß.
M. D. S. Alle 8—10 Minuten einen Esslöffel voll, bis dreimaliges Erbrechen erfolgt ist.

Vogt.

Linctus emeticus.

693. Rec. Vini stibiati ℥ß
Oxymell. squillit.
Syrupi althaeae aa ℥iij.
M. S. Alle ¼ Stunden einen Theelöffel bis zur Wirkung.
Anwend. Brechmittel für kleine Kinder.

Berends.

Emetico-cathartica.

694. Rec. Tart. stibiat. gr. ij

Sacch. albi ℥ß
Limonad. citrin. libr. ij.
M. S. Halbstündlich ein halbes Glas voll zu nehmen.

Ital. Hosp.

695. Rec. Tart. stibiat. gr. ij
Kali sulphurati ℥ß
Jusculi carn. vitul. libr. ij.
M. Dissolve.
S. Täglich gläserweise zu verbrauchen.

Hôp. des Vén.

Vinum emetico-purgans de Roy.

696. Rec. Sennae ℥iv.
Infunde frigide per tres dies cum
Vini albi generos. libr. v et ℥iv.
Cola fortiter exprimendo et in unciis hujus fluidi xvj solve:
Tart. emetic. ʒj
Filtra.
D. S. Alle 4 Stunden 1 Löffel.

Jede Unze enthält 4½ Gran Brechweinstein.

697. Rec. Magnes. sulphuric. ℥ij
Tart. emet. gr. j.
Solve in
Aquae menth. crisp. ℥viij
Syrup. rhei ℥j.
M. D. S. Alle Stunden 2 Esslöffel, bis Wirkung auf den Stuhl erfolgt.

Vogt.

698. Rec. Tart. stibiat gr. j
Infusi sambuci ex ℥ß flor. parat. ℥viij
Roob sambuci ℥j.
M. S. Stündlich ½ Schaale voll.

Anwend. Zur Beförderung der Hautausdünstung.

699. Rec. Tart. stibiat. gr. vj
Nitri puri ʒij
Aquae flor. sambuc. ℥vj
Syrupi simpl. ℥ß.
Solve.
S. Stündlich unausgesetzt, wenn auch Brechen erfolgt, 1 Esslöffel voll.

Anwend. Bei entzündlichen Brustaffectionen.

Brosius.

700. Rec. Aquae flor. sambuc. ℥v
Kali nitrici ℥ß
Antimon. tartaris. gr. iij
Syrup. commun. ℥j
D. S. Alle 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen hitzigen oder chronischen Rheumatismus.

Thilenius.

701. Rec. Tart. stibiat. gr. v
Emuls. camphorat. ℥x.
D. S. Löffelweise zu nehmen.

Anwend. Als Diaphoreticum und Alterans.

Potus antiphlogisticus Brerae.

702. Rec. Decocti hordei libr. ij
Tart. emetic. gr. ij
Mellis despumat. ℥j.
D. S. Während eines Tages zu verbrauchen.

Anwend. Bei hitzigen Fiebern, wenn den ersten Anzeigen Genüge geleistet ist, der allgemeinen entzündlichen Anlage, den gastrischen, plethorischen oder örtlich enzündlichen Complicationen. Es bewirkt ein leichtes Vonstattengehen der Excretionen und befördert die Krisen.

Apozema contrastimulans Laenneccii.

703. Rec. Tart. stibiat. gr. vj - xij
Infusi fol. aurant. ℥xij
Syrupi simpl. ℥ij.
M. S. Aller zwei Stunden den sechsten Theil zu nehmen.

Anwend. Gegen Entzündung der Lungen, der Pleura, der Hirnhaut, hitzigen Rheumatismus etc., nachdem bei heftiger Entzündung, besonders der Lungen, ein oder mehrere Aderlässe vorausgeschickt worden sind.

Potio contra anginam membranaceam.

704. Rec. Tart. stibiat gr. jß
Syrup. ipecac. ℥j
Oxymell. scillit. ℥iij
Infusi polygal. ℥iv.
M. S. Löffelweise zu geben.

Anwend. Beim Croup, um die Ausscheidung der dabei vorkommenden Membranen zu befördern.

Hôp. des Enf.

705. Rec. Tart. stibiat. gr. v
Aquae destillat. ℥j
Pulv. rad. ipecacuanh. ℈j
Sacch. albi ʒj.

M. D. S. Von drei zu drei Minuten, bis zum ernstlichen Erbrechen, Kindern je nach dem Alter Theelöffelweise zu geben.

Anwend. Gegen Croup.

Megewisch.

706. Rec. Tart. stibiat. gr. j
Extr. cicut. gr. ij.
Solve in
Aquae comm. dest. ℥ij.
Adde:
Syrupi rubi idaei ℥ß.

M. S. Kaffeelöffelweise zu nehmen, so dass es in 2 Tagen von einem Kinde von 1—2 Jahren verbraucht ist.

Anwend. Im Keuchhusten soll diese Formel so vortrefflich wirken, dass die Krankheit binnen 48 Stunden zusehends abnimmt, und in 6 Tagen sich gänzlich verliert.

Schlesinger.

707. Rec. Tart. stibiat. gr. j.
Magnes. sulphur. ℥j
Aquae chamomill. ℥vj
Syrup. commun. ℥j.

D. S. Alle Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen gastrische Fieber, wenn die Zunge etwas trocken, stark und fest belegt, Neigung zu Erbrechen oder auch wirkliches, jedoch nicht erleichterndes Erbrechen, Appetitlosigkeit, wässrige Diarrhöe, flüchtiger Schweiss etc. vorhanden sind.

Friedr. Jahn.

708. Rec. Tart. emetic. gr. j-iij
Infusi flor. arnic. ℥v
Syrupi sacchar. ℥j.

D. S. Alle 2—3 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Amaurose.

Polidoro.

709. Rec. Tart. stibiat. gr. ij
Sal. seignett. ℥j
Extr. fellis ʒß
Aquae menth. piperit. ℥vj.
D. S. Alle 2 Stunden 1 Esslöffel.
Anwend. In der Hypochondrie mit Schleimanhäufungen in dem Unterleibe und in den Digestionsorganen.

710 Rec. Tart. stibiat. gr. j
Gumm. mimos. elect. ℥ß.
Solve in:
Aquae destillat. ℥viij.
Adde:
Aquae flor. aurant. ℥ß
Syrup. capit. papav. ℥j.
M. D. S. Zwischen den Anfällen des Wechselfiebers, (leichter Quotidian- und Tertianfieber) in der ersten Stunde 1 Esslöffel, in der zweiten 2, in der dritten 3 u. s. f. bis zum Essen. Zwei Stunden nach dem Essen wieder mit 1 Esslöffel anzufangen u. s. w.

Peysson.

711. Rec. Vini stibiat. gtt. xx
Elix. succ. liquirit. ʒß
Aq. foenic. ℥ß
Syrup. althaeae ℥j.
M. S. Aller 1½ Stunden 1 Theelöffel.
Anwend. Bei Brustleiden kleiner Kinder.

Vogt.

712. Rec. Vini stibiat. ʒiij
Tinct. thebaic. ʒj.
M. S. Alle ½ — 1 Stunde 15 Tropfen.
Anwend. Gegen rheumatische Ruhr.

Richter.

713. Rec. Vini stibiat. ʒj
— squillit. ʒiij.
M. S. Alle 2 — 3 Stunden 50 — 100 Tropfen.
Anwend. Gegen Wassersucht.

Lentin.

714. Rec. Herb. viol. tricol. ʒij
Infunde.
Aquae fervid. s. q.
Colat. ℥ij adde:

Vini stibiat. ℈j
Syrupi althaeae ℥ß.
M. S. Zweistündlich einen halben Esslöffel.
Anwend. Gegen Ansprung.

Friedr. Jahn.

Syrupus pectoralis resolvens Sellii.

715. Rec. Ammoniaci ʒj.
Solve in
Oxymell. scillit. ℥ß
Vini stibiat. ʒj
Syrup. althaeae ℥ij.
M. S. Theelöffelweise.
Anwend. Gegen chronischen Husten, Asthma etc.

Collyria.

716. Rec. Vini emetici ℥ß
Aquae rosar. ℥iv
Bals. Fioraventi ʒij.
M. S. Augenwasser.
Anwend. Bei chronischen Ophthalmieen.

Spielmann.

717. Rec. Tart. emetic. gr.ij.
Solve in
Aquae destillat. simpl. ℥j.
Adde:
Spirit. corn. cerv. ℈j.
M. S. Ein paar Tropfen ins Auge fallen zu lassen.
Anwend. Bei Flecken der Hornhaut.

Fabini.

718. Rec. Tart. stibiat.
Aloës lucid. aa gr. vj
Sacch. albi gr. viij
Aquae rosar. ℥ij.
Solv. Sign. *Augenwasser.*

Rust.

Tinctura. ophthalmica.

719. Rec. Vini stibiat. ʒiij
Tinct. thebaic. ℥ß
M.

Pharm. paup. Hamb.

Aqua ophthalmica resolvens.

720. Rec. Tartar: stibiat. gr. j

Aquae flor. sambuc. ℥ß
Tinct. thebaic. ʒj.
Solve.

Pharm. paup. Hamb.

Fomentationes.

721. Rec. Tart. emetic. ʒj.
Solve in
Aquae commun. libr. j.
S. Zu Fomentationen.

Anwend. Bei heftigen Kopfschmerzen auf die Stirn, bei Diarrhöe auf den Unterleib.

Fontanelle.

722. Rec. Tart. stibiat. ʒj
Aquae destillat. ℥viij.
D. S. Zu Bähungen mittelst Tücher.

Anwend. Bei acutem Rheumatismus mit örtlicher Affection.

Delpech.

Lotiones.

723. Rec. Tart. stibiat. ʒij
Hydrarg. muriat. corros. gr. vj
Aquae destillat. ℥iß.
Solve.
S. Die Haut mit erwärmtem Flanell und dann mit dem Wasser einzureiben, welches möglichst warm sein muss.

Anwend. Um stark und schnell die Haut zu reizen.

Hannay & Ellis.

724. Rec. Tart. emetic. ʒß-j.
Solve in
Aquae destillat. simpl. ℥vj.
M. S. Zum Waschen.

Anwend. Bei chronischen Hautauschlägen mit träger, unempfindlicher Haut, bei chronischem Rheumatismus und Gicht, Drüsenverhärtungen, kalten Geschwülsten etc.

C. J. Meyer.

725. Rec. Tart. stibiat. ʒj
Aquae bullient. libr. j
Spirit. vini camph. ℥ß.
M. S. Zum Waschen.

Anwend. Bei Brustbräune.

Goodwin.

726. Rec. Tart. emet. ℈j
Spirit. lavendul. ℥iß.
Solve.
S. Zum äusserlichen Gebrauch.
Anwend. Bei Rheumatismus, der auf einer Stelle fixirt ist. Man giesst die Flüssigkeit auf einen wollenen Lappen, reibt täglich 3mal die Stelle damit ein und legt sodann den Lappen auf. Sie wirkt als gelindes Epispasticum.

Holzhausen.

Clysmata.

727. Rec. Tart. emet. gr. iij - viij
Infusi flor. arnicae ℥xij.
S. S. Klystier.
Anwend. Bei Schlagflüssen und komatösen Zuständen.

728. Rec. Folior. sennae
Salis mirab. Glaub. aa ℥ß
Tart. emetic. gr. xij
Aquae commun. ℥x.
Senna per dimidium horae quadrantem cum aqua cocta, cola et in colatura salia solve.
D. S. Zum Klystier.

Pulveres.

Pulveres emetici.

729. Rec. Tart stibiat. gr. ij
Rad. ipecacuanh. ℈j
Sacch. albi ℈ij.
M. f. pulvis. Divid. in tres part. aequal.
S. Alle Viertelstunden ein Pulver bis zur Wirkung.

Berends.

730. Rec. Tart. emet. gr. ij
Rad. scillae marit. gr. j
— ipecacuanh. ʒß
Sacch. albi ʒjß.
M. f. pulv. Divid. in vj part. aequal.
D. S. Alle 5 - 10 Minuten ein Pulver mit Chamillenthee, bis 3maliges Erbrechen erfolgt ist.

Vogt.

---

731. Rec. Tart. emet. gr. ij
— depurat. ℥j.

*

M. f. pulvis. Divid. in part. viij aequal.
S. Täglich 3—6 Pulver in Wasser zu nehmen.
Anwend. In Fällen, wo man ohne Reizung des Gefässsystems wiederholte Darmausleerungen bewirken will.

Richter.

732. Rec. Tart. emet. gr. j
— depurat.
Gummi guajaci nat. ʒj
Pulv. rad. liquirit. ℈iv.
M. f. pulvis. Divid. in part. viij aequal.
S. Täglich drei- bis viermal ein Pulver.
Anwend. Gegen Gicht.

Richter.

733. Rec. Tart. emet. gr. ij
Camphor. rasae gr. vj
Pulv. gumm. arab. ℈j
Sacch. albi ʒj.
M. f. pulvis. Divid. in part. vj aequal.
S. Alle 2 Stunden 1 Pulver.
Anwend. Zur Beförderung der Diaphorese bei Mangel an Hautthätigkeit.

C. J. Meyer.

734. Rec. Tart. stibiat. gr. xv-xx.
Natri carbon. depurat. sicc. ℈j
Ammon. muriat. depurat. ʒj
Cort. chin. fusc. ℥j.
M. f. pulvis. Divid. in x part. aequat.
S. Täglich 3-4 Stück zu nehmen.
Anwend. Gegen Wechselfieber.

Schwartze.

Pulvis relaxans s. salino-stibiatus.

735. Rec. Tartari stibiat. gr. j
Cremor. tartari ℥ß.
Mixta exacte et divide in partes sex.
D. S. Die Gaben in grossen Zwischenräumen zu reichen, damit sie auf den Stuhl wirken.
Anwend. Bei galligen Fiebern und Unterleibsstockungen.

736 Rec. Tart. stibiat. gr. iij
Chinin. sulphur. gr. x
Semin. foenicul. ʒiß
Olei Chamom. citr. gtt. v

M. f. pulvis. Divid. in vj part. aequal. Det. in chart. cerat.

S. In der Fieberfreien Zeit zweistündlich ein Pulver.

Anwend. Gegen Wechselfieber. — Die erste Gabe bringt bald Erbrechen, bald Stuhlgang zu Wege, bisweilen auch beides nicht; aber das Fieber soll immer gleich sicher verschwinden.

Gola.

Pilulae.

737. Rec. Tart. emetic. gr. xij
Opii gr. x
Micae panis
Gummi arabici aa q. s.
Fiant pilul. ponderis grani dimidii.

D. S. Ein Stück, worauf man nach langem Zwischenraum 2, dann 3, aber nie mehr giebt.

Anwend. Bei chronischen Rheumatismen.

Broussonnet.

738. Rec. Tartari stibiat.
Extr. opii aquos. aa gr. iij
Gummi tragacanth. ℈ß
Conserv. rosar. s. q.
ut f. pilul. No. 50. Consp.

D. S. Früh und Abends 2 Stück.

Anwend. In chronischen Lungenkatarrhen.

Pariset.

Pilulae antarthriticae.

739. Rec. Tart. stibiat. in s. q. aquae destill. sol. gr. iij
Extr. aconiti ʒj
Resin. guajaci
Sapon. hispan. aa ʒij.
M. f pilul. gr. ij.

D S. Dreimal täglich 10 Stück.

Pharm. paup. Hamb.

Pilulae resolventes Schmuckeri

740. Rec. Tart. stibiat. in aqua solut. gr. xvj
Pulv. rad. rhei
Sapon. medicat.
Gummi resin. galb.
— — sagapeni aa ʒiß
Succi liquirit. s. q.
ut. f. pilulae 380. Consperg. pulv. nuc. moschat.

D. S. Zwei- bis dreimal täglich 12—15 *Stück, und mit dieser Gabe zu steigen, bis Uebelkeit eintritt.*

Anwend. Von Schmucker gegen Amaurose die mit veralteten Stockungen im Unterleibe complicirt ist, empfohlen.

Pilulae resolventes Richteri.

741. Rec. Tart. emet. in aqua solut. gr. xviij
Flor. arnicae pulv.
Rad. valerianae pulv.
Sapon. medic.
Gummi ammoniac.
Asae foetid. aa ʒij.
M. f. pilul. gr. iv.
D. S. 8—10 *Stück* 3—4*mal täglich.*

Anwend. Wie im vorigen Falle.

742. Rec. Tart. stibiat. gr. xij
Pulv. rad. valerian.
— flor. arnicae
Asae foetid. aa ʒij
Extr. pulsatill. ʒß.
M. f. pilulae gr. ij. Consperg. lycopod.
S. Täglich 3*mal* 15 *Stück.*

Anwend. In derselben Krankheit.

Rust.

743. Rec. Tart. stibiat. in s. q. aq. destill. solut. gr. vj
Castorei
Pulv. fol. sennae
— rad. rhei aa ℈j
Extr. taraxaci s. q.
ut f. l. a. pilul. gr. ij. Consp. pulv. cinnam.
S. Täglich 2—3*mal* 4—8 *Stück zu nehmen.*

Anwend. Gegen Amaurose von Abdominalleiden.

Fr. Jaeger.

Suppositorium.

744. Rec. Butyri de cacao
vel
Sevi ovill. ʒj
Tart. stibiat. gr. ij-vj.
M. f. suppositorium.

Anwend. Zur Wiederhervorrufung des Hämorrhoidalflusses. Das Stuhlzäpfchen wird über den Schliessmuskel des

Afters hinaufgebracht; es schmilzt schnell und der Tart. stibiat. bleibt mit der Schleimmembran so lange in Berührung, bis er eine lebhafte örtliche Reizung und die Art Stuhlzwang bewirkt, welcher die nothwendige Folge davon ist.

Trousseau.

Unguenta.

745. Rec. Tart. stibiat. ʒij
Sacch. albi ʒj
Adipis suill. ℥ix.
M. exactissime terendo in unguentum.
D. S. Brechweinsteinsalbe von

Jenner.

746. Rec. Tart. emetic. ʒiß
Axungiae porcin. ℥j.
M. f. terendo unguentum.
D. S. Täglich dreimal eine Haselnuss gross in die Lungengegend und Herzgrube einzureiben.

Anwend. Gegen den Keuchhusten.

Autenrieth.

747. Rec. Tart. emet. ʒij
Hydrarg. muriat. corros. gr. vj
Axung. porci ℥iß.
M. f. unguent.
S. Zum Einreiben.

Anwend. Um stark und schnell die Haut zu reizen.

Hannay.

Pomatum Fabri.

748. Rec. Tartar. stibiat. ʒß
Salis ammoniac. ʒj
Camphorae gr. xxv
Moschi gr. x
Axungiae ℥j.
Misce sedulo triturando.
S. Zum Einreiben.

Anwend. Wird bei Stockungen in den Unterleibseingeweiden, anfänglich zu ¼ Quentchen und allmälig gestiegen, eingerieben.

749. Rec. Tartar. emet. subtiliss. pulv. ʒß.
Axung. porcin. ʒvij
Unguent. hydrarg. cin. ʒj.

M. f. unguent. D.

Anwend. Nach Stockes ist bei chronischer Gastritis, nächst der Blutentleerung durch Blutegel und der Beförderung der Leibesöffnung, die längere Zeit fortgesetzte Anwendung der Gegenreize von der grössten Wichtigkeit. Zu letzteren bedient er sich dieser Salbe; sie erzeugt nur kleine Pusteln, die nicht sehr schmerzhaft sind. Nach ihrer Abtrocknung wird die Friction erneuert.

Unguenta ophthalmica.

750. Rec. Tart. emetici gr. ij-v
Mell. despumat. ℥j.
M. S. Augensalbe.

Anwend. Gegen Leukome.

van Goescher.

751. Rec. Tart. emet.
Camphor. aa gr iv
Butyr. recent. insuls. ʒij.
M. exactissime.
S. Augensalbe.

Anwend. Gegen Leukome.

Fabini.

752. Rec. Tart. emet. gr. iv
Butyr. rec. insulsi
Ol. ricini aa ʒj.
M. exact. in unguentum.
S. Früh und Abends einer Linse gross ins Auge zu bringen.

Anwend. Bei Verdunklungen der Hornhaut. Nach vorherigem gelinden Reiben des obern Augenliedes wird das Auge eine Stunde lang mit einem warmen Tuche verbunden. Die Dose des Brechweinsteins wird allmälig bis auf gr. xx gesteigert, und bei erhöhter Sensibilität des Auges der Salbe einige Tropfen Tinct. opii zugesetzt.

Witzmann.

Emplastra.

753. Rec. Tart. stibiat. ʒj
Cerat. citrin. ʒiij-vj.
M. intime.
S. Auf Leinwand gestrichen, so lange liegen zu lassen, bis Pusteln entstehen.

Anwend. Bei chronischen Ophthalmieen und allen Augenleiden, wo ein anhaltendes Zugpflaster angezeigt ist.

Auch bei kalten Geschwülsten und paralytischen Affectionen.

Himly.

754. Rec. Tart. emetic.
Emplast. diach. simpl. aa q. v.
Malax. S. Pflaster.

Anwend. Als kräftiges Reizmittel in der Nähe der Augen und auf das obere Augenlied oder die Augenbraunengegend bei Blepharoptosis paralytica.

Jüngken.

755. Rec. Tart. emet. ʒj
Emplast. diachyl. ʒiij.
M. exact. Det.
S. Auf der Herzgrube bis zur Pustelbildung zu tragen.

Anwend. Beim Stickhusten neben dem innern Gebrauch der Pulsatille.

Ramm.

Emplastrum antistrumale.

756. Rec. Tartari emetici ℈ß
Mercur. dulc. ʒj
Empl. oxydi plumbi saponacei ℥ß.
M. f. emplastr.

Anwend. Man legt es auf die Kropfgeschwulst.

Pharm. Batav. edit. Niem.

Emplastrum acre.

757. Rec. Pulv. tart. emetic.
Emplastr. vesicat.
— citrini aa ʒj
Mercur. subl. corros. pulv. gr. xiv.
Malax. Det.

Anwend. Dieses Pflaster greift schnell und tief ein, und wird angewendet, wo eine schnelle und beträchtlich in die unterliegenden organischen Gebilde verletzend dringende Wirkung auf die Haut erforderlich ist. Es zieht Anfangs Blasen, später Pusteln.

Kopp.

758. Rec. Resin. pini burgund. ℥iß
Euphorbii ʒß.
Leni igne liquatis admisce:
Tart. stibiati
Opii pulverat. aa ℈j

antea cum
Aquae destillat. paux.
in pultem trita et
Terebinth. laric. ℥j.
F. emplastrum.

D. S. Auf Leder gestrichen über den Unterleib zu legen.

Anwend. Bei Durchfällen von unterdrückter Hautthätigkeit oder dergl. Doch ist das Pflaster für eine reizbare, zarte Haut viel zu stark.

LXVI. Argentum muriaticum.
Salzsaures Silber.

Argentum salitum, Chloruretum argenti, Argentum chloratum. Chlorsilber, Hornsilber, Silberchlorüre.

Wirk. u. Anwend. Dieses Präparat wurde schon in frühern Zeiten zum medicinischen Gebrauch benutzt. Poterius rühmt es als Anthelminticum und Hydragogum; nach Fr. Hoffmann soll es sich bei der Wassersucht und Melancholie wirksam erweisen. Takenius gab es, in Verbindung mit Cinnabaris Antimonii, in der Manie, Melancholie und Epilepsie. In neuester Zeit will Serre zu Montpellier das salzsaure Silber mit dem grössten Erfolg gegen syphilitische Krankheiten angewendet haben. Ricord fand indessen die Aussagen Serre's nicht bestätigt.

Pulvis antisyphiliticus.

759. Rec. Chlorureti argenti gr. j
Pulv. rad. irid. florent. solubilis substantiae privati et bene siccati gr. ij.
Contere in mortario vitreo, temperatura aëris communi et per pannum arcte textum cola, ita ut pulvis obtineatur, in partes octo ad decem dividendus.

Anwend. Diese Portionen werden auf die Zunge eingerieben.

Serre.

LXVII. Argentum muriaticum ammoniatum. Silbersalmiak.

Chloruretum argenti et ammoniaci. Salzsaures Silberammonium.

Wirk. u. Anwend. Auch dieses Mittel ist von Serre mit Nutzen gegen die Syphilis angewendet worden. Ein anderes, gleichfalls hierher gehöriges Präparat ist von Kopp schon vor

längerer Zeit gegen chronische Nervenleiden, Epilepsie und Veitstanz empfohlen worden. Es ist der:

Liquor argenti muriatico-ammoniati.

760. Rec. Argenti nitrici fusi gr. x.
Solve in
Aquae destillat. ℥ij
Soluto, filtrato instilla:
Liquor. natri muriat. q. s.
ad praecipitandum. Praecipitatum sedulo ablutum solve in
Liquor. ammon. caust. ℥iß.
Adde:
Acidi muriat. ʒiij
vel s. q., ut praecipitatio evitetur et argentum muriaticum in in statu solutionis permaneat. Pondus fluidi filtrati aequale sit unc. ℥iiß.

Anwend. Diesen vor Luft und Licht zu bewahrenden Liquor gab Kopp 10jährigen Kindern zu gtt. iij, allmälig bis zu gtt. vj gestiegen, 3mal täglich mit destillirtem Wasser.

Pilulae antisyphiliticae.

761. Rec. Clorureti argenti et ammoniaci gr. j
Pulv. rad. irid. florent. gr. ij
Conserv. flor. tiliae q. s.
ut fiat massa maximae consistentiae n pilulas xiv dividenda.

Anwend. Zum innern Gebrauch.

Serre.

LXVIII. Argentum nitricum. Salpetersaures Silber.

1) Nitras argenti crystallisatus, Argentum nitratum, Crystalli lunae s. lunares, Nitrum lunare, Hydragogum Boylei. Crystallisirtes salpetersaures Silber, salpetersaures Silberoxyd. — 2) Nitras argenti fusus, Argentum nitratum fusum, Deutonitras argenti fusus, Lapis infernalis, Causticum lunare. Geschmolzenes salpetersaures Silber, Höllenstein.

Wirk. u. Anwend. Das salpetersaure Silber scheint innerlich vorzugsweise auf das Nervensystem und namentlich auf die Nervengeflechte der Brust- und Unterleibsorgane, daher krampfstillend zu wirken. Aeusserlich ist es unverdünnt heftig ätzend,

verdünnt belebt es die Thätigkeit der Schleim- und serösen Häute. Gewöhnlich wird das crystallisirte salpetersaure Silber zum innern Gebrauche vorgeschlagen, besonders gegen eingewurzelte Epilepsie, Veitstanz, Angina pectoris, Keuchhusten, Herzzittern und Herzkrampf, Magenkrampf, Schluchzen, chronisches Erbrechen, Kolik und Cholera spasmodica. Aeusserlich dient es als Causticum zur Zerstörung krankhafter Auswüchse, als der Condylomen, Polypen, Fleischwucherungen, Warzen, Muttermäler etc., so wie zur Aetzung laxer, atonischer, schlecht eiternder, speckiger, cälloser Geschwüre und hartnäckiger primärer Chanker. In der Augenheilkunde wendet man es gegen pannöse Wucherungen, Flügelfell, Staphylom, Gerstenkörner, sarcomatöse Entartungen der Bindehaut, chronische Ophthalmieen und Ophthalmoblennorrhöen und bei der Thränenfistel an. Verdünnt wendet man es zur Erhöhung des Bildungstriebes schlaffer, schwammiger, eine stinkende Jauche absondernder Gechwüre, ferner als Einträufelung in den Gehörgang bei puriformen Ohrenflüssen, und als Einspritzung in Fisteln und gegen Hydrocele an.

Gabe u. Form. Innerlich giebt man das salpetersaure Silber zu $\frac{1}{12}$ — $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ Gran und steigt allmälig bis 1—2 Gran, gewöhnlich in Pillenform, selten in Auflösung. Man lässt dabei schleimige Getränke und Nahrungsmittel nehmen, und setzt aus, so wie sich Magendrücken oder Uebelkeit einstellt. Aeusserlich bedient man sich des Höllensteines in seiner gewöhnlichen Gestalt zum Betupfen, oder in destillirtem Wasser aufgelöset zu Verbandwassern, Injectionen, Collyrien, Pinselsäften, Salben etc.

Solutiones.

762. Rec. Argenti nitr. fus. gr. xij.
Solve in
Aquae laurocerasi ℥j.
M. D. S. Morgens und Abends 10 — 20 *Tropfen in einem schleimigen Getränke.*

Remer.

763. Rec. Argent. nitr. cryst. gr. j
Aquae destillat. ℥j.
S. S. Alle zwei Stunden einen kleinen Löffel voll zu geben.
Anwend. Bei convulsivischen Krankheiten.

D. Hosp.

764. Rec. Argent. nitr. crystallis. gr. j
Solve in
Aquae destillat. simpl. ℥ij.
Adde:

Tinctur. opii simpl. ℈j
Mucil. gumm. mimos. ℥j.
M. D. in vitro charta nigra obducto.
S. Dreimal täglich einen Esslöffel voll.

Sundelin.

Gargarisma.

765. Rec. Argent. nitric. fusi gr. iv
Aquae sabinae ℥vj
Laud. liquid. Sydenh. ʒß.
M. D. S. Zum Gurgeln.

Anwend. Gegen syphilitische Halsbeschwerden, Schmerz beim Schlingen, Röthe an den hintern Partieen etc.

Kopp.

---

766. Rec. Argenti nitric. crystall. ʒß-j.
Solve in
Aq. chamomill. ℥vj.
Adde:
Tinct. opii simpl. ʒj-jß.
M. Det. in vitro chart. nigr. invol.
S. Verbandwasser. Umgeschüttelt mit Leinwandläppchen aufzuschlagen, und Wachstaffet darauf zu legen.

Anwend. Bei qualitativ schlechter Eiterung, oder zum Vernarben eines ganz dazu vorbereiteten, aber nun stehenbleibenden Geschwüres etc.

Kluge. — Rust.

767. Rec. Argenti nitric. fusi gr. v
Aquae destillat. ℥j.
Solve.
S. Zum Verbinden schwammiger und schwieliger Geschwüre, so wie zur Beförderung der Vernarbung von Wunden, Brandschäden etc.

Samson d. Aelt.

768. Rec. Argent. nitr. cryst. gr. viij
Aquae destillat. simpl. ℥iv.
S. S. Zum Verband.

Anwend. Bei atonisch syphilitischen Geschwüren.

Vogt.

769. Rec. Argent. nitr. fus. gr. ij-iij.
Solve in
Aquae ceras. nigr. ʒvj
Adde:

Tinct. opii ʒß.
S. *Mit Charpie aufzulegen.*

Anwend. Bei tiefen und übel aussehenden Wunden der Brustwarzen.

Mappes.

770. Rec. Argent. nitr. cryst. gr. j
Aquae destillat. ℥j.
Solve.
S. *Lauwarm einzuspritzen.*

Anwend. Bei eiterartigen Ausflüssen des Gehörganges und Caries.

Buchanan.

Injectio antigonorrhoica Burnetti.

771. Rec. Argenti nitrat. gr. x
Aquae rosar. ℥j.
S. S. *Morgens und Abends das Ganze einzuspritzen, und während dem die Harnröhre 2½ Zoll hinter ihrer Oeffnung mit der Hand zusammen zu drücken, damit die Einspritzung nicht zu tief eindringe, und nicht etwa heftige entzündliche Zufälle errege. Die Spritze muss von Horn oder Perlmutter (besser wohl von Glas) sein.*

Anwend. Heilte anfangenden Tripper binnen 24 Stunden.

Collyria.

772. Rec. Argent. nitr. crystall. gr. x
Aquae destillat. ℥j.
Solve.
S. *Ins Auge zu träufeln.*

Anwend. Bei stark eiternden, torpiden und hartnäckigen Ophthalmoblennorrhöen.

v. Graefe.

773. Rec. Argent. nitr. fus. gr. j-ij
Aquae destillat. simpl. ℥ij.
Solut. filtr. Det. in vitro chart. nigr. obducto.
S. *Augentropfwasser.*

Anwend. Bei Wucherungen der Augengebilde.

Rust.

774. Rec. Argent. nitric. cryst. ℈j
Aquae destillat. simpl. ℥jv.
Solve.
S. *Zum Einspritzen.*

Anwend. Bei Thränenfistel.

Beer.

Pulvis lunaris.

775. Rec. Nitratis argent. ʒß
Panis biscocti pulv. ʒiß.
M. f pulvis. Divid. in part. aeq. XLV.
D. S. Täglich 2—6 Stück in gemeinem Syrup.
Anwend. Bei Epilepsie, Brustbräune und in Wurmkrankheiten. Nach

Swediaur.

776. Rec. Argent. nitric. fusi gr. $\frac{1}{15}$ — $\frac{1}{12}$.
Succolat. gr. viij
Sacch. lactis gr. iv.
M. f. pulvis. Dispens. tales doses xij.
D. S. Morgens, Nachmittags und Abends oder 4mal täglich ein Stück mit Wasser zu nehmen.
Anwend. Gegen Cardialgie, Singultus, chronisches Erbrechen, Wasserwürgen, Koliken, Nervenzufälle etc.

Kopp.

Pilulae.

777. Rec. Argent. nitric. cryst. gr. v
Extr. liquirit. ℈j.
F. pilul. No. 20.
D. S. Anfangs eine bis zu sechs allmälig gestiegen, oder bis Ekel entsteht.

Pharm. castr. Ruth.

778. Rec. Argenti nitr. fusi. gr. iij.
Solve in
Aquae destillat. s. q.
Adde:
Pulv. rad. liquirit. ℈iijß.
M. fiant sine ullo alio additam. pil. No. 36. Obduc. fol. argent.
D. S. Alle 2 Stunden 1 Pille. (Des Tags 6 Stück zu nehmen.
Anwend. Wie oben. No. 776.

Kopp.

779. Rec. Argent. nitr. cryst. paux. aquae solut. gr. x
Extr. hyoscyami ℈j
— valerian. ʒj
Pulv. rad. valerian. s. q.
ut fiant pilul. No. 90.

S. Anfänglich dreimal täglich eine Pille.

Anwend. Bei Epilepsie.

Löbenstein.

780. Rec. Argent. nitric. crystall. ℈ß
Extr. gentian. ʒj
Succ. liquirit. inspiss. ʒij
Opii crudi gr. v.
M. f. pilul. pond. gr. j.
S. Morgens und Abends 3 Stück.

Reil.

781. Rec. Argenti nitr. cryst. ℈ß
Opii puri gr. vj
Extr. conii ʒij
Succi liquirit. ʒj.
M. f. pilul. gr. ij. Consp. pulv. lycopod.
S. Täglich 2mal 2—5 Stück.
Anwend. Gegen Epilepsie.

Heim.

782. Rec. Argent. nitric. cryst. gr. v
Aquae destillat. q. s. ad. solut.
Pulv. rad. columbo ℈iv
Olei anisi aeth. gtt. x.
M. f. pilul. No. 40. Consperg. lycopod.
S. Gegen Epilepsie.

Sundelin.

783. Rec. Argent. nitric. cryst. ℈ß.
Tere in mortario lapideo cum pauxillo aquae destillat.; adde:
Rad. althaeae pulv.
Sacch. albi pulv. aa ʒiß
Aquae destillat. s. q.
ut f. massa pilul., e qua forment. pilul. 90. Consp. pulv. rad. althaeae. Dent. in vitr. bene clauso.
S. Morgens und Abends 3 Pillen in allmälig steigender Gabe.

Chemisch reine Silbersalpeterpillen von

J. Fr. Simon.

784. Rec. Argent. nitric. cryst. ℈ß.
Solve in
Aquae destillat. s. q.
Opii pulverat gr. vj
Resin. guajaci nativ. pulv. ʒiij.
M. f. pilul. gr. ij. Dent. ut supra.

S. Morgens und Abends 3 Pillen und allmälig bis auf ʒß gestiegen.

Anwend. In der Brustbräune.

Zipp & Harder.

785. Rec. Argent. nitric. fus. gr. vj
Extr. gummos. opii ʒj
Moschi ℈ij
Camphor. ℈iv.
M. f. l. a. pilul. No. 96.

D. S. Anfangs früh und Abends eine, nach und nach zwei, drei und mehr Pillen zu geben. Eine Pille enthält $\frac{1}{12}$ *gr. Argent. nitr.*

Anwend. Gegen Epilepsie, nervöses Zittern und Lähmung.

Hôp. de Paris.

Pilulae arcanae Heimii contra epileps.

786. Rec. Argenti. nitric. fusi ℈ß
Extr. gentian. rubr.
Succi liquirit. aa ʒß
Opii puri gr. j.
M. f. pilul. gr. ij.

D. S. Jedesmal 5 — 6 Stück.

Anmerk. Diese Pillen waren ein Geheimmittel des Pfarrers Heim zu Effelder in Sachsen. Sie mussten Monate lang ununterbrochen fortgebraucht werden, so lange als der Kranke keine Uebelkeit darauf empfand.

Unguentum nigrum Frickii.

787. Rec. Argent. nitric. crystallis. ℈j
Zinci oxydat.
Bals. peruvian. aa ʒj
Adipis suilli loti ℥j.
M. exact. f. unguent.

S. Zum Verband.

Anwend. Gegen Chankergeschwüre und als kräftiges Mittel zur Beschleunigung des Vernarbungsprocesses gegen Excoriationen, die von Neuem wieder aufbrechen etc.

Unguentum ophthalmicum magicum Guthrie.

788. Rec. Argent. nitric. in pulv. subtiliss. triti gr. ij-x
Unguenti cetacei ʒj.
Intime in mortario porphyr. mixtis, sensim adde terendo:

Liquor. plumbi subacetici gtt. xv.

D. S. Ein Roggenkorn gross unter das obere Augenlied zu bringen, die Lieder darauf gelind zu reiben, und was aus ihnen hervortritt abzuwischen.

Anwend. Gegen acute und chronische katarrhalische Augenliederentzündungen.

Unguentum ophthalm. argenti nitrici Graefii.

789. Rec. Argent. nitric. cryst. subt. pulv. gr. iij
Adipis suilli ℥j
Aceti plumbici gtt. v.
M. exactiss. Det. in olla alba.

S. Augensalbe, in sehr geringer Quantität alle 3—2—1 Tage zu appliciren.

Anwend. Gegen idiopathische, besonders aber gegen skrophulöse, veraltete, mit Auflockerung der Palpebralbindehaut verbundene Augenblennorrhöe und gegen chronische, mit Pannusbildung und Hornhauttrübungen verbundene Coniunctivitis.

Guthrie. — v. Graefe.

LXIX. Armoracia s. Raphanus rusticanus. Meerrettig.

Cochlearia officinalis. L. Meerrettig-Löffelkraut.

Wirk. u. Anwend. Die frische Wurzel des Meerrettigs oder Kreens besitzt ein flüchtig scharfes Oel, vermöge dessen sie sehr erregend auf die Organe der Digestion wirkt, die Absonderung des Magen- und Darmsaftes vermehrt, die Aufsaugung der Säfte und die Bewegung derselben durch die lymphatischen Gefässe befördert und die Harnsecretion steigert. Die zerriebene Wurzel bewirkt, auf die Haut gelegt, Entzündung derselben und zieht Blasen. Man benutzt sie innerlich bei Schwäche der Verdauung, bei Schleimanhäufung, in der Wassersucht als Diureticum, bei Steinbeschwerden, im Scorbut, bei Stockungen und Verschleimungen der Lungen, chronischen Rheumatismen und gichtischen Affectionen, auch gegen Amenorrhöen und Chlorosen. Aeusserlich dient sie als Rubefaciens, wo überhaupt Haut- und ableitende Reize angezeigt sind.

Gabe u. Form. Innerlich in Substanz als diätetisches Mittel, rein oder mit etwas Weinessig, oder als frisch ausgepresster Saft mit Wasser und Zucker gemildert, zu einem Esslöffel, oder in Aufguss (℥j-ij mit Wasser, Bier, Weinessig libr. j-ij). Aeusserlich in Substanz als Kaumittel, Epispasticum, zu Mund- und Gurgelwässern und zu Fussbädern.

Infusa.

790. Rec. Rad. armorac. rec. concis. ℥j
Aquae fervid. ℥ij.
Digere, cola et dein adde:
Sacchari albi q. s.
ad grat. sapor.
D. S. Von Zeit zu Zeit einen Theelöffel voll langsam hinabzuschlucken.
Anwend. Bei chronischer Heiserkeit.

Thomson.

791. Rec. Rad. armorac. ras. ℥ij
Semin. sinapeos nigr. contus. ℥j
Cerevisiae libr. ij.
Macera per horas octo. Colat. adde:
Syrupi cort. aurant. s. q.
ad gratum saporem.
M. D. S. Tassenweise zu gebrauchen.
Anwend. In der Wassersucht.

Schubarth.

792. Rec. Rad. armorac. recent. ℥v
Cerevisiae libr. ij.
Digere, cola et adde:
Syrupi communis ℥j.
M. S. Tassenweise, den Tag über oder in 2 Tagen zu verbrauchen.
Anwend. Ein wohlfeiles und ungemein kräftiges diuretisches Mittel bei Dysurie, Ischurie, Wassersucht und Verschleimung der Harnorgane.

Hufeland.

793. Rec. Rad. armoraciae ℥j.
Infunde
Aquae bullient. libr. j
Stet per horam in loco calido. Colat. adde:
Syrup. simpl. ℥iß.
M. D. S. Täglich zu verbrauchen.
Anwend. Gegen die Bright'sche Nierenkrankheit. Dabei geniesst der Kranke noch Meerrettig zu seinen Speisen, und erhält bei träger Darmfunction Crotonpillen. Die darauf leicht entstehenden Schmerzen im Magen, Schlund und Oesophagus verlieren sich nach der Anwendung von Alkalien. Die Kur wird damit eingeleitet, dass blutige Schröpfköpfe zu beiden Seiten der Nierengegend applicirt und nachher kleine, einige Wochen offen zu erhaltende

Blasenpflaster gelegt werden.

Huss.

794. Rec. Rad. armorac. rasae ℥iij
— zingiberis incis. ʒij
Ferri pulverat. ℥j
Vini gallici albi libr ij.
Macera per nychthemerum. Cola et filtra.
D. S. 3—4*mal täglich* ½—1 *Tasse.*

Anwend. Bei scorbutischen und chlorotischen Uebeln.

Angustin.

Succus expressus.

795. Rec. Succ. rec. expr. rad. armorac.
— — — herb. nasturtii aquat. aa ℥j.
Succos colatos et decanthatos misce.
D. S. In einem Tage zu verbrauchen mit etwas Rheinwein.

Anwend. Als Unterstützungsmittel beim Scorbut. Die Formel ist nur im Frühling, höchstens im Frühsommer zu gebrauchen.

Syrupus.

796. Rec. Raphani in tenues lamellos sect. q. s.
Inspergantur
Salis ʒij
Sacchari ℥ß.
Inde collectus et pressus succus sit ℥v.
D. S. Löffelweise.

Anwend. Bei Scorbut und Schleimanhäufungen in den Lungen.

F. X. Hartmann.

Cataplasma.

797. Rec. Rad. armoraciae rec. ras.
Farin. semin. sinapeos
Micae panis comm. aa ℥j
Aceti vini q. s.
ad consistent. sinapismi.
Det. ad fictil.

LXX. Arnica. Wohlverleih.

Arnica montana Linn. Fallkraut, Luzianskraut, Engelkraut, Engeltrankswurzel, Mutterwurz.