Dritter Abschnitt.

Arzneiformeln für die Therapie der Folgekrankheiten des Trippers.

1. Nachtripper.

Erstes Kapitel.

Arzneiformeln zum innerlichen Gebrauche.

N°. 268.

Vorschriften zu belebenden und stärkenden Ptisanen, bei sehr schwächlichen abgelebten Personen im Nachtripper zu verordnen.

℞. Pulv. cort. cinnamomi
— rad. caryophyllat.
— macis ana ℥β.
Infunde cum
Vini albi gallic. ℔jj.
Digere leni calore per hor. xjj.

In colatura solve
Sacch. alb. ℥iv.
S. Halbe Theetassenweise zu trinken.

N°. 269.

℞. Rad. chinae conc. ℥ß.
Passul. minor. cont. ℥jß.
Coque cum
Aqu. font. ℔iv.
Colaturae adde
Syr. cerasor. nigr. ℥jß.
Aceti vini opt. ℥j.
M. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

N°. 270.

Fels'sche Ptisane, sehr wirksam beim Nachtripper.

℞. Succ. catechu ℥ß.
Infunde cum
Aqu. fervid. ℔jj.
Colat. adde
Tinct. columbo ʒjj.
M. S. Früh und Abends zwei Tassen.

N°. 271.

Lind's Limonade, welche sich nach ihm und Andern besonders für den Nachtripper eignet, welcher durch krankhafte Reizbarkeit bedingt wird.

℞. Mixtur. sulph. acid. ʒjß.
Syr. berber. ℥jj.
Aqu. font. ℔jj.
M. S. Zum Getränk.

N°. 272.

Ptisane, im *Hôpital des Vénériens* zu Paris sehr häufig gegen Nachtripper aus Atonie gebraucht.

℞. Succ. catechu
Rad. consolid. maj. conc. ana ʒjjj.
Coque cum
Aqu. font. ℔jβ. ad reman. ℔j.
Colat. add.
Syr. cydonior. ℥jj.
M. S. Halbe Theetassenweise zu trinken.

N°. 273.

Cadet's Emulsion gegen veraltete *Gonorrhoe.*

℞. Bals. copaivae
Syr. de Tolu
Gm. arab. ana ℥j.
Aqu. rosar. ℥vj.
Spir. nitr. dulc. ℥j.
M. f. emuls. S. Beim Schlafengehn die eine, am andern Morgen die andere Hälfte zu nehmen, und diess einige Tage zu wiederholen.

N°. 274.

Gegen hartnäckigen Nachtripper.

℞. Bals. copaivae ʒjj.
Magnes. carb. ℈β.
Ol. amygd. dulc. ʒjβ.
Syr. ononid. spin. ʒvj.
Terantur et subigantur omnia, et simul terendo gradatim adfundantur
Aqu. cerasor. nigr. ℥vj.

M. S. Alle 2 Stunden wohl umgeschüttelt einen Esslöffel.

No. 275.

Walch's Emulsion gegen Nachtripper.

℞. Bals. peruv. ʒjjj.
Vitell. ovor. No. jjj.
Tere cum
Aqu. font. ℥v.
— cinnam. vinos. ℥j.
Syr. ejusd. ℥β.
M. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.

No. 276.

Fricke's Mischung gegen Nachtripper.

℞. Vitell. ovor. No. jj.
Acet. vin.
Ol. olivar. ana ℥jjj.
Bals. peruv. ʒvj.
M. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel voll.

No. 277.

Cooper's Mixtura adstringens, gegen Nachtripper sehr empfohlen.

℞. Decoct. fol. uvae ursi ℥vjj.
(ex ℥β. c. Aqu. ℥xvj. ad ℥vjj. par.)
Tinct. Kino
Syr. zingiber. ana ℥β.
M. S. In getheilten Dosen zu nehmen.

N°. 278.

Wendt's Formel für den durch krankhafte Reizbarkeit bedingten Nachtripper.

℞. Dcti salep tenuior. ℥vj.
Mixt. sulph. acid. ʒβ.
Syr. rub. idaei ℥j.
M. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel voll.

N°. 279.

Potio tonica et adstringens gegen Nachtripper.

℞. Aq. rosar. ℥iv.
Tinct. catechu ʒj.
Extr. Kino ℈j.
Syr. aceti vini ℥j.
M. S. Löffelweise den Tag über zu nehmen.

N°. 280.

Ein anderes Mittel gegen hartnäckigen Nachtripper.

℞. Succ. catech. ʒj.
Extr. ratanhiae ʒvj.
Aqu. cinnam. ℥v.
Mixt. sulph. acid. ʒj.
Syr. de Tolu ℥jβ.
M. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

NB. Mit diesem Mittel stillte sich schnell ein Nachtripper, welcher schon 6 Wochen gedauert hatte.

N°. 281.

Walch's Mittel, bei schlaffer, sensibler Constitution, wo oft der schon gehemmte Ausfluss nach einem mässigen Diätfehler wiederkehrt, zu empfehlen.

℞. Pulv. cort. peruv. opt.
Limat. mart. alcoh. ana. ℥β.
Infunde
Vini rhenan. ℔jj.
Stent in digestione frigida
saepius agitando.
D. S. Alle 3 Stunden eine halbe Tasse voll zu trinken.

N°. 282.

Ein anderes von *Walch*.

℞. Cort. chinae reg. opt. ʒvj.
Inf. Aqu. fervid. q. s. per ½ hor.
Colat. refrig. ℥vjjj.
adde
Tinct. opii simpl. gtt. vjjj.
Syr. bals. peruv. ℥j.
M. S. Alle 2 Stunden 2 Esslöffel voll.

N°. 283.

Berühmte Formel gegen Nachtripper

℞. Infus. Seneg. ℥jv.
solve
Extr. nuc. vomic. gr. vjjj.
— ratanh. ʒjj.
adde
Spir nitr. dulc. ʒj.
Syr. sacch. ℥j.
M. S. Täglich 4 mal einen Esslöffel voll.

N°. 284.

Müller rühmt folgendes Mittel beim Nachtripper:

℞. Rad. Senegae conc. ℥ß.
Coque cum
Aqu. font. ad col. ℥jv.
solve
Sal. ammon. dep. ℈jv.
et adde
Syr. ammoniaci ℥j.
M. S. Alle zwei Stunden 1 Esslöffel voll.

N°. 285.

Solution des *Extr. boraginis*, von *Montfils* im *Journ. de méd.* gegen Nachtripper empfohlen.

℞. Extr. borag'n. ʒjj.
solve in
Aq. cinnamom. ℥jjj.
adde
Syr. de Tolu ℥ß.
M. S. Früh und Abends einen reichlichen Esslöffel.

N°. 286.

Wendt räth, die Canthariden in Emulsion zu geben.

℞. Pulv. cantharid. gr. jjj.
— gmm. mimos ʒjj.
Sacch. alb. ʒvj.
Amygd. dulc. excort. ℥j.
f. l. a. emuls. cum
Aqu. destill. ℥vjjj.
S. Alle 2 Stunden 1 Esslöffel voll.

N°. 287.

Wyllie's äusserst wirksamer *Linctus* gegen Nachtripper.

℞. Bals. copaiv.
Mixt. sulph. acid.
Spir. nitr. aeth.
Tinct. catechu ana ʒjβ.
Syr. de Tolu ℥jj.

M. S. Wohlumgeschüttelt täglich 4 mal zwei Theelöffel voll zu nehmen.

N°. 288.

Schmidt's Linctus gegen Nachtripper.

℞. Bals. copaiv. ʒj.
Spir. nitr. aeth. ʒjβ.
Syr. ononid. spin. ℥jβ.

M. S. Wohlumgeschüttelt 4 mal des Tages einen Theelöffel voll zu nehmen.

N°. 289.

Stark's Mischung gegen den Nachtripper.

℞. Tinct. catechu
— chinae ana ʒjβ.
— thebaic. ʒj.

M. S. Alle 2 bis 3 Stunden 20—25 Tropfen zu nehmen.

N°. 290.

Ein anderes Mittel.

℞. Tinct. lignor.
— kalin.
Bals. copaiv. ana ʒjj.

M. S. 3 mal täglich 30 Trofen in einer Tasse eines schleimigen Decoct's zu nehmen.

N°. 291.

Ein anderes Mittel.

℞. Ol. succin. rect.
Bals. copaiv.
Terebinth. venet. ana ʒjj.

M. S. Täglich 3 mal 30 Tropfen in einem Kaffeelöffel klaren Zucker, worauf bald nachher ein Glas rother Wein getrunken wird.

NB. Man kann mit diesem Mittel bald bis zu 60 Tropfen steigen. Der ausgezeichnete Nutzen dieser Tropfen bewährt sich in allen chronischen Schleimflüssen der Harnröhre, so wie beim *fluor albus.*

N°. 292.

Sovärd's Anwendungsweise des *Oleum aethereum bals. copaiv.* im Nachtripper.

℞. Ol. bals. copaiv. ʒjjj.
— caryophyll. gtt. vj.
Spir. nitr. dulc. ʒj.

M. S. Viermal täglich 24, 30—40 Tropfen zu nehmen.

N°. 293.

Falk's Tinctur gegen Nachtripper aus Atonie.

℞. Bals. canadens. ʒjβ.
Gm. quajac. ʒβ.
Spir. vini rectif. ℥jβ.

Digere leni calore, dein faecibus
subsidentibus tincturam limpidam
cola, et colaturae adde
Ol. menth. pip. ℈β.
M. S. Zu 40 Tropfen täglich 2—3 mal zu nehmen.

N°. 294.

Cantharidentinctur, nur bei höchster Schwäche, vielleicht allein bei gleichzeitiger Impotenz und Unvermögen den Urin zu halten, anzuwenden.

℞. Spir. sulph. aeth. mart. ʒvj.
Bals. copaiv. ʒjj.
Tinct. cantharid. ʒβ.
M. S. Täglich 2—3 mal 25—30 Tropfen in 1 Esslöffel starken Liqueur zu nehmen.

N°. 295.

Nach *Swediaur:*

℞. Tinct. cantharid. ʒjj.
Pulv. camphor. ʒj.
M. S. 3—6 Tropfen auf Zucker zu nehmen.

N°. 296.

Electuarium, von englischen Aerzten im chronischen Tripper und weissen Fluss häufig mit Nutzen angewendet.

℞. Pulv. cubebar. opt. ʒjjj.
— cort. peruv. ℥vj. (?) —ʒvj—.
Syr. rosar. q. s. ut
f. electuar.
D. S. Alle 3 Stunden 2 Theelöffel voll.

N°. 297.

Larrey's Mittel gegen hartnäckigen Nachtripper.

℞. Bals. copaiv.
Sacch. alb. ana ℥vj.
Gm. arab. ℥jβ.
— lacc. ʒj.
Aq. menth. pip. q. s.
ut f. massa mollis.
S. Morgens und Abends 1—2 Drachmen in Oblate zu nehmen.

NB. Dabei ist Enthaltung aller rohen Speisen, eine magere Diät und Bewegung zu empfehlen.

N°. 298.

Parmentier's Bolus gegen den Nachtripper.

℞. Pulv. cort. chin. ʒjj.
— — granator. ʒj.
— catechu ʒβ.
Bals. copaiv. q. s.
ut f. boli pdre gr. xjj.
S. Früh und Abends 2 Stück, oder auch täglich 4 mal 1 Stück zu nehmen.

N°. 299.

Oder wie folgt:

℞. Bals. copaiv. ʒjj.
Gm. arab. ʒj.
Pulv. rad. liquirit. q. s.
ut f. boli No. jj.
S. Früh und Abends 1 Stück.

N°. 300.

Wendt's Pillen gegen den Nachtripper.

℞. Bals. copaiv. ℥ß.
Extr. dulcamar. ʒjj.
Pulv. rhei opt. ʒj.
— gm. arab. q. s.
ut. f. l. a. pil. gr. jj. consp. lycop.
D. S. 4 mal 7—8 Stück zu nehmen.

N°. 301.

Wyllie's sehr gerühmte Pillen gegen den Nachtripper.

℞. Bals. copaiv. ʒjj.
Gm. Kino ʒj.
Pulv. rad. althaeae ʒjj.
M. f. c. pauxillo Aq. dest. massa pil. ex qua form. pil. gr. jj. consp. conch. ppt. D. in vitro. S. Früh u. Abends 10 Stück zu nehmen.

N°. 302.

Eine von *Blankard*, *Clossius* und *Walch* sehr gerühmte Pillenmasse gegen den Nachtripper.

℞. Tereb. venet.
Extr. gentian. ana ʒjjj.
Gm. Kino
Ferr. sulphur. ana ʒjß.
M. f. l. a. pil. gr. jj. consp. cinnam. S. Täglich 4 mal 11 Stück zu nehmen.

N°. 303.

Pilulae adstringentes gegen chronische *Leucorrhöen* und *Blennorrhagien.*

℞. Calomel. ℈j.
Catechu
Bals. copaiv. ana ʒjjj.
Syr. consolid. maj. q. s.
ut. f. pil. No. 150.
S. Täglich 3 mal 4 Stück.

N°. 304.

Eine andere Pillenmasse gegen chronischen Tripper.

℞. Extr. ratanh.
Pulv. rad. Seneg. ana ʒjß.
Ferr. oxydat. fusc. ʒj.
M. f. c. extr. lign. campech. q. s. pil. gr. jj.
S. 3 mal täglich 4, 6 — 10 Stück zu nehmen.

NB. Dieses Mittel half, wo viele andere vergebens versucht worden waren; auch war sein Nutzen gegen den Frauen-Tripper bisweilen ausgezeichnet.

N°. 305.

Pillenmasse, von *Wendt* ebenfalls gegen Nachtripper empfohlen.

a.

℞. Myrrh. elect. ʒjß.
Ferr. sulph. ʒjjj.
Pulv. rad. tormentill. ʒjj.
Mucil. gm. arab. q. s. ut f. pil. gr. jj. consperg. cinnam.
S. Täglich 4 mal 7 Stück zu nehmen.

N°. 306.

b.

℞. Tereb. venet. ℥ß.

Myrrh. elect. ʒj.
Succ. liquirit. q. s. ut f. pil. gr. jj.
consp. cinnam.
S. Alle 3 Stunden 4 Stück zu nehmen.

N°. 307.

c.

℞. Catechu ʒjjj.
Pulv. rhei opt. ʒjβ.
Tereb. venet. q. s.
ut f. l. a. pil. gr. jj. consp. cinnam.
S. Täglich 4 mal 5 Stück zu nehmen.

N°. 308.

Clossius's Pillenmasse gegen den Nachtripper.

℞. Gm. oliban.
— mastich.
Terr. japon.
Sang. dracon. ana ʒj.
Tereb. vene q. s.
ut f. pil. gr. jj. consp. lycopod.
S. Täglich 3 mal 10—12 Stück zu nehmen.

N°. 309.

Swediaur hat folgende Pillen:

℞. Tereb. coct. ʒjj.
Rad. rhei ʒj.
Ferr. limat. gr. xv.
M. f. c. paux. Aq. pil. No. 36. consp. lycop.
S. Täglich 2 mal 4 Stück zu nehmen.

N°. 310.

Vorschrift, den Bleizucker gegen Nachtripper aus grosser Atonie zu verordnen.

℞. Plumb. acet. gr. vj.
Opii puri gr. jjj.
Extr. millefol.
Gm. ammon. ana ʒj.
M. f. pil. gr. jj. cosp. cinnam.
S. Früh und Abends 5 Stück zu nehmen.

NB. Diese Pillen wurden auch bei grossem Verdacht eines Geschwürs der Urethra, so wie beim chronischen Tripper der Frauen mit dem erwünschten Erfolge verwendet.

N°. 311.

Cadet's sehr bewährtes Pulver gegen den Nachtripper.

℞. Gm. kino gr. vj.
Piper. caudat. ʒj.
Rad. liquirit. ℈j.
M. f. pulv. dent. tal. dos. No. vjjj.
S. Nach Umständen täglich 4—6 mal ein halbes oder auch ganzes Pulver zu nehmen.

N°. 312.

Cantharidenpulver, gegen Nachtripper aus höchster Atonie emfohlen.

℞. Pulv. cantharid. gr. jj.—jjj.
Sacch. alb. ʒj.
M. f. pulv. div. in vj. part. aeq.
S. Früh und Abends 1 Stück zu nehmen.

N°. 313.

Hecker's Anwendungsweise der Canthariden.

℞. Cantharid. gr. jj.
Camphor. gr. vj.
Nitr. dep. ℈jj.
M. f. pulv. div. in jv. part. aequ.
S. Alle 3 Stunden 1 Pulver.

N°. 314.

Müller's Pulver gegen Nachtripper.

℞. Sal. ammon. dep.
Gm. ammon.
— myrrh. ana gr. v.
Rad. liquirit. ℈β.
M. f. pulv. dent. tal. dos. No. vjjj.
S. Alle 3 Stunden 1 Pulver zu nehmen.

N°. 315.

Desselben Anwendungsweise des schwarzen Pfeffers gegen Nachtripper.

℞. Piper. nigri ℈j.
Conch. ppt.
Sacch. lact. ana ℈β.
M. f. pulv. dent. tal. dos. No. vjjj.
S. Täglich 4 mal ein Pulver zu nehmen.

N°. 316.

Eisenmann's Pulver, welches er besonders beim Nachtripper der Frauen mit glücklichem Erfolge verordnete.

℞. Ferr. ammon.
Gm. ammon.

Gm. myrrh.
Cort. cinnam. ana gr. jjj.
Sacch. alb. ℈β.
M. f. pulv. dent. tal. dos. No. xjj.
S. Des Tags 4 Stück zu nehmen.

N°. 317.

Otto's Formel gegen Nachtripper aus allgemeiner Atonie.

℞. Subcarb. ferr. gr. vjjj.
Cort. peruv. gr. xiv.
M. f. pulv. dent. tal. dos. No. x.
S. Alle 4—5 Stunden ein Pulver.

N°. 318.

Oder wie folgt:

℞. Subcarbon. ferr. ℈β.
Chin. sulph. gr. jjj.
Rad. liquirit. gr. xjj.
Ol. menth. crisp. gtt. j.
M. f. pulv. dent. tal. dos. No. vjjj.
S. Täglich 4 mal 1 Pulver zu nehmen.

Zweites Kapitel.

Arzneiformeln zum örtlichen Gebrauche.

N°. 319.

Injection des *Cupr. sulph. ammon.* von *Lagneau.*

℞. Cupr. sulph. ammon. gr. v.
Aq. rosar. ℥v.
Solv. M. S. zum Einspritzen.

N°. 320.

Stark's Emulsion, als Injectionsmasse gegen Nachtripper empfohlen und von vielen bestätigt gefunden.

℞. Bals. copaiv. ʒj.
Vitell. ovor. No. j.
Aq. cinnam. s. rosar. ℥jv.
Tinct. opii simpl. ʒβ — j.
M. S. Zum Einspritzen, 3 — 4 mal des Tags anzuwenden.

N°. 321.

Rust's Einspritzung gegen chronischen Tripper.

℞. Alumin. crud. gr. xv.
Aq. rosar. ℥iv.
Opii puri ℈β.
Mucil. gm. arab. ℥β.
M. S. Zum Einspritzen.

N°. 322.

Kortum's Einspritzung dagegen.

℞. Pulv. gallar. ℥β.
Coq. cum
Aq. font. ad reman. ℥vjjj.
Colat. solve
Zinc. sulph. gr. jj.
Alum. crud. ʒj.
M. S. Des Tags 2 — 3 mal einzuspritzen.

NB. Bei sehr grosser Erschlaffung der Schleimhaut der Harnröhre.

N°. 323.

Augustin's Einspritzung.

℞. Myrrh. elect.
Catechu ana ʒj.
Aq. calc. viv. ℥jv.
M. S. Zum Einspritzen.

N°. 324.

Hamilton's Injection.

℞. Opii puri
Sacch. saturn. ana gr. jv.
Aq. destill. ℥jj.
Solv. S. Zum Einspritzen.

N°. 325.

Injection von *Bell.*

℞. Zinc. sulph. gr. x.
Aq. font. ℥x.
Acet. litharg. gtt. x.
M. S. Zum Einspritzen.

N°. 326.

Injection mit blausaurem Zink bei erhöhter Reizbarkeit.

℞. Zinc. hydrocyan. gr. jv.
Aq. destill. ℥jv.
Solv. S. Zum Einspritzen.

N°. 327.

Gärtanner's Einspritzung in sehr hartnäckigen Fällen.

℞. Aerugin. ʒjβ.
Spir. sal. ammon. caust. ℥β.

M. S. Hiervon 6 Tropfen mit 1 Unze destill Wasser einzuspritzen.

N°. 328.

Einspritzung dagegen von *Attenhofer*.

℞. Lapid. divin. gr. vjjj.
Aq. saturn. ℥vjjj.
Solv. S. Zum Einspritzen.

N°. 329.

Cappel's Einspritzung bei grosser Erschlaffung.

℞. Cort. salic. conc. ℥j.
Coq. cum
Aq. font. ad reman. ℥vjjj.
solve
Alum. crud. ʒj.
M. S. Täglich 2 mal einzuspritzen.

N°. 330.

Einspritzung dagegen von *Fr. Hoffmann*.

℞. Sacch. saturn. ʒj.
Ol. terebinth. ℥v —?
Camph. elect. ʒβ.
M. S. Zum Einspritzen.

N°. 331.

Injection von *Atlhof*.

℞. Plumb. acet. ʒj.
Aq. destil. ℥vj.
Liquam. myrrh. ʒjjj.
Tinct. opii simpl. ℥j.
M. S. Zum Einspritzen.

N°. 332.

Abernethy's Einspritzung beim Nachtripper, wenn zugleich Geschwüre in der Harnröhre sind.

℞. Bals. copaiv. ʒjj.
Mucil. gm. arab. ℥ß.
Mixto adde
Aq. calcis ℥vj.
S. Zum Einspritzen.

N°. 333.

Becker's Injection gegen den Nachtripper aus Atonie.

℞. Cort. peruv. opt. ℥j.
Coq. c. Aq. font. per hor. ½ ad reman. ℥x.
Colaturae refrigeratae adde
Vini rubri ℥jj.
Alum. crud. ʒj.
M. S. 2—3 mal des Tags einzuspritzen

N°. 334.

Horn's Injection gegen den Nachtripper.

℞. Hydrarg. boruss. gr. jj.
Aq. destill. ʒxiv.
— laurocer. ʒjj.
M. S. Zum Einspritzen.

NB. Dieses Mittel bewiess sich besonders da sehr gut, wo zugleich noch eine erhöhte Sensibilität zugegen war, jedoch ist bei seinem Gebrauche auf die Narcosis Acht zu haben.

N°. 335.

Injection, ebenfalls sehr empfohlen, wenn die Sensibilität der Harnröhre noch sehr erhöht ist.

℞. Zinc. sulph. gr. jjj.
Aq. destill. ℥jj.
— lauroc. ℥j.
Tinct. opii simpl. ʒjj.
M. S. Täglich 4 mal anzuwenden.

N°. 336.

Girtanner's, von *Wendt* modifizirte Einspritzung.

℞. Extr. Opii gr. jjj.
Aq. destill. ℥iv.
Acet. saturn. gtt. vjjj.
Mucil. gm. arab. ℥β.
M. S. Täglich 2 mal anzuwenden.

N°. 337.

Bell's Vorschrift zu Bougies beim Nachtripper.

℞. Empl. litharg. simpl. ℥jv.
Cerae alb. ʒjβ.
Ol. olivar. ʒjjj.
Liquef. leni igne; f. inde l. a
Cereoli. S. Kerzen.

N°. 338.

Oder wie folgt:

℞. Cerae flav. ℥jjj.
Liquef. et adde
Aceti saturni ʒj.
Fiant inde l. a. cereoli.

N°. 339.

Dease's Vorschrift zu Kerzen, wenn ein hoher Grad von *Torpor* zugegen ist.

℞. Empl. diachyl. comp. ℥jj.
— mercur. simpl. ℥j.
Antimon. crud. pulv. ℥β.
Liquef. leni igni; f. l. a. cereoli.

N°. 340.

Hunter's Vorschrift zu Kerzen für gelindere Grade empfohlen.

℞. Cerae flav. ℥jv.
Minii
Ol. olivar. ana ℥jv.
Liquef. l. igne; f. cereoli.

N°. 341.

Für sehr hartnäckige Fälle wird auch folgende Verschrift empfohlen:

℞. Cerae flavae ℥jv.
Hydrarg. mur. corr. gr. jjj.
Extr. myrrh. ʒj.
Ol. olivar. ʒjjj.
M. f. l. a. cereoli.

N°. 342.

Oder auch wie folgt:

℞. Empl. litharg. simpl. ℥vj.
Cer. flav. ʒjj.
Ol. lini ℥β.
Liquef. adde
Lapid. caust. gr. vj.
Extr. gallar. ʒjj.
F. inde l. a. cereoli.

No. 343.

℞. Lapid. caust. gr. iv.
Extr. myrrh. ʒjjβ.
Solve in
Aqu. dest. ℥jj.
et adde
Gumm. arab. q. s.
ut f. inde cereoli.

NB. Vor dem Einbringen bestreicht man diese Kerzen mit Milch oder Oel, schiebt sie nach Verhältniss 2 und mehrere Zoll tief ein, und lässt sie erst täglich ½ — 1 — 2 Stunden liegen, während welcher Zeit sie sich meistentheils auflösen, worauf der Faden wieder herausgezogen wird. Entstehen heftige Schmerzen nach dem Einbringen, so muss die Kerze wieder herausgenommen werden; denn sie war entweder zu dick oder zu reizend. Nach Verhältniss bringt man vom Anfange 1 — 2, später 4 — 5 Kerzen des Tags in die Harnröhre.

Durch das Einlegen dieser Bougies, wenn es zweckmässig veranstaltet wird, soll nicht nur die Atonie der Theile gehoben, sondern auch das Entstehen etwaiger Verengerungen in Zeiten verhütet werden. Ferner hat man beim Nachtripper, zumal wenn er offenbar auf örtlicher Atonie der Genitalien beruht, Waschungen der Schamgegend und des Mittelfleisches mit Branntwein, rothem Wein, *Spir. matricalis*, *serpyll.*, einer Auflösung des Eisenvitriols, des weinsteinsauren Eisens, örtliche Bäder (*vid. supra* No. 145. 146.), so wie auch Einreibungen flüchtiger Salben mit Kampher, oder: *Camphor. elect.* ʒβ. *Ol. c. c. foetid. Petrol. ana* ʒjj. *Unguent. rorismar. comp.* ℥j — mit

glücklichem Erfolge angewendet. Medicus rühmt die Douche, *Hunter* Vesicatoria auf's Mittelfleisch, ja sogar auf die Harnröhre, *Sprengel* die Electricität. *Hufeland* sah von der Einreibung der Sublimatsalbe in wenig Tagen einen sehr langwierigen Tripper heilen.

---

2. Desorganisationen der Harnröhre.

a. Geschwüre der Harnröhre.

Erstes Kapitel.

Arzneiformeln zum innerlichen Gebrauche.

N°. 344.

Lagneau's Mittel gegen Geschwüre der Harnröhre.

℞. Rad. sarsaparill. ver. ℥ß.
Ras. lign. guaj. ʒvj.
Coque cum
Aqu. font. ℔j.
ad remanent. ℥vj.
In colat. solve
Roob gramin. ℥ß.
Sal. ammon. dep. ʒjß.
Extr. liquirit. dep. ʒj.
D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

NB. Es wird dadurch die Absonderung in den Geschwüren und den dieselben umgebenden Theilen vermehrt, wodurch allmählig die Heilung zu Stande kommt.

N°. 345.

Abernethy's Formel, von *Otto* mit glücklichem Erfolg gegen Geschwüre der Urethra verwendet.

℞. Bals. copaiv. ℈j.
Naphth. vitriol. ʒjβ.
Syrup. alth. ℥jj.
Baryt. mur. ℈β.
M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.

N°. 346.

Mueller fand folgendes Mittel sehr wirksam:

℞. Aqu. calc. ℥vjjj.
— cinnamom. vin. ℥β.
Laud. liq. Syd. gtt. xvj.
M. D. S. Täglich zu verbrauchen.

N°. 347.

Fritze rühmt:

℞. Hb. uvae urs. ℥β.
C. coque cum
Aqu. font. ad rem. ℥vjjj.
Sub fin. coct. infd.
Fol. diosm. cren. ℥β.
Flor. boragin. ʒjj.
Stent in digest. per ¼ hor.
Colat. adde
Syrup. ammon. ℥j.
Laud. liq. Syd. ℈β—j.
M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

N°. 348.

Ein anderes von demselben.

℞. Rad. caric. aren. ℥j.
C. coque cum
Aqu. font. ℔j.
ad remanent. ℥vjj.
In colat. solve
Sal. ammon. dep.
Extr. con. mac. ana ʒj.
et adde
Syrup. sarsaparill. ℥j.
Tinct. aconit. ʒj.
M. D. S. Alle 4 Stunden einen Esslöffel.

N°. 349.

Stark's Anwendungsweise des *Lamium alb.* gegen *Gonorrhoea secundaria* und Geschwüre der Urethra.

℞. Flor. lamii alb. ℥ß.
infd. cum
Aqu. fervid. ℔j.
Stet in digest. per ½ hor.
Colat. adde
Naphth. vitriol. ʒj.
Syrup. fumar. ℥j.
M. D. S. Diese Portion den Tag über zu trinken.

N°. 350.

Folgende Pillen wurden ebenfalls sehr wirksam gefunden:

℞. Calomel. ℈ß.
Sulph. dep.
Extr. dulcam. ana ʒj.

Extr. con. mac. ʒβ.
Gumm. guaj. q. s.
M. f. Pil. No. C. Consp. pulv. lycop.
D. S. Früh und Abends 5 Stück, und allmählig zu steigen.

N°. 351.

Eisenmann fand folgendes Pulver sehr wirksam:

℞. Ferr. ammon.
Gumm. myrrh. ana gr. jjj.
— ammon. gr. v.
Sacch. alb. ℈β.
M. f. Pulv. D. tales doses No. vjjj.
S. Täglich 4 mal ein Pulver zu nehmen.

N°. 352.

Ein anderes Pulver dagegen.

Rad. aconit. gr. j—jj.
Rad. seneg. gr. vj.
Sal. ammon. dep. gr. jv.
Rad. liquirit. ℈β.
M. f. Pulv. Dent. tales doses No. vj.
S. Alle 3 Stunden ein Pulver zu nehmen.

Zweites Kapitel.

Arzneiformeln zum örtlichen Gebrauche.

N°. 353.

Abernethy's Injection gegen Geschwüre der Harnröhre.

℞. Bals. copaiv. ʒjj.
Mucilag. gumm. arab. ℥β.
Aqu. calc. ℥vj.
M. D. S. Zum Einspritzen.

N°. 354.

Biett empfiehlt:

℞. Acid. oxymur. ʒj.
Aqu. dest. ℥jjj.
Extr. opii aqu. ʒβ.
M. D. S. Täglich 2 mal anzuwenden.

N°. 355.

Schubarth's Injection, wenn zugleich grosse Atonie zugegen ist.

℞. Summitat. millefol.
Rad. helen. ana ʒjj.
C. infund. cum
Aqu. fervid. ℥vj.
Stent in digest.
per ¼ hor. Col. adde
Liquam. myrrh. ℥β.
M. D. S. Täglich 4 mal einzuspritzen.

N°. 356.

Fischer's Injection bei grosser Reizlosigkeit.

℞. Decti granator. ℥vj.
Aqu. oxymur. ℥β.
Extr. chamom. ʒj.
M. D. S. Zum Einspritzen.

N°. 357.

Eine andere Injection bei erhöheter Sensibilität.

℞. Decti rad. alth. ℥jv.
Aqu. lauroc. ʒj.
M. D. S. Zum Einspritzen und Einpinseln.

NB. Diese bisher aufgeführten Injectionen, so wie mehrere andere, welche oben beim Tripper vorkamen, können namentlich dann empfohlen werden, wenn die Geschwüre sehr weit nach vorne sitzen.

N°. 358.

Tode's Vorschrift zu Bougies beim Geschwür der Harnröhre.

℞. Empl. litharg. simpl. ℥jjj.
Cerae flav. ʒjj.
Bals. copaiv. ʒj.
M. f. l. a. Cereoli. D.

NB. Mehrere Vorschriften zu Kerzen siehe unter Nachtripper. Von ihnen hat man das Meiste zu erwarten.

---

b. Verengerungen der Harnröhre.

Erstes Kapitel.

Arzneiformeln zum innerlichen Gebrauche.

N°. 359.

Diosma crenata, gegen Stricturen der Harnröhre, namentlich von Holländern und Engländern empfohlen.

℞. Fol. diosm. crenat. ℥β.

C. infde cum

Aqu. fervid. ℔j.

Digere leni calore per tres horas.

Cola.

D. S. Alle 2 Stunden eine halbe Tasse zu trinken.

N°. 360.

Oder wie folgt:

℞. Fol. diosm. crenat. ℥ß.

C. infde cum

Aqu. fervid. ℔jij.

Digere leni calore per horas tres.

Cola.

D. S. Täglich 3 mal ein Weinglas (℥jj) zu nehmen.

N°. 361.

Oder die Tinctur dieses Krautes in folgender Form.

℞. Tinct. diosm. crenat. ʒvj.

Aqu. font. ℥jj.

Syrup. sacch. ℥ß.

M. D. S. Täglich auf 3 mal zu nehmen.

NB. Diese Tinctur wird bereitet, wenn man ℥j *Fol. diosm. crenat.* mit ℥vj. Alkohol übergiesst und mehrere Tage maceriren lässt.

In England will man namentlich dann von diesem Mittel vortreffliche Wirkung beobachtet haben, wenn man es in Verbindung des Kubebenpfeffers und der Zeitlose verwendete.

N°. 362.

Fischer's Anwendungsweise des Salmiaks in grossen Gaben gegen Anschwellung und Scirrhosität der Vorsteherdrüse und der Schleimhaut der Harnröhre.

℞. Sal. ammon. dep.
Succ. liquirit. ana ℈j.
Extr. tarax. q. s.
M. f. bolus. D. tales doses q. l.
S. Alle 2—4 Stunden ein Stück zu nehmen.

N°. 363.

Magendie's Bolus gegen dasselbe Leiden.

℞. Carbon. animal. gr. jjj.
Sal. ammon. dep. ℈j.
Extr. cicut. gr. jj.
— liquirit. q. s.
ut f. cum pauxillo aquae dest. bolus. D. tales boli No. xjj.
S. Täglich 3 mal ein Stück zu nehmen.

N°. 364.

Büttner's Salmiakpulver gegen Verdickung der Schleimhäute in den Harnwerkzeugen.

℞. Sal. ammon. dep.
Rad. liquirit. ana ʒjjj.
M. f. Pulv. Divid. in IX. part. aequales.
D. S. Dreistündlich ein Pulver mit Haferschleim zu nehmen.

N°. 365.

Biett's Pillen, gegen Verengerung der Harnröhre sehr geeignet.

℞. Sal. ammon. dep. ℥β.
Extr. stip. dulcam. ʒjj.
— con. mac. ʒj.
Gumm. guaj. q. s.
ut f. Pil. gr. jjj. Consperg. pulv. cinnamom.
D. S. Früh und Abends, oder auch täglich 4 mal 6, 10—12 Stück zu nehmen.

Zweites Kapitel.

Arzneiformeln zum örtlichen Gebrauche.

N°. 366.

Parmentier's Salbe gegen Anschwellungen und Verengerungen der Schleimhaut der Urethra.

℞. Hydr. jodic. gr. iv.
Extr. hyoscy. ℈β.
Ungt. digit. purp. ℥β.
M. f. U. D. S. Täglich 2 mal anzuwenden.

NB. Sollten Pusteln dadurch entstehen, so wird das Mittel bis zu deren völligen Heilung ausgesetzt, und alsdann vom Anfange täglich blos 1 mal eingerieben.

N°. 367.

Benaben's Behandlungsweise bedeutender Stricturen der Harnröhre, in Folge mehrerer schlecht behandelter Tripper entstanden.

℞. Kali hydriodic. ʒj.
Axung. optim. ℥jβ.
M. f. U. D. S. Täglich 2 mal anzuwenden.

NB. Als sich ein Ausbruch von Pusteln zeigte, wurde mehr Fett zugesetzt, und nun kamen diese nicht wieder. Gegen plötzlich eintretendes Schneiden in der Harnröhre gebrauchte man einige Blutigel, und die Einreibungen wurden auf einige Zeit unterlassen. Das Glied war beständig mit Flanell umwickelt. Als man 70 Einreibungen angewendet hatte, floss der Urin ohne alle Beschwerde, und die Sonde gelangte leicht bis in die Urinblase.

N°. 368.

Magendie's Kerzen gegen Stricturen der Urethra.

℞. Kali hydriodic.
Extr. belladonn. ana ℈j.
Cerae flav. ℥jv.
Cerae liquefactae add. Kali hydriod. et
Extr. belladonn.
M. exactissime. F. cereoli.

NB. Mehrere Formeln zum innerlichen sowohl als äusserlichen Gebrauche siehe unter Hodenentzündung, so wie auch mehrere Vorschriften zu Bougies unter Nachtripper.

Es sey erlaubt, in aller Kürze, wie es hier geschehen kann, noch Einiges über die Behandlung der Stricturen der Harnröhre zu erinnern.

Bei Stricturen, wo noch eine Sonde von 2 Linien im Durchmesser eingebracht werden kann, soll ein auf die verengerte Stelle angebrachter Druck, verbunden mit dem innern Gebrauche des Salmiaks in grossen Gaben, dem gegen das Ende der Kur kohlensaures Eisen zugesetzt wird, um die Heilkraft der Natur zu unterstützen, nach und nach das Uebel beseitigen können. Der örtliche Druck

wird am besten durch eingebrachte Bougies ausgeübt. Zu diesen Bougies will man die Darmsaiten, mit verschiedenartig wirkenden Substanzen bestrichen, oder noch besser ganz einfache, die hinlänglich ausgedehnt worden und nicht zu alt sind, am zweckmässigsten gefunden haben. *Eisenmann* macht von den dickern Darmsaiten, etwa 2—2½ Linie im Durchmesser haltend, Bougies von 4—6 Zoll Länge, je nachdem es der Sitz der Strictur erfordert, lässt dieselben durch Bimsstein glatt schleifen, an dem einen Ende, ohngefähr 2 Linien vor demselben eine Furche einfeilen, um darin einen starken Seidenfaden befestigen zu können, und bringt sie alsdann ganz in die Urethra ein, so dass nichts davon zur Mündung derselben heraussieht. An dem Seidenfaden, welcher heraussieht, will er noch ein Querhölzchen befestigt wissen, damit die Bougie nicht in die Blase dringen, und man sie leicht wieder herausziehen könne. Hier hat man den Vortheil, dass, wenn die Bougie aufschwillt, bloss die Harnröhre ausgedehnt, keineswegs aber zugleich deren Mündung gedrückt wird. Ist die Strictur gehoben, fliesst der Urin wieder regelmässig aus der Urethra, so räth *Walch*, hohle Kerzen, um das bei jedesmaligem Urinlassen erforderliche Herausnehmen derselben zu vermeiden, in Anwendung zu bringen. Entsteht beim Einbringen Krampf, welcher das weitere Fortschieben verhindert, so nehme man die Kerze wieder heraus. Hat man einige Zeit gewartet, und die Kerze kann wegen des Krampfes noch nicht gehörig eingebracht werden, so gebe man innerlich *Opium* oder *Lactuarium* in bedeutenden Gaben und wende örtlich warme Bäder, narkotische Breiumschläge, Einreibungen mit *Linimentum volatile etc.* an. War man

beim Einbringen auf Irrwege gekommen, waren dadurch heftige Schmerzen entstanden, so suche man diese zuerst zu beseitigen und mache alsdann von neuem Versuche mit dem Einbringen der Kerze. Ist man an die Verengerung gelangt, so sucht man die Kerze mittelst einer drehenden und einigermassen bohrenden Bewegung in dieselbe zu bringen. Anfangs bedient man sich der dünnern Kerzen, und schreitet nach und nach, so wie es die Fortschritte der Erweiterung der Strictur verlangen und zulassen, zu den dickern fort. In Fällen, wo die Urethra in ihren Stricturen durch ungleiche Verdickung ihrer Wände eine schiefe Richtung bekommen hat, so dass auch die kleinste Kerze nicht in die Verengerung gebracht werden kann, soll man nach Sömmerring zuvor Olivenöl einspritzen, die Harnröhre dann zuhalten, durch Streichen mit den Fingern das Oel weiter nach hinten zu bringen suchen und dies so lange wiederholen, bis die Kerze eindringen kann. Andere lassen die Kranken die Harnröhre vorne zusammendrücken und zu gleicher Zeit den Urin herauspressen, wodurch sich zum Theil die Urethra erweitern soll. Da einmal dagewesene Stricturen leicht wiederkehren, so lasse man, nachdem sie gehoben sind und der Urin wieder auf die natürliche Weise abfliesst, die Kerzen noch einige Zeit anwenden, damit der krankhafte Vegetationsprocess in der Harnröhre gänzlich getilgt werde. Sind die Stricturen so beschaffen, dass eine Kerze von 2 Linien im Durchmesser nicht eingebracht werden kann, so giebt man den Rath, dieselben mit einem dünnen Fischbeinstäbchen, welches an seinem vordern Ende zugespitzt und mittelst eines vorne offenen

Katheters eingebracht worden ist, zu durchstossen, und ist dies geschehen, Bougies, aus Darmsaiten bereitet, nach der angegebenen Weise bis zur völligen Heilung anzuwenden.

Die Anwendung des Messers kann nur dann statt finden, wenn die Verengerung weiter nach vorn ihren Sitz hat, so dass sie vom Messer erreicht werden kann.

Für zweckmässiger als diese beiden letztern Methoden hält man das Aetzmittel, um durch Auflösung der organischen Substanz die Verengerungen su beseitigen. Nachdem man sich mittelst *Ducamp's* Explorationssonde einen deutlichen Abdruck von der Verengerung genommen, bringt man *Lallemand's* gefüllten und in die Canäle zurückgezogenen Aetzmittelträger so in die Harnröhre ein, dass der Höllenstein der Verdickung in der Harnröhre zugekehrt ist, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man das Instrument so eingerichtet hat, dass das Aetzmittel mit der Stellschraube in gleicher Richtung liegt. Ist das Instrument auf diese Weise eingeführt worden, so sucht man das Stilett, an welchem das Aetzmittel befestiget ist, behutsam durch die Verengerung zu stossen, lässt es einige Secunden lang mit derselben in Berührung, zieht das Stilett in die Röhre zurück und alsdann mit dem ganzen Instrument aus der Harnröhre heraus. Nach geschehener Operation wird lauwarme Milch, oder Mohnsaftauflösung in die Harnröhre gespritzt. Dieses Verfahren soll man alle 2—4 Tage wiederholen, in welcher Zeit sich gewöhnlich der entstandene Schorf abzusondern pflegt, und so lange damit fortfahren, bis eine dünne Bougie durch die Verengerung geführt werden kann. Ist dies der Fall, so beendigt man ebenfalls die

Heilung durch Kerzen, mit denen nach der oben angegebenen Weise verfahren wird. Die Methode, das Aetzmittel mittelst eines Stückchen Schwamms, Charpie, zusammengerollter Baumwolle u. s. w., das man an einen Drath befestiget hat, einzubringen, ist zu unsicher, als dass sie empfohlen werden könnte, so wie jene, das Ende einer Kerze einen Viertel- oder Achtel-Zoll weit mit dünnem Tischlerleim zu bestreichen, hierauf gepulverten Höllenstein aufzutragen, das Ganze trocknen zu lassen, dann das geleimte Ende ganz eben und gleich zu machen, und endlich die mit dem Aetzmittel ausgerüstete Spitze mit einem dünnen Wachsüberzug zu versehen und so anzuwenden, aus der Natur der Dinge für überflüssig erklärt werden kann.

Kommen Fälle vor, wo auch die dünnste Sonde nicht eingebracht werden kann, so soll man nach *Hunter* so lange von Vorne nach Hinten zu ätzen, bis das grösste Hinderniss beseitigt und durch öfters versuchte Abdrücke ein zugängiger Kanal gefunden worden ist. Hierzu soll ebenfalls das *Lallemand'sche* Instrument, nur mit einem andern Stilett versehen, wo statt einer Furche zur Seite, um den Höllenstein aufzunehmen, vorne am Knopf eine kleine Höhle seyn muss, in die das Aetzmittel geschmolzen wird, sehr zweckmässig angewendet werden können. Ist so das grösste Hinderniss beseitigt, so kommt der gewöhnliche *Lallemand'sche* Apparat an die Reihe, und die Kerzen vollenden die Heilung.

---

3. Anschwellung und Verhärtung der Vorsteherdrüse.

Arzneiformeln zum innerlichen sowohl als äusserlichen Gebrauche gegen diese Krankheitsform sind unter Hodenentzündung, so wie unter Stricturen der Urethra zu finden.