Fünfter Abschnitt.

Arzneiformeln für die Therapie des Eicheltrippers.

Erstes Kapitel.

Arzneiformeln zum innerlichen Gebrauche.

Sollte der Character des Uebels innere Mittel nothwendig machen, so ist das, was unter Tripper angeführt wurde, zu vergleichen.

Zweites Kapitel.

Arzneiformelu zum örtlichen Gebrauche.

N°. 378.

Vorschrift zur Injection und Waschung beim Eicheltripper.

℞. Plumb. acet. gr. xjj.
Aqu. dest. simpl. ℔j.
S. D.

NB. Kann die Vorhaut leicht zurückgebracht werden, so lässt man mit dieser Flüssigkeit die Eichel mehrmals des Tags waschen; ist es aber wegen eines hohen Grades der Entzündlichkeit, oder aus irgend einer andern Ursache nicht möglich, die Vorhaut zurückzuziehen und die Eichel völlig zu entblössen, so muss man sich mit öfterem Einspritzen zwischen der Eichel und Vorhaut begnügen.

N°. 379.

Eine andere Einspritzung.

℞. Hepat. sulph. calc. ℥ß.
Aqu. calc. ℔j.
M. D. S. Zum Einspritzen und Waschen.

N°. 380.

Oder auch wie folgt:

℞. Merc. subl. corr. gr. jjj.
Lact. sulphur. ʒjj.
Aqu. chamom. ℥vjjj.
M. D. S. Wohlumgeschüttelt täglich mehrmals anzuwenden.

NB. Dieses Mittels soll man sich namentlich dann bedienen, wenn Excoriationen, deren Fläche speckartig wird und die weiter um sich fressen, vorhanden sind.

N°. 381.

Wendt empfiehlt hier:

℞. Hydr. mur. corr. gr. jj.
Aqu. dest. ℥jj.
Tinct. opii simpl. ♁j.
M. D.

N°. 382.

Oder auch:

℞. Extr. belladonn. gr. jv.
Solve in
Aqu. dest. ℥jv.
et adde
Liquor. hydr. nitric. gtt. jv — vj.
M. D.

N°. 383.

Otto's Waschung beim Eicheltripper.

℞. Decti rad. helen. ℥vj.
Liquor. calc. oxymur. ℥ij.
D.

NB. Dieses Mittel soll auch gegen gleichzeitige Schanker der Eichel in den meisten Fällen ausreichen. Sind die Schanker schon alt, so lässt er ʒjj *Opiumtinctur* zusetzen.

N°. 384.

Fischer's Mittel, gegen chronischen Eicheltripper empfohlen.

℞. Cort. salic. laur. ℥ß.
C. coque cum
Aqu. font. ℔j.
ad remanent. ℥jv.
Colat. refrig.
adde
Spirit. frument. ℥jj.
M. D. S. Täglich 2 — 3 mal als Waschwasser anzuwenden.

N°. 385.

Gegen die als Folgeübel des Eicheltrippers bekannte Anlage zur steten Entzündlichkeit der Eichelkrone und zur frieselförmigen Efflorescenz wird folgende Mischung als ungemein wirksam empfohlen:

℞. Hydr. mur. corr. gr. IV.
Plumb. acet. ℈β.
Solve in
Aqu. dest. ℥IV.
et adde
Zinc. oxydat. alb. ℈j.
M. D. S. Wohl umgeschüttelt täglich 2—3 mal anzuwenden.

NB. Dieses so wie der übrigen hier angeführten Mittel kann man sich auch bedienen, wenn, wie oft bemerkt wird, nach dem Harnröhren- und Eicheltripper ein lästiges Jucken in diesen Theilen zurückbleibt.

Mehrere äussere, beim Eicheltripper ebenfalls passende Mittel, siehe unter Harnröhrentripper.