Siebenter Abschnitt.

Arzneiformeln für die Therapie des Speichelflusses und Merkurialfiebers.

Erstes Kapitel.

Arzneiformeln zum innerlichen Gebrauche.

N°. 580.

Wendt's Mittel gegen den Speichelfluss.

℞. Mixt. sulph. acid. ℈j. — ʒβ.
Dct. rad. alth. ℥v.
Syr. emuls. ℥β.
M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

N°. 581.

Hufeland's künstliches Antimonialschwefelwasser, als ein vortreffliches Mittel beim Speichelfluss und bei der Merkurialkrankheit.

℞. Calc. antim. sulpharat. ʒjβ.
Coque cum

Aqu. font. ℔v.
ad remanent. ℔jv.
in vase rite clauso.
D. adhuc tepida ad lagen.
S. Theetassenweise zu 2—3 Pfund täglich zu trinken.

NB. *Walch* lässt ʒjj. von der Antimonialschwefelleber nehmen und den Kranken täglich vier Mal eine Theetasse trinken. — Binnen 3 Tagen muss dieses Wasser verbraucht werden.

N°. 582.

Dzondi's Behandlung der Merkurialkrankheit, oder solcher Kranken, die an Merkurialkrankheit und Syphilis zugleich leiden.

℞. Flor. sulph. lot. ʒjj.
Tinct. opii simpl. gtt. xx.
Aq. destill. ℥jv.
M. S. Wohl umgeschüttelt, täglich 3 mal einen Esslöffel voll zu nehmen.

N°. 583.

Oder wie folgt:

℞. Hep. sulph. kalin ℈j.
Aq. destill. ℥j.
Syr. cinnam. ʒjj.
M. D. S. Täglich auf 3 mal zu verbrauchen.

N°. 584.

Schwefelwasser gegen Speichelfluss.

℞. Hep. sulph. salin. ʒj.

solve in

Aq. destill. ℥vj.

D. S. Täglich 3 mal 1 Esslöffel voll.

N°. 585.

Walch's Pillen gegen Speichelfluss.

℞. Hep. sulph. kalin. ʒj.

Extr. gent. rubr. ʒjjj.

M. f. pil. gr. jj. consp. lycopod.

D. in vitro S. Alle 3 Stunden 4 und mehrere Stück zu nehmen.

N°. 586.

Oder auch wie folgt:

℞. Hep. sulph. salin. ʒj.

Camphor. ℈β.

Extr. liquirit.

Gm. ammoniac. ana ʒj.

M. f. pil. gr. jj. consp. cinnam.

D. in vitro. S. Täglich 3 mal 8—10 Stück zu nehmen.

N°. 587.

Eine andere Pillenmasse.

℞. Magnes. sulphurat.

Extr. trif. fibr. ana ʒjj.

M. f. pil. gr. jj. consp. cinnam.

D. S. 3 mal täglich 6—8 Stück zu nehmen.

N°. 588.

Eine andere Pillenmasse.

℞. Camphor. elect. ℈j.
Acid. phosphor. sicc. ℈jj.
Succ. liquirit.
Pulv. rad. helen. ana ʒj.
M. f. pil. gr. jj. consp. lycopod.
D. S. Täglich 3 mal 5—8 Stück zu nehmen.

N°. 589.

Eine andere.

℞. Opii puri gr. jjj — vj.
Acid. phosphor. sicc.
Ass. foetid.
Rad. Irid. flor. ana ʒj.
M. f. pil. gr. jj. consp. pulv. irid. fl.
D. S. Früh und Abends 6—8 Stück zu nehmen.

N°. 590.

Walch's Pulver beim Speichelfluss.

℞. Flor. sulph. lot. ℥ß.
Magnes. alb.
Rad. calam. arom. ana ʒjj.
Elaeos. citri ʒß.
M. f. pulv.
D. S. Alle 2 Stunden einen kleinen Theelöffel voll zu nehmen.

N°. 591.

Ein anderes Mittel gegen Speichelfluss.

℞. Opii puri gr. jj.
Camphor. gr. jjj.

Hep. sulph. kalin. gr. xxjv.
Gm. arab.
Sacch. alb. ana ʒj.
M. f. pulv. div. in vj. part. aeq.
D. S. Alle 3 Stunden ein Stück.

NB. Dabei lässt man folgenden Thee trinken:
℞. Fol. sennae Alex. ʒjjj.
Stip. dulcam.
Rad. enulae. ana ℥ß.
Sem. foenic. ʒjj.
C. C. M. S. Mit heissem Wasser zum Thee anzubrühen.

N°. 592.

Ein anderes.

℞. Sulph. praecip.
Tart. depurat. ana ʒjj.
Magnes. alb. ʒj.
Elaeos. citri ʒjjj.
M. f. pulv.
D. S. 4 mal täglich 1 Kaffeelöffel voll zu nehmen.

N°. 593.

Ein anderes.

℞. Magnes. sulphurat. ʒj.
Acid. tart. ℈jj.
Sacch. alb. ℈jv.
M. f. pulv. div. in xjj. part. aeq.
D. in charta cerata S. Alle 3 Stunden ein Pulver unter dem Aufbrausen zu nehmen.

N°. 594.

Oder wie folgt:

℞. Camphor. elect. gr. vj.
Magn. sulphurat. ʒβ.
Acid. tart. ℈j.
Elaeos. foenicul. ℈jj.
M. f. pulv. div. in vj. part. aeq.
D. in charta cerata S. Wie das Vorhergehende zu nehmen.

NB. *Hahnemann* empfiehlt nach jedesmaligem Einnehmen der Schwefelleber einige Tassen warmen Thee nachzutrinken, welcher durch Citronensaft oder Weinstein sauer gemacht worden ist.

Zweites Kapitel.

Arzneiformeln zum örtlichen Gebrauche.

N°. 595.

Kopp's Mundwasser gegen Speichelfluss.

a.

℞. Vitriol. coerul. gr. xv — ʒβ.
Tinct. myrrhae
— catechu
— kino ana ʒj.
— pimpinell. ʒv.
Infus. salviae ℥vj.
Mell. crud. ʒvj.
M. D. S. Stündlich damit den Mund auszuspülen und dann auszuspeien.

NB. Die Mund- und Gurgelwässer müssen so lange als möglich in der Mundhöhle behalten und gleichsam darin umgeschüttelt werden, ohne sie zu verschlucken.

N°. 596.

b.

℞. Acidi salis comun. ʒjjj.
Syr. moror. ℥jjβ.
M. D. S. So viel unter Salbeithee zu mischen, dass dieser angenehm sauer wird, und stündlich den Mund damit auszuspülen.

NB. Hierbei lässt er den Kranken den Tag über einen Thee aus *Rad. enulae* trinken, und um den Hals ein *Empl. meliloti* legen.

N°. 597.

Ein anderes sehr wirksames Mundwasser bei grosser Atonie der Theile.

℞. Extr. ratanh. ʒjjj.
Gm. kino
Succ. catechu ana ʒjj.
Aq. rosar. ℥jv.
Syr. moror. ʒv.
M. S. Mundwasser.

N° 598.

Sehr wirksames Mundwasser gegen Merkurialgeschwüre und Speichelfluss.

℞. Extr. ratanh. ʒβ.
Mucil. sem. cydon. ʒjjβ.

Aq. salviae ℥jβ.

S. M. S. Zum Ausspülen des Mundes.

N°. 599.

Ein anderes von *Walch*.

℞. Herb. salv.

Cort. salic.

— querc. ana ʒjjj.

Coque cum

Aq. font. ℥xvj.

ad remanent. ℥vjjj.

Cola.

D. S. Zum Ausspülen des Mundes.

NB. Nach Umständen kann man ʒj—jj. *Tinct. catechu* oder *Tinct. opii* zusetzen.

N°. 600.

Ein anderes von demselben.

℞. Alumin. crud. ʒj—jj.

Solve in

Aq. rosar. ℥v.

Adde

Mell. rosar. ʒjjj.

M. D.

N°. 601.

Mundwasser von *Ficker*.

℞. Herb. salv. c. ℥β.

Infunde cum

Aq. fervid. q. s.

ad colat. ℥vjj.

Solve
Alum. crud. ʒj.
Extr. Myrrh. ʒjj.
et adde
Mell. despum. ℥j.
M. D. S. Zum Ausspülen des Mundes.

N°. 602.

Chlornatron-Mundwasser, bei *Salivation* sehr empfohlen von *Darling*.

℞. Natr. oxymur. ʒβ.
Aq. salv.
— font. ana ℥jv.
M. S. Mundwasser.

NB. Es schaffte stets grosse Erleichterung, hemmte die Entzündung, und hielt, gleich im Anfange des Uebels gebraucht, fast beständig dessen Fortschritte auf.

N°. 603.

Ein anderes Mundwasser von *Walch* bei Geschwüren der Mundhöhle und der Merkurialkrankheit.

℞. Extr. nuc. jugl. ʒjjj.
Solve in
Aq. rosar. ℥v.
M. D.

N°. 604.

Von demselben.

℞. Vitriol. coerul. gr. jjj.
Solve in
Aq. destill. ℥j.
et adde

Tinct. myrrh. ʒj.
Mell. rosar. ʒjjj.
M. D.

N°. 605.

Von demselben in hartnäckigen Fällen.

℞. Lapid. infern. gr. jβ.
Solve in
Aq. destill. ℥j.
M. D.

N°. 606.

Ein anderes Mundwasser.

℞. Extr. tormentill. ʒjj.
Solve in
Aq. salviae ℥vj.
Adde
Tinct. myrrh. ʒjj.
M. D.

N°. 607.

P. Frank's stärkendes Mundwasser, bei schlaffen Geschwüren in der Mundhöhle von ausgezeichnetem Nutzen.

℞. Cort. querc. jun. ʒvj.
Coque cum
Aq. font. ℥xvjjj.
ad colat. ℥xjj.
Adde
Alum. crud. ʒβ.
Spir. vini rectif. ℥jβ.
M. S. Mundwasser.

N°. 608.

Ein anderes.

℞. Camphor. gr. vjjj.
Gm. mimos. ʒβ.
Extr. chinae ʒjj.
Solve in
Aq. rosar. ℥vjj.
et adde
Syr. moror. ℥j.
M. D. S. Mund- und Gurgelwasser.

N°. 609.

Ein anderes.

℞. Aq. cochlear. ℥vjjj.
— oxymur.
Mell. rosar. ana ℥j.
M. D.

N°. 610.

Ein anderes.

℞. Calcar. chlorat. ʒj.
Solve in
Aq. salv. ℥jv.
Adde
Syr. moror. ℥β.
D. D.

N°. 611.

Ein anderes Mundwasser.

℞. Infus. chamaedr. ℥vj.
Spir armorac. ℥β.

Mell. rosar. ℥j.

M. D.

N°. 612.

Ein anderes tonisches Mund- und Gurgelwasser.

℞. Decti. chin. ℥vj.

Syr. cort. aurant. ℥j.

Ammon. mur. ℈j.

M. D.

N°. 613.

Ein anderes.

℞. Camphor. ℈β.

Gm. arab. ℈jj.

Aq. salv. ℥vj.

Tinct. ratanh. ʒjjj.

Mell. rosar. ℥jβ.

M. S. Mundwasser.

NB. *Sundelin* wandte es mit Nutzen gegen schlaffe Merkurialgeschwüre an.

N°. 614.

Gasgarisma acidi acetici cum myrrha (Fothergill).

℞ Decti. hord. ℥xjj.

Inter coquendum adjice

Rad. contrayerv. cont. ℥β.

Liquori colato admisce

Acidi acet.

Tinct. myrrh. ana ℥j.

Mell. opt. ʒvj.

M. S. Mund- und Gurgelwasser.

NB. Dieses Mittel ist besonders dann zu empfehlen, wenn die Geschwüre ein sehr schlechtes, fauliges Ansehen haben.

N°. 615.

Pinselsaft bei scorbutischem Zahnfleische und Speichelflusse.

℞. Acid. mur. dilut.
Extr. chinae
Terr. japon.
Tinct. myrrh. ana ʒß.
Syr. moror.
Mell. rosat. ana ℥j.
M. D. S. Oefters in den Mund zu nehmen und damit auszupinseln.

N°. 616.

Ein anderes Mittel.

℞. Acid. nitr. mur. ʒß.
Liquam. myrrh. ʒj.
Syr. papav. rh. ℥jj.
M. D. S. Den Mund täglich 3 mal damit auszupinseln.

N°. 617.

Pinselsaft von *Angelot*.

℞. Calc. chlorat. gr. xv. — ʒß.
Mucil. gm. arab. ℥j.
Syr. cort. aurant. ℥ß.
M. D. S. Mittelst eines Charpiepinsels die ulcerirten Stellen zu bestreichen.

N°. 618.

Ein anderes Mittel.

℞. Aq. oxymur. ℥ß.
Tinct. myrrh. ʒj.
Syr. rub. idaei ℥jß
M. D. S. 1 Theelöffel voll mit ½ Tasse Salbeithee zu mischen, und damit den Mund auszuspülen.

N°. 619.

Pinselsaft gegen leichte Geschwüre im Munde beim Speichelfluss.

℞. Borac. venet. ʒj.
Liquam. myrrh. ʒjß.
Mucil. gm. arab. ℥j.
Mell. rosar. ʒjjj.
M. D. S. Die Geschwüre damit zu pinseln.

N°. 620.

Schmidt's Pinselsaft gegen Merkurialgeschwüre.

℞. Extr. ratanh. ʒjj.
Mucil. sem. cydon. ℥j.
Mell. rosat. ℥ß.
Tinct. cupri Goelis. gtt. xjj.
M. D. S. Mittelst eines Charpiepinsels auf die Geschwüre zu bringen.

NB. Der Kranke darf nichts davon verschlucken, und kurz nachher muss er den Mund nochmals mit reinem Wasser ausspülen.