Pulveres.

4725. Rec. Natri phosphorici ℥j
Elaeosacchari macidis ʒij.
M. Fiat pulvis.
S. Auf einmal in Fleischbrühe.
Anwend. Als ein dem Geschmack sehr angenehmes, nicht schwächendes Abführmittel.

4726. Rec. Natri phosphorici ʒij-iij
— carbonic. siccat. ʒß-j
Elaeosacchari foeniculi ℥ß.
M. Fiat pulvis.
S. Täglich 3—4mal einen Theelöffel.
Anwend. Als Digestivpulver.

Berends.

4727. Rec. Natri phosphorici
Magnesiae carbonicae
Florum sulphuris
Pulv. semin. foeniculi aa ʒij
Camphorae rasae gr. iv-viij
M. Fiat pulvis. Divide in xvj part. aeq.
S. Alle 3 Stunden ein Pulver mit Schafgarbenthee.
Anwend. Bei Hämorrhoidalcongestionen mit Schwäche.

Richter.

X. Natrum sulphuricum. Schwefelsaures Natrum.

Sulphas natricus cum aqua, Sulphas sodae, Deutosulphas sodii, Natrum vitriolatum, Soda vitriolata, Vitriolum sodae, Sal catharticum s. mirabile Glauberi s. Glauberi, Sal Placentinus, Sal aperitivus Fridericianus, Alkali minerale vitriolatum. Schwefelsaure Soda, Wundersalz, Glaubersalz.

Man benutzt 1) das rohe, als Nebenprodukt bei der Bereitung der Salzsäure aus dem Kochsalz gewonnene schwefelsaure Natrum, Natrum sulphuricum crudum, 2) das gereinigte krystallisirte schwefelsaure Natrum, Natrum sulphuricum depuratum crystallisatum und 3) das getrocknete oder verwitterte schwefelsaure Natrum, Natrum sulphuricum depuratum siccum.

Wirk. u. Anwend. Man bedient sich des schwefelsauren Natrums oder Glaubersalzes als abführenden und antiphlogistisch-auflösenden Mittels bei entzündlichen Fiebern und activen Localentzündungen, Andrang der Säfte nach den obern Körpertheilen, Hirnentzündung, Ophthalmieen, Gesichtsrose, Kopfwunden, Schlagflüssen, Hirnerschütterungen, in den ersten entzünd-

lichen Stadien der Schleim-, Gallen-, Nerven- und exanthematischen Fieber, zur Wiederhervorbringung zu zeitig unterdrückter Wechselfieber, bei gastrischen Zuständen, Hartleibigkeit, habituellen Obstructionen, bei Stockungen in den Unterleibseingeweiden, Wurmbeschwerden und endlich bei Vergiftungen durch salzsaure Schwererde und Blei.

Gabe, u Form. Man giebt das Glaubersalz innerlich als Abführmittel zu ℥ß-ij, in verschiedene Portionen getheilt, und als auflösendes Mittel zu ʒj-ij, mehrmals täglich, in Auflösung, Emulsion, Pulver- und Latwergenform; äusserlich in Klystieren und Stuhlzäpfchen.

Mixturae.

4728. Rec. Natri sulphurici dep. cryst. ℥i.
Solve in
Aquae communis ℥v.
Adde:
Syrupi succi citri ℥ij.
M. D. S. Stündlich einen Esslöffel oder, will man rasch abführen, eine halbe Tasse.

4729. Rec. Natri sulphurici ℥j
Sacchari albi ℥ß
Succi citri recentis ℥iß
Decocti avenae excorticatae tenuioris et percolati mens. j.
M. S. Alle zwei Stunden eine Tasse voll, bis Wirkung erfolgt.
Anwend. Als antiphlogistisches Laxans.

Reil.

4730. Rec. Natri sulphurici ℥iß
Mannae electae ℥j.
Solve in
Aquae destillatae ℥vj.
M. S. Stündlich einen Esslöffel, bis Wirkung erfolgt.

4731. Rec. Natri sulphurici ℥j
Aloës lucidae gr. vj
Extr. hyoscyami gr. ij
Aquae foeniculi ℥vij.
M. S. Täglich 2—4mal einen Esslöffel voll.
Anwend. Als Abführmittel.

v. Graefe.

4732. Rec. Natri sulphurici
Pulpae tamarindorum aa ℥j.

Solve in
Aquae fervidae ℥vj
et colatis adde:
Spirit. sulph. aether. ʒj
Elaeosacch. anisi ʒij.
M. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

Vogt.

4733. Rec. Natri sulphur. cryst. dep. ℥iß
Sacchari albi ℥iij.
Solve in
Aquae communis ℥xvj.
Adde:
Succi citri recent. express. et colati ℥ß.
M. S. Als abführendes Getränk.

Berends.

4734. Rec. Infusi sennae ex ʒij parat. ℥iv
Natri sulphurici ℥ß
Syrupi rhei c. cichoreo ℥j.
M. S. In zwei bis drei Portionen zu verbrauchen.
Anwend. Als Abführmittel.

Lincke.

4735. Rec. Natri sulphurici ℥j.
Solve in
Jusculi herbarum ℥viij.
D. S. In zwei Portionen halbstündlich zu nehmen. Bei

Edwards & Vavasseur.

4736. Rec. Olei amygdal. dulc. ℥j
Vitell. ovor. No. ij.
Terendo misce cum
Syrup. mannae ℥ij
Aquae communis ℥vj
ut fiat emulsio, in qua solve:
Natri sulphurici dep. cryst. ℥j.
D. S. Stündlich umgeschüttelt zwei Esslöffel.

4737. Rec. Olei ricini ℥j
Vitell. ovor. No. ij.
Terendo sensim misce cum
Syrupi capit. papaveris ℥j
Aquae communis ℥vj
ut fiat emulsio, in qua solve:
Extr. hyoscyami gr. vj
Natri sulphurici dep. ℥jß.

M. S. Stündlich umgeschüttelt 1—2 Esslöffel.

Anwend. Bei Bleikolik, aber auch zu andern Zwecken. Bei

Phoebus.

4738. Rec. Natri sulphurici crystallis. ℥j
Kali nitrici depurati ʒij.
Solve in
Aquae rubi idaei ℥vj.
Adde:
Tartari stibiati gr. ß
Oxymellis simplicis ℥j.
M. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Bei entzündlich-fieberhaften Zuständen.

4739. Rec. Olei amygdal dulc. ℥j
Gummi mimosae pulv. q. s.
ut fiat cum
Aquae fontanae ℥v
emulsio, in qua solve:
Natri sulphurici cryst.
Syrupi amygdal. aa ℥j.
M. S. Stündlich einen Esslöffel.

Anwend. Bei entzündlicher Affection des Darmkanals.

4740. Rec. Sulphatis sodae crystallis. ʒij
Extr. taraxaci liquid. ʒj
Aquae communis ℥j
Syrupi cichorei cum rheo ℥ß.
M. S. Alle zwei Stunden einen Theelöffel voll.

Anwend. Bei der Gelbsucht Neugeborener mit Stuhlverhaltung.

Goelis.

4741. Rec. Natri sulphurici cryst. ʒj
Nitri depurati ʒjß.
Solve in
Decoct. rad. althaeae ex ℥ß parat. libr. j.
Adde:
Oxymellis simplicis ℥jß.
M. S. Alle zwei Stunden eine halbe Schale voll zu nehmen.

Anwend. In Entzündungskrankheiten mit Verstopfung.

4742. Rec. Sulphatis sodae
Mannae in lacrymis aa ℥ß
Tartari stibiati gr ij

Aquae ℥iv
Oxymellis scillitici ℥j.
Solve. *S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.*
Anwend. Als Katharticum. Bei

Cadet de Gassicourt.

Pulveres.

4743. Rec. Natri sulphurici
Pulv. radic. jalapae aa ℈j
Olei foeniculi gtt. ij.
M. S. Abführpulver, auf einmal zu nehmen.

4744. Rec. Natri sulphurici crystallis. ℥j
Tartari depurati ℥ß
Sacchari albi ʒvj.
M. Fiat pulvis. Detur in scatula.
S. Aller 2 Stunden 1—2 Theelöffel.
Anwend. Als Abführmittel.

Berends.

4745. Rec. Natri sulphurici sicci ʒij
Radicis rhei optimi ʒß
Elaeosacchari foeniculi ʒj.
M. Fiat pulvis.
S. Auf einmal zu nehmen und Chamillenthee nachzutrinken.

4746. Rec. Natri sulphurici siccati
Magnesiae sulphuricae
Sacchari lactis aa ℥ß.
M. Fiat pulvis. Detur in scatula.
S. Alle 2 Stunden einen Theelöffel voll, bis vermehrte Stuhlgänge erfolgen.

Vogt.

Sal Guindre.

4747. Rec. Natri sulphurici ℥j
Kali nitrici gr. xij
Tartari stibiati gr. ß.
M. Fiat pulvis.
D. S. In einer Pinte Tisane oder Kräuterbouillon aufzulösen und am Morgen zu nehmen.

4748. Rec. Sulphatis sodae ℥ij
Tartari stibiati
Opii puri aa gr. j
Gummi arabici pulv.

Radic. liquirit. pulv. aa ʒij.
M. Fiat pulvis. Detur in scatula.
D. S. Diese Portion auf 3—4mal im Tage zu nehmen.

Anwend. Als Cathartico-diureticum. Bei

Swediaur.

4749. Rec. Natri sulphurici ℈iv
Opii puri gr. ij.
M. Fiat pulvis. Divide in iv partes aequales.
S. Täglich 2—3mal ein Pulver.

Anwend. Bei Blutungen oder Entzündungen nach vorhergegangenen Aderlässen und wenn die Plethora vera gehoben ist.

Pitschaft.

Electuaria.

4750. Rec. Natri sulphurici depurati sicci ℥ß
Pulpae tamarindorum ℥j
Syrupi succi citri q. s.
ut fiat electuarium.
D. S. Umgerührt stündlich zwei Esslöffel.

4751. Rec. Electuarii lenitivi ℥j
Salis mirabilis Glauberi
Cortic. peruv. pulv. aa ʒij
Radic. jalapae pulv. gr. xv
Conservae nasturtii aquat. ℥j.
M. S. Alle 2 Stunden eine welsche Nuss gross mit Molken zu nehmen.

Anwend. Bei Metrorrhagieen skorbutischer Personen.

Strack.

Species.

4752. Rec. Natri sulphurici ℥j
Fol. sennae concis. ʒj.
Misce. Detur in triplo.
S. Ein Packet mit drei Tassen Wasser anzubrühen und alle halbe Stunden eine halbe Tasse zu trinken.

Anwend. Als Abführmittel.

Hufeland.

4753. Rec. Natri sulphurici ℥j
Folior. sennae
Summitat. millefolii
— centaurei minor. aa ℥ß
Semin. foeniculi ʒiij.

Misce. Fiant species.

S. Diese Species werden locker in ein Tuch gebunden, mit ½ Maass siedenden Wassers infundirt, die Nacht zugedeckt stehen gelassen und nach Beschaffenheit der Constitution Morgens nüchtern, oder, wo diess nicht vertragen wird, zwei Stunden nach dem Frühstück eine halbe oder ganze Tasse voll davon getrunken.

Anwend. Gegen chronische Blutflüsse innerhalb der Schwangerschaft, so wie während und nach derselben.

Oesterlein.

Clysmata.

4754. Rec. Decocti avenae ℥iv
Natri sulphurici
Aceti crudi
Olei olivarum aa ℥j.
Solve. *S. Zum Klystier.*

4755. Rec. Folior. sennae ʒij
Decoct. semin. lini bullient. libr. ij.
Infunde et colaturae adde:
Natri sulphurici ℥ß.
M. S. Zum Klystier.

Hôp. de la Matern.

4756. Rec. Specier. emollient. ℥ij
Folior. sennae ℥ß
Natri sulphurici ʒij
Aquae bullientis libr. j.
Infunde et cola.
S. Als eröffnendes Klystier.

Hôt. Dieu.

4757. Rec. Fol. sennae alexandrin. ʒiij
Radic. rhei chinens. ʒß.
Infunde
Aquae fervidae s. q.
et digere per horam. Colat. ℥xij adde:
Natri sulphurici crystallis. ℥j.
M. D. S. Zu zwei Klystieren.

Vogt.

XI. Nicotiana. Tabak.

Nicotiana tabacum Linn. Gemeiner Tabak oder Tobak. Man wendet die Blätter, Herba s. folia tabaci s. nicotianae, an.

Wirk. u. Anwend. In kleinen Gaben wirkt der Tabak

vermehrend auf die Absonderungen der Schleimhaut der Respirationsorgane, des Darmkanals und der Harnwerkzeuge. In etwas grösserer Gabe in den Magen gebracht, verursacht er Ekel, Erbrechen, Durchfall, häufigen Harnabgang, kleinen, schwachen und zusammengezogenen Puls, Angst, kalten Schweiss, Schwindel, Betäubung, Ohnmacht, und in noch grösseren Gaben den Tod durch allgemeine Lähmung. Man benutzt ihn oft mit gutem Erfolg gegen mehrere chronische Nervenkrankheiten, bei Epilepsie innerlich und hauptsächlich als Fomentation auf die Magengegend, bei Schleim- und Krampfasthma, Keuchhusten, Krampfkolik, Nervenschlag, Starrkrampf, Scheintod Erwürgter, Erstickter, Ertrunkener, bei eingeklemmten Brüchen, Windsucht, hartnäckiger Stuhlverstopfung, wenn sie von einer Lähmung des Darmkanals oder einem tonischen Krampfe desselben herrührt, bei Wassersucht, behindertem Harnlassen von Harnsteinen etc. Aeusserlich wird er gebraucht bei Augenkrankheiten, Zahnschmerz, Verschleimung der Stirnhöhle und Eustachischen Röhre etc., als Ableitungsmittel, bei hartnäckigen chronischen Exanthemen, Flechten, Krätze, Tinea capitis, unreinen Geschwüren, Ungeziefer etc.

Präparate sind: 1) die Tinctura nicotianae, 2) das Oleum nicotianae destillatum, 3) das Oleum nicotianae coctum und 4) das Extractum nicotianae.

Gabe u. Form. Man giebt die Tabaksblätter innerlich in Pulver und Pillen zu gr. ½—2 p. d., im Absud, in der Ebullition ʒß-j auf ℥iv-vj, das Extract zu gr. ½—2 gr., die Tinctur zu 20—40 Tropfen, 3—4mal täglich. Aeusserlich wird der Tabak als Infusum zu Augenwässern, Waschungen, Bähungen, Kataplasmen und Klystieren verordnet. Die Tabaksrauchklystiere kann man, wenn man keinen eigens dazu construirten Apparat hat, auf folgende Weise instituiren. Man füllt eine kurze thönerne Tabakspfeife mit Tabak, zündet diesen an, bringt die mit Oel bestrichene Spitze der Pfeife vorsichtig und nicht zu tief in den Mastdarm, setzt nun den leeren Kopf einer zweiten thönernen Pfeife auf den gefüllten, umwickelt die Ränder der beiden Köpfe möglichst luftdicht mit Löschpapier u. dergl., und bläst durch das Rohr der zweiten Pfeife den Rauch in den Mastdarm einige Minuten lang oder länger, wenn es der Kranke erträgt. Oder man füllt auch einen entleerten kleinen Blasebalg, der mit einer passenden, nicht verletzenden Spitze versehen ist, durch sein Luftloch mit dem Dampfe aus einer Tabakspfeife an, verschliesst dann das Luftloch so gut als möglich und entleert ihn in den Mastdarm.

Guttae.

4758. Rec. Tincturae nicotionae q. s.

D. S. Alle Stunden 20 Tropfen in Leinsaamenthee.
Anwend. Gegen Harnverhaltung. Doch erfordert die Anwendung dieses Mittels Vorsicht.

Westberg.

Mixturae.

4759. Rec. Extr. nicotianae ʒjß
Vini antimonii ℥ß
Aquae cinnamomi ℥j.
M. S. Täglich 4mal 60—80 Tropfen.
Anwend. Gegen Bauchwassersucht.

Himly.

4760. Rec. Tinct. nicotianae
Spirit. nitrico-aether.
Oxymell. colchici
— scillitici aa ℥ß.
M. S. Täglich 4mal einen Kaffeelöffel voll.
Anwend. Gegen Wassersucht.

Ferriar.

Infusa.

4761. Rec. Folior. nicotianae ℥ß
Aquae ferventis ℥vj.
Digere in vase clauso per horam in balneo Mariae ad colaturam ℥iv; cui adde:
Spiritus vini rectificati ℥ij.
M. S. Zweistündlich täglich 40—80 Tropfen, mit 5—10 Tropfen bis auf 200 gestiegen.
Anwend. Bei Wassersucht und Dysurie.

Fowler.

4762. Rec. Folior. nicotianae ʒj-ʒß.
Infunde cum
Aquae fervidae s. q.
ad colat. ℥iv. Adde:
Syrupi cinnamomi ℥ß.
M. S. Alle 2—3 Stunden einen Esslöffel.
Anwend. Gegen Brust- und Herzbeutelwassersucht, Krampfhusten mit und ohne Tuberkeln, Oedem.

Radius.

4763. Rec. Folior. nicotianae ℈j
Aquae comm. fervid. s. q.
Repone ad refrigerationem. Colat. ʒvj adde:
Syrupi amygdalarum ℥j.
M. S. Stündlich umgeschüttelt Kindern von 1—2 Jah-

ren einen oder zwei grosse Theelöffel, 8—10jährigen Kindern einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Keuchhusten.

Pitschaft.

4764. Rec. Folior. nicotianae ℥iij
Radic. rhei ℥ij.
Ebulliant cum
Aquae communis s. q.
ad colaturam ℥viij.

D. S. Stündlich einen starken Esslöffel.

Anwend. In verzweifelten Fällen von Brucheinklemmung.

Richter.

4765. Rec. Folior. nicotianae ℥j
Radic. angelicae v. calami ℥iij
— glycyrrhizae ℥ß.
Infunde
Aquae fervidae s. q.
ad colat. ℥viij.

M. S. Alle 1½ Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Im Keuchhusten, bei Epilepsieen, Paralysen, und andern hartnäckigen Nervenübeln während eines mehr als 20jährigen Zeitraumes mit dem besten Erfolge angewendet.

Fischer.

Pulveres.

4766. Rec. Folior. nicotian. gr. ij
Tartari emetici gr. j
Gummi arabici ℥ß
Sachari albi ℥ij.
M. fiat pulvis. Divide in xx partes aequales.

S. Aller 2 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Gegen Keuchhusten sehr verschleimter Kinder; sehr oft ein Brechmittel vorher bei träger Lebenskraft.

Pitschaft.

4767. Rec. Extr. folior. nicotianae gr. ¼-ij
Elaeosach. foeniculi ℈ß.
M. fiat pulvis. Dentur tales doses xij.

S. Täglich 3—4mal 1 Pulver.

Anwend. Gegen Keuchhusten. Bei vorhandener Aufregung im Gefässsystem kleine Gaben Kalomel und bei erschwerter Expectoration gebrochene Gaben Goldschwefel damit verbunden.

Wolfsheim.

Pilulae.

4768. Rec. Pulv. folior. nicotianae virgin. caute siccat.
Conservae rosarum aa. ʒj
Mucilaginis gummi mimosae q. s.
M. fiant pilulae 60. Consperg. pulv. radic. althaeae.
D. S. Täglich dreimal oder öfter ein bis drei Stück.
Anwend. In des Wassersucht. Bei

Augustin.

4769. Rec. Extr. nicotianae ʒß
— liquiritiae ℥ß
Aceti scillitici. s. q.
Fiant pilulae No. 90. Consperg. pulv. radic. liquirit.
D. S. Täglich 2—3mal 1—3 Stück zu nehmen.
Anwend. Gegen Wassersucht.

Collyria.

4770. Rec. Folior. nicotianae
Herb. rorismarini
— salviae aa ℈iv
Aloës lucidae pulv. ℈ß
Vini gallici albi ℥iv.
Digere per nychthemer. in balneo arenae. Colaturam filtra.
D. S. Mehrmals täglich das Augenlied zu waschen.
Anwend. Gegen verhärtete Geschwülste der Augenlieder und Gerstenkörner.

Janin.

4771. Rec. Folior nicotianae ʒiß
Liquoris ammonii acetici ʒiij
Aquae fervidae ℥iß.
Digere per ¼ horam et cola.
S. Zu einigen Tropfen ins Auge zu träufeln.
Anwend. Gegen Mydriasis.

Sundelin.

Pulvis sternutatorius.

4772. Rec. Folior. nicotianae
— majoranae
Flor. lavandulae aa ℥ß.
Fiat pulvis subtilissimus.
S. Täglich öfters eine Priese zu nehmen.

Pharm. Hassiac.

*

Fomentatio.

4773. Rec. Folior. nicotianae ℥ij
Aquae fontanae libr. ij.
Coque per dimid. hor. et dein filtra.
D. S. Zum Ueberschlagen.
Anwend. Gegen Krätze, besonders Krätzflechte.

Lotio.

4774. Rec. Herbae nicotianae ℥ij.
Aquae fontanae ℥xvj.
Ebulliant per horae quadrantem. Colaturae adde:
Kali carbonici ʒj.
S. Zum Waschen des Kopfes oder Ueberschlagen mittelst Compressen, nachdem die Haare abgeschoren worden sind.
Anwend. Gegen Tinea. Ausserdem soll man die grindigen Stellen gleichzeitig früh und Abends mit einer Salbe aus Hydrarg. muriat. mit. ʒj und Unguent. picis ℥j einreiben.

Marryat & Niemann.

4775. Rec. Fol. siccat. nicotian. libr. ij.
Coque per horam cum
Aquae libr. xv.
Adde:
Natri subcarbonici ℥iv.
M. S. Zum Waschen.
Anwend. Gegen Krätze.

Clysmata.

4776. Rec. Fol. nicotianae ʒj.
Infunde cum
Aquae fervidae s. q.
In colatura ℥vj solve
Tartari stibiati gr. vj.
D. S. Wohl umgeschüttelt zu zwei Klystieren.
Anwend. Im Scheintod.

4777. Rec. Fol. nicotianae virgin. ℈j - ʒj.
Infunde
Aquae fervidae q. s.
Colaturam ℥vij. Adde:
Olei lini ℥j.
M. S. Zu zwei Klystieren.
Anwend. Bei eingeklemmten Brüchen, heftigen Krämpfen.

4778. Rec. Folior. siccat. nicotianae ʒij-℥ß.
Infunde cum
Aquae bullientis libr. j.
Coque per aliquot momenta, digere deinde per horam et cola.
S. Zu zwei bis drei Klystieren.
Anwend. Bei Ileus, hartnäckiger Verstopfung und Askariden. Bei

Swediaur.

Cataplasma.

4779. Rec. Folior. nicotianae ℥j.
Coque cum
Aquae fontanae s. q.
ut fiat cataplasma.
S. Als Umschlag auf das Epigastrium.
Anwend. Um Erbrechen hervorzubringen. Bei

Ellis.

Linimentum.

4780. Rec. Herbae nicotianae
— digitalis aa ʒiij.
Infunde cum
Aquae fervidae s. q.
ad colat. ℥iv, cui refrigerat. adde:
Extr. scillae
Olei terebinthinae aa ʒj
Vitell ovor. No. ij.
Fiat emulsio.
D. S. Täglich 2—3mal 1 Theelöffel voll in jede Nierengegend einzureiben.
Anwend. In der Bauchwassersucht. Dabei innerlich alle Stunden einen Esslöffel von einem Aufguss aus ℈j Digitalis und ʒj Enzian auf ℥vj Wasser mit ℥j Oxymel scilliticum.

J. R. Schmitt.

Ceratum.

4781. Rec. Succi nicotianae
Cerae flavae aa ℥iij
Resinae pini ℥iß.
Olei myrrhae s. q.
M. S. Zum äusserlichen Gebrauch.
Anwend. Gegen Flechten ohne begleitende Entzündung und Schmerzen empfohlen von

Consbruch.

Unguentum mundificans Poterii.

4782. Rec. Folior. nicotianae manip. vj
Butyri ℥xxiv
Terebinthinae ℥iv.
Post octo dies insolationis exprime et colaturae adde:
Gummi ammoniaci
— galbani aa ℥ij
Antimonii crudi
Cinnabaris aa ℥iij
Myrrhae
Olibani aa ℥ij.
Misce exacte ut fiat unguentum.
S. Salbe.
Anwend. Zur Behandlung von Fistelgeschwüren.

Emplastrum.

4783. Rec. Folior. nicotian. ℥iv
Olei olivarum ℥xij
Vini rubri ℥v.
Coque ad humidi consumptionem usque, exprime et adde:
Cerae flavae
Colophonii aa ℥xij.
Liquefactis adde:
Pulv. tacamahacae
— elemi
— myrrhae
— aloës aa ℥j
Olei essent. nicotianae ℥ij.
M. fiat emplastrum.
S. Auf Leder gestrichen über den Unterleib zu legen.
Anwend. Bewirkt Stuhlausleerungen nach

Triller.

XII. Nux vomica. Brechnuss.

Strychnos nux vomica Linn. Gemeines Krähenauge.

Wirk. u. Anwend. Die Brechnuss wirkt als ein kräftiges Reizmittel auf das Nervensystem, und vorzugsweise, ja fast specifisch auf das Rückenmark und die von ihm ausgehenden Nerven, so wie auf das Gangliensystem. In kleiner Gabe vermehrt sie die Hautausdünstung, die Harn- und Schleimabsonderung. In etwas grösserer Gabe verursacht sie Angst, Unruhe, Schwindel und Betäubung, Flimmern und Funkeln vor den Augen, Eweiterung der Pupille, Ameisenlaufen dem Rückgrath ent-

lang, auf den Armen und Schenkeln, schmerzhafte Zuckungen vom Rücken aus nach auf- und abwärts durch die Extremitäten, oder ein Gefühl von Erschütterung oder Schlägen durch die obern und untern Gliedmassen. Bei stärkerer Einwirkung erfolgt eine plötzliche Ermattung des ganzen Körpers, heftiges Erbrechen und Abführen, grosse Beängstigung, Convulsionen, Starrheit der Glieder und schneller Tod durch Lähmung, welche vom Rückenmark und Gangliensysteme ausgeht. Das Mittel findet daher seine Anwendung bei allgemeinen und partiellen Lähmungen, namentlich der Extremitäten, in steigenden Gaben bis zur Entstehung krampfhafter Zuckungen, ferner bei grosser Schwäche der Zeugungstheile, paralytischer Harnexcretion, bei Epilepsie, Katalepsie, Veitstanz, Keuchhusten, Hydrophobie, krampfhaft asthenischen Beschwerden, endlich in der Ruhr in ihrem letzten Stadium, um den schmerzhaften Stuhlgang zu beschwichtigen und die übermässige Schleimabsonderung zu beschränken, aber auch in andern Bauchflüssen, chronischen Durchfallen, Lienterie, Morbus coeliacus, hartnäckigen Wechselfiebern und in der Wurmkrankheit.

Präparate sind: 1) die Tinctura nucis vomicae, 2) das Extractum nucis vomicae aquosum und 3) das Extractum nucis vomicae spirituosum.

Gabe u. Form. Man giebt die Brechnuss innerlich zu gr. i-ij, allmälig steigend bis zu gr. v, Anfangs nur 1—2mal, später wohl 3—4mal täglich, im Aufguss, Pulver oder in Pillen; die Tinctur zu gtt. x-xxx in einem Trank; das wässerige Extract zu gr. ß-j-v, und das weingeistige Extract zu gr. ß-j iij-iv, 2—4mal täglich, in Mixtur, Pulver und Pillen Aeusserlich gebraucht man die Tinctur und das Extract zu Einreibungen, Linimenten und Salben.

Mixturae.

4784. Rec. Extr. nucis vomicae gr. j-ij
Aquae destillatae ℥ij.
Solve. *S. Aller 4 Stunden 6 — 10 Tropfen.*

Anwend. Gegen Mastdarmvorfall kleiner Kinder; für Säuglinge genügen 2 — 3 Tropfen. Bei hartnäckigen Fällen verbindet man es mit Extr. ratanhiae.

Schwartz, Hufeland & Cales.

5785. Rec. Extr. nucis vomicae spirit. gr. iij.
Solve in
Spiritus vini rectificatissimi ℥j.
Solve. *S. Anfänglich 20 40 Tropfen zweimal täglich.*
Anwend. Gegen Lähmungen.

Magendie.

4786. Rec. Extr. nucis vomicae spirit gr. vj-xij.
Solve in
Tinct. colocynthidis ʒj
— pimpinellae ʒiij.
D. S. Täglich 2—3 mal 30 Tropfen mit Arnicathee.
Anwend. Bei Lähmungen, namentlich der untern Extremitäten. Bei

Phoebus.

4787. Rec. Extr. nucis vomicae spirit. gr. xxiv
Camphorae ʒj
Tinct. pyrethri ℥j.
Solve. *S. Täglich 4 mal 20 Tropfen.*
Anwend. Gegen Lähmungen.

Vogt.

4788. Rec. Tinct. nucis vomicae
— cantharidum aa ʒij
Naphthae phosphoratae ℈ij.
M. S. Täglich 3—4 mal 30 Tropfen mit Arnicathee.
Anwend. Gegen Lähmungen reizloser Subjecte.

Vogt.

4789. Rec. Extr. nucis vomicae spirit. gr. ij-iv-vj
Solve in
Aquae melissae ℥vj.
Adde:
Mucilag. gummi mimosae ℥ß.
M. D. S. Umgeschüttelt 2stündlich 2 Esslöffel.
Anwend. Gegen Paralyse der untern Extremitäten und gegen Epilepsie.

4790. Rec. Extr. nucis vomic. spirit. ℈ß.
Solve in
Infusi arnicae ex ʒij parat. ℥v.
Adde:
Vini stibiati ʒiij
Spirit. sulphurico-aether. ʒj
Syrupi zingiberis ℥j.
M. D. S. Umgeschüttelt zweistündlich einen Esslöffel.
Anwend. Bei rheumatischen und rein nervösen vom Rükkenmark ausgehenden Lähmungen der Gliedmassen.

Sobernheim.

4791. Rec. Flor. arnicae ℥ß
Radic. calami aromat. ʒvj.

Concisis infunde
Vini albi generosi ℥iv
et digere loco tepido per horas iv. Dein cola et residuum expressum coque cum
Aquae fluv. s. q.
ad remanentiam ℥iv. Colaturis ambabus mixtis adde:
Extr. nucis vomicae spirit. gr. viij
Syrupi senegae ʒvj.
M. D. S. Täglich 4mal einen Esslöffel.

Vogt.

4792. Rec. Extr. nucis vomicae aquosi ʒß
Mucilaginis gummi arabici ℥ß
Aquae menthae crispae ℥vj
Syrupi althaeae ℥j.
Solve. *S. Zweistündlich einen Esslöffel.*
Anwend. Gegen Ruhr.

Hufeland.

4793. Rec. Cortic. cascarillae ʒj-ij.
Infunde in
Aquae fervidae s. q.
Colaturae ℥ij-iij adde:
Extr. nucis vomicae aquosi gr. j-ij
Mucilaginis gummi mimosae
Syrupi althaeae aa ℥j.
M. S. Umgeschüttelt zweistündlich einen Esslöffel.
Anwend. Bei Diarrhöen der Kinder mit grosser Erschöpfung, mangelhafter Ernährung, bedeutend gesteigerter Empfindlichkeit des Darmkanals, Unterleibskrämpfen, beständigem Drängen und tenesmodischen Stühlen, selbst mit Aftervorfall, ausgezeichnet befunden.

A. Richter.

Solamen gonorrhoicum Handelii.

4794. Rec. Extr. nucis vomicae aquosi ℈ß.
Solve in
Decocti cucumerin. ℥vj
Olei lini vitell. ovi subact. ℥j
Mellis simplic. ℥ß.
M. S. Umgeschüttelt 2stündlich 1 Esslöffel.
Anwend. In jedem Stadium der Gonnorrhöe, doch besonders im Nachtripper.

Guttae amarae.

4795. Rec. Nucis vomicae libr. ß

Kali subcarb. liquid. ℥ij
Fuliginis puri ʒß
Spirit. absinthii libr. j.
Post dies quatuordecim infusionis in balneo aquae exprime et filtra.

S. Einen, höchstens bis 8 Tropfen in einem Glasse eines bitteren Aufgusses.

Anwend. Gegen Windkolik. Bei

Cadet de Gassicourt.

Pulveres.

4796. Rec. Nucis vomicae gr. ij
Magnesiae carbonicae gr. vj.
M. fiat pulvis. Dentur tales doses No. xij.

S. Täglich 4 mal ein Pulver.

Anwend. Bei Bleikolik mit Erfolg angewandt. Am zweiten oder dritten Tage waren die Schmerzen gewichen, wobei zugleich Ausleerungen runder, harter, schwärzlicher Fäcalstoffe erfolgten; nach und nach kehrten die Functionen zur Norm zurück und die Schmerzen hörten auf.

Seraphinen-Hospit. z. Stockholm.

4797. Rec. Nucis vomicae gr. j
Magnesiae carbonicae ℈ß.
M. fiat pulvis. Dentur tales doses No. viij.

S. Täglich 4 mal ein Pulver.

Anwend. Bei Gastralgieen mit Brechneigung, Aufstossen, verdorbenem Geschmack, Flatulenz.

Ebendaselbst.

4798. Rec. Pulv. nucis vomicae gr. iij
Gummi mimosae
Sacchari albi aa ℈ß.
M. fiat pulvis. Dentur doses tales q. l.

S. Täglich dreimal 1 Stück zu nehmen.

Anwend. In der Dysenterie.

Hufeland.

4799. Rec. Pulv. nucis vomicae
Flor. zinci aa gr. vj
Pulv. radic. valerianae sylv. ʒij
— sacchari albi ʒj.
M. fiat pulvis. Divide in vj part. aequales.

S. Früh und Abends ein Pulver zu nehmen.

Anwend. Bei lähmungsartiger Schwäche der Glieder mit gleichzeitigen krampfhaften Beschwerden.

Pilulae.

4800. Rec. Extr. nucis vomicae
Pulv. — — aa ʒj.
M. Fiant pilulae pond. gr. ij.
D. S. Allmälig steigend Morgens und Abends sechs Stück.

Anwend. Bei rheumatischer Lähmung der Extremitäten.

Trinius.

4801. Rec. Pulv. nuc. vomic.
Extr. — — aa ℈j.
M. Fiant pilulae No. 40. Consperg pulv. radic. althaeae.
D. S. Aller 4—3—2 Stunden 1 Stück.

Anwend. Gegen Kopfgicht, Schwindel und andere Kopfaffectionen. Sehr sensible Personen können oft nur 1—2 Stück vertragen. Wo die genannten Kopfzufälle oder auch bloss grosse Eingenommenheit des Kopfes, Schläfrigkeit, Betäubung fieberlos von Stuhlverstopfung begleitet werden, kann man den Pillen 15—20—30 Gr. Extr. aloës aquos. zusetzen.

Kopp.

4802. Rec. Pulv. nucis vomicae ʒß
Succi liquiritiae q. s.
ut fiant pilulae No. 60. Consperg. lycopodio.
S. Täglich 2mal 2 Stück und allmälig gestiegen.

Anwend. Gegen Lähmung.

Poliklinik zu Berlin.

4803. Rec. Extr. nucis vomicae spirit. ℈j
— liquiritiae ℈vij.
M. Fiant pilulae No. 80. Consperg. pulv. rad. iridis florent.
S. Täglich 2—3mal 2—6 Stück.

Anwend. Gegen Lähmungen, hämorrhoidalischen Kopfschmerz, Blasenschwäche und daher rührendes unfreiwilliges Pissen.

Radius.

4804. Rec. Nucis vomicae pulveratae gr. j-vj
vel
Extr. nucis vomicae gr. j-vj
Sacchari albi pulverati ℈ß
Roob sambuci q. s.
ut fiant l. a. pilulae No. vj.

Aquae fontanae s. q.
per horam. Colat. libr. j adde:
Roob juniperi ℥j.
M. S. Auf zweimal zu nehmen.

Anwend. Im Hydrops. Bei

Fr. X. Hartmann.

Species.

4893. Rec. Radicis ononidis
Herbae virgae aureae aa ℥ß.
C. F. species. Dent. tales doses. vj.
S. Mit 4 Tassen heissen Wassers als Thee bereitet zum täglichen Verbrauch.

Anwend. Gegen Nierensteine.

Muhrbeck.

X. Opium. Mohnsaft.

Opium thebaicum, Succus thebaicus, Meconium, Papaveris somniferi succus inspissatus.

Ein fester, verhärteter Saft, welcher zum Theil auf Einschnitte aus den noch nicht reifen Kapseln des Mohns, Papaver somniferum und officinale, ausfliesst, zum Theil aber auch durch Auspressen der zerstampften Pflanzen gewonnen wird. Man unterscheidet im Handel besonders zwei Sorten Opium: 1) das exotische oder orientalische, Opium orientale, und von diesem wieder 5 Sorten: a. das constantinopolitanische, b. das smyrnaische, c. das ägyptische, d. das ostindische und endlich e. das persische Opium; 2) das inländische oder englische Opium, Opium indigenum s. nostras v. anglicum.

Wirk. u. Anwend. Das Opium wirkt in kleinen Gaben Anfangs erregend und belebend auf das Gefäss- und Nervensystem, und beschränkt die peristaltische Bewegung der Gedärme, in grösseren hingegen betäubend, einschläfernd und erschlaffend. In sehr grosser Gabe verursacht es im Anfange bisweilen Wuth, bald darauf aber Sopor, Schlagfluss, Lähmung, Aufhebung des Athemholens und der Circulatian, Erstickung und Tod. In minder unglücklichem Falle bleiben Stumpfsinnigkeit, Verlust des Gedächtnisses, Zittern der Glieder, Lähmungen der Glieder etc. zurück. Es passt dieses grosse Mittel in allen Fällen krankhaft erhöhter Thätigkeit des sensiblen Lebens und vermehrter Empfindlichkeit des Nervensystems wenn die Schwäche in den übrigen Systemen noch nicht den höchsten Grad erreicht hat; mithin bei Krämpfen, Nervenzufällen, Schmerzen, Unruhe, Schlaf-