CONTINUATIO

SYNGENESIAE.

601. CARDUUS MARIANUS.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO I. Polygamia aequalis.

GENUS. *Calyx* ovatus, imbricatus, squamis spinosis. *Receptaculum*, pilosum.

SPECIES. *Carduus* foliis amplexicaulibus hastato-pinnatifidis spinosis, *calycibus* aphyllis; spinis canaliculatis, duplicato-spinosis.

LOCUS. Planta annua, crescens in aggeribus et ruderatis Europae australis.

PHARMACEVTICA PARS. Semina et herba *Cardui Mariae.* Germ. MARIENDISTEL. *Gall.* CHARDON DE NÔTRE DAME.

ODOR nullus. *Sapor* subamarus.

VIRTUS oleracea. Folia ablatis spinis oleribus adduntur, et in Anglia instar acetarii comeduntur.

USUS. Succus in hydrope et febre intermittente, emulsio e seminibus in pleuritide quondam dabatur.

DOSIS. In febre intermittente ante accessum unciae quatuor succi dantur.

602. ONOPORDUM ACANTHIUM.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO I. Polygamia aequalis.

GENUS. *Receptaculum* favosum. *Calycis* squamae mucronatae.

SPECIES. *Onopordum* calycibus squarrosis: *squamis* patentibus: *foliis* ovato-oblongis, sinuatis.

LOCUS. Planta biennis, crescens ad vias et in locis ruderatis.

PHARMACEVTICA PARS. *Cardui tomentosi* herba recens. Germ. WEISSE WEGDISTEL, KREBSDISTEL. Gall. CHARDON COMMUN. EPINE BLANCHE SAUVAGE.

ODOR nullus. *Sapor* oleraceus.

VIRTUS. Radix et discus instar cynarae edulis. Succus herbae recentis anticancrosus.

USUS. In ulceribus concroideis faciei, nasi, labiorum succus recens dum linteo carpto, vel ipsa herba contusa applicatur, insigne praestitit auxilium testimonio multorum auctorum. Frustra autem contra mammarum cancrum, utpote maligniorem tentabatur.

FORTSETZUNG

DER MITBUHLER.

601. DIE MARIENDISTEL.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. I. ORDNUNG. Gleiche Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Kelch *eyrund, dachziegelförmig übereinander gelegt, aus dornigen Schuppen bestehend. Der* Fruchtboden *haarig.*

ART. Die Distel *mit den Stängel umfassenden, spiefsförmig gefiedert in Querstücke gespaltenen, dornigen Blättern, blätterlosen* Kelchen, *und doppelt stachlichen, rinnenförmigen Dornen.*

VATERLAND. Eine jährige Pflanze, welche auf Dämmen und Schutte des südlichen Europa wächst.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Samen und Kraut der Mariendistel. *Latein.* CARDUUS MARIAE. *Franz.* CHARDON DE NÔTRE DAME.

GERUCH, keiner. Geschmack, *etwas bitter.*

ARZNEYKRAFT, gemüfsartig. Man nimmt die Blätter, wenn man sie von den Stacheln entblöfst hat, zu Zugemüfs, und ifst sie in England als Salat.

GEBRAUCH. Den Saft pflegte man einst in der Wassersucht und im Wechselfieber, die Pflanzenmilch aus Samen bey Seitenstechen zu geben.

DOSIS. Man gibt im Wechselfieber vor dem Anfalle desselben vier Unzen Saft.

602. DIE GEMEINE ZELLBLUME.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. I. ORDNUNG. Gleiche Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *zellicht. Die Schuppen des* Kelches *stechend.*

ART. Die Zellblume *mit sparrigen Kelchen, abstehenden Schuppen und eyrund-länglichen, vertieften Blättern.*

VATERLAND. Eine zweyjährige Pflanze, welche an Wegen und auf Schutte wächst.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Das frische Kraut der weifsen Wegdistel, Krebsdistel. *Latein.* CARDUUS TOMENTOSUS. *Franz.* CHARDON COMMUN. EPINE BLANCHE SAUVAGE.

GERUCH, keiner. GESCHMACK, gemüfsartig.

ARZNEYKRAFT. Wurzel und Scheibe wie bey der efsbaren Artischocke. Der Saft des frischen Krautes wider den Krebs.

GEBRAUCH. In krebsartigen Geschwüren des Gesichtes, der Nase, der Lippen, hat sie sich, nach dem Zeugnisse vieler Schriftsteller, als ein vortreffliches Heilmittel bewiesen, indem entweder der frische Saft auf Charpie, oder die zerstossene Pflanze selbst aufgelegt wird. Vergebens versuchte man sie aber gegen den Krebs der Brüste, welcher bösartiger ist.

603. EUPATORIUM CANNABINUM.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO I. Polygamia aequalis.

GENUS. *Receptaculum* nudum. *Pappus* plumosus. *Calyx* imbricatus, oblongus. *Stilus* semibifidus.

SPECIES. *Eupatorium* foliis digitatis.

LOCUS. Planta perennis locorum aquosorum.

PHARMACEVTICA PARS. Herba et radix *Eupatorii*. Germ. WASSERDOSTEN, KUNIGUNDISKRAUT. Gall. EUPATOIRE.

ODOR fortis. *Sapor* peramarus.

VIRTUS. Alvum, lotium et vomitum movens, roborans, viscera abdominis obstructa resolvens.

USUS. In hydrope, infarctu viscerum abdominalium praesertim ex febribus intermittentibus nato. Rusticis in Belgio vulgaris in scorbuto, ulceribus mali moris et cruribus tumidis medela est. Cataplasma ex coctis foliis hydrocelen aliosque tumores scroti dissipat.

DOSIS. Pugillus herbae cum aquae, vini vel cerevisiae ℥IV. in *infuso*.

604. SPILANTHUS ACMELLA.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO I. Polygamia aequalis.

GENUS. Receptaculum paleaceum, conicum. *Semina* apice biaristata, arista altera minore. *Calyx* subaequalis.

SPECIES. *Spilanthus* foliis ovatis serratis, caule erecto, floribus radiatis. Caveas ne confundatur cum *Spilantho Pseudacmella*, huic simillima, sed radio destituta.

LOCUS. Planta annua, in Zeylona et Ternata crescens.

PHARMACEVTICA PARS. Herba et semina *Acmellae Zeylanicae*. Germ. INDIANISCHES HARNKRAUT. Gall. ACMELLE.

ODOR herbae nullus. *Sapor* subamarus, subadstringens, balsamicus, masticatione linguam calefaciens.

VIRTUS. Mirifice olim claruit vi calculum comminuendi, diuretica, roborante. Post bibitum Acmellae infusum urina hominis, vesicae calculo laborantis, per chartam colata, reliquit sursum plus tartari et crassiorem, quam antea.

603. DIE HANFARTIGE EUPATORIE.

XIX. KLASSE Mitbuhler. I. ORDNUNG Gleiche Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *nackt. Die* Haarkrone *federig. Der Kelch dachziegelförmig übereinander gelegt, länglich. Der Griffel halbzweyspaltig.*

ART. Das Alpkraut *mit gefingerten Blättern.*

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze an feuchten Orten.

PHARAMZEVTISCHER THEIL. Kraut und Wurzel des Wasserdosten, Kunigundiskrautes. *Latein.* EUPATORIUM. *Franz.* EUPATOIRE.

GERUCH, stark. GESCHMACK, sehr bitter.

ARZENEYKRAFT. Purgierend, Urin treibend, Erbrechen erregend, stärkend, die verstopften Baucheingeweide auflösend.

GEBRAUCH. In der Wassersucht, Verstopfung der Baucheingeweide, besonders wenn sie vom Wechselfiebern herrührt. Die Bauern in den Niederlanden brauchen dieses Kraut als Hausmittel gegen Scorbut, bösartige Geschwüre, und geschwollene Beine. Das Köchelchen aus gekochten Blättern zertheilt den Wasserbruch und andere Geschwülste des Hodensackes.

DOSIS. Fünf Finger voll Kraut mit vier Unzen Wasser, Wein oder Bier, als Aufguss.

604. DIE ACMELLE.

XIX. CLASSE. Mitbuhler. I. ORDNUNG. Gleiche Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *spreuförmig, konisch. Die* Samen *an der Spitze 2 granicht, wovon die eine Grane kleiner ist. Der* Kelch *fast gleich.*

ART. Spilanth *mit eyrunden gesägten Blättern, aufrecht stehendem Stängel, und strahligen Blumen. Man hüte sich, sie mit der* unechten Acmelle *zu verwechseln, welche dieser sehr ähnlich ist, aber keine strahligen Blumen hat.*

VATERLAND. Eine jährige Pflanze, welche auf Zeylon und Ternate wächst.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Kraut und Samen des indianischen Harnkrautes. *Latein.* ACMELLA ZEYLANICA. *Franz.* ACMELLE.

GERUCH des Krautes, keiner. GESCHMACK, etwas bitter, zusammenziehend, balsamisch, durch Kauen die Zunge erhitzend.

ARZENEYKRAFT. Sie war einst vorzüglich berühmt wegen Auflösung der Harnsteine, wegen Harn treibender und stärkender Kraft. Nach getrunkenem Aufgusse der Acmella, liefs der durch Papier gesiehene Urin eines Menschen, welcher am Blasensteine litt, oben viel mehr und dickeren Weinstein zurück, als vorher.

USUS in nephritide calculosa, ischuria notha, dysuria et stranguria, praecipue si viscida tenaxque lympha subest. In menstruis suppressis, in flore albo, et hydrope. In Aethiopia creditur linguam puerorum ab herba masticata reddi volubiliorem et aptiorem ad litteras Arabicas pronuntiandas unde herba ABCDARIA vocatur.

DOSIS. Pugillus, cum aquae ℥IV. in *infuso*, quod radice liquiritiae et syrupo althaeae dulcificandum.

Quoniam herba valde charo pretio venit, hinc qua succedaneum commendatur *Sigesbeckia orientalis* vel *Coreopsis bidens* nec non *Bidens tripartita*.

605. SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO I. Polygamia aequalis.

GENUS. *Receptaculum* paleaceum. PAPPUS nullus. *Calyx* imbricatus, haemisphaericus.

SPECIES. *Santolina* pedunculis unifloris, *foliis* quadrifariam dentatis.

LOCUS Frutex crescens in Europa australi.

PHARMACEVTICA PARS. Herba *Santolinae* seu *Abrotani feminae*. Germ. AFTERCYPRESSE.

ODOR fragrans. *Sapor* amarus.

VIRTUS antispasmodica, anthelminthica, resolvens.

USUS rarissimus, etsi viribus planta non est destituta in hysteria, vermibus, obstructionibus viscerum abdominalium.

DOSIS. Pugillus j. cum aquae ℥IV. in *infuso*.

ORDO II.
POLYGAMIA SUPERFLUA.

606. ARTEMISIA VULGARIS.

CLASSIS XIX. *Syngenesia*. ORDO II. Polygamia superflua.

GENUS. *Receptaculum* subvillosum vel nudiusculum. *Pappus* nullus. *Calyx* imbricatus squamis rotundatis conniventibus. *Corollae* radii nullae.

GEBRAUCH. In Nierenschmerzen vom Steine, unechter Harnverstopfung, Harnbrennen und Harntröpfeln, besonders wenn eine klebrige und zähe Lymphe zum Grunde liegt. Bey unterdrückter monathlicher Reinigung, weissem Flusse, und in der Wassersucht. In Aethiopien glaubt man, dafs die Zunge der Knaben durch das gekaute Kraut geläufiger und geschickter werde, die arabischen Buchstaben auszusprechen; daher es auch das ABC KRAUT *genannt wird.*

DOSIS. Fünf Finger voll mit vier Unzen Wasser als Aufgufs, *welcher mit Süfsholzwurzel und Eibisch-Syrupe süfs gemacht werden mufs.*

Weil das Kraut sehr theuer ist, so empfiehlt man als Surrogat die morgenländische Sigesbekie, *das* zweyjährige Wanzengesicht, *den* dreytheiligen Zweyzahn.

605. DIE AFTERCYPRESSE.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. I. ORDNUNG Gleiche Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *spreuförmig.* Haarkrone *keine. Der* Kelch *dachziegelförmig übereinander gelegt, halb kugelförmig.*

ART. Die heilige Pflanze *mit einblumigen Fruchtstielen, und vierreihig gezähnten* Blättern.

VATERLAND. Ein Strauch, welcher in dem mittägigen Europa wächst.

PHARMACEVTISCHER THEIL. Das Kraut der Aftercypresse. *Latein.* ABROTANUM FEMINA.

GERUCH, durchdringend. GESCHMACK, bitter.

ARZENEYKRAFT, krampfwidrig, wurmtreibend, auflösend.

GEBRAUCH, sehr selten, ob die Pflanze gleich nicht ohne alle Kraft ist, bey Mutterbeschwerden, Würmern, Verstopfungen der Eingeweide.

DOSIS. Fünf Finger voll mit vier Unzen Wasser als Aufgufs.

II. ORDNUNG.
ÜBERFLÜSSIGE VIELWEIBEREY.

606. DER GEMEINE BEYFUSS.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. II. ORDNUNG Ueberflüssige Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *fast weichhaarig, oder etwas nackt.* Haarkrone, keine. *Der* Kelch *dachziegelförmig übereinander gelegt aus zugerundeten sich bedeckenden Schuppen bestehend. Strahlen der* Blumenkrone, *keine.*

SPECIES. *Abrotanum* foliis pinnatifidis, planis, incisis, subtus tomentosis, *racemis* simplicibus recurvatis. *Florum* radio quinquefloro.

LOCUS. Planta perennis ad vias et locis ruderatis copiosa. *Duplex* prostat *varietas*: *rubra*, caule et flore purpurascente; *alba*, caule et flore albicante. Virtus medica eadem.

PHARMACEVTICA PARS. Herba et Summitates *Artemisiae*. Germ. BEYFUSS. Gall. ARMOSIE.

ODOR suaveolens si leniter teritur, praecipue sumitatum. *Sapor* amaricans.

VIRTUS antispasmodica, emmenagoga. Coquorum mos est anseres artemisia infarcire saporis causa.

USUS in affectione hysterica et ad menstrua, lochia, partum et secundinas pellendas. *Externe* herba recens contusa ad ulcera consolidanda applicatur et herba siccata ad parandam *Moxam*.

DOSIS. Pugilli 2 cum aquae ℥vj in *infuso*. *Pulveris* ʒiij de die. Herbae manip. iij. in *pediluvio* emmenagogo.

MOXA paratur ex siccata superiori plantae parte vel foliis solis pistillo tusis et inter manus tritis, rejectis reliquiis crassioribus. Elegantius dein pectinis ope carminari solet. Ita praeparata lanugo in conum rotatur, pene uncialem, qui cuti, saliva si placet, affigitur et ope festucae ligneae accenditur.

Hic conus ob mollem teneramque compagem igne non mox consumitur, sed lente depascitur et demum in favillam vertitur. Sic aeger primum gratum sentit calorem, dein dolorem sensim ingravescentem, et stigma remanet, quae in suppurationem persaepe transit.

USUS praecipuus *Moxae* in vera et recente arthritide, dum locus inflammatione caret, nec non in rheumatismo chronico et malo ischiadico est. Subin dolor internus momento fere eodem cessat, quo torunda ab igne est consumta. Demum in loquela ex paralysi linguae amissa, in paralysi cruris ex congestione humoris aquosi in articulo femoris adustio per moxam profuit. Ischuria inveterata curabatur, dum moxa supra os sacrum poneretur. Ulcera demum rebellia mox sanabantur, dum moxa super ipsa ulcera deflagraret.

ART. Beyfuss *mit gefiedert in Querstücke gespaltenen, flachen, eingeschnittenen, auf der Unterfläche filzigen Blättern, einfachen, zurück gekrümmten* Trauben *und* Blumen *mit einem fünfblumigen Strahle.*

ORT. Eine ausdauernde Pflanze auf Wegen und Schutte häufig. Es gibt eine doppelte Varietät; *eine* rothe, *mit purpurrothem Stängel, und purpurrother Blume, und eine* weisse *mit weifslichem Stängel, und weifslicher Blume. Die medicinische Kraft ist dieselbe.*

PHARMAZEUTISCHER THEIL. Kraut und Spitzen des Beyfufses. *Latein.* ARTEMISIA. *Franz.* ARMOISE.

GERUCH, angenehm, wenn er sanft gerieben wird, besonders jener der Spitzen.

ARZNEYKRAFT, krampfwidrig, den Monathflufs treibend. Die Köche pflegen des Geschmackes wegen die Gänse mit Beyfufse anzustopfen.

GEBRAUCH in hysterischen Zufällen, und den Monathflufs, die Kindbettreinigung, die Geburt und Nachgeburt zu treiben. Aeusserlich *wird das frische Kraut zerstofsen um Geschwüre zu heilen, und das getrocknete Kraut zur Bereitung der Moxa angewendet.*

DOSIS. Zwey Gäuflein mit vier Unzen Wasser als Aufgufs. Pulver *täglich drey Quentchen. Drey Handvoll Kraut als Monathflufs treibendes Fufswafser.*

Die MOXA bereitet man aus dem oberen getrockneten Theile der Pflanze, oder aus den Blättern allein, welche man mit dem Stöfsel zerstofsen, und unter den Händen zerrieben hat; die übrigen gröbern Theile wirft man weg. Dann pflegt man sie mittelst eines Kammes zierlicher zu krämpeln. Die so bereitete Wolle wird in einen beynahe einen Zoll langen Kegel gedreht, welcher an die Haut, etwa mit Speichel befestiget, und mit einem Spane angezündet wird.

Dieser Kegel wird wegen des weichen und zarten Zusammenhanges von dem Feuer nicht bald verbrannt, sondern langsam verzehrt, und endlich in Asche verwandelt. Auf diese Art empfindet der Kranke zuerst eine angenehme Wärme, dann Schmerz, welcher allmählig sich vergrössert, und es bleibt ein Brandmahl zurück, welches sehr oft in ein Geschwür übergeht.

Der vorzüglichste Gebrauch *der* Moxa *ist in einer wahren und frischen Gliederkrankheit, wenn der Ort nicht entzündet ist, eben so im langwierigen Rheumatismus und in Hüftschmerzen. Bisweilen hört der innere Schmerz in eben demselben Augenblicke auf, als die Wiecke vom Feuer verzehrt worden ist. Endlich hat sich auch bey der durch Lähmung der Zunge verlornen Sprache, und bey Lähmung des Beines durch Anhäufung der wässerigen Feuchtigkeit in dem Gelenke des Schenkels, die Moxa heilsam bewiesen. Eine veraltete Harnverstopfung wurde gehoben, indem sie über das Heiligenbein gelegt wurde. Auch wurden hartnäckige Geschwüre bald geheilt, da die Moxa über den Geschwüren selbst verbrannte.*

607. ARTEMISIA PONTICA.

SPECIES. *Artemisia foliis* multipartitis, subtus tomentosis, *floribus* subrotundis, nutantibus, *receptaculo* nudo.

LOCUS. Planta perennis in Hungariae inferioris et Sibiriae locis aridis apricisque.

PHARMACEVTICA PARS. Herba *Absinthii pontici* seu *romani*. Germ. RÖMISCHER WERMUTH. Gall. ABSINTHE ROMAINE. GRANDE ABSINTHE.

ODOR gratior quam Absynthii vulgaris. *Sapor* vero minus amarus.

VIRTUS magis aromatica quam Absynthii vulgaris, hinc si aroma spectatur, ponticum praeferendum.

USUS Absynthii vulgaris.

DOSIS eadem.

607. DER RÖMISCHE BEYFUSS.

ART. Beyfuſs *mit vielmahl getheilten, auf der Unterfläche filzigen* Blättern, *fast rundlichen hängenden Blumen, und nacktem* Fruchtboden.

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze auf dürren von der Sonne beschienenen Orten Nieder-Ungarns und Sibiriens.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Kraut des Römischen Wermuthes. *Latein.* ABSYNTHIUM PONTICUM SEU ROMANUM. *Franz.* ABSINTHE ROMAINE. GRANDE ABSINTHE.

GERÜCH, angenehmer, als des gemeinen Wermuths; GESCHMACK hingegen, weniger bitter.

ARZNEYKRAFT, mehr gewürzhaft, als des gemeinen Wermuths; daher verdient der Römische den Vorzug, wenn man auf das Gewürz Rücksicht nimmt.

GEBRAUCH des gemeinen Wermuths.

DOSIS, eben dieselbe.

608. ARTEMISIA ABSYNTHIUM.

SPECIES. *Artemisia foliis* compositis, multifidis; *floribus* subglobosis, pendulis; *receptaculo* villoso.

LOCUS. Planta perennis, in locis ruderatis et ad vias crescens.

PHARMACEVTICA PARS. Herba et Summitates *Absynthii vulgaris*. Germ. WERMUTH. Gallic. ABSINTHE.

ODOR fortis et specificus, qui vero mora et exsiccatione fere perit, decoctione autem integre tollitur. *Sapor* amarissimus.

VIRTUS calida, stomachum roborans, acidum primarum viarum infringens, prout cerevisiam acescentem dolio immissa, corrigit, sed loco humili adhibitum cerevisiam reddit inebriantem. Multi hominum ex idiosyncrasia absynthium absque praesentissimo capitis dolore, ac oculorum inflammatione non ferunt. Herba comesta lac vaccarum, et carnes ovium amaritie imbuit. Lac puerperae ex usu continuato extracti Absynthii, fellis instar amarum et infanti noxium evasit.

USUS. In febribus intermittentibus, malo hypochondriaco, ictero, infarctu pertinaci hepatis vel lienis, si sapo jungitur; in calculo, podagra, scorbuto, convulsione scorbutica, vermibus et hydrope, si baccae juniperi cum Absynthio infunduntur.

Externe herba recens contusa oedemata discutit et gangraenam coercet.

DOSIS. Ad ʒß bis de die in *pulvere*. Herbae pug. j cum

608. DER WERMUTH.

ART. Beyfuſs *mit zusammengesetzten, vielspaltigen* Blättern, *fast kugelrunden hängenden* Blumen, *weichhaarigen* Fruchtboden.

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze, welche auf Schutte und an Wegen wächst.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Kraut und Spitzen des Wermuths. Latein. ABSYNTHIUM VULGARE. *Franz.* ABSINTHE.

GERUCH, stark und specifisch, welcher aber mit der Zeit und durch Austrocknen fast gänzlich sich verliert, durch Abkochen aber ganz und gar verschwindet. GESCHMACK, sehr bitter.

ARZNEYKRAFT, erwärmend, den Magen stärkend, die Säure der ersten Wege schwächend, so wie er das sauerwerdende Bier verbessert, wenn er in das Faſs gelassen wird; allein statt des Hopfens angewendet, macht er das Bier berauschend. Viele Menschen können durch Idiosyncrasie den Wermuth ohne den heftigsten Kopfschmerzen, und ohne Augenentzündung nicht ertragen. Das genossene Kraut macht die Milch der Kühe, und das Fleisch der Schafe bitter. Die Milch einer Kindbetterin wurde durch fortgesetzten Gebrauch des Wermuths-Extracts, wie Galle bitter, und dem Kinde schädlich.

GEBRAUCH. In Wechselfiebern, Hypochondrie, Gelbsucht, in hartnäckiger Leber- oder Milzverstopfung, wenn er mit Seife verbunden wird, bey Blasensteinen, Podagra, Scorbut, scorbutischer Convulsion, Würmen, und Wassersucht, wenn Wacholderbeere mit Wermuthe aufgegossen werden.

Aeuſserlich *zertheilet das zerquetschte frische Kraut die Geschwülste, und hält den Brand ab.*

DOSIS. Bis ein halbes Quentchen zweymahl des Tages,

aquae vel vini ℥viij in *infuso frigido.* Efficacissimum est semivinosum.

PRAEPARATA. Conservae ʒij. Tincturae ʒß. Extracti ℈ß. in pilulis vel mixtura pro dosi.

609. ARTEMISIA ABROTANUM.

SPECIES. *Artemisia* fruticosa, foliis setaceis, numerosissimis.

LOCUS. Frutex, crescens Monspelii, in Italia, Syria in montibus apricis.

PHARMACEVTICA PARS. Herba et Summitates *Abrotani maris.* Germ. STABWURZ. Gall. GARDEROBE.

ODOR gravis. *Sapor* aromaticus, amarus, quorum uterque siccando debilior fit.

VIRTUS incidens, aperiens, sudorem et menstrua movens, anthelmintica.

USUS in anorexia, colica flatulenta, vermibus intestinalibus, saburra pituitos. *Externe* forma fomenti scopo tumores frigidos resolvendi aut gangraenam figendi usurpatur.

DOSIS. Pugill. j cum aquae ℥IV in *infuso.*

610. ARTEMISIA JUDAICA.

SPECIES. *Artemisia* fruticosa, *foliis* obovatis, obtusis, lobatis, parvis, *floribus* paniculatis, pedicellatis.

LOCUS. Sponte crescit in Arabia.

PHARMACEVTICA PARS. Semen *Santonici* seu *Cinae*, seu *Contra.* Germ. WURMSAMEN, ZWITTERSAMEN. Gall. BARBOTINE. Alii vero ex *Artemisia santonica*, alii ex *Artemisia Contra* hoc semen depromunt. Videntur hinc semina harum plantarum, quoad effectum, non esse disparia.

ODOR seminis Santonici in nostris officinis prostantis fortis, peculiaris. *Sapor* subacris, valde amarus.

VIRTUS. Communi consensu efficacissimum anthelminticum reputatur. Non sola amaritie, sed vi specifica est vermibus infestum semen Santonici; in ejusdem enim infuso aquoso saturato lumbrici vivi intra horas 7 necantur, quum hi contra in longe amarioris decocto Absynthii per 30 vivere pergerent.

als Pulver. Fünf Finger voll Kraut, mit acht Unzen Wasser oder Wein, als kalter Aufguſs. *Am wirksamsten ist der Aufguſs, wenn man halb Wasser, und halb Wein nimmt.*

PRAEPARATE. Conserve *zwey Quentchen; ein halbes Quentchen Tinctur, ein halber Scrupel Extract als Pillen oder Mixtur für die Dosis.*

609. DIE STABWURZ.

ART. Staudiger Beyfuſs, *mit borstenförmigen, sehr ästigen Blättern.*

VATERLAND. Ein Strauch, welcher in Montpellier, Italien, Syrien, an den von der Sonne beschienenen Bergen wächst.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Kraut und Spitzen der Stabwurz. *Latein.* ABROTANUM MARIS. *Franz.* GARDEROBE.

GERUCH, stark. GESCHMACK, aromatisch, bitter, welche beyde durch Trocknen schwächer werden.

ARZNEYKRAFT, einschneidend, eröffnend, Schweiſs und monathliche Reinigung befördernd, gegen die Würmer.

GEBRAUCH, bey Mangel an Eſslust, Windkolik, Eingeweidwürmern, schleimigen Darmunrathe. Aeusserlich *wird sie als Umschlag gebraucht, die kalten Geschwülste zu zertheilen, oder den Brand aufzuhalten.*

DOSIS. Fünf Finger voll mit vier Unzen Wasser als Aufguſs.

610. DER JUDÄISCHE BEYFUSS.

ART, staudiger Beyfuſs, *mit verkehrt eyrunden, stumpfen, gelappten, kleinen* Blättern, *und geriſften, gestielten* Blumen.

VATERLAND. Wächst wild in Arabien.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Wurmsamen, Zwittersamen. Latein. SEMEN SANTONICI, CINAE, CONTRA. *Franz.* BARBOTINE. *Einige nehmen aus dem* Santonischen, *andere aus dem* Persischen *Beyfuſse diesen Samen her. Es scheint daher, daſs die Samen dieser Pflanze in Rücksicht der Wirkung nicht verschieden sind. Der*

GERUCH des Wurmsamens, welcher in unsern Apotheken verkauft wird, ist stark, ganz eigenthümlich. Der GESCHMACK etwas scharf, sehr bitter.

ARZNEYKRAFT. Nach der allgemeinen Meinung das wirksamste Mittel gegen die Würmer. Der Wurmsamen ist den Würmern nicht nur durch seine Bitterkeit, sondern auch durch seine specifische Kraft zuwider. Denn in dem gesättigten, wässrigen Aufgusse desselben werden die Spulwürmer innerhalb sieben Stunden getödtet, da sie doch in einem Absude des weit bitteren Wermuths bis dreyſsig Stunden fortleben.

USUS in vermibus intestinalibus praesertim infantum. Nonnunquam et taenia hoc semine fuit eliminata.

DOSIS. Infantibus mane ad cochleare unum vel bina pro thea, in pulvere, pani butyraceo, vel pani melle oblito, inspergendo. Vel eadem quantitas ingeritur cum lacte naturaliter tepido. Vel bolus cum syrupo formatur. Maxime prodest sub initium vel finem lunae decrescentis per tres dies datum subjungere purgans.

Adulti ad cochlear unum majus sumant, interpolando laxans.

611. TANACETUM VULGARE.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO II. Polygamia superflua.

GENUS. *Receptaculum* nudum. *Pappus* nullus. *Calyx* imbricatus, haemisphaericus. *Corollae* radii obsoletae, trifidae.

SPECIES. *Tanacetum* foliis bipinnatis, incisis, ferratis. *Varietas* foliis *crispis* est officinalis.

LOCUS. Planta perennis, crescens in muris, aggeribus, ad fossas.

PHARMACEVTICA PARS. Herba, flores, semen *Tanaceti*. Germ. RHEINFARN. Gall. TANAISIE. HERBE AUX VERS.

ODOR herbae fortis. *Sapor* valde amarus. *Flores* minus amari.

VIRTUS roborans, anthelmintica, resolvens, sudorifera. *Semina* perperam tamen seminibus Santonici aequalia aestimantur.

USUS in vermibus intestinalibus, febribus intermittentibus, cachexia, arthritide, podagra ad ventriculum conversa, hydrope. *Flores* in hysteria. *Externe* herba cum lacte decocta forma clysteris contra ascarides laudatur.

DOSIS. Herbae pugil. j cum aquae ℥vj in infuso. Pulveris florum ʒj.

612. TANACETUM BALSAMITA.

SPECIES. *Tanacetum foliis* ovatis, integris, serratis.

LOCUS. Planta perennis crescens in Gallia inferiori, Hetruria, Helvetia, florens auctumno.

PHARMACEVTICA PARS. Herba *Tanaceti hortensis* vel *Balsamitae maris*. Germ. FRAUENMÜNZE. BALSAMKRAUT. Gall. BALSAMITE. COQ DES JARDINS.

GEBRAUCH bey Eingeweidwürmern, besonders der Kinder. Bisweilen wurde auch durch diesen Samen der Bandwurm abgetrieben.

DOSIS. Den Kindern in der Frühe einen oder zwey Theelöffel voll, als Pulver, oder indem man ihnen denselben auf Butter- oder Honigbrot streuet. Oder man gibt die nähmliche Menge in kuhwarme Milch; oder man macht einen Bissen mit Syrup. Am meisten nützt er, wenn man ihn durch drey Tage am Anfange oder Ende des abnehmenden Mondes gibt, und dann ein Abführungsmittel folgen läſst.

Erwachsene müssen zu einem Löffel voll mehr, und dazwischen ein Abführungsmittel nehmen.

611. DER GEMEINE RHEINFARN.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. II. ORDNUNG. Ueberflüssige Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *nackt.* Haarkrone, *keine.* Kelch, *dachziegelförmig über einander gelegt, halbkugelrund.* Krönchen *des Strahles gering, dreyspaltig.*

ART. Rheinfarn *mit doppelt gefiederten, eingeschnittenen und sägeförmig gezähnten* Blättern. Die Varietaet *mit* krausen Blättern *ist officinell.*

VATERLAND. Eine mehrjährige Pflanze, welche an Mauern, Dämmen, Gräben wächst.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Kraut, Blumen, Samen des Rheinfarns. Latein. TANACETUM. *Franz.* TANAISIE. HERBE AUX VERS.

GERUCH des Krautes stark. GESCHMACK sehr bitter Die Blumen *weniger bitter.*

ARZNEYKRAFT, stärkend, wurmtreibend, Schweiſs verursachend. Den Samen aber hält man fälschlich dem Wurmsamens gleich.

GEBRAUCH bey Eingeweidwürmern, Wechselfiebern, Cachexie, Podagra, welches sich auf den Magen gezogen hat, Wassersucht. Die Blumen *bey Mutterbeschwerden.* Aeusserlich *rühmt man das Kraut mit Milch abgekocht als Klystier gegen die Springwürmer.*

DOSIS. Fünf Finger voll Kraut mit sechs Unzen Wasser als Aufguſs. *Blumenpulver ein Quentchen.*

612. DIE FRAUENBLÄTTER.

ART. Rheinfarn *mit eyrunden, ganzen, gesägten Blättern.*

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze, welche im südlichen Frankreiche, in Toscana, in der Schweiz wächst. Sie blüht im Herbste.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Das Kraut der Frauenmünze, *des* Balsamkrautes. *Latein.* TANACETUM HORTENSE, BALSAMITA MARIS. *Franz.* BALSAMITE. COQ DES JARDINS.

ODOR fragrans ad illum Menthae accedens. *Sapor* amarus.

VIRTUS roborans, antispasmodica, emmenagoga. Dubito de vi specifica opium aliaque venena cicurandi.

USUS in torminibus, menstruis suppressis, malo hysterico et melancholia, dysenteria.

DOSIS. Herbae pug. j cum aquae ℥vj in *infuso.*

613. GNAPHALIUM ARENARIUM.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO II. Polygamia superflua.

GENUS. *Receptaculum* nudum. *Pappus* plumosus. *Calyx* imbricatus: squamis marginalibus rotundatis, scariosis, coloratis.

SPECIES. *Gnaphalium* herbaceum, *foliis* lanceolatis, inferioribus obtusis; *corymbo* composito, *caulibus* simplicissimis.

LOCUS. Planta annua, in locis aridis, sabulosis crescens.

PHARMACEVTICA PARS. Flores *Stoechadis citrinae.* Germ. RHEINBLUME. Gall. STECHAS CITRIN. Non confundatur cum STOECHADE ARABICA.

ODOR nullus. *Sapor* adstringens.

VIRTUS adstringens.

USUS obsoletus, quondam hi flores dabantur in lumbricis, ictero, catarrho, infarctu viscerum abdominalium.

DOSIS. Pugil. j cum aquae ℥iv in *infuso.*

614. GNAPHALIUM DIOICUM.

SPECIES. *Gnaphalium sarmentis* decumbentibus, *caule* simplicissimo; *corymbo* simplici, terminali; *floribus* dioicis.

LOCUS. Planta annua, in locis siccis, apricis crescens.

PHARMACEVTICA PARS. Flores *Gnaphalii*, seu *Hispidulae*, seu *Pedis cati.* Germ. KATZENBLUMEN. Gall. PIECHATIER.

ODOR nullus. *Sapor* subadstringens.

VIRTUS adstringens leviter.

USUS obsoletus. Quondam hi flores in tussi convulsiva, exulceratione pulmonum, haemoptysi da-

GERUCH, durchdringend, und nähert sich dem der Münze. GESCHMACK, bitter.

ARZNEYKRAFT, stärkend, krampfwidrig, die monathliche Reinigung befördernd. Ich zweifle an der specifischen Kraft, Opium und andere Gifte unschädlich zu machen.

GEBRAUCH, bey Bauchgrimmen, unterdrückter monathlicher Reinigung, Mutterbeschwerden, Melancholie, Ruhr.

DOSIS. Fünf Finger voll Kraut, mit vier Unzen Wasser als Aufguſs.

613. DIE SANDRUHRPFLANZE.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. II. ORDNUNG. Ueberflüssige Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *nackt. Die* Haarkrone *federig. Der* Kelch *dachziegelförmig über einander gelegt, aus zugerundeten, trocknen, gefärbten Ränderschuppen bestehend.*

ART. Krautartiges Ruhrkraut, *mit lanzetförmigen* Blättern, *wovon die unteren stumpf sind; zusammengesetztem* Afterstraufse, *und sehr einfachen Stängeln.*

VATERLAND. Eine einjährige Pflanze, welche auf dürren und sandigen Orten wächst.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Die Blumen der Rheinblume. *Latein.* STOECHAS CITRINA. *Franz.* STECHAS CITRIN. *Man vermenge sie nicht mit dem* arabischen Stöchas-Kraute.

GERUCH, keiner. GESCHMACK zusammenziehend.

ARZNEYKRAFT, zusammenziehend.

GEBRAUCH, veraltet. Vor Zeiten gab man diese Blumen bey Spuhlwürmern, Gelbsucht, Katharr, Verstopfung der Baucheingeweide.

DOSIS. Fünf Finger voll mit vier Unzen *Wasser als* Aufguſs.

614. DIE GANZ GETRENNTE RUHRPFLANZE.

ART. Ruhrkraut *mit darnieder liegenden* Ranken, *sehr einfachem Stängel; einfachem* Afterstraufse, *und mit ganz getrennten Geschlechtern der Blumen.*

VATERLAND. Eine einjährige Pflanze, welche auf trocknen sonnigen Orten wächst.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Die Blumen der Katzenblumen. *Latein.* GNAPHALIUM, HISPIDULA, PES CATI. *Franz.* PIECHATIER.

GERUCH, keiner. GESCHMACK, etwas zusammenziehend.

ARZNEYKRAFT, sanft zusammenziehend.

GEBRAUCH, veraltet. Vor Zeiten gab man diese Blumen im Keichhusten, Eiterung der Lungen, Bluthu-

bantur. Cum pane butyraceo vitulis in diarrhoea ingeruntur.

DOSIS. Pug. j cum aquae ℥IV in *infuso.*

615. BELLIS PERENNIS.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO II. Polygamia superflua.

GENUS. *Receptaculum* nudum, conicum. *Pappus* nullus. *Calyx* hemisphaericus, squamis aequalibus. *Semina* obovata.

SPECIES. *Bellis scapo* nudo.

LOCUS. Planta perennis ad vias et in pascuis crebra.

PHARMACEVTICA PARS. Flores et herba *Bellidis minoris.* Germ. MASSLIEBEN, GÄNSEBLUMEN. Gall. PETITE MARGUERITE. PAQUERETTE.

ODOR nullus. *Sapor* herbae leviter acris, subadstringens.

VIRTUS eccoprotica, resolvens, vulneraria censetur.

USUS. Olim flores cum herba a mulieribus Francofurtanis instar oleris cum carnibus coquebantur, scopo infantibus alvum sollicitandi. Succus in catarrho suffocativo, febre hectica, vulneribus praesertim thoracis ac pulmonum exhibebatur.

DOSIS. Pugil. j cum aquae ℥IV in *infuso.*

616. CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO II. Polygamia superflua.

GENUS. *Receptaculum* nudum. *Pappus* marginatus. *Calyx* hemisphaericus, imbricatus: squamis marginalibus membranaceis.

SPECIES. *Chrysanthemum* foliis amplexicaulibus, oblongis, superne serratis, inferne dentatis.

LOCUS. Planta perennis in pratis frequens.

PHARMACEVTICA PARS. Herba et flores *Bellidis majoris.* Germ. GROSSE MASSLIEBEN. Gall. GRANDE MARQUERITE.

ODOR nullus. *Sapor* herbae ante expansionem florum decoctae acris, piperinus.

VIRTUS diuretica, expectorans, vulneraria censetur.

USUS obsoletus, quondam herba in zythogalo decocta et pota adversus asthma, phthisin, orthopnoeam

sten. Mit Butterbrote gibt man sie den Kälbern beym Durchfalle.

DOSIS. Fünf Finger voll mit vier Unzen Wasser als Aufguſs.

615. DIE AUSDAUERNDE MASSLIEBEN.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. II. ORDNUNG. Ueberflüssige Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *nackt, kegelförmig.* Haarkrone, *keine. Der* Kelch *halb kugelrund, mit gleichen Schuppen. Die* Samen *verkehrt eyrund.*

ART. Die Maſslieben *mit* nacktem *Schaſte.*

VATERLAND. Eine dauernde Pflanze, auf Wegen und Triften häufig.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Blumen und Kraut der Maſslieben, *des* Gänseblümchens, *Latein.* BELLIS MINOR. *Franz.* PETITE MARGUERITE. PAQUERETTE.

GERUCH, keiner. GESCHMACK des Krautes ein wenig scharf, etwas zusammenziehend.

ARZNEYKRAFT. Man hält sie für gelind abführend, auflösend, Wunden heilend,

GEBRAUCH. Vor Zeiten kochten sie die Weiber zu Frankfurt anstatt des Gemüses mit dem Fleische, um ihre Kinder abzuführen. Der Saft diente im Keichhusten, hecktischem Fieber, bey Wunden, vorzüglich der Brust und der Lungen.

DOSIS. Fünf Finger voll mit vier Unzen Wasser als Aufguſs.

616. DIE GEMEINE WUCHERBLUME.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. II. ORDNUNG. Ueberflüssige Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *nackt. Die* Haarkrone *gerändert. Der* Kelch *halb kugelrund, dachziegelförmig über einander gelegt, mit häutigen Ränderschuppen.*

ART. Wucherblume *mit den Stängel umfassenden, länglichen, oben gesägten, unten gezähnten Blättern.*

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze, häufig auf Wiesen.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Kraut und Blumen der groſsen Maſslieben. *Latein.* BELLIS MAJOR. *Franz.* GRANDE MARQUERITE.

GERUCH, keiner. GESCHMACK des vor Ausbreitung der Blüthen abgesottenen Krautes scharf, pfefferartig.

ARZNEYKRAFT. Man hält sie für urintreibend, Auswurf befördernd, Wunden heilend.

GEBRAUCH, veraltet. Ehmahls lieſs man das in gleichen Theilen Bier und Milch abgesottene Kraut als

exhibebatur et flores adversus strumas. Demum folia ad exulcerationes linguae sanandas masticabantur.

DOSIS. Pugillus j cum aquae ℥IV in *infuso.*

617. MATRICARIA CHAMOMILLA.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO II. Polygamia superflua.

GENUS. *Receptaculum* nudum. *Pappus* nullus. *Calyx* hemisphaericus, imbricatus: squamis marginalibus solidis, acutiusculis.

SPECIES. *Matricaria receptaculis* conicis; radiis patentibus, squamis calycinis margine aequalibus.

LOCUS. Planta annua in agris copiosa.

PHARMACEVTICA PARS. Flores et herba *Chamomillae nostratis* seu *Chamaemeli vulgaris.* Germ. GEMEINE CHAMILLE. Gall. CAMOMILLE DE CHAMP.

ODOR florum fragrans non admodum gratus. *Sapor* amarus.

VIRTUS febrifuga, anodyna, resolvens, antispasmodica.

USUS in febribus intermittentibus, in colica flatulenta, spasmodica et nephritica, in cardialgia, dysenteria, doloribus post partum, in calculo renali. Demum post captum vomitorium, emeseos incitandae causa, infusum florum chamomillae superbibi solet.

Oleum destillatum est proficuum hystericis, colica ac cardialgia laborantibus, aut lumbricis. Thecae vertebrali cum oleo anethino ante febris intermittentis insultum inungitur.

Externe forma fomenti sicci vel humidi aut cataplasmatis ad tumores varios resolvendos doloresve sopiendos applicatur. Clysmata ex infuso chamomillae flatus dissipant, et putredinem coercent. Pediluviis flores cum herba adduntur.

DOSIS. Pugillus j cum aquae ℥IV in *infuso. Pulveris* vero ʒj aliquoties die vacuo datur in febribus intermittentibus. *Oleum destillatum* forma elaeosacchari ad paucas guttas datur.

Mittel wider kurzen Athem, Lungensucht, Steckkatharr, trinken. Man kaute die Blumen wider die Kröpfe, und die Blätter um Zungengeschwüre zu heilen.

DOSIS. Fünf Finger voll mit vier Unzen Wasser als Aufguſs.

617. CHAMILLE.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. II. ORDNUNG Ueberflüssige Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *nackt.* Haarkrone *keine. Der* Kelch *halb kugelrund, dachziegelförmig übereinander gelegt, mit dichten etwas zugespitzten Randschuppen.*

ART. Mutterkraut *mit kegelförmigen* Fruchtböden, *abgebogenen Strahlen, und am Rande gleichen Kelchschuppen.*

VATERLAND. Eine einjährige Pflanze, auf Aeckern häufig.

PHARAMZEVTISCHER THEIL. Blumen und Kraut der gemeinen Chamille. *Latein.* CHAMILLA NOSTRAS, CHAMAEMELUM VULGARE, *Franz.* CAMOMILLE DE CHAMP.

GERUCH der Blumen durchdringend, nicht sehr angenehm. GESCHMACK, bitter.

ARZNEYKRAFT, wider das Fieber, schmerzstillend, auflösend, krampfwidrig.

GEBRAUCH in Wechselfibern, in der Windkolik, in Kolik von Krämpfungen und Nierenschmerzen, Magenshmerzen, Ruhr, Nachwehen, Nierensteine. Endlich pflegt man auch nach eingenommenen Brechmittel, um sich zum Brechen zu reitzen Chamillenblumen-Aufguſs darauf zu trinken.

Das destillirte Oehl *ist nützlich, für hysterische, mit Kolik, Magenschmerzen, oder Spulwürmern behafteten Personen. Mit Dillähle vermischt, schmiert man damit den Rückgrath vor dem Anfalle des Wechselfiebers.*

Aeuſserlich *wendet man sie an als trocknen oder nassen Umschlag, oder als Köchelchen um verschiedene Geschwülste zu zertheilen, oder die Schmerzen zu stillen. Die Klystiere aus Chamillen-Aufgusse vertreiben die Winde, und halten die Fäulniſs ab. Zu Fuſsbädern nimmt man die Blumen sammt dem Kraute.*

DOSIS. Fünf Finger voll mit vier Unzen Wasser als Aufguss. *Von dem* Pulver *aber gibt man ein Quentchen etliche Mahle an einem fieberlosen Tage in Wechselfiebern. Das* destillirte Oehl *gibt man in wenigen Tropfen in Gestalt des Oehlzuckers.*

618. MATRICARIA PARTHENIUM.

SPECIES. *Matricaria foliis* compositis, planis, foliolis ovatis, incisis; *pedunculis* ramosis.

LOCUS. Planta perennis in muris et ruderatis frequens.

PHARMACEVTICA PARS. Herba cum floribus *Matricariae* vel *Parthenii*. Germ. MUTTERKRAUT. Gall. MATRICAIRE. ESPARGOUTE.

ODOR fragrans, ad illum Chamomillae accedens, sed gravior. *Sapor* imprimis herbae, valde amarus, tanaceti fere et nauseosus.

VIRTUS emmenagoga, antihysterica, anthelmintica, febrifuga.

USUS in catameniis vel lochiis suppressis, in hysteria, vermibus intestinalibus, febribus intermittentibus. Herba in sartagine calefacta et capiti imposita, hemicraniam, et cataplasma ex concisa planta dolores podagricos lenire fertur.

DOSIS. Pugilli ij cum aquae ℥viij in *infuso*.

618. DAS MEIDBLUMENFÖRMIGE MUTTERKRAUT.

ART. Mutterkraut, *mit zusammengesetzten flachen* Blättern, *eyrunden*, *eingeschnittenen Blättchen, und zweygichten* Fruchtstielen.

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze, auf Mauern und Schutte häufig.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Kraut mit den Blumen des Mutterkrautes, *Latein.* MATRICARIA, PARTHENIUM. *Franz.* MATRICAIRE, ESPARGOUTE.

GERUCH, durchdringend, ähnlich jenem der Chamille, aber stärker. GESCHMACK, besonders des Krautes, sehr bitter, beynahe wie jener des Rheinfarns, ekelhaft.

ARZNEYKRAFT, den Monathflufs treibend, wider die Mutterbeschwerden, die Würmer und das Fieber.

GEBRAUCH. In gehemmten Monath- und Kindbettflüfsen, Mutterbeschwerden, Eingeweidwürmern, Wechselfiebern. Das in einer Pfanne erwärmte, und auf den Kopf aufgelegte Kraut soll den Kopfschmerzen, und das Köchelchen aus der zerschnittenen Pflanze die Schmerzen des Podagra lindern.

DOSIS. Zwey Gäuflein mit acht Unzen Wasser als Aufgufs.

619. ANTHEMIS NOBILIS.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO II. Polygamia superflua.

GENUS. Receptaculum paleaceum. *Pappus* nullus. *Calyx* hemisphaericus, subaequalis. *Flosculi* radii plures, quam 5.

SPECIES. *Anthemis foliis* pinnato-compositis, linearibus, acutis, subvillosis.

LOCUS. Planta perennis, in pratis Europae temperatioris crescens.

PHARMACEVTICA PARS. Flores *chamomillae romanae* seu chamaemeli nobilis. Germ. RÖMISCHE CHAMILLE. Gall. CAMOMILLE ROMAINE.

ODOR fragrantior, quam chamomillae vulgaris. *Sapor* amarus. Floribus *plenis* odor et sapor est imbecillior. Chamomilla romana plus olei aetherei, quam vulgaris praebet.

VIRTUS et *usus* chamomillae vulgaris.

619. DIE EDLE CHAMILLE.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. II. ORDNUNG Fruchtlose Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *spreuförmig.* Haarkrone *keine. Der* Kelch *halb kugelrund, fast gleich.* Blümchen *des Strahles mehr als fünf.*

ART. Chamille *mit gefiedert-zusammengesetzten, linienförmigen, spitzigen, fast weichhaarigen* Blättern.

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze, welche auf Wiesen des gemäfsigteren Europa wächst.

PHARMACEVTISCHER THEIL. Die Blumen der Römischen Chamille. *Lat.* CHAMILLA ROMANA, CHAMAEMELUM NOBILE. *Franz.* CAMOMILLE ROMAINE.

GERUCH, durchdringender, als jener der gemeinen. GESCHMACK, bitter. Die gefüllten *Blumen haben einen schwächeren Geruch und Geschmack. Die Römische Chamille gibt mehr ätherisches Oehl, als die gemeine.*

ARZNEYKRAFT und GEBRAUCH der gemeinen Chamille.

620. ANTHEMIS COTULA.

SPECIES. *Anthemis. Receptaculis* conicis, *paleis* setaceis, *seminibus* nudis.

LOCUS. Planta annua ad vias et locis ruderatis crebra.

620. DIE LAUGENBLUMENFÖRMIGE CHAMILLE.

ART. Chamille *mit kegelförmigen* Fruchtböden, *borstenförmigen* Spreuen, *und nacktem* Samen.

VATERLAND. Eine einjährige Pflanze auf Wegen und Schutte häufig.

PHARMACEVTICA PARS. Herba cum floribus *Cotulae foetidae*. Germ. STINKENDE CHAMILLE, HUNDSCHAMILLE, KRÖTENDILL. Gall. CAMOMILLE PUANTE.

ODOR ingratus. *Sapor* amarus.

VIRTUS sudorifera, antihysterica, antinsectosa, odor vero bufonibus gratus. Apes et pulices fugat.

USUS in hysteria, in arthritide consummata, scrophulis, haemorrhoidibus forma decocti interne et cataplasmatis externe.

DOSIS. Pugillus j cum aquae ℥IV in *infuso* vel *decocto*.

621. ANTHEMIS PYRETHRUM.

SPECIES. *Anthemis caulibus* simplicibus, unifloris, decumbentibus; *foliis* pinnato-multifidis.

LOCUS. Planta perennis calidioris Europae, Arabiae, Syriae, regni Tunetensis.

PHARMACEVTICA PARS. Radix *Pyretri*. Germ. BERTRAMSWURZEL. Gall. RACINE SALIVAIRE. PYRETHRE.

ODOR nullus. *Sapor* fervidus etsi non initio statim perceptibilis.

VIRTUS. Radix masticata copiam salivae prolicit, hinc ex primariis est apophlegmatizantibus. Pulvis naribus attractus, sternutationem ciet.

USUS. Decoctum radicis cum aqua, vino vel aceto paratum forma collutorii in odontalgia et paralysi linguae conducit.

DOSIS. Radicis ʒij cum aquae ℥iv pro collutorio. In odontalgia additur parum salis ammoniaci.

622. DORONICUM PARDALIANCHES.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO II. Polygamia superflua.

GENUS. *Receptaculum* nudum. *Pappus* simplex. *Calycis* squamae duplicis ordinis aequales, disco longiores. *Semina* radii nuda pappoque destituta.

SPECIES. *Doronicum foliis* cordatis, obtusis, denticulatis; radicalibus petiolatis; caulinis amplexicaulibus.

LOCUS. Planta perennis in Helvetia, in alpibus Valesiae, Pannoniae.

PHARMACEVTICA PARS. Radix *Doronici*. Germ. GEMSENWURZ, SCHWINDELWURZ. Gall. DORONIC.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Kraut und Blumen der stinkenden Chamille, Hundschamille, Krödendill. *Latein.* COTULA FOETIDA. *Franz.* CAMOMILLE PUANTE.

GERUCH, unangenehm. GESCHMACK bitter.

ARZNEYKRAFT, schweifsbringend, wider Mutterbeschwerden, wider die Insecten, der Geruch aber ist den Kröten angenehm. Sie verscheucht Bienen und Erdflöhe.

GEBRAUCH, in Mutterbeschwerden, in veralteter Gicht, Scropheln, Haemorrhoiden, als Absud innerlich, und als Köchelchen äufserlich.

DOSIS. Fünf Finger voll mit vier Unzen Wasser als Aufgufs, oder Absud.

621. DIE SPEICHELWURZ.

ART. Chamille *mit einfachen, einblumigen, niederliegenden* Stängeln, *und gefiedert vielspaltigen* Blättern.

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze des wärmeren Europa, Arabiens, Syriens, des Königreiches Tunis.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Die Bertramswurzel. *Latein.* PYRETRUM. *Franz.* RACINE SALIVAIRE PYRETHRE.

GERUCH, keiner. GESCHMACK, brennend, obschon man ihn Anfangs nicht gleich empfindet.

ARZNEYKRAFT. Die gekaute Wurzel locket eine Menge Speichel hervor, daher ist sie eine von den vorzüglichsten Speichel ausleerenden Mitteln. Wenn man das Pulver schnupft, so erreget es Niesen.

GEBRAUCH. Der Absud der Wurzel mit Wasser, Wein, oder Efsig, als Mundwasser bereitet, ist bey Zahnschmerzen und Lähmung der Zunge zuträglich.

DOSIS. Zwey Quentchen der Wurzel mit vier Unzen Wasser als Mundwasser. Bey Zahnschmerzen setzet man ein wenig Salmiak hinzu.

622. DIE SCHWINDELWURZ.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. II. ORDNUNG Ueberflüssige Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *nackt. Die* Haarkrone, *einfach. Die Schuppen des* Kelches *gleich, in doppelter Reihe stehend, länger als die Scheibe. Die* Samen *des Strahles nackt, und ohne Haarkrone.*

ART. Gemsenwurz *mit herzförmigen, stumpfen, feingezähnten* Blättern, *gestielten Wurzelblättern, und umfassenden Stängelblättern.*

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze in der Schweiz, auf den Walliser- und Pannonischen Alpen.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Die Gemsenwurz, Schwindelwurz. *Latein.* RADIX DORONICI. *Franz.* DORONIC.

ODOR vix subaromaticus. *Sapor* dulcis, aliquantum adstringens et leviter aromaticus. *Herba* aromatica et suaviter acris est.

VIRTUS antispasmodica, emmenagoga. Nullatenus ut quidam olim opinabantur, venenata est.

USUS obsoletus. Quondam commendabatur in vertigine, epilepsia, catameniis suppressis.

DOSIS. Radicis pugilli ij cum aquae ℥vij in *decocto.*

623. ARNICA MONTANA.

CLASSIS XIX. *Syngenesia.* ORDO II. Polygamia superflua.

GENUS. *Receptaculum* nudum. *Pappus* simplex. *Corollulae* radii filamentis 5 absque antheris.

SPECIES. *Arnica* foliis ovatis, integris: caulinis geminis oppositis. Duae prostant *varietates*, una foliis *latioribus*, altera foliis *angustioribus.* Haec facilius emesim ciet.

LOCUS. Planta perennis, crescens in Europae alpibus frigidis, ut Helveticis, Lapponicis et in collibus apricis pratensibus, ut in Westrogothia Sueciae et Hercynia.

PHARMACEVTICA PARS. Flores, herba, radix *Arnicae.* Germ. WOLVERLEY, FELLORAUT. Gall. PLANTE DES MONTAGNES. BOTAIGNE DES MONTAGNES. Vocatur quoque *Arnica Plauensis* et *Doronicum germanicum.*

ODOR plantae recentis graveolens. *Sapor* herbaceus, acris cum amaritie. Fragrantior et suaveolentior est Bohemica, quam Hercynica.

VIRTUS resolvens, penetrans, antispasmodica, antiparalytica, valde antiseptica. Flores et folia inter manus confricata et olfacta sternutationem et dosi majori ingesta vomitum cient. Radix alvum cohibet. Terrorem ciere non debet vomitus, facile enim placatur et saburram saepe eliminat. Nec anxietas aut cardialgia, nec sensus varii ingrati in parte affecta post captam arnicam percepti sunt timendi, hi bonum potius, quam malum ferunt augurium. Calida vero natura arnicae praesente febre cum pulsu duriori et fortiori, quae ad indolem inflammatoriam accedunt, non convenit.

GERUCH, kaum etwas gewürzhaft. GESCHMACK, süfs, etwas zusammenziehend und gewürzhaft. Das Kraut *ist gewürzhaft und angenehm scharf.*

ARZNEYKRAFT, krampfwidrig, den monathlichen Blutflufs treibend. Sie ist keineswegs giftig, wie einige ehemahls glaubten.

GEBRAUCH, veraltet. Vor Zeiten empfahl man sie bey Schwindel, Epilepsie, unterdrücktem Monathflusse.

DOSIS. Zwey Gäuflein der Wurzel mit vier Unzen Wasser als Absud.

623. DIE BERGWOLVERLEY.

XIX. CLASSE. Mitbuhler. II. ORDNUNG. Ueberflüssige Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *nackt.* Haarkrone, *einfach. Die Strahlen des* Blumenkrönchens *mit fünf Staubfäden ohne Staubbeuteln.*

ART. Wolverley *mit eyrunden, ganzen Blättern, doppelten und entgegengesetzten Stängelblättern. Es gibt zwey* Varietäten, *eine mit* breiteren, *die andere mit* schmäleren *Blättern. Diese erregt leichter Brechen.*

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze, welche auf den kalten Alpen Europens, als auf den Schweizerischen, Lappländischen wächst, so wie auf sonnigen Wiesenhügeln in Westgothland und in Thüringen.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Blumen, Kraut, Wurzel der Wolverley, *des* Fallkrautes. *Latein.* ARNICA. *Franz.* PLANTE DES MONTAGNES. BETOIGNE DES MONTAGNES. *Sie heifst auch* Plauische Wolverley, *und* Deutsche Gemsewurz.

GERUCH der frischen Pflanze stark. GESCHMACK, krautartig, scharf mit Bitterkeit. Die Böhmische ist von einem durchdringenderem und angenehmeren Geruche, als die Thüringische.

ARZNEYKRAFT, auflösend, durchdringend, krampfwidrig, gegen die Lähmung, sehr der Fäulnifs widerstehend. Wenn man die Blumen und Blätter zwischen den Händen reibt, und dazu riecht, so erregen sie Niefen, und in einer gröfseren Gabe genommen, Erbrechen. Die Wurzel verstopft den Stuhlgang. Man darf sich wegen des Brechens nicht bange werden lassen, denn es wird leicht gestillt, und vertreibt oft den Darmunrath. Eben so wenig lassen Aengstlichkeit, Magenschmerzen, oder mancherley unangenehme Gefühle, welche man an dem kranken Theile, nach genommener Wolverley empfindet, etwas befürchten, sie sind vielmehr ein gutes, als übles Zeichen. Die hitzige Natur der Wolverley aber verträgt sich nicht bey Gegenwart eines Fiebers mit härterem und stärkeren Pulse, welche Zufälle den Entzündungen eigen sind.

USUS florum imprimis laudatur in paralysi artuum vel linguae, hemiplegia, amaurosi, febre intermittente, in sugillatione sanguinis.

Radicis odor fortis, gravisque; sapor autem acris, aromaticus, nec ingratus, non nisi levissimam fert coctionem. In avertenda et subigenda putredine, et viribus erigendis ob aroma junctum, plus valere videtur, quam flores et folia.

Radix profuit eximie in febre putrida maligna, dysenteria putrida, in diarrhoea diuturna e viscerum atonia, colliquatione humorum phthisicorum pululenta; demum in gangraena humida, imprimis in camphorae connubio.

DOSIS, in diarrhoea horis alternis, ʒß ad ʒj. *Florum* p. ij cum aquae libra in *infuso*, foliorum p. ij in libra j aquae vel cerevisiae.

Folia in contusionibus et sugillationibus adhibentur; flores herba sunt imbecilliores.

GEBRAUCH der Blumen rühmt man bey Lähmungen der Glieder und der Zunge, Halbschlägen, schwarzem Staare, Wechselfieber, in Blutunterlaufungen.

Der Geruch der Wurzel *ist stark, und den Kopf einnehmend. Der Geschmack aber scharf, gewürzhaft, nicht unangenehm. Sie verträgt nur ein sehr leichtes Kochen. Bey Abhaltung und Vertreibung der Fäulnifs, und zur Stärkung der Kräfte wegen des verbundenen Gewürzes, scheint sie mehr Kräfte zu haben, als die Blumen und Blätter.*

Die Wurzel *erwies sich ganz vortrefflich im bösartigen Faulfieber, fauler Ruhr, in langwierigem Durchfalle von Schwäche der Eingeweide, in der Auflösung der eitrigen Säfte der Lungensüchtigen; endlich in dem nassen Brande, vorzüglich in Verbindung mit Kampher.*

DOSIS, im Durchfalle alle zwey Stunden ein halbes bis ein Quentchen. Zwey Gäuflein Blumen *mit einem Pfunde Wasser als* Aufgufs; *zwey Gäuflein* Blätter *in einem Pfunde Wasser oder Bier.*

Die Blätter *gebraucht man in Quetschungen und Blutunterlaufungen. Die Blumen sind schwächer, als das Kraut.*

624. INULA HELENIUM.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO II. Polygamia superflua.

GENUS. *Receptaculum* nudum. *Pappus* simplex. *Antherae* basi in setas duas desinentes.

SPECIES. Inula *foliis* amplexicaulibus, ovatis, rugosis, subtus tomentosis, *calycum* squamis ovatis.

LOCUS. Planta perennis, crescens in pratis depressis Angliae, Belgii, Scaniae, Oelandiae.

PHARMACEVTICA PARS. Radix *Inulae* seu *Helenii*. Germ. ALANTWURZ. Gall. AUNÉE.

ODOR radicis siccatae violaceus. *Sapor* initio subrancidus, glutinosus, dein amarus, aromaticus et pungens.

VIRTUS resolvens, roborans, sudorifera, antiscabiosa, emmenagoga.

USUS in tussi, in asthmate pituitoso a pulmonum obstructione, ventriculi imbecillitate, scabie, chlorosi, menostasia et tremore artuum ex mercurio. *Externe* forma unguenti vel lavacri adhibetur in scabie.

DOSIS a ʒß ad ʒj in *pulvere*. ʒjß cum aquae ℥vj in *infuso*.

624. DER GEMEINE ALANT.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. II. ORDNUNG. Ueberflüssige Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *nackt. Die* Haarkrone *einfach. Die* Staubbeuteln *an der Grundfläche sich in zwey Borsten endigend.*

ART. Alant *mit den Stängel umfassenden, eyrunden, runzlichen, auf der Unterfläche filzigen* Blättern, *eyrunden* Kelchschuppen.

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze, auf niedrigen Wiesen in England, in den Niederlanden, Schonen, Oeland.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Die Alantwurz. *Latein.* INULA, HELENIUM. *Franz.* AUNÉE.

GERUCH der getrockneten Wurzel veilchenartig. GESCHMACK, Anfangs ein wenig ranzig, leimartig; dann bitter, gewürzhaft und stechend.

ARZNEYKRAFT, auflösend, stärkend, schweifsbringend, wider die Krätze, den monathlichen Blutflufs treibend.

GEBRAUCH, in Husten, schleimigem Dampfe von Verstopfung der Lungen, in Magenschwäche, Krätze, Bleichsucht, unterdrücktem Monathflufse und Zittern der Glieder vom Quecksilber. Aeufserlich *wird sie als Salbe oder Bad in der Krätze angewendet.*

DOSIS. Ein halbes bis ein Quentchen als Pulver, ein halbes Quentchen mit sechs Unzen Wasser, als Aufgufs.

625. INULA DYSENTERICA.

SPECIES. *Inula foliis* amplexicaulibus, cordato-oblongis, *caule* villoso, paniculato, squamis *calycinis* setaceis.

LOCUS. Planta perennis, crescens locis subhumidis, et in fossis exsiccatis.

PHARMACEVTICA PARS. Herba *Conyzae mediae.* Germ. DÜRRWURZ, BERUFKRAUT. Gall. CONISE. HERBE AUX MAUCHERONS.

ODOR levis. *Sapor* adstringens, acriusculus.

VIRTUS tonica, antidysenterica.

USUS. *Russi* in expeditione persica ope hujus herbae a dysenteria convaluerunt.

DOSIS. Herbae pugil. ij cum aquae ℥vj in *infuso.*

625. DER RUHRALANT.

ART. Alant *mit den Stängel umfassenden, herzförmig-länglichen* Blättern, *weichhaarigem rispenförmigen Stängel und borstenartigen* Kelchschuppen.

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze, welche auf etwas feuchten Orten und ausgetrockneten Gräben wächst.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Dürrwurz, Berufkraut. *Latein.* CONYZA MEDIA. *Franz.* CONISE. HERBE AUX MOUCHERONS.

GERUCH, gelinde. GESCHMACK, zusammenziehend, etwas scharf.

ARZNEYKRAFT, stärkend, wider die Ruhr.

GEBRAUCH. Die Russen genasen im Persischen Feldzuge durch dieses Kraut von der Ruhr.

DOSIS. Zwey Gäuflein Kraut, mit sechs Unzen Wasser als Aufguſs.

626. ERYGERON ACRE.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO II. Polygamia superflua.

GENUS. *Receptaculum* nudum. *Pappus* pilosus. *Corollae* radii lineares, angustissimae.

SPECIES. *Erygeron* pedunculis alternis, unifloris.

LOCUS. Planta perennis in collibus, ruderibus, pascuis siccis.

PHARMACEVTICA PARS. Herba *Conyzae coeruleae.* Germ. BLAUES DÜRRKRAUT, BLAUES BERUFKRAUT.

ODOR nullus. *Sapor* acris. In alpibus vero crescens omnino fere mitis.

VIRTUS mucum incidens. Vis vero, quae olim adversus incantamenta fuit credita, seculi nostri non est.

USUS. In soda et morbis pectoris quondam adhibebatur.

DOSIS. Pugilli ij cum aquae ℥vi in *infuso.*

626. DAS SCHARFE ALTMANNSKRAUT.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. II. ORDNUNG. Ueberflüssige Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *nackt. Die* Haarkrone *haarig. Die Strahlen der* Blumenkrone *linienförmig, sehr schmal.*

ART. Altmannskraut *mit wechselweise stehenden, einblumigen Fruchtstielen.*

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze auf Hügeln, Schutte, trocknen Triften.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Kraut des blauen Dürrkrautes, blauen Berufkrautes. *Latein.* CONYZA COERULEA.

GERUCH keiner. GESCHMACK, scharf, aber fast ganz mild bey dem auf den Alpen wachsenden.

ARZNEYKRAFT, Schleim zerschneidend. Der Aberglauben brauchte es vor Zeiten zu Zaubereyen.

GEBRAUCH. Man brauchte es einst bey Sodbrennen und Brustkrankheiten.

DOSIS. Zwey Gäuflein mit sechs Unzen Wasser als Aufguſs.

627. SOLIDAGO VIRGAUREA.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO II. Polygamia superflua.

GENUS. Receptaculum nudum. *Pappus* simplex. *Corollae* radii circiter 5. *Calycis* squamae imbricatae, clausae.

SPECIES. *Solidago* caule subflexuoso, angulaot, racemis paniculatis, erectis, confertis.

627. DIE GEMEINE GOLDRUTHE.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. II. ORDNUNG. Ueberflüssige Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *nackt. Die* Haarkrone *einfach. Strahlen der* Blumenkrone *ungefähr fünf. Die Schuppen des* Kelchs *dachziegelförmig übereinander gelegt, geschlossen.*

ART. Goldruthe *mit fast gebogenem, gewinkelten Stängel, gerifften, aufrecht stehenden, gedrängten Trauben.*

LOCUS. Planta perennis in sylvis frequens.

PHARMACEVTICA PARS. Herba *Virgae aureae*, seu *Solidaginis saracenicae*. Germ. HEIDNISCH WUNDKRAUT. Gall. VERGE D'OR.

ODOR nullus. *Sapor* subadstringens, amarus et leviter aromaticus.

VIRTUS. Conducit ad diathesin calculosam, roborando renes, tollendam, sabulum expellendum, et ne in calculum concrescat, impediendum. Est denique diuretica et vulneraria.

USUS. In morbis viarum urinariarum calculosis et ulcerosis auxilio multoties fuit. Valuit etiam in febre hectica et hydrope incipiente ex obstructione viscerum.

DOSIS. Herbae pugillus j cum aquae ℥IV in *infuso*, ʒj in *pulvere*.

628. SENECIO VULGARIS.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO II. Polygamia superflua.

GENUS. *Receptaculum* nudum. *Pappus* simplex. *Calyx* cylindricus, calyculatus: squamis apice sphacelatis.

SPECIES. *Senecio corollis* nudis, *foliis* pinnato-sinuatis, amplexicaulibus, *floribus* sparsis.

LOCUS. Planta annua, vulgatissimum hortorum nostrorum vitium.

PHARMACEVTICA PARS. Herba *Senecionis*. Germ. KREUZKRAUT, KREUZWURZ. Gall. SENEÇON.

ODOR nullus, *Sapor* oleraceus, quodammodo salsus.

VIRTUS censetur resolvens, emolliens, anthelmintica.

USUS. Succus in vermibus intestinalibus hominum et equorum, nec non in colica commendatur. *Externe* herba lacte cocta vel butyro frixa, applicatur in coagulis mamarum lacteis; haemorrhoidibus, arthritide, et sola contusa in furunculis.

DOSIS. Succi ℥ij dantur interne.

629. TUSSILAGO FARFARA.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO II. Polygamia superflua.

GENUS. *Receptaculum* nudum. *Pappus* simplex. *Calycis* squamae aequales, discum aequantes, submembranaceae.

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze, in Wäldern häufig.

PHARMACEVTISCHER THEIL. Kraut des heidnischen Wundkrautes. *Latein.* VIRGA AUREA, SOLIDAGO SARACENICA. *Franz.* VERGE D'OR.

GERUCH, keiner. GESCHMACK, etwas zusammenziehend, bitter, ein wenig aromatisch.

ARZNEYKRAFT. Sie ist wirksam zur Hebung der Anlage zum Steine, indem sie die Nieren stärkt; zur Abtreibung des Sandes, und zur Verhinderung, dafs derselbe nicht zu Stein zusammen wachse. Endlich ist sie auch Urin treibend, und Wunden heilend.

GEBRAUCH. Bey Krankheiten der Harnwege vom Steine und Geschwüren hat sie öfters Hülfe geleistet. Auch im hektischen Fieber, und beym Ansatze zur Wassersucht von Verstopfung der Eingeweide, hat sie sich heilsam erwiesen.

DOSIS. Fünf Finger voll Kraut mit vier Unzen Wasser als Aufgufs, *ein Quentchen als* Pulver.

628. DIE GEMEINE KREUZWURZ.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. II. ORDNUNG. Ueberflüssige Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *nacht. Die* Haarkrone *einfach. Der* Kelch *walzenförmig, gekelcht, aus an der Spitze gebrandeten Schuppen bestehend.*

ART. Kreuzwurz *mit nackten* Blumenkronen, *gefiedert-vertieften, den Stängel umfassenden* Blättern, *zerstreuten* Blumen.

VATERLAND. Eine einjährige Pflanze, und sehr gemeines Unkraut unserer Gärten.

PHARMAZEVTISCHER THEIL. Das Kraut des Kreuzkrautes, *der* Kreuzwurz. *Latein.* SENECIO. *Franz.* SENEÇON.

GERUCH, keiner. GESCHMACK, gemüsartig, etwas salzig. Die

ARZNEYKRAFT hält man für auflösend, erweichend, wurmtreibend.

GEBRAUCH. Den Saft empfiehlt man bey Eingeweidwürmern der Menschen und Pferde, so wie auch gegen die Kolik. Aeufserlich *wird das Kraut in Milch gekocht, oder in Butter geröstet, bey Milchverhärtungen in den Brüsten, Haemorrhoiden, Gicht, und blofs zerquetscht bey Blutaissen, aufgelegt.*

DOSIS. Man gibt innerlich zwey Unzen Saft.

629. DER GEMEINE HUFLATTIG.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. II. ORDNUNG. Ueberflüssige Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *nacht. Die* Haarkrone *einfach. Die Schuppen des* Kelchs *gleich mit der Scheibe von gleicher Gröfse, fast häutig.*

SPECIES. *Tussilago* scapo unifloro, imbricato, *foliis* subcordatis, angulatis, denticulatis.

LOCUS. Planta perennis, crescens ad fossas solo argilloso, in agris subhumidis vulgare vitium.

PHARMACEVTICA PARS. Folia et radix *Tussilaginis* seu *Farfarae*. Germ. HUFLATTIG. Gall. TUSSILAGE ou le Pas d'Ane.

ODOR nullus. *Sapor* subamarus, viscidus, subausterus.

VIRTUS pectoralis, antiscrofulosa, antexanthematica.

USUS. Infusum vel decoctum saturatum in tussi, affectionibus catarrhalibus, scrofulis, ulceribus scrofulosis ac phthisi scrofulari, demum in psorophthalmia, crusta lactea infantum et tinea capitis adhibetur.

DOSIS. Succi recens expressi unciae duae. Foliorum Manipuli tres ad libram aquae.

PRAEPARATA. *Loch de farfara* ex pulpa radicum coctarum cribrata et melle juncta in tussi et phthisi laudatur.

ART. HUFLATTIG mit einblumigem dachziegelförmig über einander gelegten Schafte. Fast herzförmigen, eckigen, feingezähnten Blättern.

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze, auf Gräben mit thonigem Boden, und gemeines Unkraut auf etwas feuchten Wiesen.

PHARMAZEUTISCHER THEIL. Blätter und Wurzel des Huflattigs. *Latein.* TUSSILAGO, FARFARA. *Franz.* TUSSILAGE, PAS D'ANE.

GERUCH keiner. Geschmack *etwas bitter, klebrig, etwas herbe.*

ARZNEYKRAFT in Brustkrankheiten, Scrofeln, Hautausschlägen.

GEBRAUCH. Der gesättigte Aufguſs oder Absud wird im Husten, in Katharr-Krankheiten, Scrofeln, scrofulosen Geschwüren, scrofuloser Lungensucht, in der Psorophthalmie, im Milchschorfe der Kinder und Erbgrinde angewendet.

DOSIS. Zwey Unzen des frisch ausgepreſsten Saftes. Drey Hand voll Blätter zu einem Pfunde Wasser.

PRAEPARATE. Farfara-Mundsäftchen *aus dem gesiebten und mit Honige verbundenen Marke der gekochten Wurzeln, wird bey Husten und Lungensucht gerühmt.*

630. TUSSILAGO PETASITES.

SPECIES. *Tussilago* thyrso ovato, flosculis femineis nudis paucis.

LOCUS. Planta perennis, crescens ad rivos Europae temperatioris.

PHARMACEVTICA PARS. Radix *Petasitidis*. Germ. PESTILENZWURZEL. Gall. PÉTASITE. HERBE AUX TEIGNEUX.

ODOR, dum recens est, gravis. SAPOR subamarus, acris et aliquantum aromaticus.

VIRTUS sudorifera, attenuans, alexipharmaca quondam credita.

USUS. Imprimis adhibebatur quondam interne et externe ad bubones in peste, podagra et epilepsia, asthmate, vermibus et obstructione menstruorum. Forte magis prodest in scrofulis quam Farfara.

DOSIS. Radicis uncia ad aquae libram in *infuso*.

630. DIE PESTILENZWURZ.

ART. Huflattig mit eyrundem Strauſse, und nackten, wenigen, weiblichen Blümchen.

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze, an Bächen im gemäſsigteren Europa.

PHARMAZEUTISCHER THEIL. Die Wurzel der Pestilenzwurzel. *Latein.* PETASITES. *Franz.* PÉTASITE. HERBE AUX TEIGNEUX.

GERUCH der frischen Pflanze den Kopf einnehmend. GESCHMACK etwas bitter, scharf, ein wenig gewürzhaft.

ARZNEYKRAFT schweiſstreibend, verdünnend. Einst hielt man die Wurzel für ein Gegengift.

GEBRAUCH. Ehemahls gebrauchte man sie besonders innerlich und äuſserlich bey Pestbeulen, Podagra, fallender Sucht, Engbrüstigkeit, Würmern und Verstopfung der monathlichen Reinigung. Vielleicht nützt sie in Scrofeln mehr als der Huflattig.

DOSIS. Eine Unze der Wurzel zu einem Pfunde Wasser als Aufguſs.

631. ACHILLEA MILLEFOLIUM.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO II. Polygamia superflua.

631. DIE SCHAFGARBE.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. II. ORDNUNG. Ueberflüſsige Vielweiberey.

GENUS. *Receptaculum* paleaceum. *Pappus* nullus. *Calyx* ovatus imbricatus. *Flosculi* radii circa 4 et plures.

SPECIES. *Achillea* foliis bipinnatis nudis, laciniis linearibus dentatis, caulibus sulcatis.

LOCUS. Planta perennis in campis et pascuis vulgaris.

PHARMACEVTICA PARS. Herba et flores *Millefolii.* Germ. SCHAFGARBE. Gall. MILLE FEUILLE.

ODOR nonnihil aromaticus. SAPOR subadstringens, amaricans.

VIRTUS adstringens seu tonica, antispasmodica, subnarcotica.

USUS in haemoptysi, fluxu haemorrhoidali nimio, haemorrhagia uteri et in profluvio sanguinis per alvum ex nimio nixu; in leucorrhoea, imprimis in dolore rheumatico et in malo hypochondriaco. Succus laudatur in ulceribus internis. Quondam herba inter lapides tusa vel pinguedine mixta imponebatur vulneribus.

DOSIS. Herbae pugillus unus cum aquae unciis quatuor in *infuso.*

632. ACHILLEA AGERATUM.

SPECIES. *Achillea* foliis lanceolatis, obtusis, acute serratis.

LOCUS. Planta perennis Galliae inferioris.

PHARMACEVTICA PARS. Herba *Agerati.* Germ. LEBERBALSAM. FREMD-LEBERKRAUT. Gall. EUPATOIRE DE MESUÉ.

ODOR suavis. SAPOR amaricans.

VIRTUS roborans, reserans obstructa, anthelmintica.

USUS. Quondam in obstructionibus hepatis et aliorum viscerum adhibebatur. Hodie non amplius praescribi solet.

DOSIS praecedentis.

633. ACHILLEA PTARMICA.

SPECIES. *Achillea* foliis lanceolatis, acuminatis, argute serratis.

LOCUS. Planta perennis, crescens in pratis humidis.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *spreuförmig.* Haarkrone *keine.* Kelch *eyrund, dachziegelförmig über einander gelegt. Strahlen des Blümchens ungefähr 4 und mehrere.*

ART. Die Schafgarbe *mit zweymahl gefiederten, nackten Blättern, linienförmigen, gezähnten Einrissen und gefurchtem Stängel.*

VATERLAND. Eine ausdauernde auf Feldern und Triften gemeine Pflanze.

PHARMAZEUTISCHER THEIL. Kraut und Blüthen der Schafgarbe. *Latein.* MILLEFOLIUM. *Franz.* MILLE-FEUILLE.

GERUCH etwas gewürzhaft. GESCHMACK ein wenig zusammenziehend, bitter.

ARZNEYKRAFT. Zusammenziehend oder stärkend, krampfwidrig, in einem geringen Grade betäubend.

GEBRAUCH im Bluthusten, übermäfsigem Hämorrhoidal-Flusse, Blutsturze der Gebährmutter, beym Hervorfliefsen des Blutes aus dem Unterleibe aus zu grofser Anstrengung, im weifsen Flusse, besonders bey rheumatischen Schmerzen und in der Hypochondrie. Den Saft rühmt man bey innerlichen Geschwüren. Ehemahls wurde das Kraut zwischen Steinen zerquetscht oder mit einer Fettigkeit vermischt auf Wunden aufgelegt.

DOSIS. Fünf Finger voll Kraut mit vier Unzen Wasser als Aufgufs.

632. DAS BALSAM-LEBER-KRAUT.

ART. Schafgarbe *mit lanzetförmigen, stumpfen, scharf gesägten Blättern.*

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze des südlichen Frankreichs.

PHARMAZEUTISCHER THEIL. Kraut des Leberbalsams, Fremd-Leberkrautes. *Latein.* AGERATUM. *Franz.* EUPATOIRE DE MESUÉ.

GERUCH angenehm. GESCHMACK bitter.

ARZNEYKRAFT stärkend, die Verstopfungen eröffnend, wider die Würmer.

GEBRAUCH. Man gebrauchte es einst in Verstopfungen der Leber und anderer Eingeweide. Heut zu Tage pflegt man es nicht mehr zu verschreiben.

DOSIS, wie bey der vorhergehenden Pflanze.

633. DAS NIESSKRAUT.

ART. Schafgarbe *mit lanzetförmigen, zugespitzten, scharf gesägten Blättern.*

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze auf feuchten Wiesen.

PHARMACEVTICA PARS. Herba *Ptarmicae* cum floribus. Radix *Ptarmicae*. Germ. WILDER BERTRAM. Gall. HERBE à ÉTERNUER.

ODOR nullus. SAPOR acris.

VIRTUS errhina, masticata salivam movens.

USUS. Quondam herba cum floribus in pulvere naribus attrahebatur pro sternutatione movenda, et collutorium ex herba vel radice ad mucum faucium solvendum et in odontalgia adhibebatur.

DOSIS. Drachma una pro errhino.

ORDO III.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

634. CENTAUREA BENEDICTA.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO III. Polygamia frustranea.

GENUS. *Receptaculum* setosum. *Pappus* simplex. *Corollae* radii infundibuliformes, longiores, irregulares.

SPECIES. *Centaurea* calycibus duplicato-spinosis, lanatis, involucratis. *Foliis* semide currentibus, denticulato-spinosis.

LOCUS. Planta annua crescens in Hispania, Chio et Lemno. Apud nos quotannis colitur in hortis pharmacevticis.

PHARMACEVTICA PARS. Herba *Cardui benedicti*. Germ. CARDOBENEDICT. Gall. CHARDON BENI.

ODOR ingratus, qui siccatione facile perit. SAPOR intense amarus.

VIRTUS stomachica, viscera obstructa reserans, roborans, diaphoretica, anthelmintica, non adeo calefaciens ut alia amara. Decoctum vomitum excitat.

USUS in infirmitate ventriculi, ictero, viscerum abdominalium obstructione, febribus intermittentibus, febribus malignis, imo praemissa venae sectione in pleuritide ac pneumonia laudatur. *Externe* convenire dicitur inspersio foliorum in cancro mammae et ulceribus profundis crurum.

DOSIS. Herbae pugillus unus cum aquae unciis quatuor in *infuso*. Drachma una in *pulvere*.

PHARMAZEUTISCHER THEIL. Kraut, Blumen und Wurzel des wilden Bertrams. *Latein.* PTARMICA. *Franz.* HERBE à ÉTERNUER.

GERUCH keiner. GESCHMACK scharf.

ARZNEYKRAFT. Niefsen und Speichel erregend.

GEBRAUCH. Ehemahls schnupfte man das Kraut mit den Blumen als Niefspulver. Das Mundwasser aus dem Kraute oder der Wurzel wurde zur Auflösung des Schleimes im Schlunde und in Zahnschmerzen gebraucht.

DOSIS ein Quentchen als Niefspulver.

III. ORDNUNG.

FRUCHTLOSE VIELWEIBEREY.

634. DER CARDOBENEDICT.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. III. ORDNUNG. Fruchtlose Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *borstig. Die* Haarkrone *einfach. Die Strahlen der* Blumenkrone *trichterförmig, länger, unregelmäfsig.*

ART. Flockenblume *mit doppelt-dornigen, wolligen, eingehüllten Kelchen, und an dem Stängel halb herunter laufenden, gezähnt-dornigen* Blättern.

VATERLAND. Eine einjährige Pflanze in Spanien, Chios und Lemnos. Bey uns baut man sie alle Jahre in pharmazeutischen Gärten.

PHARMAZEUTISCHER THEIL. Kraut des Cardobenedict. *Latein.* CARDUUS BENEDICTUS. *Franz.* CHARDON BENI.

GERUCH unangenehm und geht durch Trocknen leicht verloren. GESCHMACK äufserst bitter.

ARZNEYKRAFT den Magen stärkend, die verstopften Eingeweide auflösend, stärkend, schweifstreibend, wider die Würmer, nicht so erhitzend wie andre Bitterkeiten. Der Absud erregt Erbrechen.

GEBRAUCH bey Magenschwäche, Gelbsucht, Verstopfung der Baucheingeweide, Wechselfiebern, bösartigen Fiebern. Auch rühmt man es nach vorausgegangenem Aderlasse im Seitenstechen und in der Lungenentzündung. Aeufserlich *soll das Auflegen der Blätter beym Brustkrebse und bey tiefen Geschwüren der Schenkel heilsam seyn.*

DOSIS. Fünf Finger voll Kraut mit vier Unzen Wasser als Aufguſs. *Ein Quentchen als* Pulver.

635. CENTAUREA CYANUS.

SPECIES. *Centaurea* calycibus serratis; *foliis* linearibus integerrimis, infimis dentatis.

LOCUS. Planta annua, inter segetes frequens.

PHARMACEVTICA PARS. Flores *Cyani*. Germ. KORNBLUME. Gall. LE BLUET.

ODOR florum et SAPOR nullus. Herba vero et semen amarum.

VIRTUS. Infusum florum diureticum et eccoproticum.

USUS in hydrope, in suppressione urinae. *Externe* infusum vel succus in inflammatione, exulceratione et debilitate oculorum adeo celebres fuerunt hi flores, ut apud Gallos *Casselunette* fuerint vocati.

DOSIS. Pugillus unus cum aquae unciis sex in *infuso*.

635. DIE BLAUE KORNBLUME.

ART. Flockenblume *mit gesägten Kelchen, linienförmigen, ganzen* Blättern, *wovon die untern gezähnt sind.*

VATERLAND. Eine einjährige Pflanze, häufig zwischen den Saaten.

PHARMAZEUTISCHER THEIL. Die Blumen der Kornblume. *Latein.* CYANUS. *Franz.* LE BLUET.

GERUCH und GESCHMACK der Blumen keiner; Kraut aber und Samen sind bitter.

ARZNEYKRAFT. Der Aufguſs der Blumen Urin treibend, gelind abführend.

GEBRAUCH in der Wassersucht, Zurückhaltung des Urins. Der Aufguſs oder Saft wird bey Entzündung, Geschwüren, Schwäche der Augen äuſserlich *aufgelegt. In Hinsicht der Kräfte für schwache Augen standen diese Blumen in einem so groſsen Ansehen, daſs sie die Franzosen* CASSELUNETTE *nannten.*

DOSIS. Fünf Finger voll mit sechs Unzen Wasser als Aufguſs.

636. CENTAUREA CALCITRAPA.

SPECIES. *Centaurea* calycibus subduplicato-spinosis, sessilibus; *foliis* pinnatifidis, linearibus, dentatis, caule piloso.

LOCUS. Planta annua, crescens in Oriente, Italia, Gallia, Anglia, Helvetia, Germania.

PHARMACEVTICA PARS. Herba, Radix et Semina *Calcitrapae*. Germ. STERNDISTEL. Gall. CHARDON ETOILÉ.

ODOR nullus. SAPOR amarus.

VIRTUS roborans, febrifuga. Caules juniores edules. Semina valde diuretica.

USUS in febribus intermittentibus in pulvere, succo vel extracto. Semina in urinae difficultate pituitosa. Succus maculas corneae delet. Herba apud Judaeos fuit condimentum agni paschalis.

DOSIS. Pulvis herbae ad dr. j. Extractum ad dr. ij et succus ad unc. IV datur.

636. DIE STERNDISTEL.

ART. Flockenblume *mit fast doppelt-dornigen, aufsitzenden Kelchen; gefiedert in Querstücke gespaltenen, linienförmigen, gezähnten* Blättern, *und haarigem Stängel.*

VATERLAND. Eine einjährige Pflanze, im Oriente, in Italien, Frankreich, England, in der Schweiz, in Deutschland.

PHARMAZEUTISCHER THEIL. Kraut, Wurzel und Samen der Sterndistel. *Latein.* CALCITRAPA. *Franz.* CHARDON ÉTOILÉ.

GERUCH keiner. GESCHMACK bitter.

ARZNEYKRAFT stärkend, wider das Fieber. Die jungen Stängel sind eſsbar. Die Samen sehr stark Urin treibend.

GEBRAUCH in Wechselfiebern in Gestalt eines Pulvers, Saftes oder Auszuges. Die Samen in der schleimigen Harnverhaltung. Der Saft vertreibt die Flecken der Hornhaut. Das Kraut war bey den Juden die Würze des Osterlammes.

DOSIS. Pulver von dem Kraute ungefähr ein Quentchen, Auszug zwey Quentchen und Saft ungefähr vier Unzen.

637. CENTAUREA BEHEN.

SPECIES. *Centaurea* calycibus scariosis, *foliis* radicalibus lyratis, lobis oppositis, caulinis amplexicaulibus.

LOCUS. Planta annua, crescens ad radices montis Libani in locis aquosis et umbrosis: nec non in Asia minori.

637. DIE BEHEN.

ART. Flockenblume *mit trocknen Kelchen, leyerförmigen Wurzelblättern, entgegengeſetzten Lappen, und den Stängel umfassenden Stängelblättern.*

VATERLAND. Eine einjährige Pflanze, am Fusse des Libanon an wasserreichen und schattigen Orten, und in Kleinasien.

PHARMACEVTICA PARS. Radix *Behen albi.* Germ. WEISSE BEHEN. Gall. BEEN BLANC. Sed vix in pharmacopoliis amplius prostat.

ODOR haud ingratus. SAPOR acris.

VIRTUS. Ab Arabibus censetur roborans, pinguefaciens, seminis secretionem augens.

USUS in tremore membrorum, in debilitate memoriae.

DOSIS. Drachma semis in *pulvere* vel *electuario.* Drachmae tres cum aquae unciis octo ad unc. sex in *decocto.*

638. HELIANTHUS TUBEROSUS.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO III. Polygamia frustranea.

GENUS. *Receptaculum* paleaceum, planum. *Pappus* diphyllus. *Calyx* imbricatus, subsquarrosus.

SPECIES. *Helianthus* foliis ovato-cordatis, triplinerviis.

LOCUS. Planta perennis habitans in Brasilia.

PARS DIAETETICA. Tubera *Helianthi tuberosi.* Germ. ERDARTISCHOCKE. Gall. TAUPINAMBOUR.

ODOR tuberum recentium nullus. SAPOR fatuus. Tuberum vero coctorum sapor perfecte fere saporem disci Cynarae coctae aemulatur.

VIRTUS nutriens. Cibus sapidissimus, at caput parum quandoque temulentans.

USUS. Tubera haec in taleolos scissa, elixata et dein cum embemmate butyraceo ut Asparagus parata, delicatum sistunt cibum.

ORDO IV.

POLYGAMIA NECESSARIA.

639. CALENDULA OFFICINALIS.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO IV. Polygamia necessaria.

PHARMAZEUTISCHER THEIL. Die Wurzel des weifsen Behen. *Latein.* BEHEN ALBUM. *Franz.* BEEN BLANC. *Aber schwerlich in Apotheken mehr anzutreffen.*

GERUCH nicht unangenehm. GESCHMACK scharf.

ARZNEYKRAFT. Die Araber halten sie für stärkend, fettmachend, die Absonderung des Samens vermehrend.

GEBRAUCH bey Zittern der Glieder, Schwäche des Gedächtnisses.

DOSIS. Ein halbes Quentchen als Pulver *oder* Latwerge. *Drey Quentchen mit acht Unzen Wasser, zu sechs Unzen als* Absud.

638. DIE KNOLLIGE SONNENBLUME.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. III. ORDNUNG. Fruchtlose Vielweiberey.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *spreuartig, flach. Die* Haarkrone *zweyblätterig. Der* Kelch *dachziegelförmig über einander gelegt, etwas sparrig.*

ART. Sonnenblume *mit eyrund-herzförmigen und dreyfach gerippten Blättern.*

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze, in Brasilien einheimisch.

DIAETETISCHER THEIL. Die Knollen der Erdartischocke *Latein.* HELIANTHUS TUBEROSUS. *Franz.* TAUPINAMBOUR.

GERUCH der frischen Knollen, keiner. GESCHMACK fade. Der Geschmack der gekochten Knollen aber ist fast vollkommen dem Geschmacke der gekochten Scheibe der Artischocke ähnlich.

ARZNEYKRAFT, nährend. Die Speise ist sehr schmackhaft, macht aber bisweilen den Kopf etwas betäubt.

GEBRAUCH. Die in kleine Scheiben zerschnittenen Knollen geben ausgelaugt, und mit einer Buttertunke, wie der Spargel, zubereitet, ein sehr wohlschmeckendes Gericht.

IV. ORDNUNG.

NOTHWENDIGE VIELWEIBEREY.

639. DIE GEMEINE RINGELBLUME.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. IV. ORDNUNG. Nothwendige Vielweiberey.

GENUS. *Receptaculum* nudum. *Pappus* nullus. *Calyx* polyphyllus, aequalis. *Semina* disci membranacea.

SPECIES. *Calendula* seminibus cymbiformibus, muricatis, incurvatis omnibus.

LOCUS. Planta annua in arvis Europae australioris. Sed vulgaris in hortis nostris.

PHARMACEVTICA PARS. Flores et herba *Calendulae*. Germ. RINGELBLUME. Gall. SOUCI DES JARDINS.

ODOR florum ingratus, bitumen quodammodo redolens. SAPOR primum subdulcis, dein amarus. Folia magis amara, subacria, ingratioraque.

VIRTUS sudorifera, emmenagoga, solvens.

USUS. Flores in febribus malignis et ipsa peste laudabantur. Folia recentia ad verrucas, callum pedum, marginemque durum ulcerum tollendum imponuntur. Folia, floresque instar acetarii comesta infantibus scrofulosis profuere.

DOSIS. Pugillus unus florum, cum aquae unciis quatuor in *infuso*.

ORDO VI.

MONOGAMIA.

640. VIOLA ODORATA.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO VI. Monogamia.

GENUS. *Calyx* pentaphyllus. *Corolla* quinque petala, irregularis, postice cornuta. *Capsula* supera, trivalvis, unilocularis.

SPECIES. *Viola* aculis, *foliis* cordatis, *stolonibus* reptantibus.

LOCUS. Planta perennis in australioris Europae nemoribus, collibus, hortis pomiferis et inter gramina primo vere frequens.

PHARMACEVTICA PARS. Flores *Violae martiae*. Herba *Violariae*. Germ. MAERZVEILCHEN. Gall. VIOLETTE DE MARS.

ODOR florum recentium gratissimus, specificus. Sed halitus prout aliarum stirpium valde fragrantium angustiori conclavi occlusus caput tentat, et omnem sensum supprimit. SAPOR amaricans, mucilaginosus.

GESCHLECHT. Der Fruchtboden *nackt.* Haarkrone *keine. Der* Kelch *vielblättrig, gleich. Die* Samen *der Scheibe häutig.*

ART. Die Ringelblume *mit lauter kahnförmigen, zackigen und gekrümmten Samen.*

VATERLAND. Eine einjährige Pflanze, auf Feldern des südlicheren Europa. In unsern Gärten gemein.

PHARMAZEUTISCHER THEIL. Blumen und Kraut der Ringelblume. *Latein.* CALENDULA. *Franz.* SOUCI DES JARDINS.

GERUCH der Blumen unangenehm, fast wie Erdharz. GESCHMACK. Anfangs süfslich, dann bitter. Die Blätter sind noch bitterer, etwas scharf und unangenehmer.

ARZNEYKRAFT. Schweifs treibend, den Monathflufs befördernd, auflösend.

GEBRAUCH. Die Blumen rühmte man in bösartigen Fiebern und selbst in der Pest. Die frischen Blätter werden auf Warzen, Schwielen der Füfse, und um den harten Rand der Geschwüre zu heilen, aufgelegt. Die Blätter und Blumen als Salat gegessen waren den mit Scrofeln behafteten Kindern heilsam.

DOSIS. Fünf Finger voll Blumen mit vier Unzen Wasser als Aufgufs.

VI. ORDNUNG.

REINE EHEN.

640. DAS WOHLRIECHENDE VEILCHEN.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. VI. ORDNUNG. Reine Ehen.

GESCHLECHT. Der Kelch *fünfblättrig. Die* Blumenkrone *unregelmäfsig fünfblättrig, hinten gehörnt. Die* Samenkapsel *oben dreyklappig, einfächerig.*

ART. Veilchen *ohne Stängel, mit herzförmigen* Blättern *und kriechenden* Ranken.

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze in Hainen des südlichen Europa, auf Hügeln, in Obstgärten und unter dem Grase im angehenden Frühlinge häufig.

PHARMAZEUTISCHER THEIL. Die Blumen des Märzveilchens. *Latein.* VIOLA MARTIA. *Franz.* VIOLETTE DE MARS.

GERUCH. Der frischen Blumen sehr angenehm, specifisch. Allein die Ausduftungen der Blumen in einem verschlossenen Zimmer nehmen den Kopf ein, und betäuben, so wie andere stark riechende Pflanzen. Der GESCHMACK bitterlich, schleimig.

VIRTUS syrupi violarum, qui solus in usum medicum adhibetur blande anodyna. Herba emolliens, radix recens emetico-laxans. Semen diureticum.

USUS. Syrupus tussim sedat, dolores ab aphthis lenit, in tenerioribus somnum blande promovet.

DOSIS. Pugillus unus florum cum aquae unciis sex in *infuso*.

641. VIOLA TRICOLOR.

SPECIES. *Viola* caule triquetro, diffuso, *foliis* oblongis, incisis, *stipulis* pinnatifidis.

LOCUS. Planta annua in pratis arvisque montanis, Europae temperatioris habitans.

PHARMACEVTICA PARS. Herba *violae tricoloris*. Germ. DREYFALTIGKEITSBLUME. Gall. PENSÉE.

ODOR herbae fortius contritae nonnihil ad illum nucleorum Persicae accedit. SAPOR herbae recens masticatae subamaricans, in lingua sensum acredinis diu relinquens.

VIRTUS alvum laxans, quandoque emetica, diuretica, antexanthematica, urinae quandoque foetorem fellinum concilians.

USUS in crusta lactea, serpigine, achoribus, tinea, herpete, scabie, furunculis; varis faciei, arthritide, rheumatismo, ulceribus cruris, epilepsia infantum.

DOSIS. Pro infante annuo herbae dr. ij in aqua unciis sex coquantur ad remanentiam unc. IV. Collaturae addatur lac et saccharum. Homini adulto paratur decoctum ex herbae uncia una et aquae libra una.

642. LOBELIA SYPHILITICA.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO VI. Monogamia.

GENUS. *Calyx* quinquefidus. *Corolla* monopetala, irregularis. *Capsula* infera 2 vel 3 locularis.

ARZNEYKRAFT des Veilchen-Syrups, welcher allein zum medizinischen Gebrauche dient, sanft Schmerz stillend. Das Kraut erweichend, die frische Wurzel brechend-purgierend. Der Samen Urin treibend.

GEBRAUCH. Der Syrup stillet den Husten, lindert bey Kindern den von Mundschwämmchen verursachten Schmerz, bey kleineren Kindern ist er ein sanftes Beförderungsmittel des Schlafes.

DOSIS. Fünf Finger voll Blumen mit sechs Unzen Wasser als Aufguſs.

641. DAS DREYFÄRBIGE VEILCHEN.

ART. Veilchen *mit weitschweifigem, dreyseitigen Stängel, länglichen, eingeschnittenen* Blättern, *und gefiedert in Querstücke gespaltenen* Blattansätzen.

VATERLAND. Eine einjährige Pflanze auf Wiesen, Bergfeldern des gemäſsigteren Europa.

PHARMAZEUTISCHER THEIL. Kraut der Dreyfaltigkeitsblume. *Latein.* VIOLA TRICOLOR. *Franz.* PENSÉE.

GERUCH des stark zerriebenen Krautes ist dem Geruche der Pfirsichkerne einiger Maſsen ähnlich. Der GESCHMACK der frisch gekauten Wurzel ist etwas bitter und läſst auf der Zunge lange das Gefühl eines scharfen Geschmackes zurück.

ARZNEYKRAFT abführend, bisweilen Erbrechen erregend, Harn treibend, wider die Hautausschläge. Bisweilen verschafft es dem Urine einen Gallengestank.

GEBRAUCH im Milchschorfe, trocknem Schwinde, in der Kopfraude, im Erbgrinde, in der Flechte, Krätze, bey Blutschwären, Gesichtshübeln, in der Gicht, im Rheumatismus, bey Geschwüren der Schienbeine, Epilepsie der Kinder.

DOSIS. Für ein Kind von einem Jahre koche man zwey Quentchen Kraut in sechs Unzen Wasser zur Remanenz von vier Unzen. Zur durchgesiehenen Masse gebe man noch Milch und Zucker. Für einen erwachsenen Menschen bereite man einen Absud aus einer Unze Kraut und einem Pfunde Wasser.

642. DIE LUSTSEUCHEHEILENDE LOBELIE.

XIX. KLASSE. Mitbuhler. VI. ORDNUNG. Reine Ehen.

GESCHLECHT. Der Kelch *fünfspaltig. Die* Blumenkrone *einblättrig, unregelmäſsig. Die* Samenkapſel *unten zwey oder dreyfächerig.*

SPECIES. *Lobelia* caule erecto, *foliis* ovato-lanceolatis, subserratis, calycum sinubus reflexis.

LOCUS. Planta perennis, crescens in locis udis, ad fossas et flumina Virginiae.

PHARMACEVTICA PARS. Radix Lobeliae. Germ. BLAUE CARDINALSBLUME. Gall. CARDINALE BLEUE.

ODOR ingratus. SAPOR acris, Nicotianam aemulans, diu linguae adhaerens. Planta recens lactescens.

VIRTUS emetico-purgans, antisyphilitica. Dosi minori sudorem, majori alvi dejectiones et adhuc majori nauseam et vomitum excitat.

USUS. Feri Americae Septentrionalis jam dudum in lue venerea adhibent. Sanationem intra quatuordecim dies succedere affirmant.

DOSIS. Manipulus unus radicis coquitur in aquae mensuris tribus. Hujus decocti bibitur ab initio mensura dimidia, si aeger tenerioris fuerit habitus. Dein dosis augetur quotidie, donec aeger decocti vim purgantem amplius ferre nequeat. Dum abstinendum a decocto per unum alterumve diem et iterum incipiendum, si opus est, ad perfectam sanationem usque. Partes lue contaminatae simul saepius hoc decocto lavari debent.

ART. Lobelie *mit aufrecht stehendem Stängel, eyrundlanzetförmigen, fast gesägten* Blättern, *und zurückgebogenen Vertiefungen der Kelche.*

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze auf feuchten Plätzen, an Gräben und Flüssen in Virginien.

PHARMAZEUTISCHER THEIL. Die Wurzel der blauen Cardinalsblume. *Latein.* LOBELIA. *Franz.* CARDINALE BLEUE.

GERUCH unangenehm. GESCHMACK scharf, ähnlich jenem des Tobaks, lange an der Zunge haftend. Die frische Pflanze ist milchig.

ARZNEYKRAFT brechend-purgierend, die Lustseuche heilend. In kleinerer Gabe verursacht sie Schweifs, in gröfserer Abführung des Unflaths im Leibe, und in noch gröfserer Ekel und Erbrechen.

GEBRAUCH. Die Wilden in Nord-Amerika brauchen sie schon lange in der Lustseuche. Nach ihrer Versicherung soll sie die Heilung innerhalb vierzehn Tagen bewirken.

DOSIS. Man kocht eine Handvoll Wurzeln in drey Mafs Wasser. Ist der Kranke von einer zarteren Leibesbeschaffenheit, so trinkt er Anfangs eine halbe Mafs davon. Darauf gibt man ihm täglich eine gröfsere Dosis, bis er die purgierende Kraft des Decocts nicht weiter mehr ertragen kann. Man läfst ihn dann ein oder zwey Tage kein Decoct trinken, fängt aber wieder an, wenn es nöthig ist, es ihm zu verordnen, bis er vollkommen genesen ist. Die von der Lustseuche angesteckten Theile müssen öfters mit diesem Decocte gewaschen werden.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

ORDO I.

DIANDRIA.

643. ORCHIS MASCULA.

CLASSIS. XX. Gynandria. ORDO I. Diandria.

GENUS. Nectarium corniforme pone florem.

SPECIES. *Orchis* bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido, crenulato: cornu obtuso, petalis dorsalibus reflexis.

LOCUS. Planta perennis in sylvis et pratis Europae et Asiae habitans.

XX. KLASSE.

EIFERSÜCHTIGE.

I. ORDNUNG.

ZWEYMÄNNIGE.

643. DAS MÄNNLICHE KNABENKRAUT.

XX. KLASSE. Eifersüchtige. I. ORDNUNG. Zweymännige.

GESCHLECHT. Das Honigbehältnifs *hornförmig hinter der Blume.*

ART. Knabenkraut *mit unzertheilten Zwiebeln, vierlappiger, feingekerbter Lippe des Honigbehältnisses, stumpfem Horne, und zurückgebogenen Rückenblumenblättern.*

VATERLAND. Eine ausdauernde Pflanze in Wäldern und auf Wiesen von Europa und Asia.