IV. Arzneimittel,

welche nicht länger als ein Jahr aufbewahrt werden dürfen.

Folia Digitalis.
Glandulae Lupuli.
Rhizoma Filicis.

Arzneimittel,

bei denen die Pharmacopöe einen bestimmten Gehalt vorschreibt.

Acetum mit 6% Acidum aceticum.
Acetum pyrolignosum crudum mit mindestens 6% Acidum aceticum.
Acetum pyrolignosum rectificatum mit mindestens 6% Acidum aceticum.
Acetum Scillae mit 5,1% Acidum aceticum.
Acidum aceticum — 96%.
Acidum aceticum dilutum — 30%.
Acidum hydrochloricum — 25%.
Acidum hydrochloricum crudum — mindestens 29%.
Acidum hydrochloricum dilutum — 12,5%.
Acidum nitricum — 30%.
Acidum phosphoricum — 20%.
Acidum sulfuricum — 94 bis 97%.
Acidum sulfuricum crudum — mindestens 91%.
Ammonium chloratum ferratum — 2,5% Eisen.
Aqua Amygdalarum amararum — 0,1% Acidum hydrocyanicum.
Aqua chlorata — mindestens 0,4% Chlorum.
Auro-Natrium chloratum — 30% Aurum.
Calcaria chlorata — mindestens 20% wirksames Chlorum.
Cerussa — mindestens 85% Bleioxyd.
Chininum bisulfuricum bei 100° getrocknet 77% Rückstand.

Chininum hydrochloricum bei 100° getrocknet 91% Rückstand.
Chininum sulfuricum bei 100° getrocknet mindestens 85% Rückstand.
Chinioïdinum — soll verbrannt nicht mehr als 0,5 bis 0,7% Asche hinterlassen.
Extractum Opii — mindestens 11,33% Morphinkrystalle.
Ferrum carbonicum saccharatum mit 10% Eisen.
Ferrum jodatum mit 82% Jod.
Ferrum oxydatum saccharatum solubile mit 3% Eisen.
Ferrum reductum — 89,75% Eisen.
Gossypium depuratum mit höchstens 0,6 bis 0,8% Asche.
Liquor Aluminii acetici mit 7,5 bis 8% basisch. Aluminiumacetat.
Liquor Ammonii acetici mit 15% Ammoniumacetat.
Liquor Ammonii caustici mit 10% Ammoniak.
Liquor Ferri acetici mit 4,8 bis 5% Eisen.
Liquor Ferri oxychlorati mit nahezu 3,5% Eisen.
Liquor Ferri sesquichlorati mit 10% Eisen.
Liquor Ferri sulfurici oxydati mit 10% Eisen.
Liquor Kali caustici mit nahezu 15% Kaliumhydroxyd.
Liquor Kalii acetici mit 25% Kaliumacetat.
Liquor Kalii arsenicosi mit 1% arseniger Säure.
Liquor Kalii carbonici mit 25% Kaliumcarbonat.
Liquor Natri caustici mit nahezu 15% Natriumhydroxyd.
Opium mit mindestens 10% Morphium.
Syrupus Ferri jodati mit 5% Jodeisen.
Syrupus Ferri oxydati solubilis mit 1% Eisen.
Tinctura Ferri acetici mit 4% Eisen.
Tinctura Ferri chlorati aetherea mit 1% Eisen.
Tinctura Jodi mit 10% Jod.
Tinctura Opii benzoïca mit nahezu 0,05% Morphin.
Tinctura Opii crocata mit nahezu 1% Morphin.
Tinctura Opii simplex mit nahezu 1% Morphin.
Trochisci Santonini — 0,025 Santonin per Stück.
Unguentum hydrargyri cinereum mit 33,33% Quecksilber.
Zincum sulfocarbolicum mit nahezu 14,6% Zinkoxyd.