De af de modne sporangier udrystede sporer.

Bleggult, meget fint, let, tørt pulver, der svømmer paa vand, uden lugt og smag. Bringes det ind i en flamme, forbrænder det med knitren uden røg.

Skal være frit for forurensninger og tilblanding af pollenkorn af pinusarter, hvilke er mørkere gule og lugter af terpentinolje ved gnidning.

Manna.

Manna.

Fraxinus Ornus L. *Oleaceae.* Træ hjemmehørende og dyrket i det sydlige Europa.

Den af indsnit i stammen udsvedede og i luften indtørrede saft.

Flade eller rendeformede, ikke klæbrige stykker af vekslende længde, udvendig gulagtige, indvendig næsten hvide. Bruddet er skjørt, viser koncentriske lag og krystallinsk struktur. Smager sødt, ikke kradsende.

Manna opløses for største delen i vand og i kogende spiritus; ved afkjøling af den spirituøse opløsning udskilles krystaller i rigelig mængde.

Mel.

Honning.

Apis mellifica L. *Insecta. Hymenoptera.*

Farveløs eller gulagtig, klar vædske af tyk sirups konsistens, bliver ved at henstaa ugjennemsigtig og kornet krystallinsk. Lugter eiendommelig, smager sødt, reagerer neutralt eller svagt surt.

Maa ikke lugte og smage syrlig.

Opbevares paa et kjøligt sted.

Mel depuratum.

Loco Mellis despumati Ph. Norv. Ed. I et Mellis depurati Ph. Norv. Ed. II.

Renset honning.

Mellis 100
Aqvae destillatae 100
singulorum partes centum
Carbonatis calcici praecipitati *partes duae* 2
Albuminis Ovi gallinacei *partes qvatuor* 4
Aqvae destillatae *partes viginti qvinqve* . . . . . 25.

100 dele honning og 2 dele kalciumkarbonat udrøres med 100 dele vand og tilsættes 4 dele eggehvide, der forveien er udrørt med 25 dele vand. Blandingen omrøres godt og gives et opkog. Den koagulerede eggehvide afskummes, vædsken koleres gjennem flanel, inddampes paa vandbad til sirups tykkelse (specifik vegt omtrent 1,33) og koleres atter.

Skal være klar, gul eller brungul; maa ikke smage eller lugte branket eller surt.

Opbevares paa et kjøligt sted.

Mentholum.

Mentol.

$C_{10}H_{19}.OH$.

Farveløse, naaleformede krystaller, der lugter og smager som pebermynteolje, smelter ved 43° og koger ved 212°, men sublimerer allerede ved svag opvarmning. De opløses i yderst ringe mængde i vand, derimod let i spiritus, i æter, i kloroform og i fede oljer.

Ved opvarmning i en aaben skaal paa vandbad skal mentol fordampe fuldstændig.

Mixtura acida.

Loco Mixturae acidae. Ph. Norv. Ed. I.

Sur mikstur.

Acidi sulfurici diluti *partes duae*	2
Aqvae destillatae *partes octoginta*	80
Syrupi Rubi Idaei *partes duodeviginti*	18
	100.

Blandes.
Skal være klar og frisk rød.

Mixtura Acidi hydrochlorati.

Saltsyremikstur.

Acidi hydrochlorati diluti *partes duae*	2
Aqvae destillatae *partes octoginta*	80
Syrupi Rubi Idaei *partes duodeviginti*	18
	100.

Blandes.
Skal være klar og frisk rød.

Mixtura alba.

Loco Mixturae albae. Ph. Norv. Ed. I et Ed. II.

Kridmikstur.

Carbonatis calcici praecipitati	3
Gummi Arabici pulverati	3
singulorum partes tres	
Aqvae destillatae *partes octoginta octo*	88
Syrupi Sacchari	3
Aqvae Cinnamomi spirituosae	3
singulorum partes tres	
	100.

De faste substanser udrives med vand, hvorpaa de øvrige bestanddele tilsættes.

Skal efter omrystning være hvid.

Tilberedes ex tempore.

Mixtura aperiens.

Afførende mikstur.

Tartratis kalici *partes qvindecim*	15
Aqvae destillatae *partes triginta qvinqve*	35
Infusi Rhei alkalini *partes qvinqvaginta*	50
	100.

Opløses og blandes.

Skal være klar og brunrød.

Tilberedes ex tempore.

Mixtura Ferri composita.

Loco Mixturae Balsamodendri ferratae Ph. Norv. Ed. I et Mixturae Ferri compositae Ph. Norv. Ed. II.

Griffiths mikstur.

Carbonatis kalici *partes duae*	2
Gummi-resinae Myrrhae *partes qvatuor*	4
Aqvae destillatae *partes centum qvadraginta qvatuor*	144
Sulfatis ferrosi *partes tres*	3
Aqvae Menthae piperitae *partes centum viginti septem*	127
Syrupi Sacchari *partes viginti*	20
	300.

Kaliumkarbonat og myrrha udrives med vand til emulsion, bringes i en flaske og tilsættes det i pebermyntevand og sukkersirup opløste ferrosulfat.

Skal være grøn og uklar.

Tilberedes ex tempore.

Moschus.

Moskus.

Moschus moschiferus L. *Mammalia. Ruminantia.* Lever i Central- og Østasien.

Indholdet af en pung paa hannens underliv.

En salveagtig eller kornet, smuldrende, fedtagtig glinsende, mørkebrun masse af eiendommelig, gjennemtrængende lugt og svagt bitter smag.

Maa ikke lugte af ammoniak.

Moskus skal tørres over svovlsyre, indtil den ikke taber mere i vegt. Den tørrede moskus maa ved glødning ikke efterlade mere end 8 % aske.

Opbevares i godt lukket kar i et eget rum.

Mucilago Gummi Arabici.

Syn.: Mucilago gummi Acaciarum. Ph. Norv. Ed. I.

Gummiopløsning.

Gummi Arabici *partes centum*	100
Aqvae destillatae *partes ducentae*	200
	300.

Opløses og koleres.

Skal være klar og næsten farveløs.

Opbevares paa et kjøligt sted.

Mucilago Salep.

Syn.: Mucilago Orchidum. Ph. Norv. Ed. I.

Salep.

Tuberis Salep pulverati *pars una*	1
Aqvae destillatae frigidae *partes decem*	10
Aqvae destillatae fervidae *partes octoginta novem*.	89
	100.

1 del pulveriseret saleprod udrystes med 10 dele koldt vand, tilsættes derpaa kogende vand og rystes, indtil der er dannet en sirupstyk vædske.

Skal være uklar og tykflydende.

Tilberedes ex tempore.

Naphtholum.

β-Naftol.

$C_{10}H_7OH$.

Farveløse, glinsende krystaller eller hvidt krystallinsk pulver af karbolsyrelignende lugt og brændende, skarp smag. De smelter ved 122°, koger ved 286° og opløses i omtrent 1000 dele koldt og i 75 dele kogende vand, let i spiritus, æter, kloroform, fede oljer og natronlud.

En vandig opløsning af β-naftol antager ved tilsætning af ammoniak svagt blaalig fluorescens. Opløses β-naftol i natronlud, og rystes vædsken med kloroform, antager den sterkt blaa farve, som ved opvarmning forandres til smudsiggrøn.

β-Naftol skal fuldstændig opløses i 50 dele ammoniak til en svagt gulfarvet vædske og igjen udfældes som hvidt pulver ved overmætning med saltsyre.

En varmt mættet, vandig opløsning skal ved tilsætning af klorkalkopløsning farves rødliggul, ikke violet (α-naftol).