VSVS: Tussis, Colica saturnina, Exanthemata, Bubo, Anthrax, Dystocia, Obstipatio; nocet Scabiosis et Gingivis ulcerosis.
COMP. Enemata.

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

340. EQVISETVM *arvense*, scapo fructificante nudo, sterili frondoso. *Linn. Sp. pl.* 1516. *Mrt. med.* 625. *Gr. virg.* 123. *ed. n.* 163.
LOC. Novebor. — Virginiae pascua. *Perennis.*
PHARM. *Equiseti* Herba.
QVAL. sicca. *Exoleta, eximia.*
VIS: adstringens! diuretica!
VSVS: Haematuria! Gonorrhoea benigna, Profluvia, Phthisis.

341. ADIANTVM *pedatum*, frondibus pedatis, foliolis pinnatis, pinnis antice gibbis incisis fructificantibus. *Linn. Sp. pl.* 1557. *Kalm. it.* 3. *p.* 338. *Gron. virg.* 123. *ed. n.* 167. *Cold. noveb.* 236.
LOC. Canada — Virginia. *Perennis.*
PHARM. *Adianti pedati* (*Capill. veneris canad.*) Herba.
QVAL. (Capilli Veneris. *Mat. med.* 633.) sicca, subodorata.
VIS: corroborans, diuretica.
VSVS: Obstructio viscerum. Ad omnes Tusses valet. *Clayt.*

MVSCI-

MVSCI.

342. LYCOPODIVM *Selago*, foliis sparsis octofariis caule erecto dichotomo fastigiato, floribus sparsis. *Linn. Sp. pl.* 1565. *Mat. med.* 635. *Gr. virg. ed. n.* 168.
LOC. Virginia. *Perennis.*
PHARM. *Musci erecti* Herba.
QVAL. virulenta. *Exoleta, heroica.*
VIS: drastica, abortiva, phthiriaca.
VSVS: Hydrops, Pediculi.

343. POLYTRICHVM *commune*, caule simplici; anthera parallelepipeda. *Linn. Sp. pl.* 1573. *Mat. med.* 636. *Gr. virg. ed. n.* 168.
LOC. Novae-Angliae – Virginiae arida. *Perennis.*
PHARM. *Adianti aurei* Herba.
QVAL. cruda. *Exoleta, inutilis.*
VSVS: Pleuritis. (de viribus conferend. *Plum.* filic. Am. p. 2. praef. *Clayton.*)

HYPNVM *castrense* — masticatum et vulneri a Morsura Serpentis impositum, utile esse mihi indicatum est.

ALGAE.

344. LICHEN *pulmonarius*, foliaceus laciniatus obtusus glaber: supra lacunosus, subtus tomentosus. *Linn. Sp. pl.* 1612. *Mat. med.* 639.
LOC. Novae Caesareae arbores. *Parasiticus.*
PHARM. *Pulmonariae arboreae* Herba. *Praestans.*
QVAL. mucilaginea, amaricans.
VIS: tonica, nutriens, thoracica.
VSVS: Tussis, Icterus.

345. LICHEN *caninus* coriaceus repens lobatus obtusus planus: subtus venosus viilosus, pelta

pelta marginali adscendente. *Linn. Sp. pl.* 1616. *Mat. med.* 641. *Gr. virg. ed. n.* 178.
LOC. Americae septentr. sylvae lapidesque.
PHARM. *Musci canini* Herba.
QVAL. tetra, mephitica. *Inusitata.*
VIS: mundificans, pellens.
VSVS: Hydrophobia! Rabies!
COMP. Pulv. antilyssus. ℈jv.

346. LICHEN *cocciferus*, scyphifer simplex integerrimus, stipite cylindrico; tuberculis coccineis. *Linn. Sp. pl.* 1618. *Mat. med.* 642. *Gr. virg. ed. n.* 178.
LOC. Americae sylvae.
PHARM. *Musci pyxidati* Herba.
QVAL. sicca.
VSVS: Tussis convulsiva.

347. LICHEN *plicatus* filamentosus pendulus: ramis implexis, scutellis radiatis. *Linn. Sp. pl.* 1622. *Mat. med.* 644. *Gr. virg. ed. n.* 173.
LOC. Americae sylvae. *Parasiticus.*
PHARM. *Musci arborei* Herba.
QVAL. sicca.
VIS: adstringens.
VSVS: Excoriatura, Haemorrhagia, Hernia umbilicalis.

348. FVCVS *saccharinus* caule tereti brevissimo Folio maximo ensiformi subsimplici. *Sp. pl.* 1630.
LOC. Maris atlantici litora. Esculentus.

349. FVCVS *natans* caule tereti ramosissimo, foliis lanceolatis serratis, fructificationibus globosis pedunculatis subaristatis. *L. Sp. pl.* 1628.
LOC. in Pelago libere natans.
Gulfweed.–Pulvis parturientibus datur. *Kalm.* 2.

F V N G I.

349. AGARICVS *coriaceus* Iuglandis. Ad nodos Iuglandis albae, intra lignum nascitur. Fomes ad ignem citissime concipiendum. *Punck* hic vulgo dictus. *Gr. virg. ed. n.* 175.
VIS: Sanguinem sistens.
VSVS: Chirurgicus.

AGARICVS substantiae tenellae gelatinae, auriculae forma. *Iews-ear. Gr. virg. ed. n.* 175. An Peziza Auricula. *Linn. Mat. med.* 656?

350. LYCOPERDON *Tuber* globosum solidum muricatum radice destitutum. *Linn. Sp. pl.* 1655. *Mat. med.* 547. *Gr. virg. ed. n.* 176.
LOC. Novae Caesareae — Virginiae sylvae. *Subterrestris.*
PHARM. *Boleti Cervini.*
QVAL. hircina. *Exoleta, dubia.*
VIS: aphrodisiaca, flatulenta.
VSVS: Atecnia.
Ad panem conficiendum Indi utuntur hoc fungo, vulgo *Tuckahoo. Clayt.*

351. LYCOPERDON *Bovista* subrotundum lacerato-dehiscens. *Linn. Sp. pl.* 1653. *Mat. med.* 648.
Lycoperdon maximum dehiscens, pulvere repletum. *Gr. virg.* 176.
LOC. Noveboraci — Virginiae campi, sylvae.
PHARM. *Crepitus Lupi.*
QVAL. farinosa, styptica, nigrans. *Trita, eximia.*
VIS: adstringens, obstipans, absorbens, incrassans, gastritica, ophthalmica.
VSVS: Amputatio, Haemorrhagia! Haemorrhois, Vlcera, Intertrigo.

OBSCV-

OBSCVRAE.

352. *Old. Roberts Root.* Planta, in Turkey Creeck Settlement, Pensylvaniae, mihi visa, non autem flores.

Radix fibrosa, fibrillis, tenuibus albis. Folia radicalia, petiolis canaliculatis, glabris, obovata vel subrotunda, obtusa, crenata, glabra, long. poll. 1¼ lat. 1½. Mense Octobri flores plures parvos flavos in caule sesquipedali proferre dicitur. Amat Querceta siccca, nec copiosa invenitur.

Rad. et fol. sapore herbaceo amaricante; pulverisata externe applicata Vlcera aliaque cutis vitia sanat; eodem tempore autem infusum plantae bibendum est. Framboesiam (the Yaws) quoque curare dicitur.

353. *Butterfly-root*; *Pleurisy-root.*—Hoc nomine in Terra Mariana Radix quaedam insignitur, alba, crassitie digiti auricularis, cuius virtutes incolae in Pleuritide, aliisque morbis febrilibus, magni faciunt. Plantam non vidi; nomen vero, illam ad Diadelphiam pertinere, suadet. — Sapor est mucilagineo-dulcescens, amaricans.

In Pensylvania nomine *Pleurisy-root* Radix Asclepiadis tuberosae venit, cujus particula, dimidium pollicem magnitudine aequans, decocta pro remedio certissimo adversus Pleuritidem habetur, ut nuper e literis Ven. *Muhlenbergii* didici.