cias Aquae Cinnamomi; — Bel. Kino partem unam et octo Alcoholis (20°); — *Br.* sedecim Alcoholis (0,935); — Sax†. quinque Spiritûs rectif.; — Sax2†. *Vm.* sex Alcoholis (caeterum ut tinct. Absinth. Sax2†.); — Lus Kino uncias duas, Aquae Vitae sesquilibram; — Ful†. Kino drachmas duas, Aquae Cinnamomi simpl. sesquiunciam et Aquae Cinnamomi vinos. semunciam; — Li†. Kino uncias duas, Aquae dest. uncias sex et Spiritûs Nitri dulcis tantidem; — HC†. Kino uncias duas, Spir. rectificatiss. libram, digestionem per triduum, ut sit colatura libras; — HassP†. Kino uncias duas, Spiritûs Vini rectif. sedecim, sex diebus digestionem calore 20 ad 24°; pondus tincturae filtratae uncias quatuordecim aequet. — *DB. T.* Kino unciam unam, Alcoholis 25° B. sedecim, digere per dies duodecim vel quindecim; — *Fl.* Kino uncias novem, Alcoholis 24° libras tres, macerata per dies quatuordecim filtra.

RC. Kino sesquiunciam, Corticis Lauri Cassiae unciam unam, Alcoholis diluti libram unam.

Gabe, eine Drachme bis halbe Unze.

L.

L a c.

Milch; Lait (*Gal.*); Milk (*Ang.*); Lebn (*Ar.*); Leche (*His.*); Dud (*Hin.*); Melk (*Bel.*); Latte (*I.*); Schir (*Pe.*); Khschira, Payas, Dughda (*Sa.*); Jaelk (*Suec.*); Leite (*Lus.*).

Ba†. Bor5†. Ham†. HassP†. Wir†. Ams. GalM. GalP. HisS. LH. LP. Suec. Taur. *A. G. Gr. Pid. Sp. T*

Eine undurchsichtige, weiße, etwas fettige, und schwerere Flüssigkeit als Wasser, welche die Brustdrüsen weiblicher Säugthiere kurze Zeit nach der Geburt abzusondern anfangen. Sie hat einen süßen, angenehmen, mehr oder minder zuckerartigen Geschmack und einen eigenthümlichen Geruch, welcher sich in dem Maße, wie sie erkaltet, verliert.

Man wendet drei Arten Milch an:

1) *Lac vaccinum s. bubulum*, Kuhmilch; Lait de vache (*Gal.*); Cow's milk (*Ang.*); Ellakerrie (*Cy.*); Ghayka dud (*Duk.*); Gaicha dud (*Mah.*); Susu (*Mal.*); Gokschira (*Sa.*); Paschuin paal (*Tam.*); Au palu (*Tel.*).

2) *Lac caprinum*; Ziegenmilch; Lait de chèvre (*Gal.*); Goat's milk (*Ang.*); Jlukirie (*Cy.*); Chaylie ka dud (*Duk.*), Leche de cabra (*His.*); Ajakschira (*Sa.*); Aatu paal, Vellatu paal (*Tam.*); May ka palu (*Tel.*).

3) *Lac asininum*; Eselsmilch; Lait d'ânesse (*Gal.*); Asses' milk (*Ang.*); Cotalukirie (*Cy.*); Gadika dud (*Duk.*); Ghaduva tcha dud (*Mah.*); Kharakhira (*Sa.*); Kalady paal (*Tam.*); Gadilay palu (*Tel.*).

Die beiden erstern sind einander sehr ähnlich; die letztere enthält weit mehr Rahm als sie.

Ueberläßt man die Milch sich selbst, so trennt sie sich nach einiger Zeit in drei Theile:

1) den *Cremor*; Milchrahm; Crème (*Gal.*); Graedda (*Suec.*);

2) das *Caseum, Caseus*; Käse; Fromage (*Gal.*); Queijo (*Lus.*); und

3) das *Lac ebutyratum, Serum*; Buttermilch; Sérum, Babeurre, Lait de Beurre, Petit lait (*Gal.*); Dogh (*Ar.*); Schaat-sh (*Duk.*); Mutha (*Hin.*); Takram, Dandabatam (*Sa.*); Moru (*Tam.*); Tsalla (*Tel.*).

Schlägt man den Rahm, so erhält man die Butter, *Butyrum, Butyrum vaccinum recens*, Beurre (*Gal.*); Butter (*Ang.*); Manteca de vacca (*His.*); Manteiya (*Lus.*); Boter (*Bel.*); Burro (*I.*); Smaer (*Suec.*).

A†. Ba†. Hass†. Li†. Pal†. Sax†. WW†. Ams. B. Bel. Gal. HisS. Suec. Taur. *DB. G. Gr. Pid. Sp.*

Eine fette und derbe Substanz, von weißer oder gelber Farbe, angenehmem Geschmack und etwas würzigem Geruch, welche, nach Chevreul, Käsestoff, Buttermilch, Elain, Stearin, einen färbenden Stoff, etwas Buttersäure und ein Oel enthält. Die ungesalzene Butter (Butyrum insulsum *Gr.*) wird unmittelbar aus dem Rahm ohne Salz, durch Schlagen bereitet. Sie wird zu Salben gebraucht. Die gereinigte Butter (Butyrum purificatum) wird aus frischer Butter bereitet, indem man sie bei gelinder Wärme schmelzt, sich setzen läßt, und das Klare in ein in kaltes Wasser gestelltes Gefäß gießt.

Der Käsestoff, welchen man in dem Kälberlaab findet, führt bei den Franzosen den Namen présure (Gal. Gen.). Er ist mit Essig-, Salz- und Buttersäure vermischt, welche die Wände dieses Magens abson-

dern, wodurch er einen sauern Geruch bekommt.

Der getrocknete Kälberlaab (Stomachus vitulinus exsiccatus Bor5†.) wird zur Bereitung der Molken benutzt.

Dampft man die Molken ab, so erhält man das

Saccharum Lactis; Milchzucker; Sucre de lait (*Gal.*); Milksugar (*Ang.*); Melksukker (*D.*); Melkzuiker (*Bel.*); Zucchero di latte (*His. I.*).

Ba†. Bor4†. Br†. Ful†. Han†. Hass†. HassP†. HC†. HN† Li†. O† Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. WW† Ams. D. Fenn. Fer. Gen. Pol. Suec. *DB. Fl. G. Gr. Pid. Sp. T. Vm.*

Eine in weißen Parallelepipeden crystallisirende, halbdurchsichtige Substanz von etwas zuckerartigem, fadem und erdigem Geschmack.

Nährend, einschneidend, verdünnend, leicht abführend, zum Putzen der Zähne, bei Lungensucht und andern entzündlichen Lungenkrankheiten. Gabe, eine Drachme mehrmals täglich.

Syrupus Lactis. (*Braconnot.*)

℞. Lactis recentis octarios (*litres*) duos cum dimidio coque et adde

Acidi muriatici diluti parvam quantitatem; sero defuso, coagulum cum Natri subcarbon grammis (*grammes*) quinque contritum cum Sacchari pari quantitate syrupum coque.

Der dadurch erhaltene Syrup ist gleichartig läßt sich, ohne sauer zu werden, aufbewahren und giebt, mit Wasser verdünnt, eine der frischen Milch ähnliche Flüssigkeit und ein angenehmes Getränk.

Hydrogala. (*Ra.*)

℞. Lactis vaccini . uncias quatuor.
Aquae Hordei . . . libras duas

Pulvis Sacchari Lactis compositus. (HC†.)

℞. Sacchari Lactis pulverati unciam.
Magnesiae carbonicae,
Pulveris Gummi Mimosae,
— Kali nitrici, sing. drachmas duas.

Misce.

Pastilli Lactis. (*DB.*)

℞. Lactis recent. . . libras duas, coque et adde:
Aceti Vini . . . . semunciam.

Coagulum fortiter exprime et contunde in mortario marmoreo cum Syrupo emulsivo unciis duabus et Protobicarbonate Sodii drachma; deinde adde Sacchari albi pulver. libras duas et Gummi Arabici drachmas duas pulver. et fac pastas granorum octodecim.

Pulvis pectoralis. (B*.)

℞. Sacchari Lactis . unciam unam.
Gummi Arabici drachmas quinque.
Elaeosacch. Foenic. drachmas tres.

Potus Sacchari Lactis, Tisana pectoralis. (*Au†.*)

℞. Sacchari Lactis . . semunciam.
Aquae bullientis . . libras duas.

L a c c a.

Unter diesem Namen sind zwei verschiedene Substanzen bekannt:

1) *Lacca; Gummi Laccae*; *Κηγκάμον*?; Lack, Gummilack; Laque, Gomme Laque (*Gal.*); Lake (*Ang.*); Lak (*Ar.*); Kambalo (*Ba.*); Lakada (*Cy.*); Lacca (*His. Lus.*); Lak'h, Lahi (*Hin.*); Balo (*Ja.*); Ambalu (*Mal.*); Leka (*Pol.*); Lakscha (*Sa.*); Lacka (*Suec.*); Komb-urruk (*Tam.*); Commolekka (*Tel.*).

Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. Has P†. HC†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. *M†.* Ams. An. D. E. Fer. Gal. Gen. Hi 3. Lus. Pm. Pol. R. Suec. Taur. *A. Be. Br G. Gr. Pid. Re. Sp. T.*

Man unterscheidet zwei Sorten Lack.

1 *Lacca in ramulis s. ramis s. baculis*; Stocklack, Stablack, Stangenlack: Laque en bâtons (*Gal.*); Sticklac (*Ang.*). Es ist mehr oder weniger dunkelroth, fast durchsichtig, ungleich, uneben, hart, zerreiblich, und bildet eine, einige Zoll lange, eine Linie dicke Rinde um ein kleines Stöckchen, um welches es jedoch selten ganz herumgeht. Auf seiner Oberfläche bemerkt man viele Löcher, welche mit eben so viel eirunden, unregelmäßig neben einander liegenden Zellen zusammenhängen und aus denen ein weißer filziger Stoff hervorkommt.

2) *Lacca in granis s. seminibus*; Körnerlack; Laque en grains (*Gal.*); Seed Lac (*Ang.*); es sind Stücke des vorigen, von den Zweigen losgebrochen.

3) *Lacca in tabulis s. massis*; Gummilack, Schelllack; Laque en masses ou en pains (*Gal.*); Lamplac, Shell lac (*Ang.*); in dünnen Plättchen oder Schuppen, welche durch Schmelzen des vorigen von Unreinigkeiten befreit worden sind.

Das Lack wird durch den Stich des Weibchens von Coccus Laccae, *Ker.*, Coccus Ficus, L., eines halbflügeligen Insects Indien's (Journ. compl. des Sc. méd. T. X. p. 20.), in der Rinde vieler harziger Bäume hervorgebracht, unter denen man besonders unterscheidet: Ficus religiosa, L., Ficus indica, L., Croton

aromaticum, castaneifolium, L., und lacciferum, Aleurites laccifera, *Willd.* (Lacca Zeylanica), Erythrina monosperma, Rhamnus Jujuba. L., Mimosa cinerea, *Willd.* und Mimosa Corinda, *Willd.* Virey hegt, und wahrscheinlich mit Recht, Latreille entgegen, die Meinung daß das Harz nicht von dem Insect selbst ausgearbeitet werde, sondern nur nach dem Stiche desselben ausfließe, und daß nur die schöne purpurrothe Farbe desselben von dem Weibchen und den Eiern des Insects herrühre

Es besteht, nach Funke, aus Harz, einem eigenthümlichen Stoffe, dem Lackstoff (Laccinum), Laccin (*Gal.*), welcher zwischen Wachs und Harz steht, und einem thierischen Farbestoffe. John will auch eine eigenthümliche Säure, die Lacksäure (Acidum laccicum), Acide laccique (*Gal.*), darin gefunden haben.

2) *Lacca coerulea*, *Lacca musica*, *Tornasolis coerulea*, *Laccae muscus*, *Lacmus*, *Bezetta coerulea*, *Lacmus tinctorius*, *L. tinct. albo-coeruleus*; blauer Lack, Lackmus; Orchill, Orseille, Tournesol (*Gal.*); Cudbear, Litmus (*Ang.*); Lackmus (*Bel.*); Oricello (*I.*); Orchilla (*His.*).

HassP†. AD. *Fi. Gr. Re. T.*

Ein Farbestoff, von welchem man zwei Sorten im Handel unterscheidet:

1) Lackmus in Brodten oder Steinen, Tournesol en pains ou en pierre (*Gal.*). (A†. Br†. *M*†. Bel. Du. *G. Gr. Re. Sp.*), in kleinen, geraden Parallelepipeden von blauer Farbe, welches man aus mehreren Flechtenarten, z. B., Lichen calcareus, parellus, roccella etc. bereitet, indem man sie pulvert, mit Weinhefenasche und Kalk mischt und mit Menschenharn gähren läßt.

2) Lackmus in Lappen; Tournesol en drapeaux, Becetta, Nezetta (*Gal.*), (*Gal. Gr.*), alte Lappen, welche mit dem Safte der Spitzen von Croton tinctorium, L. (Monoecia Monadelphia, L.; Euphorbiaceae, *J.*), einer Pflanze (*Lob.* Ic. 26.) des südlichen Europa's, getränkt, dann getrocknet und dem Dunste eines Gemisches von Harn und ungelöschtem Kalk so lange ausgesetzt worden sind, bis sie eine blauviolette Farbe bekommen.

Infusum Laccae coeruleae (*Gr.*). Reagens.

Tinctura aquosa Laccae s. Gummi Laccae aquosa s. aluminosa. (Bor5†. Br†. Pal†. Sax2†. Wir†. His3. R. Sar. *DB. Sp. T.*)

℞. Laccae in granis pulv. partem.
Aluminis crudi partem dimidiam.
Aquae destillatae . partes octo.
Coque ad dimid. (partes sex Bor5†.); post refrigerat. adde
Aquae Rosarum rubrarum,
— Salviae, sing. partes duas.
Filtra. (Bor5†. Sax2†. R.)

Fi. et *T.* Aquae dest. partes sex, Aquae Rosar. et Salviae, sing. tres, caeterum ut antea.

℞ Baccae pulveratae unciam unam.
Aluminis . . . . semunciam.
Aquae Rosarum . . libras duas.
Digere in vase tecto et liquorem rubro colore bene impraegnatum filtra. (His3.)

DB. Laccae uncias duas, Aluminis unciam, Aquae libras duas macerare per 24 horas in temperatura 30° R. et filtrare per chartam.

℞. Laccae pulveratae unciam unam.
Aluminis crudi sesquidrachmam.
Aquae Salviae . . . uncias tres.
— Rosarum . sesquiunciam.
Coque et filtra. (*Sp.*)

℞. Laccae electae . unciam unam.
Aluminis crudi pulv. drach. unam.
Aq. Salviae,
— Rosarum,
— Cochlear., sing. uncias duas.
Coque lente et cola. (Sar.)

Br†. Laccae unciam, Aluminis drachmas duas et Aquarum, sing. uncias duas; — Wir†. Laccae unciam, Aluminis sesquidrachmam et Aquarum, sing. sesquiunciam.

℞. Laccae . . . . drachmas sex.
Aluminis . . . drachmas duas.
Aquae Salviae,
— Brunellae,
— Cochlear., sing. libram unam.
Stent in digestione absque bullitione, donec liquor colore rubro bene sit impraegnatus et cola. Addere potes Caryophyllorum scrupulos duos. (Pal†.)

Reizend, für antiscorbutisch gehalten. — In Waschungen und Gurgelwässern angewendet.

Alcohol cum Lacca, Tinctura Laccae alcoholica s. spirituosa. (Ful†. Ams. Pm. *DB. T. Vm.*)

℞. Laccae in ramulis pulv. part. unam.
Alcoholis . . . . partes sex.
Infunde per horas duodecim in balneo aquae et filtra. (*Vm.*)

Ams. Laccae partem unam, Alcoholis (0,884) octo et octo dies infusionis; — Ful†. Laccae partem unam et Spiritus Cochleariae sedecim; — Pm. Laccae unam, Alcoholis cum Cochlearia octo et dies sex digestionis: — *DB. T.* Laccae unciam, Alcoholis 36° libram; digere.

Bei Krankheiten des Mundes und Zahnfleisches von Schwäche, meist in Form von

Gurgelwasser oder collutorium; sie scheint nur vermittelst des darin enthaltenen Alcohols zu wirken.

Tinctura Laccae s. Gummi Laccae composita s. gingivalis balsamica s. Laccae alcoholica composita. (Ba†. HC†. Wür†. Fer. LH. Lus. R. Sar. Suec. *Gr.*)

℞. Laccae pulveratae unciam unam.
Myrrhae electae . . uncias tres.
Spiritûs Cochleariae sesquilibram.
Post aliquot dies digestionis cola. (R. Suec.)

Gr. Laccae uncias quatuor, Myrrhae duas, Spir. Cochleariae octar o sex; — Lus. Laccae unciam, Myrrhae drachmas tres, Spiritûs libras duas et octo dies macerationis; — Fer. Laccae unam, Myrrhae drachmas duas et Spiritus Cochleariae sesquilibram; — LH. Laccae, Myrrhae, Catechu, sing. drachmas sex, Bals Peruv. unam, Alcoholis 32°, Spir. Cochlear., sing. uncias quatuor, digere per quatriduum.

℞. Laccae pulveratae . uncias duas.
Alumin. crudi pulv. sesquidrachmam.
Spiritus Cochleariae libram unam.
Digere ex arena tepida et cola. (Sar.)

Wür†. digerere Laccae semunciam et Aluminis scrupulos duos in una libra Spiritûs Cochleariae, donec liquor pulchrum acceperit rubrum colorem; Lus. Laccae unciam, Myrrhae drachmas tres, Spiritus libras duas et octo dies digestionis; — Ba†. Laccae partes quinque, Aluminis unam, Aquae triginta sex et Spiritus quinque; — HC†. Laccae in baculis sesquiunciam, Aluminis crudi drachmas duas cum dimidia coquere cum Aquae destillatae unciis decem ad colaturam unciarum quinque et addere Aquae Rosarum, Aq. Salviae, sing. uncias duas, Spiritûs Cochleariae unciam.

Schwach reizend, in Waschungen, Gurgelwassern oder Collutorien, bei Mundgeschwüren von Asthenie. Die nach der zweiten Formel bereitete Tinctur ist wirksamer als die andere und adstringirend.

Tinctura antiscorbutica s. gingivalis balsamica. (LP.)

℞. Myrrhae,
Kino, singulorum . semunciam.
Gummi Laccae . unciam unam.
Balsami Peruviani drachmam unam.
Spiritûs Cochleariae sesquilibram.
Macera per dies sex, cola ac filtra.

Tinctura Laccae kalica s. Laccae cum Spiritu Cochleariae officinalis, Alcohol cum Cochlearia et Lacca. (Ham†. Hass†. Bo. *Fi. Pid. T. Vm.*)

℞. Laccae in granis unciam unam.
Myrrhae electae . semunciam.
Pulveratis infunde
Olei Tartari p. deliq. semunciam.
In pastam redige, blando igne siccandam et massae pulveratae infunde
Spiritûs Cochleariae uncias sex.
Post tres aut quatuor dies digestionis filtra.

Fi. et *T.* Laccae pulv. unciam, Kali subcarb. drachmas duas; mixta in patina porcellanea per duos dies aëri stent exposita, quo facto infundantur Spiritûs Cochleariae librae uni et digerantur etc. (si loco spir. cochl. Alcoh. purum adhibetur, *Tincturam Laccae spirituosam s. Alcoholem cum Lacca* habes *Fi.*); — *DB.* Spiritûs libram.

Boerhaave empfahl diese Tinctur innerlich bei Gicht und Rheumatismen, äusserlich bei scorbutischen Affectionen des Mundes und des Zahnfleisches. Er gab sie in Spanischem oder Madera-Wein Das kohlensäuerliche Kali ist die Hauptursache ihrer Wirksamkeit.

Tinctura Laccae alcoholica s. spirituosa s. aluminata. (Wür†. An. HisS. Sar.).

℞. Laccae pulveratae . uncias duas.
Alum. crudi pulv. sesquidrachmam.
Spiritûs Cochleariae libram unam.
Digere in arena tepida et cola (Sar.)

Wür†. Laccae semunciam, Aluminis scrupulos duos et Spiritûs libram unam; — An. Laccae unciam unam, Aluminis drachmas duas et Spiritûs libram unam.

℞. Laccae pur. contus. unc. unam.
Aluminis in Aqua dissoluti sesquidrachmam.
Spir. Cochlear. aut Lepidii uncias octo.
Digere donec liquor bene ruber sit factus et filtra. (HisS†.)

Eben so gebraucht wie die einfache Tinctur; außerdem ist sie etwas adstringirend.

Tinctura Laccae coeruleae. (*Fi. T.*)

℞. Laccae in panibus quantum libet.
Alcoholis diluti 20° B. . . q. s.
Digere, subinde agitando, per dies aliquot, decantha per chartam etc.

Die *Tinctura Laccae coeruleae aquosa*:

℞. Laccae pulv. . drachmam unam.
Aquae dest. bull. sesquiunciam.
Solutionem filtra. (*Fi.*)

bekommt zwar eine intensive blaue Farbe, ist aber leichter der Verfärbung und dem Verderben unterworfen. (*T.*)

Charta exploratoria coerulea. (Bor5†. HC†. HN† *T.*)

Laccae muscus in pulverem tritus quatuor (sex HC†.) Aquae partibus in fundatur et per viginti quatuor horas reponatur, vas subinde agitando. Liquore filtrato illinantur segmenta chartae albissimae expansa (colla minus imbuta HC†), quae siccata in vasis (vitris HC†.) bene clausis loco umbroso servantur. (Bor5†. HC†. HN†.)

T. ut chartam exploratoriam aurantiam parari.

Charta (coerulea HC†) *exploratoria rubefacta s. rubra.* (Bor5†. HassP†. HC†. HN†. *T.*)

Charta exploratoria coerulea Aceto destillato aut Acido muriatico valde diluto rubro inficiatur colore, tum siccetur et servetur. (Bor5†. *T.*)

HC†. Chartam in solutione Acidi phosphorici concentrati guttarum quatuor in Aquae destillatae unciis octo tingere; — HN†. Frusta chartae coeruleae mixtura ex Acidi muriatici drachmis duabus et Aquae dest. unciis octo tingere et siccare.

HassP†. Acidum Aceti vel Phosphori adhibet.

Lacryma Iobi.

Coix Lacryma, L., ova a; Hiobsthränen; Larme de Job (*Gal.*).

Wir†. *Sp.*

⊙ (Monoecia Triandria, L.; Gramineae, *J.*) Eine ostindische Pflanze. (*Rumph.* Amb. 5. t. 75. f 2.)

Man wendet den Saamen (semen Lacrymae Job s. Lithagrostis) an; er ist bläulichweiß, glänzend, sehr hart, eirund und am Ende etwas spitzig.

Er galt ehedem als harntreibend.

Lactuca.

Man wendet in der Medicin an:

1) *Lactuca sativa, hortensis, L.*; Lattich, Gartensalat; Laitue cultivée (*Gal.*); Gardenlettuce (*Ang.*); Salat, Locyka (*B.*); Laktuk (*D. R. Suec.*); Le chuga (*His.*); Gewoone salade, Lataw (*Bel.*); Lattuga (*I.*); Loczyga (*Pol.*); Leituga (*Lus.*).

Br†. Wir†. *M*†. AD. Ed Fer. Gal. Gal VI. HisS LonN. LoP. LPC. Taur. *Bc. Br. C. C'i. G. Gr. Re. Sp. Z.*

⊙ (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Synanthereae, *Cass.*) Eine in Gärten gebaute Pflanze, wo sie viele Varietäten hervorbringt. (*Blackw.* t. 88 *Plenck* t. 594. *Hayne* VII. 30 Fl. méd. IV. 213.)

Man wendet das Kraut und die Saamen an.

Das Kraut (herba Lactucae) besteht aus länglichen, eirunden, welligen Blättern von süßlichem, wässerigen Geschmack. — Die Saamen sind länglich, platt, an beiden Enden spitzig und grau.

2) *Lactuca Scariola, sylvestris, L.*; wilder Lattig, Wildlattig, Leberdistel, wilder Salat; Laitue sauvage (*Gal.*); Lattuga selvatica (*I.*).

A†. Li†. Wir†. Am. Fer. Gal. Taur. *Fl. G. Gr.*

⊙ oder ♂. Eine in Europa wachsende Pflanze. (*Hayne* I. 46. *Zorn* Ic. pl. t. 294.)

Man wendet das Kraut (herba Lactucae sylvestris s. Scariolae) an; es besteht aus abwechselnden, sitzenden, umfassenden, länglichen, am Grunde pfeilförmigen, oben spitzigen, meist fiederspaltigen, am Rande mit einigen dornigen Zähnen versehenen, glatten Blättern. Es hat einen unangenehmen Geruch und einen bittern Geschmack.

3) *Lactuca virosa, L.*; giftiger Lattich, stinkender Lattich, Giftlattich; Laitue vireuse (*Gal.*); Strong scented lettuce, Hemlock lettuce (*Ang.*); Locyka lesnj neb plana (*B.*); Stinkende laktuk (*D.*); Stinkenda salade (*Bel.*); Salata jadowita, locyga dzika (*Pol.*); Alsace brava (*Lus.*).

Ba†. Bor5†. Br†. Ful† Han†. HassP†. HC†. HN†. Sax†. Wir†. Wür†. *M*†. AD. An. Ed. Fer. Gal. GalM. LH Pol. R. Taur. *Br. C. G. Gr Re. Sp. Z.*

⊙ oder ♂. Eine Europäische Pflanze. (*Schk.* t. 217. Düss. off. Pfl. IV. t. 22. *Hayne* I 47. *Zorn* Ic. pl t. 285. *Bert.* Bild. V. 38 f. 2.)

Man wendet das Kraut (herba Lactucae virosae s. sylvestris s. sylvestris majoris odore opii s. Intybi angusti) an; es besteht aus abwechselnden, sitzenden, umfassenden, langen eingeschnittenen, an der Spitze stumpfen Blättern, von denen die untern buchtig und gezähnelt sind. Es hat einen widerlichen Geruch und einen scharfen und sehr bittern Geschmack.

AD. *Gr.* führen noch L. perennis, dessen Kraut die menses beschränkt, und L. elongata an, welche ähnlich wie L. virosa wirkt und auch zum Extract verwendet wird.

Der Gartensalat wird als beruhigend betrachtet, wirkt aber ohne Zweifel nur erweichend. — Gabe des Safts, eine halbe bis zwei Unzen. Der Giftlattich ist außerordentlich stark reizend, wirkt auf das

Nervensystem und vermehrt die Urinabsonderung

Extractum s. Succus spissatus Lactucae virosae. (A†. Bor5†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN† Li†. Sax2†. Wir†. Wür†. AD. An. Bel. Ed. R Taur. *Br. Sw. Vm.*)

℞. Foliorum Lactucae virosae q. vis.
Contunde in mortario lapideo, Aquae pauxillum adspergendo, exprime succum et illum statim in aquae balneo, agitando continuè sub finem spatulae ope, consume (Ful†. Han†. Li†. Wür†. AD. Ed. R. *Br.*)

Sw. contundere Folior. libras decem, Aquae sex affundendo, succum exprimere et illum semel ebullitum vaporando consumere; — HassP†. ut extr. aconiti, belladonnae etc. — Bor5†. HN†. Sax2†. ut extr. Aconiti herbae recentis; — *DB.* ut extractum Cicutae

℞. Herbae Lactucae virosae libram.
Contunde in mortario marmoreo et exprime succum; residuum per horam coque cum Aquae libris tribus; cola exprimendo, et succo cum decocto mixto totum simul inspissa. (Has †.)

℞. Herbae rec Lactucae viros. q vis.
Exprime succum, qui in loco frigido, ne fermentet, servetur; decantha, coque per aliquot momenta et per pannum cola, Albumine clarificatum iterum cola, dimidium deinde blando igne consume, refrigeratum et iterum Albumine clarificatum atque colatum ad extr. consist. vaporando redige. (Wir†.)

℞. Foliorum Lactucae virosae q. vis.
Contunde cum Aquae pauxillo et per pannum cola; repone, decantha, super igne coagulatum denuo cola; tum ad massae pilularis consist. evaporatum ab igne remove et additâ faecula antea seposita, denuo ad consistentiam aptam vaporando consume. (An. GalP. Taur. (*Extr. cum faecula*). *Vm.*)

HC†. ut extractum Aconiti.

℞. Fol. rec. Lactucae viros. q. vis.
Contunde in mortario et exprime succum qui in tantum evaporet ut Pulveris Herbae sicc. Lactucae pars quarta sufficiat ad consist. extracti ei praebendam. (Bel.)

℞. Foliorum Lactucae virosae q. vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
Herba pluribus sequentibus bullitionibus perfecte extractâ, liquores mixti et decanthati in balneo aquae evaporent. (A†.)

T. ut extractum Cicutae, praeterea autem ut Bel. vel succum expressum, balnei aquae vel vaporis ope aliquanto condensatum et per manicam laneam filtratum ad mellis consist. evaporare, et ab igne remotum, faeculâ additâ, ad extracti vel massae pilul. consist. redigere.

Extractum Lactucae virosae alcoholicum.

(Taur.) ut extr. Cicut. alcohol.
Gabe, zwei, vier bis zwölf Gran und mehr.

Extractum Lactucae sativae (AD. GalP. LonN. LPC. *CG. DB. Gr. Re. T.*)

℞. Fol rec Lactucae libram unam.
Contunde in mortario lapideo, insperso exiguo Aquae; dein exprime succum, eumque non defaecatum consume, donec idoneam crassitudinem habeat. (AD. LonN. *CG. Gr. Re.*)

DB. ut extractum Cichorei; — GalP. ut extractum Cicutae cum fecula; — *T.* Succum expressum et cum Aquae copia modica dilutum Albuminis et caloris ope clarificare, filtrare et vaporando ad extracti consist inspissare; — LPC ut extractum Aconiti.
Gabe, fünf bis zehn Gran.

Aqua Lactucae sativae. (Gal. GalP. Sar. Taur. *DB. Fi.*)

℞ Herb Lactucae rec. partem unam.
Aquae . . . . . partes duas.
Destillent partes duae. (Sar.)
Taur destillet dimidium, caeterum ut antea; — *DB.* Lactucae prelo expressae partes duas infundere cum Aquae parte una et destillare partem ponderis tertiam; — GalP. Lactucae libras decem, Aquae vigiti, contundere et libras decem destillare; — *Fi.* Lactucae recentis libram unam, Aquae comm. decem; destillent sex; — Gal. Lactucae capitatae partes quinquies mille, Aquae duodecies mille et quingentas; destillare partes decies mille, productum in novam Lactucae recentis quantitatem infundere, Aquae partes decies mille admiscendo, partes dies mille destillando elicere et tertiò hoc repetere.
Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Aqua Lactucae Scariolae. (*DB.*)

Eodem modo praeparatur ut aqua Lactucae sativae.

Pediluvium sedativum. (B*.)

℞. Lactucae plantas integras
no. 8. aut 10.

Aquae . . . quantum sufficit.
Stent parumper in infusione, tum coquantur. — Nicht durchgeseiht anzuwenden.

Tinctura s. Essentia Lactucae virosae. (HC†. Sax2†. B*. GalP.)

℞. Herbae recentis . . . libram.
Spir. Vin. rectificatiss. uncias octo
Post macerationem per octiduum cola et filtra, ut sit colatura librae unius. (HC†. *Tinct. e herba recente.*)
GalP. ut tinctura Rhois toxicodendri.

℞. Succi Lactuc. viros. recens expr.,
Alcoholis concent., sing part. aeq.
Macera frigide per aliquot dies et filtra. (Sax2†.)

℞. Herbae Lactucae virosae unciam.
Cinnamomi . drachmam unam.
Alcoholis concentrati,
Aquae destill., sing.
uncias quatuor.
Post aliquot dies digestionis cola exprimendo et filtra. (B*.)

Reizend, bei Wassersuchten empfohlen. — Narcotisch. — Gabe, funfzehn Tropfen und mehr, allmälig gestiegen.

Pomata Lactucae virosae. (*DB.*)

Eodem modo paratur ut pomata Cicutae.

Syrupus Lactucae sativae (GalP.)

Eadem praeparatio ut syrupus florum Naphae.

Lactucarium.

Lactucarium, Extractum Lactucae, Succus spissatus Lactucae sativae, Thridax; *Θριδαξ*; Thridace (*Gal.*); Lettuce opium (*Ang.*).

HC†. Am. B*. Ed. LPC. *C. DB. Gr. Re. Sp.*

Eine dunkelbraune, harte, brüchige Substanz von etwas betäubendem Geruch und einem sehr merklich bittern Geschmack.

Es ist der getrocknete Milchsaft, welchen man dadurch erhält, daß man die Stängel von Lactuca sativa, L., in horizontale Scheibchen zerschneidet. Auch quillt er aus in die Epidermis gemachten Stichen bis zum Reifen des Saamens ununterbrochen aus Ueber Lactucarium und dessen Gewinnung s. Berl. Jahrb. XX. S. 196. Buchner's Repert. XV. 2. S. 273 und XXV S 104. Taschenb. 1823. S. 24.

Nach Caventou enthält das Lactucarium kein Morphin, sondern Aepfelsäure und Kalk.

Man hält es für Schlaf bewirkend ohne narkotische Nebenwirkung und für ein Verminderungsmittel der Häufigkeit des Pulses und der thierischen Wärme. — Gabe, zwei bis vier Gran und mehr allmälig, zwei- bis viermal täglich.

Tinctura Lactucarii. (B*. *C. Gr.*)

℞. Lactucarii . . . unciam unam.
Aquae Vitae . octarium unum.
Post sufficientem digestionem filtra. — Gabe, zehen bis sechszig Tropfen.

Syrupus de Thridace. (GalP. GalP.)

℞. Extract. Lactucae drachmam cum granis quinquaginta et sex.
Aquae purae . . . uncias duas.
Syrupi simplicis . . . libram.
Solve extractum in aqua, misce cum Syrupo, evapora ad consistentiam aptam et trajice. (GalP.)

℞. Succi rec Stipit. Lactucae, tempore florescentiae foliis privatarum . . . . libram unam.
Sacchari albi . . . libras duas.
Solve frigide et filtra.

Pilulae Lactucarii. (*E2.*)

℞. Lactucarii optimi grana duodecim.
Divide in pilulas no. VI. — Eine Pille, und binnen zwei Stunden, wenn kein Schlaf eintritt, wieder eine.

Pilulae torpentes ac resolventes. (B*.)

℞ Lactucarii . . grana duodecim.
Roob Sambuci,
Extracti Liquiritiae, sing . q. s.
Fiant pilulae quatuor. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden, bei hartnäckigem Husten ohne Auswurf und bei sogenannten activen Wassersuchten.

Potio nutriens et sedans s. sedativa. (*B.*)

℞. Lichenis Islandici . uncias duas.
Aquae fontanae quantum sufficit ut decocti uncias octo obtineantur; colaturae adde
Lactucarii . . semidrachmam.
Mucilag. Gummi Arabici
semunciam.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Allmälig zu nehmen, bei hartnäckigem Husten und knotiger Lungensucht.

Ladanum.

Labdanum, Gummi Ladanum; *Λαδανον*; Ladanum; Ladanum; Labdanum (*Gal.*); Ladun (*Ar.*); Ladano (*His.*); Labdano (*Lus.*).

Br†. Wir†. Wür†. *M*†. Ams. An. B. Bel. Fer. Gal. GalP. Gen. His3. LH. LP. Lus. Taur. *A. Be. Br. G. Gr. Re. Sp. T.* Z

Man unterscheidet zwei Sorten:

1) *Ladanum in massis*; Ladanum in Broden, Ladanum en masses (*Gal.*), in weichen, schlüpfrigen, bei'm Druck jede Form annehmenden, schwärzlichrothen oder schwarzen Massen — 2) *Ladanum in sortis*, Ladanum in Stöcken: Ladanum en bâtons (*Gal.*), in wolzigen, platten, schraubenförmig gedrehten, trocknen, harten, brüchigen, schwärzlichgrauen Stücken.

Der Geruch ist angenehm, der Geschmack schwach, aber balsamisch und etwas bitter.

Dieses Harz schwitzt von selbst aus den Blättern und Zweigen von Cistus Creticus, ladanifer, laurifolius u. Ledon, L., einem Strauche (Polyandria Monogynia, L.; Cisteae, J.) des Archipels. (Fl méd. IV 212.) Das L in sortis soll nach *Gr.* durch Kochen der Zweige von Cistus ladaniferus gewonnen werden.

His3. schreibt eine Reinigung desselben vor: man läßt es, zerstückelt, im kochenden Wasser weichen und preßt die flüssig gewordene Masse durch ein Haarsieb, knetet das nach dem Erkalten auf dem Wasser schwimmende Harz und walzt es oder bewahrt es so auf. Fast eben so verfährt Taur.

Reizend, aber wenig in Gebrauch.

Emplastrum Picis Burgundicae s. cephalicum s. Labdani s. Ladani s. stomachicum. (Ams. LH. Lon. LP. Lus. *Br. C. Gr. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Picis Burgundicae . libras duas.
Labdani . . . . libram unam.
Resinae flavae,
Cerae flavae, sing. uncias quatuor.
Olei . . . . . unciam unam.
(*Gr.*)

℞. Ladani . . . . . uncias tres.
Olibani . . . . unciam unam.
Liquatis blando calore adde
Olei Nucis moschatae expressi,
Balsami Peruviani,
Cinnamomi pulv., sing. semunciam.
Misce. (Lus.)

Lon. *Br. Gr. Re.* et *Sw.* Olibani unciam unam, Ladani tres, Olei Nucis mosch. semunciam (semidrachm. (*Re.*), Cinnamomi tantidem et Olei Menthae virid. essent. drachmam unam; — C. Ladani uncias tres, Resinae Pini unam, Olei Nucis mosch. sesquiunciam, Cinnamomi tantidem et Olei Menthae drachmam unam; — LH. Picis Burg. libras duas, Ladani unam, Resinae, Cerae flav., sing. uncias quatuor, Olei Nucis mosch. expr. unam. (*Empl. Picis Burgundicae.*); — LP. Cerae flav. libram unam, Resinae flavae uncias duas, Terebinthinae unam, Ladani quatuor, Mastichis, Caryophyl., Bals. Peruv., Olei expr. Nucis mosch., sing. semunciam.

℞. Emplastri communis,
— Cumini, *sing.* . . libram.
Colophonii . . . . semilibram.
Styracis . . . . . semunciam.
Liquatis igne blando adde
Ladani pulverati . uncias duas.
Misce bene. (Ams.)

℞. Cerae flavae . . . partes sex.
Sebi vervecini,
Colophonii, sing. partes quatuor.
Elemi . . . . . partem unam.
Liquata macera cum
Seminum Cumini,
Baccarum Lauri,
Florum Meliloti, sing.
part. duabus.
Liquorem calidum cola et adde
Empl. Litharg. fusi
part. triginta sex.
Gummi Ammoniaci partem unam.
Ladani . . . . partes quatuor.
Misce. (*Vm.*)

℞. Ladani . . . . libram unam.
Cerae flavae . . libras decem.
Olei Palmae . . . libras octo.
Resinae nigrae . libras quinque.
Picis Burgundicae libras quatuor.
Olei Macidis expressi uncias duas.
— Carvi . drachmas quatuor.
— Menthae vulgaris
sesquiunciam.

℞. Ladani,
Mastiches, singulorum semunciam.
Benzoës,
Caryophyllorum,
Nucis mosch., sing.
drachmas duas.
Tacamahacae . uncias quatuor.
Pulverata et mixta sparge supra Cerae flavae uncias tres, Terebinthinae duas, singulas fusas; massae concrescere coeptae admisce
Storacis Calamita . semunciam.
Opii . . . . drachmam unam in Vino albo dissoluta et ad mellis consist. redacta; adde, quum emplastrum consist. butyraceam acceperit, Olei Menthae, Juniperi et Absinthii, sing. guttas aliquot.

Ladanum factitium. (*Gr.*)

℞. Cerae flavae,
Adipis suilli, sing. . uncias sex.
Eboris usti nigri uncias quatuor.

Lamium.

Lamium album, *L.*; weißer Bienensaug, weiße Todtennessel; Ortie blanche (*Gal.*); White dead nettle (*Ang.*); Hlucha, Mrtwa, Smzadlawa, Kopriwa (*B.*); Daednelde (*D.*); Ortiga marta (*His.*); Pokozywa martiva (*Pol.*); Ortiga morta (*Lus.*); Blind nesla (*Suec.*).

Br†. Sax2†. Wir†. Wür†. *M*†. An. Gal. *Be. Br. Gr. Sp.* Z.

♃ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, *J.*) Eine in ganz Europa sehr gemeine Pflanze. (*Bull.* t. 213. *Blackw.* t. 33. *Hayne* V. 41. *Zorn* Ic. pl. t. 80.

Man wendet das Kraut und die Blüthen an.

Das Kraut (herba Lamii albi s. Galeopsidis s. Urticae mortuae) besteht aus einem fast glatten oder nur wenig behaarten Stängel und herzförmigen, gestielten, spitzigen, spitzig gezähnten Blättern. Es hat einen unangenehmen Geruch und einen styptischen Geschmack. — Die Blüthen, von welchen man nur die Kronen nimmt, sind weiß und haben einen unangenehmen Geruch und einen süßlichen Geschmack. Sie sind erweichend.

Lapis nephreticus.

Nephreticus lapis; Griesstein; Pierre néphrétique, Jade néphrétique ou oriental (*Gal.*); Piedra cananor, Piedra nefritica (*His.*)

Wir†. HisS. *Sp.*

Ein grüner Stein von fettigem Ansehen. Ehedem gebrauchte man ihn als Amulet und Schutzmittel gegen Epilepsie.

Laserpitium.

Die Pharmacopöen führen an:

1) *Laserpitium latifolium*, *L.*; Hirschwurzel, weißer Enzian; Laser à larges feuilles, Gentiane blanche (*Gal.*); Broad leav'd lesserwort (*Ang.*).

Br†. Wir†. *M*†. Gal. *Be. Gr. Re. Sp.*

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Jacq.* Fl. Austr. t. 146. *Schk.* t. 67.)

Man wendet die Wurzel (radix Gentianae albae) an: sie ist sehr lang, rund, außen gelblichbraun, inwendig gelblichweiß. Sie hat einen gewürzhaften, angenehmen Geruch und einen gewürzhaften, scharfen und etwas bittern Geschmack.

Tonisch, reizend.

2) *Laserpitium Siler*, *L.*; roßkümmelartiges Laserkraut; Laser sermontain. (*Gal.*); Mountain lasserwort (*Ang.*); Eselskomin (*Bel.*); Laserpicio silerino (*Lus.*).

Br†. Wir†. Wür†. *M*†. Gal. *Be. Gr. Re. Sp.*

♃ Eine Alpenpflanze. (*Jacq.* Fl. Austr. t. 145. *Hayne* VII. 7.)

Man wendet den Saamen (semen Sileris montani, Seseli) an; er ist länglich, platt, gefurcht und sehr schmalgeflügelt. Er hat einen angenehmen gewürzhaften Geruch und einen scharfen, gewürzhaften und bittern Geschmack.

Tonisch, reizend.

Gr. führt noch L. augustifolium und chironium an.

Laurus.

Laurus nobilis, *regia*, *L.*; Lorbeerbaum; Laurier commun (*Gal.*); Common sweet Bay, Laureltree (*Ang.*); Bob (*B.*); Laurbaertrae (*D.*); Laurel (*His.*); Laurierboom (*Bel.*); Lauro riccio, Alloro, Meloro (*I.*); Bobek drzewo (*Pol.*); Loureiro (*Lus.*); Lagerbaerstraed (*Suec.*).

A†. *Ba*†. *Bor5*†. Br†. Ful†. Ham†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. WW†. *M*†. AD. Ams. An. B. Bel. D. Ed. Fenn. Fer. Gal. Gal. J. Gen. HisS. LH. LonN. LP. LPG. Lus. Pol. R. Suec. Taur. *Be. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Pd. Re. Sp.* Z.

Ein Baum (Enneandria Monogynia, L.; Laurineae, *J.*), welcher ursprünglich in der Levante zu Hause, im südlichen Europa naturalisirt ist. (*Blackw.* t. 175. *Plenck.* t. 315. *Schk.* t. 310. Dict. d. Sc. nat. Cab. IV. *Zorn* Ic. pl. t. 52.)

Man wendet die Blätter und die Früchte an.

Die Blätter (folia Lauri) sind glatt, hart, ledrig, an den Rändern etwas wellenförmig, vier bis fünf Zoll lang, und haben, wenn man sie reibt, einen starken, gewürzhaften Geruch und einen brennenden, gewürzhaften Geschmack. — Die Früchte oder Beeren (baccae Lauri) sind klein, eirund, fast so groß wie Kirschen, frisch dunkelblau, getrocknet schwärzlich und runzelig, und enthalten, unter einer dünnen brüchigen Schale, gelbe oder gelblichbraune Saamen. Sie haben einen gewürzhaften, angenehmen Geruch und einen etwas bittern, scharfen und gewürzhaften Geschmack.

Die Blätter dienen eher als Gewürz denn als Arzneimittel. Uebrigens sind sie nicht minder reizend, als die Beeren.

L. Persea liefert ein magenstärkendes Oel. (*Gr.*)

Pulvis Lauri carbonicus s. stimulans. (*Au*†.)

℞. Baccarum Lauri . . uncias sex.
Nucis moschatae,
Cornu Cervi calcin., sing.
uncias (?) sex.
Liquiritiae . uncias triginta sex.
Gabe, ein Kaffeelöffel bei Rhachitis.

Oleum Baccarum Lauri s. Baccarum Lauri destillatum. (HC†. His3.)

℞. Bacc. Lauri rec sicc. libram unam.
Aquae font. . libras quadraginta.
Digere loco calido per dies quatuor ad dimidium et oleum per infundibulum separa.

HC†. ut oleum Absinthii aethereum, p. sp. = 0,915.

Oleum laurinum s. laurinum verum s. Lauri nobilis s. Baccarum Lauri s. Lauri expressum (unguinosum). (A†. Bor5†. Br†. Ful†. HassP†. HC†. HN†. Pal†. Wir†. Ed. Gal. GalP. His3. Lus. Sar. *DB. Gr. Re. Sw. T.*)

℞. Baccarum Lauri . quantum vis.
Contusas lente in mortario, tere supra lapidem calefactum et exprime. (GalP. His.)

His3. Baccas tritas et per setaceum trajectas in mortario ferreo calefacto in massam tenuissimam convertere, et sacco linteo receptam, statim prelo calido subjicere

℞. Baccarum Lauri . quantum vis.
Contusas in mortario et supra lapidem calefactum tritas coque cum Aqua et post refrigerationem, oleum superficiei inhaerens collige. (A†. Br†. Hass†. Pal†. Wir†. Gal. Lus. Sar. Suec. *DB.*)

℞. Baccarum Lauri . quantum vis.
Contusis in mortario, pastam in sacco e tela confecto inclusam vapori aquae bullientis expone et deinde prelo calefacto submitte (*Sw.*)

T. Baccas cum Aquae quantitate modica in pastam redigere et hanc sacco e tela confecto inclusam prelo subjicere.

Bor5†. HassP†. HC†. HN†. O†. Sax2†. Pol. et *Vm.* oleum venale (expressione vel coctione obtentum Bor5†. HN†.) praescribunt.

Reizend, auflösend, blähungtreibend, stärkend, nervenstärkend, bei Krankheiten des Uterus, Krämpfen, Koliken, Würmern bei Kindern, Schmerzen und Schwäche der Gelenke, Ohrenschmerzen.

Enema carminativum. (Li†.)

℞. Florum Chamomillae semunciam.
Aquae communis . libram unam.
Coque parumper, cola et adde
Olei Baccarum Lauri semunciam.

Linimentum aethereum. (*Au*†.)

℞. Aetheris sulphurici drachmas duas.
Alcoholis . . . . uncias duas.
Olei Baccarum Lauri semunciam.
In Einreibungen auf Brüche, besonders Nabelbrüche der Kinder.

Unguentum s. Pomatum laurinum, Oleum laurinum infusum. (Gal. GalP. Pm. Sar. Taur. *DB. Fi. Re. T. Vm.*)

℞. Foliorum Lauri . partem unam.
Axungiae . . . . partes duas.
Contunde et coque lente ad consumpt. humidi usque, sub finem addendo

Bacc. Lauri contus. partem unam.
Post horas decem digestionis in balneo aquae, cola et exprime. (Gal. GalP. *Re.*)

Sar. Taur. Digerere per tres dies in balneo aquae Fol. Lauri rec. concis. libras tres in Olei Oliv. libris sex, colare fortiter exprimendo et colaturam novae per tres dies digestioni subjicere cum Fol. et Baccar. Lauri, sing. sesquilibra; — *Fi.* Axungiae Porci libras decem, Fol. Lauri duas cum dimidia; per tres dies in infusione calida relictas cola fortiter exprimendo, adde Baccarum contus. libras decem, infunde itidem per dies tres et cola; post refrigerationem partem aquosam liquefac lentissimo calore etc.; — *DB. T.* Folior. libras tres, Axungiae sex, Baccar. tres, digestionem 24 hor. (*DB.* trium dierum).

℞. Foliorum recentium Lauri,
Olei Amygd. dulc., sing.
partem unam.
Bacc. Lauri rec. contus.
partes quatuor.
Axungiae Porci . . partes octo.
Folia et deinde baccas contusa coque lente cum axungia per horas duodecim, cola et refrigeratis sedimentum exime; quod restat liqua aut ab initio Aqua calida lava, donec haec clara transeat. (*Vm.*)

Jeromel Folior. sicc. et contus. unciis tribus infundere Axungiae Porci rec. libram, vas per horas duodecim eaedem caloris vi exponere, colare et axungiam liquare in Olei Bacc. Lauri expr. libra una.

Reizend, stärkend.

Pm. *Oleum vel Unguentum laurinum ad usum Artis veterinariae:* Fol. rec. libras duas, Adipis porcini depur. libris quatuor per triduum infunde, liquorem cum expressione cola, expresso

adde Bacc. Lauri contus, libras duas, infusionem balneo maris repete, cola et praelo submitte, et humorem faecesque separa; — *Gr. Oleum laurinum vulgare:* Fol. libram, Bacc. semilibram, Fol. Brassic. uncias quatuor, Axung. Pedum Tauri libras quinque, Adipis bovill. duas, coque et exprime.

Unguentum nervinum s. Lumbricorum nervinum s. laurinum s. aromaticum s. Rorismarini compositum. (A†. Bor5†. Br†. Ful† Han† Hass†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. WW†. Ams. An. B. Bel. D. His3. LP. Lus. Pol. R. Suec. *Br. Fi. Gr. Pid. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Herbae Salviae,
— Chamaepityos,
— Majoranae,
— Rorismarini,
— Menthae,
— Lavandulae,
— Hyperici,
— et Florum Primulae veris,
Florum Chamomillae,
— Meliloti,
Summitatum Anethi,
Rad. Pyrethri, *sing.* drachmas duas.
Bacc. Lauri,
— Juniper, *sing.* unciam unam.
Mastichis . . . . semunciam.
Benzoës . . . . drachmas sex.
Terebinthinae . uncias quatuor.
Olei Lumbricorum,
— Anethi,
— Hyperici,
Adipis vulpinae, *sing.* uncias tres.
— humanae,
— Felis Cati veri,
— caninae, *sing.* sesquiunciam.
Terebinth. Venet. unciam unam.
Coque et cola. (Pal†.)

℞. Herbae Salviae,
— Chamaepityos,
— Majoranae,
— Rorismarini,
— Menthae,
— Rutae,
— Lavandulae,
— Hyperici,
— et Florum Primulae veris,
Florum Chamomillae,
— Meliloti,
— Hyperici,
Summitatum Anethi,
Bacc. Lauri
— Juniperi, *sing.* drachmas sex.
Olei Olivarum . . libram unam.

Macera per aliquot dies, tum coque lente ad humidi usque consumptionem, cola et colaturae adde
Terebinthinae Venetae uncias duas.
Cerae flav. unc. quatuor c. dimid.
Olei Terebinthinae unciam unam.
— Lumbricorum,
— Lauri, *sing.* . uncias duas.
Benzoës in Alcoholis concentrati unciis tribus solutae unciam unam.

Fiat unguentum. (Br†. Wir†.)

℞. Radicis Pyrethri,
Foliorum recentium Anethi,
— — Lauri,
— — Majoranae,
— — Menthae crispae,
— — Rorismarini,
— — Salviae,
Flor. rec Chamomillae,
— — Lavandulae,
— — Meliloti,
— — Hyperici, *sing.* part. quatuor.
Benzoës,
Mastichis, singulorum partes sex.
Baccarum Lauri,
— Juniperi, *sing.* partes octo.
Axungiae,
Terebinthinae, *sing.* partes sedecim.
Cerae albae partes quadraginta tres.
Olei Olivar. partes nonaginta sex.

Contunde folia, baccas, flores et radicem cum oleo et axungia, macera in vase clauso, calore modico per horas quatuor, cola et cum Aqua tepida ablue, adde mastichem et benzoën cum terebinthina calefacta, cola et ceram fusam admisce, cola absque expressione et agita donec refrixerint. (*Vm.*)

℞. Herbae Rutae recentis,
Summit. floresc. Salviae,
— — Majoranae,
— — Rorismarini,
— — Menthae,
— — Chamaepityos,
— — Verbasci,
— — Lavandulae,
— — Hyperici,
— — Chamomillae,
— — Meliloti, *sing.* uncias duas.
Baccarum Lauri,
— Juniperi, *sing.* unciam unam.
Olei Lumbricorum . libras tres.

Macera per dies duos, coque, donec humidum omne evanuerit, cola et colaturae adde
Cerae flavae . . uncias novem.
Massae semirefrigeratae denuo adde
Olei Cerae,
— Terebinth., *sing.* uncias duas.
Unguenti Althaeae uncias quatuor.

Misce bene. (Hi 3.)

℞. Herbae Rorismarini uncias duas.
— Rutae,
— Majoranae,
— Menthae crispae,

Florum Meliloti,
— Lavandulae,
— Chamomillae,
Bacc. Lauri, sing. unciam unam.
Axungiae Porci . libram unam.
Sebi vervecini . . . semilibram.
Coque lente ad humidi consumptionem usque et in colatura liqua
Cerae flavae,
Terebinthinae, sing. uncias duas.
Olei Lauri . . uncias quatuor.
Fiat unguentum. (D.)

℞. Summit. sicc. Rorismarini,
— — Salviae,
— — Lavandulae,
— rec. Rutae, sing. unciam.
Adipis suillae . . libram unam.
— vervecini . uncias quatuor.
Olei Lauri . . . uncias octo.
— Terebinthinae sesquiunciam.
Prioribus sex lento calore balnei aquae per quatriduum maceratis et expressis olea adde. (*Fi.*)

℞. Herbae Rorismarini,
— Salviae,
— Lavandulae,
— Rutae, sing. manip. unum.
Baccarum Lauri rec. uncias tres.
Axungiae Porci . libram unam.
Sebi vervecini . uncias quatuor.
Stent per dies quatuor in balneo aquae; coque deinde exprimendo et colaturae adde
Olei Baccarum Lauri uncias octo.
Misce. (*Br.*) — *Unguentum aromaticum.*

℞. Herb. rec. Rorism. libram unam.
— — Majoranae,
— — Rutae, sing. semilibram.
Baccarum Lauri.
Rad. Pyrethri, sing. unc. quatuor. (tres Bor5†.)
Axungiae Porci . libras quatuor.
Sebi vervecini . . . libras duas.
Coque ad consumptionem humidi, exprime et adde colaturae
Cerae flavae liquatae semilibram.
Olei Rorismarini,
— Bacc Junip., sing. uncias tres
Misce. (Bor5†. Han† O†. Sax†. B*.)
HN†. radicem Pyrethri omittit, reliqua ut antea; — HC†. Baccas juniperi omittens, Oleum laurinum (unciam dimidiam) adhibet; si herba recens non prostat, Herbae siccatae quarta pars cum dimidia Spirit. Vin. rectif. contundatur, per noctem cum adipe digeratur et tunc, radice Pyrethri addita, ad consumptionem humidi spirituosi evaporet.

℞. Florum Rorismarini,
Fol. Populi balsamif., sing. unc. quatuor.
Axungiae Porci . . libras duas.
Digere per dies quatuordecim, cola et post refrigerationem adde
Aquae destillatae Lavandulae,
— — Chamomillae,
— Rutae, sing . semunciam.
Misce. (Hass†.)

℞. Fol. Populi balsamif., uncias octo.
Axungiae Porci calidae libras duas.
Post dies quatuordecim cola et adde
Olei Succini,
— Chamomill., sing. semunciam.
— Rutae,
— Menthae, sing. drachm. duas.
Misce. (*Pid.*)

℞. Bacc. rec. Lauri . uncias octo.
Fol. rec. Lauri . . uncias duas.
Contunde et cineribus imposita macera in
Axungiae Porci . unciis sedecim.
Post horas viginti quatuor exprime, Aqua tepidâ lota liqua et repone. (*Sw.*)

℞. Sebi vervecini . . partes octo.
Liqua et ab igne remotis et semirefrigeratis adde, agitando bene
Olei Lauri . . partes duodecim.
— Terebinthinae partem unam.
— Succini rectif. part. dimidiam.
— Menthae piperitae,
— Rorismarini,
— Junip., sing. partis octantem.
Misce sedulo. (Sax2†. — *Unguentum aromaticum.* (Sax†.) Si *viride* desideratur, Herba Millefolii cum sevo coquatur. (Sax2†.)

℞. Axungiae Porci . libras quatuor.
Sebi vervecini . . libras duas.
Cerae flavae . . . semilibram.
Mixturae liquat. et semirefrigerat. adde
Olei Lauri . . . uncias duas.
— Rorismarini,
— Bacc. Junip., sing. uncias tres.
Mixta serva. (Pol.)

℞. Axungiae Porci . unciam unam.
Olei Lauri . . . . semunciam.
— Rorismarini,
Ammoniaci liq., sing. sesquidrach.
Misce. (WW†.)

℞. Sebi cervini . . . uncias sex.
Liquatis adde
Olei Lauri . . . . uncias sex
— Terebinthinae unciam unam.
— Succini rectificati,
Salis Ammon, sing. . semunciam.
Misce exacte. (Li†.)

℞. Axungiae Porci . . uncias tres.
Sebi cervini . . unciam unam.
Liquatis lente, adde

Olei Lauri . . . unciam unam.
— Succini . . . semunciam.
— Menth. crisp. drachmas duas.
Tere ad refrigerationem usque. (Ful†.)

℞. Sebi vervecini . . uncias octo.
Olei Lauri . . . uncias decem.
Lente liquatis et semirefrig. adde
Essent. Terebinth. unciam unam.
Olei Succini depurati semunciam.
Misce. (An. Bel. Succ. *Sp. Vm.*)

LP. Sebi, Olei Terebinthinae et Succini easdem quantitates ut antea, sed Olei Lauri libram unam et praeterea Camphorae uncias duas.

℞. Sebi vervecini . . uncias octo.
Liquatis adde
Olei Baccarum Lauri libram unam.
Essent. Terebinth. sesquiunciam.
Misce bene. (Lus.)

℞. Olei laurini . . . libras tres.
Ung. Sambuci virid. libram unam.
Axungiae . . . . libras duas.
Olei Succini . . uncias quatuor.
Misce ut fiat ung. (*Gr.*)

℞. Sebi vervecini . . uncias octo.
Massae liquatae adde
Olei Lauri . . . libram unam.
— Terebinthinae unciam unam.
— Petrae . . . . semunciam.
Tere ad refrigerationem usque. (B. R.)

Ams. Sebi uncias octo, Olei Lauri libram, Essent. Terebinth. unciam et Olei Cajeput semunciam.

℞. Ung. simpl. libras duas et dimid.
Olei Lauri,
Cerae flavae, sing. . uncias tres.
Mixturae liquat. et semirefrig. adde
Olei ess. Juniperi,
— — Serpylli, sing. drachmas duas.
Misce. (A†.) — *Unguentum aromaticum.*

Aeußerlich als stärkend, auflösend und schmelzend angewendet.

Unguentum carminativum. (Ful†. Pal†.)

℞. Baccarum Lauri . . semunciam.
Fol. rec. Chamomillae manip. duos.
— — Meliloti,
Summit. rec. Abrotani,
— — Hederae terrest.,
— — Menth. crisp.,
— — Tanaceti, sing. manip. unum.
Semin. Cumini,
— Levistici, sing. drachm. duas.
Olei Chamomillae libram unam.
— Anethi,
— Rutae, sing. . semunciam.
Post dierum quatuordecim macerationem coque leviter, donec humidum disparuerit et colaturae adde
Cerae flavae . . . uncias duas.
Styracis liquidae . drachmas sex.
Olei ess. Anisi,
— — Carvi,
Olei ess. Menthae, sing. drachmam.
Misce. (Pal†.)

℞. Axungiae Porci . drachmas sex.
Cerae flavae . . drachm. unam.
Mixturae liquat. et semirefrig. adde
Olei Lauri . . drachmam unam.
— Anisi . . guttas octodecim.
— Carvi . . guttas duodecim.
Misce. (Ful†.)

Erweichend, krampfstillend, blähungtreibend.

Unguentum laurino-camphoratum s. aromaticum camphoratum s. contra perniones. (Ba†. HassP†. *Ca.*)

℞. Sebi vervecini . partes sedecim.
Olei Lauri . . . partes viginti.
Calefac lente et in fine adde
Camphorae in Olei Juniperi paucillo solutae . . partes duas.
Misce. (Ba†.)

Ca. Liquare Axungiae Porci, Adipis bubulae, Olei Lauri, Cerae, sing. uncias duas et post refrigerationem addere Camphorae in Alcoholis uncia una solut. semunciam; — HassP†. Sevi vervecini uncias novem; liquatis et semirefrigeratis admisce Olei Laurini uncias decem et tandem Camphorae unciam unam solutam in Olei Baccarum Juniperi, Lavandulae, destillatorum sing. semuncia.

Unguentum martiatum. (Wir†. *Sp. Vm.*)

℞. Fol. rec. Lauri . . uncias octo.
— — Rutae uncias quinque.
— — Majoranae uncias quatuor.
— — Rorismarini uncias tres.
— — Myrti,
— — Ebuli,
— — Menthae,
— — Basilici, sing. unciam unam.
Vini albi . . . uncias quatuor.
Olei Olivarum . libram unam.
Butyri recentis,
Axungiae ursinae,
— gallinaceae,
Medull. cervin., sing. drachmas sex.
Infunde per dies aliquot, tum coque lente ad humidi consumptionem usque, cola exprimendo et colaturae adde
Cerae flavae . . . uncias octo.
Pulveris Storacis drachmas quinque.
— Mastichis . . semunciam.
— Olibani . . drachmas tres.
Misce. (Wir†. *Sp.*)

℞. Fol. rec. Absinthii,
— — Abrotani,
— — Basilici,
— — Calamintae,
— — Balsamitae maris,
— — Chamaedryos,
— — Lauri,
— — Majoranae,
— — Menthae aquaticae,
— — Rorismarini,
— — Rutae,
— — Sabinae,
— — Salviae, sing. part. duas.
Contunde in mortario, succum exprime, quo supra ignem coagulato, faeculam exemtam lava, Aquam quam potest, separa et solve deinde in
Axung. Porci
part. sexaginta quatuor calefactae cum
Semin. Cumini,
— Foeni gr., sing. parte una.
Nucis moschatae . partibus sex.
Adde deinde
Styracis liquidae,
Cerae albae, sing. partes quatuor.
Cola et donec refrixerint agita. (*Vm.*)
Reizend, auflösend.

Emplastrum Baccarum Lauri. (Br†. Pal†. Wir†. Sar. *Sp.*)

℞. Baccarum Lauri uncias quatuor.
Cyperi rotundi,
Corticis Winterani,
Olibani,
Mastichis,
Myrrhae, singul. unciam unam.
Pulverata admisce mixturae liquatae de
Cerae flavae . . . unciis octo.
Resinae Pini,
Olei Lauri,
— Terebinth. sing. unciis duabus.
Reizend, auflösend.

Electuarium Baccarum s. e Baccis Lauri, (Pal†. Sar. Taur. *Gr. Sp.*)

℞. Baccarum Lauri . uncias duas.
Mastichis,
Myrrhae,
Olibani, singulorum unciam unam.
Costi Arabicae,
Cyperi rotundi, sing. semunciam.
Olei Baccarum Lauri,
Terebinth. Chiae, sing. uncias tres.
Mellis purificati . sesquilibram.
Melli calefacto adde terebinthinam et oleum liquata et deinde reliquas substantias pulveratas. (Sar. Taur.)

℞. Baccarum Lauri . sesquiunciam.
Radicis Calami . drachmas duas.
Herbae Rutae,
— Menthae,
Herbae Origani,
Seminum Ammi,
— Cumini,
— Nigellae,
— Levistici,
— Carvi,
— Carottae,
Piperis nigri,
— longi,
Castorei, sing. . drachmas duas.
Sagapeni . . . . semunciam.
Opopanacis . . drachmas tres.
Mellis despum. unc. quatuordecim.
Misce. (Pal†. *Sp.*)

Gr. Fol. Rutae sicc., Sem. Carvi, Petroselin., Bacc. Lauri, sing. unciam, Sagapeni semidrachmam, Pip. nigri, Cast. Russ., sing. drachmas duas, Mellis uncias quindecim.

Alcohol aromaticum. (An.)

℞. Baccarum Lauri unciam unam.
Myrrhae,
Styracis, singularum drachmas sex.
Cinnamomi,
Zingiberis,
Nucis moschatae,
Caryophyll., sing. drach. duas c. dimid.
Aquae,
Alcoholis (20°), singulorum uncias quinquaginta quatuor.
Post horas viginti quatuor macerationis destillatio eo producatur, donec productum 80° indicet.
Mit Unrecht nennt An. dieses Präparat *Balsamum Fioravanti*; dieser enthält keine Terpentintinctur.

Lavandula.

Lavandula Spica, Stoechas, *L.*, angustifolia, *Ehr.*, vera, *Dec.*; Lavendel, Spieke; Lavande commune (*Gal.*); Lavandel (*Bel. D. Suec.*); Lavander (*Ang.*); Espliego, Alhugema (*His.*); Lavendola, Spigo Nardo Italiano (*I.*); Lawanda (*Pal.*); Alfazema (*Lus.*).

A†. Ba†. BorC†. Bor5†. Br†. Ful†. Ham†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax†. Wir†. Wür†. WW†. *M*†. AD. Am. Ams. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. GalM. GalP. Gen. His8. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Pol. R. RC. Suec. Taur. *Br. C. CG. Fi. G. Gr. Pid. Re. Sp.*

♃ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, *J.*) Eine Pflanze des mittägigen Europa's. (*Bull.* t. 337. *Hayne* VIII. t. 37. *Zorn* Ic. pl. t. 53.)

Man wendet die blühenden Spitzen (herba et flores s. summitates s. spicae florentes Lavandulae s. Spicae s. Spicae

vulgaris) an; sie bestehen aus aufrechten, verästigten Stängeln mit linienförmigen, filzigen, weißlichen Blättern und blauen oder violetten, Wirtel bildenden Blüthen, welche vereinigt eine unterbrochene Aehre zusammensetzen, die durch schmale linienförmige Deckblätter geschützt ist. Sie haben einen durchdringenden, sehr angenehmen Geruch und einen gewürzhaften, bittern Geschmack.

Ein kräftiges Reizmittel. — Gabe des Pulvers, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Species aromaticae s. cucuphis. (Bor5†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Sax2†. *Huf*†. GalM. LH. Pol. Sar. *Sp. Sw.*)

℞. Herbae et Florum Rorismarini,
— — — Lavandulae,
— — — Salviae, sing. partes aequales.
Fiant species. (LH.)

℞. Herbae Majoranae,
— Menthae piperitae,
— Rorismarini,
— Serpylli,
Flor. Lavandulae, sing. part. duas.
Caryophyllorum,
Cubebarum, sing. partem unam.
Fiat pulvis grossus. (Bor†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Pol. Sar.)

Bor5† Majoranae, Rorismarini, Serpylli, Thymi, Flor. Lavandulae, sing. partes (uncias) duas, Caryophyllor. unam; — Sax2†. Majoranae uncias duas, Menth. pip., Rorism., Serpylli, Flor. Lavand., sing. unciam.

℞. Herbae Rorismarini,
— Rutae,
— Salviae,
— Hyssopi,
— Lavandulae,
— Absinthii,
— Origani,
— Thymi,
Foliorum Lauri,
Florum Rosarum rubrarum,
— Chamomillae,
— Meliloti,
— Sambuci,
Salis Ammoniaci, sing. part. aeq.
Fiat pulvis grossus. (*Sp.*) — Zum Bähen.

℞. Florum Lavandulae,
— Chamomillae,
Herb. Menthae piperitae,
— Melissae,
— Thymi,
— Majoran., sing. part. aeq.
Concisa misce. (*Huf*†.)

℞. Flor. et Summit. Lavandulae,
— — Melissae,
— — Menthae piperitae,
Flor. et Summit. Salviae,
— — Thymi,
— — Absinthii,
— — Menthae aquaticae,
— — Origani,
— — Rorism., sing. part. aeq.
Concisa misce. (Gal.)

℞. Florum Lavandulae,
— Arnicae,
Herbae Majoranae,
— Serpylli,
— Rorismarini, sing. unciam.
Concisa misce. (*Sw.*)

Species cephalicae pro fomentatione s. epithemate. (Pal†. Wir†. Wür†. *Fi. T. Vm.*)

℞. Herbae Majoranae,
— Menthae,
— Melissae,
— Serpylli,
Flor. Lavandulae,
— Arnicae, sing. . part. aeq.
Concisa misce. (Wür†.)

℞. Herbae siccatae Origani,
— — Serpylli,
— — Thymi,
— — Menthae Romanae,
— — Salviae,
— — Majoranae,
— — Rorismarini,
Flor. Lavandulae,
— Rosar., sing. . . . unciam.
Concisa misce. (*Fi. T.*)

℞. Herbae et Summitatum Betonicae,
— — Hyssopi,
— — Lavandulae,
— — Majoranae,
— — Origani,
— — Rorismarini,
— — Rutae,
— — Salviae,
— — Serpylli,
Florum Chamomillae,
— Meliloti,
— Rosarum,
— Sambuci,
Fol. Lauri, sing. . unciam unam.
Salis Ammoniaci . . semunciam.
Concisa et contusa misce. (Pal†. Wir†. *Vm.*)

Infusum Lavandulae. (GalM.)

℞. Summit. sicc. Lavandulae,
Liquirit. rasae, sing drach. duas c. dimid.
Aquae bullientis quantum sufficit ut colaturae librae duae obtineantur.

Aqua vulneraria, Tinctura aromatica composita. (GalM.)

℞. Specier. aromat. . partem unam.
Alcoholis (22°) . partes novem.

Species cum alcoholis parte dimidia stent in infusione per octo dies et colentur deinde cum expressione, residuo reliquum Alcoholem infunde et liquores commixtos filtra.

Aeußerlich in Waschungen und Bähungen, meist mit Wein. — Reizend.

Acetum Lavandulae. (HC†. Pal†. Wir†. Wür†. Gal. GalP. Lus. *Fi. Gr. Pid. T.*)

℞. Florum Lavandulae partem unam.
Aceti albi . . . . partes sex.

Macera soli exposita per aliquot dies et cola cum expressione. (Pal†. Wir†. *Pid.*)

Gal. Lavand. partem unam, Aceti sedecim et quatuordecim dies macerationis; — HC†. ut acetum Digitalis; — GalP. ut acetum Rosarum; — Wür†. Lavand. partem unam, Aceti novem et tres septimanas macerationis; — *Fi.* Lavand. libram unam, Aceti fortis duodecim; digere loco tepido per dies sex; — *T.* Lavandulae uncias sex, Aceti libras sex et digestionem per dies sex vel decem; — *Gr.* quantitates non indicat, tres quadrantes abstrahere jubet; praeterea Olei q. pl. cum Aceto destill. miscere.

℞. Flor. sicc. Lavand. libram unam.
Aceti . . . . . libras sex.

Post sex dies macerationis coque parumper et colaturae adde
Alcoholi . . . . semilibram.
Misce bene (Lus.)

Gewürzhaft, bisweilen in Form von epithema angewendet.

Acetum Lavandulae compositum, Acidum aceticum aromaticum s. aceticum aromat cum Roosii, Spiritus aromaticus a etosus, Acetum quatuor latronum. (Bor5†. HC†. B*. Fenn. GalP. *Br. DB. Vm.*)

℞. Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis mosch., sing. . drachmam.
Menthae piperitae . semunciam.
Lavandulae,
Rorismarini, sing. unciam unam.
Aceti . . . . . uncias octo.
Aquae Vitae . . uncias viginti.

Destillent partes viginti octo. (*Vm.*)

℞. Herb. recentis Absinthii,
Menthae crispae,
— Rutae,
— Rorism., sing. sesquiunciam.
Flor. sicc. Lavand. uncias duas.
Radicis Calami,
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
Caryophyll., sing. drachmas duas.
Aceti albi . . . libras decem

Post dierum decem macerationem cola exprimendo et filtra. (*Br.*)

℞. Summit. sicc. Absinth.,
— — Artemis. pontic.,
Herb. Rorismarini,
— Salviae,
— Rutae,
— Menth. pip.,
Flor. Lavandulae, sing. uncias duas.
Rad. Calami,
Cort. Cinnamom.,
Caryophyllor.,
Nucis moschat.,
Allii, sing. . . drachmas duas.
Camphorae . drachmas quatuor.
Acidi acetic. . . . uncias duas.
Aceti Vini . . . . libras octo.

Macera plantas in Aceto per dies quatuordecim, trajice cum expressione, adde Camphoram in Acido acetico solutam et filtra post aliquot horas. (GalP.)

DB. Priorum septem plantarum, sing. sesquiunciam, omisso Acido acetico.

℞. Summitatum Absinthii,
— Millefolii,
Herbae Menthae piperitae,
Florum Lavandulae,
Caryophyllorum,
Zingiberis, sing. drachmas quatuor.
Aceti bullient. libras septem c. dimid.
Acidi acetici . . . semilibram.

Macera per dies quatuor, cola exprimendo, Lacte vaccino clarifica, cola iterum et adde colaturae
Spir. Rorismarini uncias quatuor.
Serva (Fenn.)

℞. Cinnamomi,
Macidis,
Caryophyllor., sing. semunciam.
Ligni Rhodii,
— Santali albi,
Semin. Foenic., sing. drachm. duas.
Aceti . . . . . octarios duos.

Digere blando calore per dies duos; adde deinde
Herbae Absinthii,
— Rorismarini,
— Menthae piperitae,
Flor. Lavandulae, sing. semunciam.
Herb. Majoranae drachm. unam.

Stent in digestione per dies duos, tunc coque et refrigerata cola. (B*.)

℞. Acidi acetici . . . . unciam.
Olei Caryophyllorum drachmam.
— Lavandulae,
— de Cedro, sing. scrupulos duos.

Olei Bergamottae,
— Thymi, sing. . scrupulum.
— Cassiae cinnamomeae guttas decem.
Misce. *Acid. acet. arom. Roosii.* (Bor5†. HC†.)

Aqua Lavandulae s. florum Lavandulae s. ex Lavandula. (A†. Pal†. Wir†. Gal. GalP. Pm. Sar. Taur. *Gr.*)

℞. Herb. floresc. Lavand. partem unam.
Aquae communis partes quatuor.
Destillet dimid. pars. (Pal†. Gal. Sar. Taur. ut aq. Menth. pip.)

GalP. Lavandulae libras duas, Aquae communis q. s., destillare libras quatuor; — Wür†. Lavandulae partem unam et sex Aquae; — A†. Aquae duodecim; — Pm. Summitatum floridarum libras viginti, Aquae libras quinquaginta, extrahe libras viginti; — *Gr.* Aquam in destillatione olei collectam.

Gabe, zwei bis vier Unzen.

Oleum Lavandulae s. Lavendulae s. Lavandulae aethereum s. destillatum s. Lavandulae Spicae. (A†. Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fer. Gal. Gen. His3. LonN. LP. LPC. Lus. Pol. R. Sar. Suec. *Br. C. CG. DB. Fi. Gr. Pid. Re. Sw.*)

℞. Herb. flor. Lavandulae . q. vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillatione oleum quod separatur, collige. (Ful†. AD. Am. Ams. B. Bel. Du. Ed. Fer. Gen. Lon. LonN. LPC. Lus. R. Suec. *Br. C. CG.*)

Sw. Herbae partem unam et quatuor Aquae; — Bor5†. Han†. Sax2†. His3. Pol. et *Fi.* Aquae octo; — D. Aquae sex; — An. Herbae sex et viginti Aquae; — Gal. Herbae quinque et septem Aquae; — Ba†. Herbae unam et Aquae novem; — A†. Aquae duodecim; — *T.* ut oleum florum aurantiorum; — Pm. oleum e destillatione aquae; — LP. macerationem aliquot dierum et destillationem; — HC† Sax2†. Oleum venale (p. sp. = 0,87—0,89 HC†.); — *DB.* ut oleum Rosarum.

℞. Lavandulae partes viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis communis . . partes tres.
Destillent. (Br†. Hass†. Pal†. Wir†. Sar. *Pid.*)

℞. Lavandulae . . . quantum vis.
Aquae Lavandulae . . . q. s.
Destillent. (Wür†.)

Gabe, zwei bis acht Tropfen.

Bor5†. HassP†. et HN†. Oleum venale. P. sp. 0,898 Bor5†. HN†.

Gr. Oleum Lavandulae latifoliae s. exoticum indicat; — praeterea rectificationem Olei Lavandulae (*Oleum Lavand. rectificatum*).

Olea mixta (*Gr.*) (Mixed oils for sal volatile drops): Essent. Bergam., Limon., sing. unciam, Ol. Lavand., Piment., sing. semunciam.

Sal volatile drops (*Gr.*): Oleor. mixt. uncias duas, Sal. volat. Ammon. viginti, Spir. Vini rectif. congios duos; abstrahe octarios 18 vel 19.

Linimentum aromaticum, Balsamum Lavandulae. (*Br. Sw.*)

℞. Olei Lavandulae partem unam.
— Nucis mosch. partes quinque.
Misce. (Br†.)

℞. Olei Lavandulae,
— Nucis moschatae,
Butyri Cacao, sing. partes aequales.
Misce. (*Sw.*)

Dieses sehr einfache Präparat ersetzt das unguentum nervinum vollkommen, und wird auch von *Sw.* so benannt.

Oleum Lavandulae (pingue). (*DB. Fi. T.*)

℞. Flor. Lavand. rec. libram unam.
Olei Olivarum . libras quatuor.
Macera calide per duos dies, tunc coque per horae quadrantem, exprime et oleum separa; — *T.* Florum uncias quindecim, Olei libras quinque, tres macerationes, priores per tres vel quatuor dies, tertiam per mensem circiter protrahendam; — *DB.* ut oleum Chamomillae coctum.

Spiritus s. Alcoholatum Lavandulae, Spiritus Lavendulae simplex, Alcohol cum Floribus Lavandulae, Aqua Lavandulae spirituosa. (A†. Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. AD. Am. An. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. GalP. LonN. LP. LPC. Lus. Pm. Pol. R. Sar. Suec. *C. CG. DB. Gr. Pid. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Lavandulae . . partem unam.
Alcoholis (20°) . partes quatuor.
Spiritus destillatione elicitus 28° indicet. (Br†. Hass† Pal†. Wir†. An. Ed. *Pid.*)

Bel. Lavand. partem unam et sedecim Alcoh.; — GalP. ut spiritus Rorismarini; — Suec. Lavand. partem unam cum dimidia et decem Alcoh.; — Lus. Lavand. partem unam cum dimidia, et decem Alcoh.; — *T.* Flor. recentium libras duas, Spiritus Vini

32° B. octo, destillando libras circiter quinque elice; — Sar. Lavandulae partem unam, Alcoholis quatuor et cohobationem producti supra novam Herbam; — D. Lavandulae partem unam, Alcoholis sex et cohobationem supra novos Flores; — Wür†. Lavandulae partem unam cum dimidia, Alcoholis decem, et cohobationem supra novam Herbam; — Fer. Florum sesquilibram et octo Alcoholis; destillent sex.

℞. Lavandulae . . . . partes tres.
Aquae Vitae . . . partes sex.
— purae . partes triginta sex.
Destillent partes novem. (*Vm.*)

Bor†. Han†. O†. Sax†. et Pol. Lavand. partem unam, Alcoh et Aquae, sing. quatuor; — Ba†. Lavand. unam, Alcoh. (0,910) quatuor cum dimidia et Aquae sex; — Fenn. Lavand. unam cum dimidia, Alcoh. quatuor et tres Aquae; — Du. *Gr.* Herbae sesquilibram, Alcoholis octarios octo et Aquae q. s; — AD. Am. LonN. *C. CG. Gr. Re.* Herbae libras duas, Alcoholis vel Aquae Vitae octarios octo et Aquae q. s. ut empyreuma prohibeatur; — LPC. Lavandulae libras duas cum dimidia, Spirit. rectific. congium, Aquae octarios duos; destillare congium; — *DB.* ut aqua Melissae spirituosa; — Bor5†. HassP†. HN†. Flor. libram unam, Spir. Vini rect. quatuor, Aquae font. q. s.; post macerationem per horas viginti quatuor, destillando libras quatuor elice; — Pm. Flor. libram unam, Alcoholis 22° octo, Aquae sex, digestionem per diem et balneo maris destillationem liquoris librarum octo. — LP. Summit. sicc. uncias sedecim, Spirit. Vini libras quatuor, Aquae unam, infusionem per triduum et destillationem, usque spiritus non amplius prodeat; — *Gr.* Flor. partem unam, Spir. rectif. tres, vel: Flor. libras duas, Spirit. rectif. pond. octo, destill. pond. librae septem, vel: Flor. libr. quatuordecim, Spirit. rect. congios quinque, Aq. q. s. ut congii decem abstrahi possint; praeterea: Olei Lavand. uncias quinque, Spiritus rectif. congios tres, Aquae dest. duos, Alum. ust. ad clarif.

℞. Lavandulae . partes duodecim.
Alcoholis . . . . . partes sex.
Aquae . . . . . partes duas.
Partibus sex destillando elicitis productum novae destillationi cum Lavand. partibus duodecim et Aquae duabus subjiciatur, quo partes sex extrahantur. (*Sw.*)

℞. Lavandulae . . . semilibram.
Aquae Lavandulae libram unam.
Alcoholis . . . libras quatuor.
Post infusionis horas viginti quatuor destillent librae tres. (R.)

℞. Spiritûs Vini alcoholisati uncias octo,
Olei Lavandulae drachmam unam cum dimidia.
Misce. P. sp. = 0,83. (HC†.)

Sax2. Ol. Lavand. scrupulos duos, Spir. rectificatiss. uncias sex, Aq. dest. q. s. ut mixtura sit pond. spec. = 0,885 – 0,895.

Gr. praeterea: Olei Lavand. libras duas, Ess. Ambrae gris. semunciam, Spirit. rect. congios duodecim; — Ol. Lavand. uncias duas, Ol. Rorism. unam, Ol. Cinnam. guttas quatuor, Aquae Vitae congium: — Ol. Lavand. uncias tres, Ess. Bergam. unam, Ess. Ambrae griseae drachmas quinque, Spiritûs rectif. octarios quatuordecim, Aquae Rosar. opt. duos; — Ol. Lavand. drachmas duas, Ess. Bergam. unam, Ess. Amb. gris. gutt. triginta, Ol. Rhodii, gutt. sex (Mosch. gran. unum?), Spir. rectif. libram; — Ol. Lavand. drachm. duas, Ol. Rorism., Ess. Ambr. gris., sing. unam, Spir. rectif. libras duas. — *Re. Lavender water:* Spir. Vin. opt. congios triginta, Flor. Lavand. max. et recentiss libras sex, digere per hor. 24 et leni igne congios viginti quinque abstrahe, sepone per dies 10 et adde Ol. Lavand. Angl. opt. uncias decem, misce et per mensem repone.

Tinctura Lavandulae composita s. aromatica, Spiritus Lavandulae compositus, Alcohol cum Lavandula Spica compositus. (Han†. HN†. Pal†. AD. Am. An. B*. D. Du. Ed. Fenn. GalF. Gen. Lon. LonN. LP. Suec. *C. Ca. CG. Gr. Re. Sw. Vm.*)

℞. Spir. Lavand. partes triginta duas.
— Rorismarini partes sedecim.
Cinnamomi,
Nucis mosch., sing. partes duas.
Infunde frigidè per tres dies et adde
Ligni Santali rubri partem unam.
Macera iterum per aliquot dies, tunc cola exprimendo et filtra. (*Vm.*)

Han†. HN†. Spir. Lavand. libras duas, Spir. Rorism uncias octo, Cinnamomi, Nucis mosch., sing. drachmas duas, et Ligni Santali rubri semunciam; — B*. et GalF. Spir. Lavand. libras tres, Spir. Rorism. unam, Cinnamomi, Nucis mosch., sing. semunciam et Santali rubri unciam; — Pal†. et Suec. Spir. Lavand. libras tres, Spiritus Rorism. unam, Cinnamomi, Nucis mosch, sing. semunciam et Santali rubri drachmas tres; — *Ca.* Spir. La-

vand. libras tres, Spir. Rorism. unam, Cinnamomi, Santali rubri, sing. sesquiunciam et Nucis mosch. unciam; — *Vm.* Spir. Rorism. uncias duodecim, Spir. Lavand. triginta sex, Cinnamomi, Nucis mosch., sing. semunciam, Coccionellae semidrachmam.

LP. Spiritûs Lavandulae libram unam, Spiritûs Cinnamomi uncias quatuor et Olei Nucis moschatae semidrachmam miscere

℞. Spiritûs Lavandulae . libras tres.
— Rorismarini libram unam.
Cinnamomi,
Nucis mosch., sing. semunciam.
Coccionell. contus. semidrachmam.

Digere, modico igne, per tres dies et cola. (Fenn.)

℞. Spiritûs Lavandulae libras duas.
— Rorismarini . uncias sex.
Pulv. Cinnamomi,
— Nucis mosch., sing. semunciam.
— Santali rubri drachmas tres.

Post digestionem per septimanam filtra et residuo infunde

Spiritûs Lavandulae libram unam.
— Rorismarini . uncias sex.

Stent in digestione per tres dies, quo facto colaturae filtratae misceantur. (An.)

℞. Spiritûs Lavandulae libras tres.
— Salviae . . libram unam.
Cinnamomi . . unciam unam.
Nucis moschatae . semunciam.
Ras. Santali albi drachmas tres.

Post frigidam per octo dies infusionem cola. (*Sw.*)

℞. Spiritûs Lavandulae . libras tres.
— Rorismarini libram unam.
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
Santali citrini, sing. semunciam.
Ambrae griseae . semiscrupulum.
Croci . . . drachmam unam.

Post octo dies macerationis cola. (Gen.)

℞. Spir. Lavandulae,
— Rorismar., sing. viginti quatuor.
Cinnamomi . . unciam unam.
Nucis moschatae . semunciam.
Caryophyllorum drachmas duas.
Aquae . uncias centum viginti.

Destillent liquidi unciae quadraginta octo, in quibus infunde

Ligni Santali rubri drachmas tres et filtra, vel totum, absque destillatione, infusioni subjice per plures dies cum utroque spiritu et filtra. (*Vm.*)

℞. Spir. Lavandulae part. octoginta quatuor.
Spir. Rorism. part. quadraginta octo.
— Citri . . partes duodecim.
Cinnamomi . . . . partes tres.
Cubebarum,
Caryophyll., sing. partem unam.

Stent per plures dies in frigida infusione, tum filtrentur. (*Vm.*)

℞. Spiritûs Lavandulae octarios tres.
— Rorismarini octarium unum.
Nucis moschatae,
Cinnamomi, sing. . semunciam.
Caryophyllorum drachmas duas.
Ras. Ligni Santali rub. . unciam.

Post decem dies cola. (Am. Du. *C.*)

AD. Cinnamomi unciam, Santali drachmas tres, macerare per dies quatuordecim; — Lon. ante 1809. *Gr.* Santali drachmas tres et absque caryophyllis; — Lon. LonN. *CG. Gr. Re.* Caryophyllos omittunt; — Ed. *Gr.* et *Sw.* Spir. Lavand. libras tres, Spir. Rorism. unam, Cinnamomi unciam, Caryophyll. drachmas duas, Nucis mosch. semunciam, Santali rubri drachmas tres et octo dierum macerationem.

℞. Fol. Lavandulae partes duodecim.
— Rorismarini . . partes sex.
Caryophyllorum,
Cinnamomi, sing. . partes tres.
Cubebarum . . . partem unam.
Aquae Vitae partes centum quadraginta quatuor.
Aquae purae partes ducentas octoginta octo.

Destillent partes centum octo. (*Vm.*)

Gr. praeterea: Rasurae Sant. rubri libram, Pimentae, Cass. lig., sing uncias octo, Spir. rectif octarios duodecim, digere, exprime et adde Olei Lavand. uncias quatuor, Olei Rorism. duas, Spir. tenuioris congios quatuor; vel: Ras. Sant. rubr. libram, Cass. lign. uncias duas, Nuc. mosch unam, Croci drachmas quatuor, Pis. Aurant unciam, Fol. Ros. rubr. duas, Spir. rectif. congium, hujus tincturae octariis quatuor adde Ol. Lavand. uncias quatuordecim, Spir. volat. aromat. sex, Spir. rectif. congios quinque. Aq. dest. octarios decem; vel: Santal. rubr. uncias quatuor, Spir. rectif. octarios quatuor, digere, exprime et adde Olei Lavandulae drachmas quatuor, Ol. Rorism. unciam, Ol. Cass. gutt. octo, Ol. Caryophyll. gutt. quatuor, Spir. Amm. comp. q. s. (circiter drachmas sex); vel sec. Du. ut formula antea indicata sed additis Caryoph. drachmis duabus.

D. Lavandulae libras duas, Rorism. unam, Cort. rec. Citri uncias tres, Al-

coholis libras duodecim, destillationem ad siccum et infusionem producti cum Cubebarum, Caryophyll., sing. uncia una et Cinnamomi unc. tribus.

Reizend. — Gabe, von zehen Tropfen bis zu zwei Drachmen in Zuckerwasser.

Spiritus Lavandulae ammoniacalis, Guttae anglicae cephalicae. (*T.*)

℞. Spir. Cornu Cervi (destillatione cornu cervi vel fili bombycini obtenti) . . . . uncias octo.
Olei ess. Lavand. drachmas duas.
Alcoholis 33° B. . unciam unam.

Aqua odorifera. (Wir†. B*.)

℞. Herbae Rorismarini,
— Majoranae,
Flor. Lavand., sing. unciam unam.
— Liliorum Convallium,
— Rosarum, sing. uncias duas.
Ligni Rhodii,
Cort. rec. Citri, sing. sesquiunciam.
Cinnamomi . . . uncias duas.
Caryophyllorum . sesquiunciam.
Alcoholis . . . . libras octo.
Aquae . . . . libras quatuor.

Post tres dies digestionis destillent tres quadrantes. (Wir†.)

℞. Lavandulae,
Melissae, singularum libras duas.
Radicis Calami . libram unam.
Caryophyllorum,
Herb. Rorism., sing. semilibram.
— Majoranae,
— Menthae piperitae,
Cinnamomi, sing. unciam unam.
Alcoholis . . . . libras duas
Aquae . . . . libras triginta.

Destillent unciae viginti. (B*.)

Fast nur dem Namen nach von dem Karmeliter und Köllnischen Wasser verschieden Es dient zu demselben Gebrauch.

Smith's British Lavander water (*Gr. Re.*): Ol. Lavand. Angl. uncias duas, Ess. Ambr. gris. unam, Aq. Coloniens. octarium unum, Spir. rectif. duos.

Lawsonia.

Lawsonia inermis, L.; rothes Mundholz, rothes Aegyptisches Färbekraut; Henné (*Gal.*); Alkanet (*Ang.*); Pachar (*Jav.*); Pontalesche (*Malab.*).

Ba†. Wir†. *M*†. Gal. *A. Gr. Sp.*

Ein Strauch (Octandria Monogynia, L.; Salicariae, *J.*) Ostindien's und Africa's (Hort. Malab. IV. p. 117. t. 57.)

Man wendet die Wurzel (radix Alcannae verae s. orientalis s. Cypri antiquorum s. Ligustri Aegyptiaci) an; sie ist dunkelroth und hat einen herben, styptischen Geschmack.

Schwach adstringirend.

In Ostindien gebraucht man die Wurzel der Lawsonia spinosa, L.; Henné épineux (*Gal.*); Urkan (*Ar.*); Maritondi (*Cy.*); Mayndie (*Duk.*); Daun lacca (*Mal.*); Mail anschi (*Malab.*); Henna (*Pe.*); Sagachero (*Sa.*); Marudanie (*Tam.*); Gorunta chettu (*Tel.*).

Sie hat viel Aehnlichkeit mit der vorigen und sie soll bei Aussatz und andern Hautkrankheiten, sowohl äußerlich als innerlich angewendet, zu einem halben Kaffeelöffel gegeben, nützlich seyn.

Ledum.

Ledum palustre, L.: Haidebienenkraut, Sumpfporsch, wilder Rosmarin, Porsch, Porst; Romarin sauvage (*Gal.*); Marsh ledum (*Ang.*); Vild rosmarin (*D.*); Wilde rosmaryn (*Bel.*); Ledo (*I.*); Rozmarin czeski (*Pol.*); Getpores Sqwattram (*Suec.*).

A†. Bor5†. Br†. Ham†. Han†. HC†. HN† Li†. O†. Sax2†. Wir†. *M*†. D. Fenn. Fer. Gal. Pol. R. Suec. *Be. Gr. Sp.*

♃ (Decandria Monogynia, L.; Rhodoraceae, *J.*) Eine Nordeuropäische Pflanze. (*Schk.* t. 117. *Plenck* t. 337. *Hayne* III. 21. *Zorn* Ic pl. 54.)

Man wendet die Spitzen (herba s. folia Ledi palustris cum floribus s. Rorismarini sylvestris s. Anthos sylvestris) an; sie bestehen aus behaarten, röthlichen Zweigen mit linienförmigen, fast sitzenden, am Rande umgeschlagenen, oben grünen, unten filzigen und röthlichen Blättern und weißen, endständige, sitzende Dolden bildenden Blüthen.

Diese Pflanze wird für narkotisch gehalten und in convulsivischen und Krampfkrankheiten gepriesen.

Infusum Ledi s. Ledi palustris. (HN†. B*. *Sw. Sy.*)

℞. Fol. Ledi unciam dimidiam ad unam.
Aquae bullientis . libram unam.
Infunde per horam unam et cola.

Bei Aussatz, Krätze, Kopfgrind, Keichhusten, venerischen Krankheiten empfohlen. Zwei Löffel. (HN†.)

Aqua Ledi palustris (*Gr.*) wird für Rosenwasser verkauft.

Lens.

Ervum Lens, L.; Linse; Lentille (*Gal.*); Common lentil (*Ang.*); Lentec-

chia (*I*); Lins (*Suec.*); Lentilha (*Lus.*).
M†. Gal. LP. *B. G. Gr. Sp*

⊙ (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, J.) Eine in Europa gebaute Pflanze. *Plenck* t. 565. *Schk.* t. 202. *Sturm* Fl. D. I. 32. *Oed.* Fl Dan. t. 95.)

Man wendet den Saamen (semen Lentis) an; er ist kreisrund, platt, an beiden Seiten bauchig und von gelblicher Farbe.

Ehedem gab man die Abkochung bei Blattern; sie ist, schwach bereitet, etwas adstringirend.

Lepidium.

Von dieser Pflanzengattung werden angeführt:

1) *Lepidium latifolium*, *L.*; Pfefferkraut; Passerage à larges feuilles, grande Passerage (*Gal.*); Broadleav'd paperwort (*Ang.*); Peperur (*D.*); Breedlabig peperkruid (*Bel.*); Lepidio (*I.*); Peparaer (*Suec.*).

Gal. His. HisS. *Gr. Sp.*

♃ (Tetradynamia Siliquosa, L.; Cruciferae, J.) Eine in Europa gemeine Pflanze (*Blackw.* t. 448. *Oed.* Fl. Dan. t. 557.)

Man wendet das Kraut (herba Lepidii s. Piperitidis) an; es besteht aus einem walzigen, glatten, ästigen Stängel mit eirundlanzettigen, blaß- und selbst blaugrünen, gezähnelten oder bisweilen ungetheilten Blättern, von denen die untern gestielt, die obern sitzend und schmal sind. Es hat einen scharfen, gewürzhaften, pfefferartigen Geschmack.

2) *Lepidium Iberis*, *L.*; kleines Pfefferkraut; Passerage ibéride, petite Passerage (*Gal.*).

Gen. *Gr.*

⊙ Eine in Europa gemeine Pflanze (*Zorn* Ic. pl. t. 593.)

Man wendet das Kraut (herba Iberidis) an; es besteht aus einem ästigen Stängel, gestielten, lanzettigen, an der Spitze gezähnten oder selbst eingeschnittenen, fiederspaltigen oder leierförmigen Wurzelblättern und linienförmigen, ganzen und ganzrandigen Stängelblättern. Es hat einen scharfen, starken, dem der Kresse ähnlichen Geschmack.

Reizend, gegen Scorbut.

Gr. führt außerdem Lepidium procumbens, Ambrosia an; die Saamen sind eröffnend, einschneidend und antiscorbutisch.

Conserva Lepidii. (His. HisS.)

℞ Fol. rec. Lepidii . partem unam.
Contundendo pistilli lignei opa in mortario marmoreo in pastam mollem redige, addendo sensim
Sacchari albi pulverati partes duas.

Infusum Lepidii. (B*.)

℞. Herb. Lepidii
unc. dimid ad unam.
Aquae bullientis quantum sufficit ut colaturae unciae sex obtineantur.

Dieser Aufguß ist, nach Erdmann, in Rußland gegen Wechselfieber in Gebrauch. — Gabe, alle Stunden einen Löffel.

Lichen.

Wir führen unter diesem Namen an:

1) *Physcia nivalis*, *Cand.*; Schneeflechte; Lichen blanc de neige (*Gal.*).
Wir†.

Ein kryptogamisches Gewächs der Alpen und der Pyrenäen. (*Dill.* Musc. t. 21. f. 56.)

Es besteht (Lichen terrestris cinereus) aus weißen oder gelblichen, am Grunde etwas abstehenden, oben wieder aufwärts gerichteten, ästigen, fast ausgezackten, krausen Blättern, welche in platte, rundliche oft mit schwarzen Puncten gesäumte Läppchen endigen; die auf den Blättern sitzenden Schildchen sind sehr selten, sitzend, braun und von einem gekerbten Rande eingefaßt.

Das Pulver dieser Pflanze wurde ehedem als ein specificum gegen die Wuth betrachtet.

2) *Scyphophorus cocciferus*, *Cand.*; scharlachfarbige Becherflechte, Feuerkraut, Fiebermoos; Lichen coccifère (*Gal.*).

Gal. *Gr.*

Diese Flechte (herba Ignis s. Musci pyxidati, Lichen cocciferus) besteht aus kleinen, oben grünlichweißen, unten weißeren Blättern, von denen walzige, oft ästige Stängel entspringen, welche sich in Becher erweitern, an deren Rändern rothe Höcker sitzen.

3) *Peltigera canina*, *Cand.*; Hundsflechte; Lichen contre la rage (*Gal.*); Ashcolour'd ground liverwort (*Ang.*); Hondsmoos (*Bel.*); Musgo canino (*Lus.*); Hund mossa (*Suec.*).

Br†. *M*†. Gal. *Gr. Sp.*

Ein sehr häufig in Hölzern auf der Erde wachsendes kryptogamisches Gewächs. (*Plenck* t. 747. *Vaill.* Bot. t. 21. f. 16.)

Es besteht diese Flechte (herba Musci canini s. Lichen terrestris s. caninus s. cinereus terrestris) aus großen, breiten, ledrigen, rundlichen, aschgrauen oder braunen Blättern, welche unten mit rothen, behaarten, ästigen und unter einander zu-

sammentretenden Rippen versehen und in rundliche Lappen getheilt sind, von denen einige aufsteigende die rothen, ebenen, länglichen, scheitelrecht stehenden Schildchen tragen; der Rand der letztern ist eingewachsen.

Peltigera venosa, horizontalis, polydactyla und aphthosa (*Hoffm.* Lich. I. t. 6. f. 1. *Jacq.* Coll. IX t. 17.), welche von der Französischen Pharmacopöe ebenfalls angezeigt sind, haben viel Aehnlichkeit mit ihr.

Ehedem hielt man diese Pflanze als gegen die Wuth für sehr nützlich.

4) *Scyphophorus pyxidatus*, *Cand.*; Becherflechte; Lichen en entonnoir (*Gal.*).

Ful†. Ham†. Li†. *M*†. Gal. GalM. *Gr Sp.*

Ein kryptogamisches Gewächs, welches man auf der Erde, auf Holz und an alten Mauern antrifft. (Handb. d. pharmac. Bot. t. XCII. f. 427. *Dill.* Musc. t. 14. f. 2.)

Dieses Moos (herba Musci s. Lichenis pyxidati) besteht aus lappigen oder gekerbten, oben etwas grünlichen, unten weißern Blättern, welche regelmäßig von unten nach oben ausgerandete becherförmige Schildchen tragen, an deren Rande dunkelbraune Höcker sitzen.

Ehedem gegen Husten empfohlen.

5) *Usnea plicata*, *Cand.*; Haarflechte, Wickelflechte; Lichen entrelacé, Mousse de chêne (*Gal.*); Hairy treemoss (*Ang.*); Skinslav (*D.*); Musco arboreo (*His.*); Worrig schurffmoos (*Bel.*); Musgo dos carvalhos (*Lus.*); Taf (*Suec.*).

Wir†. *M*†. Gal. His. HisS. *Gr.*

Ein kryptogamisches Gewächs, welches sich auf den Zweigen alter Bäume häufig findet. (*Dill.* Musc. t. 11. f. 1.)

Es besteht (Muscus albus quernus s. arboreus) aus bisweilen über 1 Fuß langen, sehr festen, höckrigen, in durcheinander gewirrte Aeste getheilten, weißlichen Stängeln und vielen fast endständigen, weißen, mit haardünnen Wimpern am Rande versehenen Schildchen. Es hat einen angenehmen Geruch und einen etwas adstringirenden Geschmack.

Schwach adstringirend, ehedem für schmerzstillend gehalten und sowohl als magenstärkend, als auch um Ausflüsse jeder Art zu hemmen und Husten zu mildern, angewendet.

6) *Physcia Islandica*, *Cand.*, *Cetraria islandica*, *Lichen islandicus*; Lungenmoos, Isländisches Moos; Lichen d'Islande (*Gal.*); Iceland lichen, Iceland liverwort (*Ang.*); Gaternjk (*B.*); Islandskmoos, Fielgraes (*D.*); Liquen islandico (*His.*); Yslandisch moos (*Bel.*); Licheno islandico, Musco catartico (*I.*); Meck islandzki (*Pol.*); Musgo islandico (*Lus.*); Islandsmosse (*Suec.*).

A†. Ba†. BorC†. Bor5†. Br†. Ful†. Ham†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. WW†. *M*†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. HisS. LH. LonN. LP. Lus. Pol. R. RC. Suec. Taur. *Bc. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Pid. Sar. Sp. Va. Z.*

Ein in Europa, besonders im Norden, sehr gemeines kryptogamisches Gewächs. (*Jacq.* Coll. IV. t. 8. f. 1. *Plenck* t. 744. *Blackw.* t. 599. *Oed.* Fl. Dan. t. 153. f. 879.)

Es besteht (herba Lichenis Islandici s. Muscus Islandicus s. catharticus, Cladonia Islandica) aus häutigen, kastanienbraunen oder olivenfarbigen, am Grunde bräunlichrothen, unten blässern, aufrechten, ästigen, in zurückgebogene, fast linienförmige, vielspaltige, hohle, gezähnte und gefranst'te Lappen getheilten Ausbreitungen; die breiteren Lappen tragen ebene, sitzende, angedrückte, gleich- oder weniger dunkelgefärbte Schildchen mit erhabenem, ganzem und gefranst'tem Rande.

Nach Proust enthält diese Pflanze, in 100 Theilen, 64 Schleim, 33 satzmehlartigen und 3 bittern Stoff.

Es besitzt, je nachdem man ihm den bittern Stoff entzogen hat oder nicht, entweder bloß nährende oder zugleich auch tonische Eigenschaften. Man hat es besonders in der Lungenschwindsucht gerühmt. Lichen vellens soll ähnliche Eigenschaften besitzen.

7) *Imbricaria parietina*, *Cand.*; Wandflechte, goldgelbe Schuppenflechte, Plankenflechte; Lichen des murs (*Gal.*); Common yellow lichen (*Ank.*); Guul skorpemoos (*D.*); Maurig schurffmoos (*Bel.*); Vaeggmosse (*Suec.*).

A†. Ba†. Sax†. Fer. GalM.

Ein Kryptogamist Europa's. (Fl. Dan. 1005. *Hoff.* Enum. Lich. XVIII. I. *Hayne* V. t. 47. *Dill.* Musc. t. 24. f. 76.)

Es besteht aus einem häutigen, geschindelten, unten weißlichen, oben grünlichen, später in's Goldgelbe und Aschgraue übergehenden Laub mit rundlichen, in Lappen getheilten, krausen, großen, ausgebreiteten Blättern, in deren Mitte zahlreiche Schildchen mit dunkler gefärbter Scheibe und ganzem Rande sitzen.

Bitter, als Ersatzmittel der China bei Wechselfiebern ausgegeben. Doch hat die Schrader'sche Analyse eine Aehnlichkeit mit der China nicht dargethan.

8) *Psyscia*, *Prunastri*, *Cand.*; weißes Lungenmoos; Lichen du prunellier (*Gal.*).

Wir†. *Gr. Sp.*

Diese Flechte wächst in Europa. (*Dill.* Musc. t. 21. f 54. 55. A.)

Sie besteht (Muscus arboreus s. Acaciae) aus einer weichen, häutigen, aschgrauen, weißlichen, bisweilen grünlichen, runzeligen, höckrigen, unten milchweißen, ungleich gabeligen, sehr ästigen Ausbreitung mit aufrechten, linienförmigen, verdünnten, ebenen Lappen; die Schildchen sind einzeln, braun und randständig

Schwach adstringirend.

9) *Lobaria pulmonaria, Cand., Sticta pulmonacea, Ach., Lichen pulmonarius, L.*; Lungenflechte; Lichen pulmonaire, Pulmonaire de chêne (*Gal.*); Lungwort (*Ang.*); Lungemos (*D.*); de Pulmonaria arbol (*His.*); Longachtig lungwort (*Bel.*); Polmonaria di quercia (*I.*); Hepatica dos avores (*Lus*); Lungmossa (*Suec.*).

Br†. Wir†. Wür†. *M*†. Gal. GalM. Gen. Taur. *Be. Fi. Gr. Sp.*

Ein besonders im Norden Europa's sehr gemeines kryptogamisches Gewächs. (*Plenck* t. 745. *Hayne* V. t. 48. *Zorn* lc. pl. t. 494.)

Es besteht (herba Pulmonariae arboreae s. Muscus s. Lichen pulmonarius) aus einer oben gelbgrünen Ausbreitung mit einem Netz hervorstehender Höhlen, unten gleichsam höckerig, weiß und an den Erhöhungen, welche die Höhlen daselbst bilden, glatt, in den Zwischenräumen derselben braun und behaart.

10) *Sphaerococcus crispus*: Irländisches Moos, Carragaheen. HC†.

Ein Tang, welcher an den Englischen und Irländischen Küsten häufig wächst.

Dieser Tang (Fucus crispus s. Lichen Carragaheen) enthält eine große Menge Schleim, von dem eine Unze hinreichend ist, eine sehr schleimige Abkochung von sechs Unzen zu bereiten.

Species pectorales. (Ful†.)

℞. Lichenis Islandici libram unam
Radicis Althaeae . libras duas.
Concisa misce.

Pulvis antilyssus. (Br†. Wir†. *Sp.*)

℞. Lichen. terrest. ciner. uncias duas.
Piperis nigri . . unciam unam.
Fiat pulvis.

Chocolata Lichenis Islandici s. cum Lichene Islandico, Pasta cacaotina lichenifera s. lichenata, Cacao cum Lichene Islandico, Mooschocolade. (Bor5†. HC†. Sax2†. *Au*†. GalP.)

℞. Seminum Cacao tostorum,
Sacchari, sing. . libras quatuor.
Lichenis Islandici . libras duas.
Salep . . . . . uncias tres.

Von Trommsdorf angegeben. (*Au*†.)

Sax2†. Pastae Cacaotinae saccharatae super prunas recens paratae libris duabus interere per vices Gelatinae Lichenis Isl. recens coctae etc. et pulv. q. ex unciis tribus Lichenis isl. addere, deinde addere Rad. Salap pulv. drachmas duas, igne leni et continue triturando humiditatem superfluam dissipare, ut massa in formas solitas l. a. cogi possit.

℞. Lichenis Isl. Aqua cal. loti et sicc. partem unam.
Pulveris Salep partem octavam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Mixtis exacte adde
Pastae Cacao calidae partem unam.
Fiant tabellae. (Sax†.)

℞. Lichenis Islandici uncias quatuor.
Infunde
Aquae comm. fervid. libras duas.
Kali carb. e cin. clav. drachmas duas
in solut. tenentis. Stent per horas tres. Tum liquorem decantha, residuum Aqua comm. frigida probe ablut. et siccat. in pulverem redige. Hujus pulveris unciis tribus adde
Cacao tostae in mortario ferreo calido in massam subtiliss. redact. (Pastae Cacao),
Sacch. albi pulv., sing. sesquilibram.
Radicis Salep pulv. drachmas tres.
Massam intime mixtam aut in cistulas effunde aut refrigeratam in pulverem redige. (Bor5†. HC†.)

℞. Cacao Caraccens.,
Cacao Antillarum, sing. libras duas.
Sacchari pulver. . . libras tres.
Gelatin. Lichen. Island. libram cum unciis sex.
Eodem modo paratur, ut Chocolata simplex, addendo simul Saccharo et Gelatina.

Extractum Lichenis Islandici. (Wür†.)

℞. Lichenis Isl. mund. quantum vis.
Alcoholis . . quantum sufficit ut quatuor digitorum crassitiem tegatur; digere blando calore et decantha; residuum cum Aqua coctum coletur cum expressione; colatura in balneo aquae ad mellis consist. evaporet, addita sensim tinctura et agitatione continua ut massa homogenea neque grumosa obtineatur.

Infusum Lichenis Islandici. (*Sa.*)

℞. Lichenis Islandici drachmas tres.
Aquae bullientis quantum sufficit ut post semihoram infusionis et aliquot momenta ebullitionis, colaturae

librae viginti obtineantur, quibus adde
Syrupi Rubi Idaei sesquiunciam.

Syrupus Lichenis Islandici. (Han†. HC†. HN†. *Vm.*)

℞. Lichenis Islandici . uncias sex.
Aquae bullientis . . libras sex.
Decoque ad libras quatuor et adde
Sacchari albi . libras quinque.
Coque ad consistentiam syrupi. (Han†.)

Vm. Lichenis partem unam, Aquae triginta quinque ad viginti coctione redactas et decem Sacchari.

℞. Saccharolati Lichenis Islandici drachmas duas.
solve leni calore in
Aquae fervidae . . . drachma, admisce
Syrupi simplicis . unciam. (HC†)

Syrupus de Musco querno. (Wir†.)

℞. Musci querni . . uncias tres.
Herbae Chenopodii ambrosiaci,
Passular. min., sing. semunciam.
Rad. Consolidae maj. unciam unam.
— Liquiritiae . . semunciam.
Aquae bullientis . sesquilibram.
Infunde per noctem, tum lente coque. Colatur. unciarum decem clarif. adde
Balsami Tolutani sesquidrachmam.
Sacchari albi pulv. sesquiunciam.
Misce exacte.

Decoctum Lichenis Islandici. (Sax† B*. Suec. Taur. *DB. ParC. Ba. T. Vm.*)

℞. Lichenis Islandici partem unam.
Aquae frigidae . . partes octo.
Macera per semihoram et liquidum decanth. rejice. Tum coque lich. cum
Aquae . partibus triginta duabus ad dimidium, cola et exprime. (Sax†.)

T. Lichenis uncias duas, Aquae bull. modicam quant., quam decanthatam rejice et lichen coque cum Aquae libris quatuor ad dimid. Si aquam prioris bullitionis non rejicias, addere potes, ad temperandum saporem amarum, momento, quo ab igne removes, Rad. Liquirit. modicam quant.

℞. Kali subcarbonici drachmam unam.
Aquae . . uncias triginta duas.
Solutionem infunde
Lichenis Isl. mund. unciis duabus.
Post macerationem duodecim horarum liquidum decantha, lichen Aqua pura bene ablue et ei infunde
Aquae . uncias quadraginta octo.
Decoque ad unciar. sedecim remanent., cola et exprime. (B*. Suec. *Vm.*)

℞. Lichenis Islandici . semunciam.
Coque, antea per sexagesimas quinque Aqua bull. bene ablutum, cum
Aquae communis . libris tribus ad librar. duar. colat. remanent. (*Ba.*)

Taur. *DB.* Lichenis unciam per horam in Aqua calente digerere, tunc aqua rejecta cum novae libra una et dimid. coquere ad tertiae partis consumptionem et colare.

℞. Lichenis Islandici . semunciam.
Aqua calida bene abluto adde
Aquae octarios duos cum dimidio.
Coque ad sesquioctarium et colat. adde
Syrupi Sacchari . . uncias duas.
Misce bene. (*ParC.*)

Decoctum Lichenis s. Lichenis Islandici (amarum). (*Au*†. AD. Am. B*. Ed. GalM. Lon. LonN. LPC. RC. Suec. *C. CG. E2. Fi. Gr. Re. Sa.*)

℞. Lichenis Islandici unciam unam.
Aquae purae uncias sedecim. (sesquioctarium *E2*.)
Decoque ad unciarum duodecim (octarii *E2*.) colaturae remanentiam. (WW†. B*. *E2*.)

AD. Am. Lon. LonN. *C. CG. Gr. Re.* Lichenis unciam, Aquae sesquioctarium (sesquilibram *Gr*.), pro triente consumendum; — Ed. *Fi.* Lichenis unciam, Aquae libras duas ad uncias sedecim redigendas; — Du. Lichenis uncias duas, Aquae libras duas ad uncias sedecim redigendas; — Suec. Lichenis libram et Aquae uncias viginti quatuor ad sedecim redigendas; — RC. Lichenis semunciam, Aquae font. sesquilibram ad libram unam coquenda et sub finem addendo Rad. Liquirit. drachmam vel Mellis puri semunciam; — LPC. Cetrariae drachmas quinque, Aquae sesquioctarium, decoquere ad octarium et colare.

℞. Lichenis Isl
unciam dimid ad unam.
Aquae . . . . . libras duas.
Decoque ad unius librae colat. et adde
Mellis albi . . . unciam unam.
Liqua. (GalM.)

℞. Lichenis Islandici . semunciam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut colaturae sesquilibra obtineatur; post horae quadrantis ebullit. adde
Syr. Althaeae.
— Papav. albi, sing. unciam unam.
Misce. (*Sa.*)

℞. Lichenis Islandici drachmas duas.
Salep . . . . grana decem.
Cinnamomi . . . . grana octo.
Aquae . . . uncias duodecim.
Coque ad unciar. sex rem. et adde
Syrupi Sacchari . quantum vis.

Misce. (*Au*†.)

Bitter. — Bei Lungenschwindsucht, weißem Fluß, Keichhusten empfohlen. — Gabe, vier Unzen drei oder vier Mal täglich.

Tisane de Lichene Hospit. Paris. (*Va.*)

℞. Lichen. Isl. amaritie privat. unciam.
Aquae . . . . . libras tres.
Coque ad tertiam partem, cola et adde
Syrupi Althaeae . . uncias duas.

Warm, kleine Tassenweise, mit Milch oder allein, bei Brustkrankheiten. Manche nehmen statt des Wassers Molken.

Decoctum Lichenis Islandici lacteum. (*Au*†.)

℞. Lichenis Islandici unciam unam.
Seri Lactis . . . uncias viginti.
Decoque ad uncias duodecim et adde
Sacchari lactis . drachmas sex.

Potio nutriens et sedans. (*B.*)

℞. Lichenis Isl. abluti uncias duas.
Rasurae Cornu Cervi unciam unam.
Aquae . . . quantum sufficit ut potio gelatinosa formetur, cui adde
Laudani liq. Sydenh. gutt. quindecim.

Allmälig den Tag über zu nehmen. — Bei Lungenschwindsucht mit großen Schmerzen empfohlen.

Decoctum pectorale nutriens. (*B.*)

℞. Lichenis Islandici . uncias duas.
Turionum Abietis . semunciam.
Aquae . . . quantum sufficit ut colaturae libra una obtineatur.

Decoctum pectorale nutriens et incitans s. Lichenis Islandici compositum, Tisana tonico-expectorans. (Wür†. *Au*†. LH. *B. Sw.*)

℞. Lichenis Isl. abluti unciam unam
Chinae . . . . . semunciam.
Serpentar. Virg. drachmam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut decocti unciae quatuor obtineantur, quarum colaturae adde
Emulsion. gummos. uncias quatuor.
Misce bene. (*B.*)

℞. Lichenis Islandici,
Hederae terrest., sing. semunciam.
Chinae . . . . drachmas duas.
Aquae . . . . quantum sufficit ut dec. librae duae obtineantur; adde
Lactis vaccini . . uncias decem.
Misce bene. (*B.*)

℞. Rad. Polygalae Virg. drachmas duas.
Lichenis Islandici . semunciam.
Dulcamarae . drachmam unam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Colaturae unciarum quatuor adde
Lactis vaccini . . . uncias sex.
Misce bene. (*B.*)

℞. Lichenis Islandici . semunciam.
Rad. Polygalae amar. unciam unam.
Aquae . . . . . libras tres.
Coque ad librar. duar. colaturam. (*Sw.*)

LH. Lichenis drachmas duas, Polygalae unam, cum Aquae sesquilibra ad libram unam decoquere, colare et refrigerato addere Syrupi communis unciam unam. — Gabe, drei Unzen, zwei Mal.

℞. Lichenis Islandici drachmas sex.
Fungi Melitensis,
Rad. Consolidae majoris,
— Polygal. amar., sing. semunciam.
Conserv. Rosar. rubr. uncias duas.
Seminum Hyoscyami drachmas tres.
Aluminis . . . sesquidrachmam.
Aquae fontanae . libras quinque.
Decoque ad librarum trium cum dimidia remanentiam et colaturae adde
Mellis rosati . . sesquiunciam.
Misce bene (Wür†)

℞. Ligni Quassiae . drachmas duas.
Lichenis Islandici drachmas sex.
Aquae . . . . uncias tredecim.
Decoque ad unc. decem reman. et adde
Extracti Myrrhae drachmam unam.
Tartari stibiati . . grana duo.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel. (*Au*†.)

℞. Lichenis Islandici . uncias duas.
Boleti Salicis,
Summitatum Millefolii,
Florum Salicariae,
Passular. min., sing. semunciam.
Harum specierum semunciam coque cum Aquae octario uno. (*Au*†.)

Saccharolatum Lichenis Islandici. (HG†.)

℞. Lichenis Islandici concisi libram unam.
Coque cum
Aquae communis libris viginti quatuor ad colaturam librarum octo cum expressione cola et residuum cum eadem quantitate aquae pari modo decoque. Decocta commixta evaporent ad remanentiam librarum quinque, quibus semirefrigeratis admisceantur
Spiritûs Vini rectificatissimi librae quatuor.

Gelatina hac operatione praecipitata per linteum colando separetur, tunc adhuc humida in vase porcellaneo cum

Sacchari pulverati . unciis octo commixta, balneo vaporis agitando ad siccum evaporet et in pulverem subtilem redigatur, qui in vitro bene obturato servetur.

Gelatina s. Mucilago Lichenis Islandici s. de Lichene Islandico. (BorC†. Ful†. Han† HassP†. HC†. HN†. Li†. Sax2†. Wür† *Au*† *Hu*† Ams An. B. Bel. Fenn. Gal. LP. Lus. Suec Taur. *Ca. DB. Fi. Gr. Re. T.*)

1) Ohne den bittern Stoff.

℞. Lich Isl. Aqua alcalina ablut. libram.
Aquae fontanae libras duodecim.
Decoque ad dimidium, cola, exprime et ad locum frigidum repone, ut in gelatinam abeat. (Suec.)

HC†. Lichenis Aqua frigida loti unciam cum Aquae fervidae libris ad colaturam unciarum trium decoquere, per linteum fortiter exprimere et solvere Sacchari unciam, in syrupum coquere, qui despumatus refrigeratione in gelatinam cogatur et sit ponderis unciarum quatuor. *Gelatina edulcorata:* Saccharolati Lichenis Islandici partem unam, Aquae fervidae partes tres, coque paulisper et solutione peracta, refrigeratione fiat gelatina; — Han†. Lichenis Aqua alcalina loti uncias duas, Aquae uncias triginta ad sex redactas et Sacchari libras quatuor; — *Gr.* Lichenis uncias quatuor, Aquae q. s. ut post expressionem sesquioctarius obtineatur, Sacchari albi uncias quatuor.

℞. Lichenis Islandici partem unam.
Aquae frigidae . . partes octo.
Macera per semihoram, liquidum rejice et residuo infunde
Aquae . . partes triginta duas.
Decoque ad dimidium, tunc ad mellis consist. evaporatum in locum frigidum repone. (Sax†.)

Gal. *Ca. Fi. Re.* et *T.* coquere lente Lichenis uncias duas in Aquae q. s., liquidum rejicere, coquere deinde bis residuum in Aqua (unciis duabus), decocta conjungere, addere iis Ichthyocollae solutae drachmam unam (duas *Re.*) et Sacchari albi uncias quatuor, colare, clarificare et evaporando ad semilibrae reman. consumere; — *DB.* Lichenis aquâ alcalinâ loti unciam, Aquae bullientis uncias quatuor, digerere in temperatura 70° R. per horas quatuor, exprimere, colare, Sacchari albissimi pulver. unciam addere et hoc frigido in gelatinam cogere; — HassD†. Lichenis Isl. uncias tres, Aquae fervidae quantum sufficit, infunde et rejice aquam, lichenem coque in Aquae libris tribus ad unciarum decem rem., quae leni igne ad sex evaporent; — Sax2. Lichenem Aquae fervidae q s. infundere et illem post decem horae sexagesimas defundere lichenem Aqua frigida ablutum coquere cum Aq font. partibus duodecim ad colat. partium novem, quae ad gelatinae consistentiam inspissentur; — Taur. Decocto Lichenis Isl. percolato adde Sacch. sesquiunciam et nova ebullitione circiter ad duas tertias partes consume et in locum frig. sepone, ut concrescat; — GalP. Lichenem infundere per tres dies cum Aqua frigida, quâque sextâ horâ renovandâ, aut infundere cum Aqua frigida, ter repetitâ et ad 60° R. semper subactâ.

2) Mit dem bittern Stoff.

℞. Lichenis Islandici . . libram.
Aquae . . . . . libras viginti.
Decoque ad librar. sex reman., cola fortiter exprimendo et in locum frigidum sepone. (Fenn.)

BorC†. Lichenis unciam unam et Aquae duodecim ad octo redig; — *Huf*†. Lichenis q. s. ut Aquae quantitas arbitraria in mucilaginem redigatur; — *Au*†. Lichenis unciam et Aquae duodecim ad octo redigere.

℞. Lichenis Islandici . uncias tres.
Aquae . . . libra quatuor.
Decoque ad tertiae partis reman., cola, exprime, vaporando ad libram unam consume et adde
Syrupi cujuslibet . uncias tres.
Misce bene. (*Au*†.)

℞. Lichenis Islandici sesquiunciam.
Aquae . . . . . libras duas.
Decoque ad colat. unciar. sex et adde
Sacchari albi . uncias quatuor.
Ad syrupi spissi consistentiam redacta refrigescant. (Li†. Ams. An. B. Bel. Lus.)

HN† Lichenis uncias duas, Aquae dest. triginta ad colaturam unciarum sex, Sacchari albissimi quatuor; — GalP. Lichenis uncias duas ebullire cum Aquae s. q. per horam, exprimere, colare et liquorem depositum decanthare; addere Sacchari uncias quatuor et Ichthyocollae in Aquae frigidae unciis duabus maceratae drachmam, iterum semper agitando ebullire ad aptam consistentiam, ut abeat per refrigerationem in gelatinam, remoto pelliculo in superficie formato; — LP. Lichenis sesquiunciam, Aquae quantum sufficit, coctionem per horam, colare, inspissare ad gelatinae

consistentiam et addere Sacchari albi unciam.

Regnault: Lichenis uncias sex, Aquae octarios tres, quadrantem horae ebullitionis, colaturae evaporationem ad octarium usque, Sacchari uncias sex et coctionem ad syrupi spissi consist. — *Ide* et *Chevallier* coquere proposuerunt in globo stanneo cochlea instructo, in balneo aquae, Lichenis Aqua calida loti unciam cum Aquae unciis quinque per horas tres, decoctum colare et exprimere, addere colaturae Sacchari unciam, lente ad unciar. quatuor liquidi reman. consumere, in ollam effundere et postquam concreverint, pelliculam in superficie formatam removere. (GalF.)

3) Mit dem bittern und einem adstringirenden Stoffe.

℞. Lichenis Islandici,
Musci pulmonarii,
Fungi Melitens., sing. drachm. sex
Aquae . . . quantum sufficit.
Decoque ad colaturae sesquilibrae reman, inspissa ad gelatinam, cui adde
Sacchari rosati . sesquiunciam.
Misce bene. (Würt†.)

℞. Lichenis Islandici sesquiunciam.
Musci albi querni,
Petalorum Rosarum,
Rad. Polygal. amar., sing. semunciam.
Ichthyocollae . . . . unciam.
Aquae sufficientem quantitatem.
Coque per horas duas et adde col.
Elaeosacchari Citri uncias duas.
Misce bene (*Au*†.)

Ful†. Lichenis Isl. uncias tres, Fungi Melit. unam, Aquae libras quatuor ad tertiam partem redig., evaporationem colaturae ad consistent. aptam et Syrupi Sacchari uncias tres.

Diese Gallerte ist nach der ersten Formel analeptisch und der Gährung unterworfen, nach der zweiten tonisch, und adstringirend und selbst blutstillend nach der dritten. — Gabe, zwei bis sechs Löffel, ein bis zwei Unzen täglich.

Gelatina Lichenis Islandici siccata. (GalP.)

℞. Lichen Island.
Sacchari albi, sing. . . libram.
Lichenem principio amaro privatum coque cum Aqua per horam, exprime, cola et evapora semper agitando ad consistentiam satis compactam; exsicca in hypocausto, in pulverem redige et in vitro bene clauso conserva. — Zur schnellern Bereitung der Moosgallerte sehr passend, wozu GalP. folgende Vorschrift giebt:

℞. Gelatin. Lichen. Island. siccat. drachmas decem.
Sacchari albi . . . uncias tres.
Aquae communis . . uncias sex.
Coque ad remanentiam unciarum octo.

Gelatina Lichenis cum China. (Gal. GalP.)

℞. Lichenis Islandici . uncias duas.
Ichthyocollae . . . drachmam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque lichen leviter in aqua, qua rejecta, coque denuo bis e serie, duobus decoctis adde ichthyocollam separatim dissolutam et
Syrupi Chinae vinosi uncias sex.
Post levem ebullitionem cola, evaporatione pro parte dimidia consume et ad refrigerandum repone.

Gelatina Lichenis opiata.

℞. Lichenis Islandici,
Ras. Cornu Cervi, sing. semunciam.
Aquae . . . . uncias octo.
Decoque ad unciarum quatuor remanentiam et adde colaturae
Syrupi Opii . . . . . unciam.

Pasta lichenifera s. cum Lichene Islandico. (Sax† GalH. GalP.)

℞. Lichenis Islandici . libras duas.
Sacchari albi,
Gummi Senegal, sing. libras octo.
Extr. Opii gummos. drachmas duas.
Aquae Flor. Aurant. semilibram.
Coque lichen in Aqua per aliquot tempus; liquido rejecto, coctionem continua, colaturam cum saccharo et gummi separatim dissoluta commisce et ad mellis spissi consist. evaporatis adde extractum in aquae flor. aurant. parte una solutum, evaporationem continua, addendo aquae aromaticae quod restat, et coque donec massa non amplius manui adhaereat. (GalH.)

℞. Lichen. Island. . . . libram.
Gummi Arabic. . libras quinque.
Sacchari albi . . libras quatuor.
Coque Lichenem cum Aquae s. q. usque ad ebullitionem; remoto liquore coque iterum cum nova Aquae quantitate per horam, exprime et cola, adde deinde Gummi et Saccharum et his solutis evapora leni igne ad consistentiam pastae. [Ad praeparandam *Pastam Lichenis opiata* adde Extracti Opii drachmam] (GalP.)

℞. Gelat. Lichen. Isl. partes duodecim.
Sacchari pulverati partem unam.

Gummi Arabici pulv. partes duas.
Misce saccharum et gummi cum gelatina adhuc calida. (Sax†.)

Gelatina Fuci crispi s. Lichenis Carragaheen. (HC†.)

℞. Fuci crispi . . drachmas tres.
Coque cum
Aquae communis libra ad colaturam librae dimidiae.
Per linteum fortiter exprime et solve
Sacchari albi . . . . unciam.
Refrigerando fiant gelatinae unciae septem.

Trochisci Lichenis Islandici. (GalP. GalH. GalP.)

℞. Lichenis . . . . libram unam.
Aqua frigida ablutum coque cum
Aquae . . . . libris sex
per sexagesimas viginti; colaturae adde
Sacchari albi . . libram unam.
Evaporata lente ad siccum pulvera; hujus pulveris et Sacchari albi partes aeq. commixtae cum Aquae q. s. in pastam redige in trochiscos dividendam.
℞. Gelatin. Lichen. Island. siccat. libram,
Sacchari albi pulv. . libras duas,
Gummi Arabici pulv. sesquiunciam,
Aquae communis . . . . q. s.
Misce in mortario, ut fiat massa homogenea, et divide in trochiscos granorum sedecim. (GalP.)

Electuarium incrassans. (Wür†.)

℞. Gelat. Lichen. Isl. (Wür†.) uncias duas.
G. Tragacanth. . . . unciam.
Rad. Consolidae maj. pulv. drach. tres.
Conserv. Rosar. rubr. drachmas sex.
Syrupi Capitum Papaveris . q. s.

Jus pectorale s. Decoctum cum Carne pectorale. (Ca.)

℞. Lichenis Islandici . semunciam.
Helices (Pomatia) albos . no. 6.
Cordis vervecini partem dimidiam.
Pulmonis vitul. concis. unc. quatuor.
Aquae . . . sesquioctarium.
Coquendo partem tertiam consume.

Hydromel anticatarrhale. (Ca.)

℞. Lichenis Isl. Aqua bull. abluti uncias duas.
Foliorum Hyssopi . semunciam.
Hydromellis . . . libras duas.
Macera per plure dies, cola et adde
Sacchari albi . . uncias tres.
Filtra denuo.

Lignum Agallochum.

Lignum Agallochi veri s. Aloës s. Calambac s. aquilinum, Xylaloës; Aloëholz, Paradiesholz; Bois d'Aloes ou de Calambac, de Calembouc (*Gal.*); Calambuk, Agha luchie (*Ar.*); Aggur, Agor (*Beng. Hin.*); Sukkiang (*C.*); Chin hiam (*Co.*); Aghir (*Duk.*); Legno aloe, Agallocho, Xilaloe (*I.*); Udhindi (*Pe.*); Legno aloes (*His.*); Pao de aloes (*Lus.*); Aguru (*Sa.*).
Br†. Wir† *M*†. Fer. His3. GalP. Taur. *A. Fl. G. Gr. Sp.*

Dieses Holz ist knotig, sehr schwer, derb, fettig und besteht fast ganz aus Harz: es ist außen röthlichbraun, auf der Durchschnittsfläche grauer und mit schwarzen Flecken gezeichnet. Es hat einen starken balsamischen Geruch und einen bittern Geschmack. Es brennt unter Verbreitung eines sehr angenehmen Geruchs.

Man leitet es von Excoecaria Agallocha, L., Aloexylum Agallochum, *Lour.*, einem Baume (Dioecia Triandria, L.; Euphorbiaceae, *J.*) Cochinchina's (*Rumph.* Amb. II. t. 79. f. 80.), oder von Aquilaria Agallocha, *Roxb.*, A. malaccensis *Lam.*, und A. secundaria, *DC.*, her.

Tonisch, reizend.

Species cordiales temperatae. (Wir†.)

℞. Sericei crudi usti,
Eboris ad albedinem usti,
Corallii rubri,
— albi, singulorum semunciam.
Margaritarum praep. sesquiunciam.
Rad. Doronici,
— Behen albi,
— — rubri, sing. drach. tres.
Ligni Agallochi . . semunciam.
Cinnamomi,
Caryophyllorum.
Ossis cordis cervini, sing. drach. tres.
Hyacinthi,
Smaragdi,
Sapphiri, sing. . . drachmam.
Croci . . . . scrupulos duos.
Fiat pulvis, cui adde
Foliorum Auri,
— Argenti, sing. quantum vis.

Ein abgeschmacktes Präparat, welches man ehedem von einem halben Scrupel bis zur halben Drachme bei bösartigen Fiebern, Herzklopfen und Ohnmachten von Furcht gab.

Extractum Ligni Aloës s. Agallochi. (Br†. Pal†. Wir†.)

℞. Ligni Agallochi . quantum vis.
Alcoholis concentrati . . q. s.
ut lignum penitus extrahatur; tinctu-

ram in balneo aquae vaporationi subjice et quod, Alcohole elicito, restat, serva. — Man setzte ehedem dieses Extract zu Haupt-Pulvern und Pillen. — Gabe, ein bis zwei Gran.

Tinctura s. Essentia Ligni Aloës s. Agallochi. (Br†. Wir†. His. HisS.)

℞. Ras. Lig. Agallochi sesquiunciam. Alcoholis concentrati semilibram. Post sufficientem macerationem filtra (Br†. Wir†.)

His. Ligni partem unam (duas HisS.) et duodecim Alcoholis.

Reizend, magenstärkend, auf den Uterus, gegen Kopfschmerz und analeptisch wirkend. — Gabe, zwanzig bis vierzig Tropfen.

Lignum Aquilae.

Lignum Aspalathi, Aloës, Aloëxylon, Agallochum; Adlerholz; Bois d'Aigle (*Gal.*); Legno d'Aquila, aspalato (*I.*).

Br†. Wir†. *Be. Fi. G. Gr.*

Dieses Holz ist schmutzig gelb, wenig harzig, faserig, bisweilen schlammig und schwer zu zerbeißen. Der Geschmack ist gewürzhaft, aber nicht bitter. Der Geruch ist schwach, moschusartig.

Es stammt, wie man glaubt, von Aquilaria ovata, *Cav.*, malaccensis, *Lam.*, einem Baume (Decandria Monogynia, L.; Samydeae, J.), welcher in Ostindien wächst. (*Cav.* Diss. bot. 7. p. 377. t. 224.)

Ein wenig gebrauchtes Reizmittel.

Lignum Brasiliense.

Lignum Brasilianum rubrum s. Fernambuci; Brasilienholz; Bois de Brésil, de Fernambouc (*Gal.*); Ibirapitanga (*Bras.*)

Br†. L†. GalP. *G. Gr.*

Dieses Holz ist schwer, hart, geruchlos und von wenig bemerkbarem Geschmack; die rothe Farbe desselben zeigt verschiedene Abstufungen.

Es kommt von Caesalpinia echinata, *Lamk.* oder crista, Brésillet (*Gal.*), einem Baume (Decandria Monogynia, L.; Leguminosae, *J.*) Brasilien's (*Piso* Bras. p. 164. Ic. *Bert.* Bild. t. 45. fig. 2.)

Adstringirend, ehedem bei Diarrhöe angewendet, heutzutage aber außer Gebrauch.

Infusum Ligni Brasiliensis (*Gr.*) e Ligno et Aqua bulliente. Reagens.

Lignum Campechianum.

Lignum Campechiense s. Campechense s. Campescanum s. Brasilianum rubrum s. Sappan s. coeruleum s. Haematoxyli; Campescheholz, Blauholz; Bois de Campeche (*Gal.*); Logwood (*Ang.*); Campesketraet (*D.*); Palo de Campeche (*His.*): Campechehout (*Bel.*); Legno di Campeggio (*I.*); Niebieskie drzewo (*Pol.*); Pao de Campeche (*Lus.*); Campechetraed (*Suec.*).

Bor5†. Br†. Ful†. Ham†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. Sax2†. Wir†. Wür†. *M*†. AD. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. GalP. Gen. LP. LPC. LonN. Pm. Pol. R. RC. Suec. Taur. *Be. Br. C. CG. G. Gr. Par. Re. Va.*

Das Campescheholz, welches wir ohne Rinde und Bast erhalten, ist hart, sehr dicht, schwer und außen graulichbraun. Die frische Durchschnittsfläche hat eine dunkelrothe, etwas ins Gelbliche ziehende Farbe mit der Länge laufenden schwärzlichen Adern. Queer durchgesägt zeigt es kleine, wellenförmig gebogene, dunkelrothe Ringe. Der Geschmack ist süßlich, adstringirend, hintennach etwas bitter. Es färbt den Speichel bläulichroth.

Es kömmt von Haematoxylon Campechianum, L., einem Baume (Decandria Monogynia, L.; Leguminosae, J.) Südamerica's. (*Blackw.* t. 498. *Plenck* t. 329. *Bert.* Bild. III. 43. f. 2. *Desc.* Fl. Ant. I. 73.)

Chevreul hat darin einen besonderen färbenden Stoff, das Hämatoxylin oder Hämatin (Haemotoxylinum, Haematinum), Hématine (*Gal. DB.*) entdeckt.

Adstringirend, tonisch.

Infusum Ligni Campechiensis (*E2. Gr.*) e Ligno et Aqua bulliente. Reagens.

E2. Ligni semunciam, Aquae bullientis octario per horas duas ad tres infundere et exprimere. — Ein Eßlöffel Kindern alle zwei, drei Stunden bei Cholera.

Decoctum Haematoxyli s. Ligni Campechiani s. Campechensis. (Ful†. Wür†. AD. B*. HisS. RC. *E2. Re. Sa. Sw.*)

℞. Ligni Campechiani . . unciam. Aquae purae . . libras quatuor. Digere primum, tunc coque ad dimidii remanentiam usque et cola. (His. HisS.)

AD. Ligni Campech. rasi unciam, Aquae octarios duos, coque ad remanentiam dimidii; — B*. et *E2.* Ligni drachmas duas ad quatuor, Aquae libram et decoctionem ad unciar. sex colat. reman.; — *Sa.* Ligni unciam et Aquae q. s. ad colat. librae unius reman.; — *Sw.* Ligni rasp. unciam, Aquae libram, reductionem ad dimidium et, si necesse est, additionem

Tinct. Chinae unciae unius et Tinct. sedativae guttarum triginta; — Ful†. Ligni unciam, Aquae libras duas et decoctionem ad dimidium.

Du. RC. *Re.* Ligni rasi sesquiunciam, Aquae font. libras duas ad unam decoquere et sub finem addere Corticis Cassiae (Cinnamomi) drachmam.

℞. Ras. Ligni Campech. uncias duas.
Aquae fontanae . libras quatuor.
Decoque ad librarum duarum cum dimidia remanentiam et adde
Alcoholis . . . uncias quatuor.
Cinnamomi . scrupulos quatuor.
Liquorem post unam vel duas ebullitiones cola. (Wür†.)

Adstringirend, bei Durchfall, chronischer Ruhr, Lederfluß und Blutungen empfohlen. — Gabe, eine bis zwei Unzen alle vier Stunden und öfter.

Extractum Ligni Campechiani s. Campechiensis s. Haematoxyli. (Bor5†. Ful†. Han†. HassP†. HC† HN†. Sax2†. Wür†. AD. Am. Du. Ed. LonN. LPC. Pol. RC. *C. CG. Gr. Re.*)

℞. Ligni Campechiani partem unam.
Aquae communis . partes octo.
Macera per horas viginti quatuor, coque deinde per horae quadrantem et cola fo titer exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor quo facto liquores commixti, post viginti quatuor horarum sepositionem, ad aptam consist. evaporent. (Sax†.)

℞. Ras. Ligni Campech partem unam.
Aquae fontanae . . partes octo.
Coquendo ad dimidium redacta cola exprimendo; tunc liquor ad massae pil. consist. evaporet. (AD. Am. Du. Ed *C.*)

LonN. *CG. Gr.* et *Re.* Ligni libram, Aquae ferventis congium per horas 24 macerare, tum ad octarios quatuor decoquere et liquorem adhuc calentem colatum ad idoneam crassitudinem inspissare; — RC. ut extractum Gentianae luteae.

℞. Ligni Campechiani partem unam.
Aquae bullientis . partes octo.
Coque leviter per horae quadrantem et cola cum expressione; residuum cum Aquae partibus quatuor coctum itidem coletur et exprimatur; tunc liquores commixti et post sufficientem sepositionem decanthati leni calore ad extracti consistentiam evaporent. (Bor5†. HN†.)

Han†. coquere binis vel ternis vicibus sequentibus Ligni partem unam in Aquae sex et colaturas conjunctas vaporando inspissare; — Pol. coquere quater per horae quadrantem quaque vice cum Aquae partibus octo; — Bor5†. Sax2†. ut extractum Cascarillae (sed evaporet ad siccum Sax2†.); — HC†. ut extractum Angusturae; sed ad quarti gradus extracti consistentiam; — LPC. ut extractum Gentianae; — HassP†. ut extractum Colombo.

℞. Rasurae Ligni Campechiani q. vis.
Alcoholis . . quantum sufficit ut lignum quatuor digitorum crassitiem tegatur; stent blando calore in digestione et decanthentur; residuo cum Aqua per horam cocto et cum expressione colato, colatura in balneo aquae ad mellis consist. evaporet, addita pedetentim tinctura et inter continuam agitationem, ut massa homogenea neque grumosa obtineatur. (Ful†. Wür†.)

Gabe, eine bis zwei Drachmen, in einem passenden Vehikel.

Mixtura cum Extracto Haematoxyli, Potio adstringens. (E2.)

℞. Extr. Lig. Campech. drach. tres.
Aquae . . . . uncias septem.
Tincturae Catechu drachmas duas.
Gabe, zwei Löffel alle drei oder vier Stunden, bei Durchfall und Ruhr.

Elixir adstringens. (Ham†. *Au*†.)

℞. Extr. Lig. Campech. drachmas duas.
Aquae destillatae uncias quatuor.
Elixir acid. Hall. drachmam unam.
Misce exacte. (Ham†.)

℞. Ext. Ligni Campech. semunciam.
Vini rubri . . . . uncias duas.
Gabe, alle zwei Stunden sechszig Tropfen. (*Au*†.)

Mixtura adstringens. (*Sw.*)

℞. Extr. Lig. Campech. drachmas tres.
Aquae Cinnam. spirit. sesquiunciam.
Contere et adde
Aquae . . . . uncias septem.
Tincturae Kino drachmas duas.
Gabe, alle vier oder fünf Stunden zwei Löffel.

Solutio Haematini (*Gr.*). Lignum pulv. per horas circiter sex in Aqua temp. 120—130° F. macera, filtra, ad siccum vapora, extractum per hor. 24 in Alcohole macera, filtratum vaporatione inspissa, adde Aquam, et spontaneae sicccationi derelinque ut crystalli haematini prodeant, quae Spiritu Vini ablutae in Aqua dissolvantur — Reagens auf verschiedene Säuren und Alkalien.

Lignum fossile.

Braunkohle

Oleum empyreumaticum e ligno fossili: Braunkohlenöl.

HC†.

Pilulae antarthriticae Lucas. (HC†.)

℞. Olei empyreum ex ligno fossili, Stibii sulphurati nigri, sing. semunciam.
Olibani pulverati . . drachmam.
Pulveris Stipitum Dulcamarae drachmas tres.
M. f. pil. granorum duorum.

Lignum nephriticum.

Griesholz; Bois néphrétique (*Gal.*); Palo nefrítico (*His.*)

Br†. Wir†. *M*†. Fer. Gal. HiS. *Be. G. Gr. Sp.*

Dieses Holz ist sehr schwer, geruchlos und besteht aus einem weißlichen, sehr derben Bast und einem röthlichen, sehr harten Kern; die Rinde ist leicht, innen faserig, auswendig schwammig und geborsten. Es hat einen nur wenig bemerkbaren, schwach pfefferartigen Geruch.

Einige leiten es von Guilandina Moringa, L., Andere von Mimosa Unguis cati, L., und noch Andere endlich, nach Wirey, von einer Cissampelos her. Es kömmt aus Neu-Spanien.

Ehedem schrieb man ihm kräftige harntreibende Eigenschaften zu. Heutzutage ist es nur noch wenig im Gebrauch.

Lignum Rhodii.

Rosenholz, Rhodiser Holz; Bois de Rhodes, de rose, de Chypre (*Gal.*).

Br†. Sax†. Wir†. *M*†. Ams. Be. Fer. GalP. HiS Suec. *Be. Br. G. Gr Sp.*

Dieses Holz ist hart, schwer, gelbbraun, in der Mitte dunkler als im Umkreis und besteht aus concentrischen sehr dichten Schichten. Der Geschmack ist etwas bitter; der Geruch, besonders gerieben, stark rosenartig.

Es kommt von der Wurzel und bisweilen von dem untern Ende einer Pflanze, welche man allgemein für Convolvulus scoparius, L., hält, einen großen Strauch (Pentandria Monogynia, L.; Convolvulaceae *J.*) der Canarischen Inseln. Manche Schriftsteller leiten es von Genista Canariensis, L., her; jedoch ist dieß weniger wahrscheinlich. Ein L. rhodium liefert auch Amyris balsamifera. (*Gr.*)

Reizend, wenig gebraucht.

Oleum Ligni Rhodii essentiale. (Br†. Ful†. Pal†. Wir† Gal. GalP. *Gr. Re.*)

℞. Ras. Ligni Rhodii partes decem.
Salis communis . partem unam.
Aquae purae . . partes viginti.
Post horarum duodecim macerationem fiat destillatio et oleum in fundo producti eximatur. (Gal.)

Br† Wir†. Ligni partes sex, Salis unam et Aquae triginta sex; — Ful†. Ligni unam, Aquae quatuor, absque sale et quatuor dies digestionis; — Pal†. Ligni unam, Aquae sex et quinque vel sex dies digestionis; — GalP. ut oleum Cinnamomi.

Dieses Oel wird mehr als Schönheits-, denn als Arzneimittel gebraucht.

Aqua Ligni Rhodii destillata. (Gal.)

℞. Ligni Rhodii raspati partes duas.
Aquae communis partes sedecim.
Post duodecim horarum infusionem destillent partes octo.

Tinctura Rhodii. (*Gr.*)

℞. Ligni Rhodii ras. uncias quatuor.
Spiritus rectificati . . octarium.
Macera per dies quatuordecim et cola. — Eine halbe bis eine Drachme täglich drei Mal in schleimigen Mixturen.

Ligusticum.

Ligusticum Levisticum, L., officinale, K., Angelica *Dec.*; Liebstöckel, Badekraut, Badekrautliebstöckel, Bärmutterkraut; Livèche (*Gal.*); Common lovage (*Ang.*); Apich weliky, Apich libecek (*B.*); Lovstilk, Lobstik (*D.*); Ligustico (*His.*); Laveskruid (*Bel.*); Livistico (*I.*); Lakotnego ziele (*Pol.*); Levistiko (*Lus.*); Libbsticke (*Suec.*).

A†. Bor5†. Br†. Han†. HasP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. *M*†. Ams. B. Bel. D. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. Pol. R. Suec. Taur. *Be. Br. G. Gr. Pid. Sp.* Z.

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Pflanze des gemäßigten Europa's (*Blackw.* t. 275. *Hayne* VII. t. 6. Düss. off. Pfl. VI. 12. *Zorn* Ic. pl. t. 233.)

Man wendet die Wurzel und die Saamen an.

Die Wurzel (radix Levistici s. Lybistici s. Ligustici s. Laserpitii Germanici) ist einen Fuß lang, fleischig, sehr ästig, außen braungelb, innen weißlich und kurzzelig. Sie hat einen starken, durchdringenden, wenig angenehmen Geruch und einen anfangs süßlichen, hinterher scharfen

und widerlichen Geschmack. — Die Saamen sind länglich, gelb und fünfrippig.

Reizend treibend, harnabführend, bei bösartigen Fiebern, unterdrückter Menstruation, Wassersucht.

Ligusticum aquilegifolium s. Cornubicum liefert ein Harz (Resina Ligustici (*Gr.*).

Infusum aquosum (HN†.) Uncia dimidia ad unam ad colaturam unciarum octo. — Löffelweise alle zwei Stunden.

Extractum Ligustici s. Levistici. (Bor5†. O†. Sax†. Pol.)

℞. Radicis Levistici, .
Alcoholis, singulorum libras duas.
Aquae communis . libras novem.
Digere per horas duodecim, cola exprimendo, alcoholem destill. elice et residuum ad aptam consist. in-pissa. (Pol.)

Bor†. O†. et Sax†. Radicis partes duas, Alcoholis tres et novem Aquae; — Bor5†. ut extractum Aconiti.

Essentia Levistici. (Wir†.)

℞. Radicis Levistici . uncias duas.
Seminum Levistici unciam unam.
Alcoholis . . . uncias decem
Post sufficientem digestionem cola exprimendo et filtra.

Reizend, Gegengift, blähung- und harntreibend. — Man hat sie bei Wassersuchten empfohlen.

Ligustrum.

Ligustrum vulgare, L.; Liguster; Troène (*Gal.*); Privet (*Ang.*); Liguster (*Bel. D Suec.*); Alhena jermanica (*His.*); Liguetro (*I.*); Zoba (*Pol.*); Altena (*Lus.*).

Wir†. *Gr. Re. Sp.*

Ein Strauch (Diandria Digynia, L.; Jasmineae, *J.*) Europa's. (*Zorn* Ic. pl. t. 112.)

Man wendet die Blätter und die Blüthen an

Die Blätter (folia Ligustri) sind lanzettförmig, ganz und ganzrandig, glatt, von bitterem und adstringirendem Geschmack. — Die weißen, angenehm riechenden Blüthen bilden kleine Trauben.

Schwach adstringirend, nicht häufig gebraucht.

Aqua Ligustri. (Pal†.)

℞. Florum Ligustri . partem unam.
Aquae . . . . . partes tres.
Destillet pars una cum dimidia.

Lilium.

Lilium candidum, album, L.; weiße Lilie; Lis blanc (*Gal.*); White lily (*Ang.*); Lilium bjle (*B.*); Hvide lilie (*D.*); Azucena blanca (*His.*); Witte lelie (*Bel.*); Liglio bianco (*I.*); Silia (*Pol.*); Lirio branco (*Lus.*); Hwit lilja (*Suec.*).

Br†. HassP†. Sax2†. Wir†. *M*†. Ams. An. B. Bel. Fer. Gal. GalP. Gen. His3. Lus. Taur. *Br. Br. G. Gr. Sp.*

♃ (Hexandria Monogynia, L.; Liliaceae, *J.*) Eine ursprünglich in der Levante einheimische, in Gärten cultivirte Pflanze. (*Blackw.* t. 11. *Hayne* VIII. 26. *Plenck* t. 273. *Zorn* Ic. pl. t. 462.)

Man wendet die Zwiebel, die Blüthen und die Staubbeutel an.

Die Zwiebel ist eirund, gelblich, außen schuppig, unten mit dicken breiteligen Fasern besetzt. Sie hat keinen Geruch, der Geschmack ist etwas scharf. — Die Blüthen bestehen aus fünf weißen, gerieften Blättern von einem angenehmen, durch Trocknen sich verlierenden Geruch. Die Staubbeutel sind länglich und gelb.

Conserva Florum Liliorum alborum. (Gen.)

℞. Petal. Liliorum alb. partem unam.
Sacchari albi . . . partes tres.
Contere.

Pulpa Lilii. (Gal. GalP. *T.*)

℞. Bulb. Liliorum mund. . q. vis.
In chartam involutos coque sub cinere calido donec facile inter digitos conteri possint; partibus ustis remotis contunde reliqua in mortario marmoreo ut fiat pulpa, per cribrum arcte textum trajicienda.

T. Bulbos pastae farinae alicujus cerealis involutos in furno coquere; — GalP. ut pulpa Prunorum.

Aqua Liliorum. (Pal†. Gal. Gen. Taur. *T.*)

℞. Flor. rec. Liliorum partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Destillet dimidia pars (Gal. *T.*)

Taur. Florum et Aquae ut antea, caet. ut aq. flor. Aurant.; — Pal†. Florum partem unam et tres Aquae; destillet pars una cum dimidia; — Gen. Florum libras quatuor et Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma; destillent librae sex.

Oleum Liliorum alborum. (Br†. HassP†. Pal†. Wir†. Ams. An. B. Bel. Gal. *His.* His3. Sar. Taur. *DB. Gr. T.*)

℞. Petal. Liliorum rec. part. unam
c. dimid.

Olei Olivarum . . partes tres.
Digere in balneo aquae per dies duos, refrigerata exprime et macerationem repete. (Sar.)

HassP†. Florum libram unam, Olei sesquilibram, digere ad humidi evaporationem, oleum exprime et refrigeratum serva. — Gal. Petalorum partem unam, Olei quatuor et tres macerationes sequentes quarum postrema per menses tres producatur.

℞. Petalorum Liliorum partem unam.
Olei Olivarum . partes quatuor.
Post aliquot horas digestionis in aquae balneo, exprime. (An. B. Bel.)

℞. Petalorum Liliorum partem unam.
Olei Olivarum . . partes tres.
Macera per dies aliquot in loco calido, tunc coquendo humidum consume et cola cum expressione. (Ams. His.)

His3. Petalorum libras tres, Olei octo, tres vel quatuor dies macerationis salis calore aut loco calido, caeterum ut antea; T. Florum recent. uncias quindecim cum Olei Oliv. libris quinque solis calore per 3 vel 4 dies macerare, exprimere, oleo filtrato, novos flores addere et ita macerationem bis repetere, supremam per mensem circiter protrahendo, filtrare, exprimere et oleum post aliquot dierum sepositionem clarificatum decanthare; — DB. ut oleum Chamomillae; — Paur. ut oleum Hyoscyami.

℞. Petalorum Liliorum,
Olei Olivarum, sing. partes aeq.
Coquendo humidum consume et exprime (Pal†.)

℞. Petalorum Liliorum partes duas.
Olei Olivarum . . partes tres.
Post octo dies digestionis coque et exprime. (Br†. Wir†.)

Erweichend, schmerzstillend.

Linaria.

Von dieser Gattung kommen vor:

1) *Linaria spuria, Mill.*; Bastardleinkraut; Linaire bâtarde. (*Gal.*)
Gal. *Sp.*

⊙ (Didynamia Angiospermia, L.; Scrofulariae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t. 913.)

Man wendet das blühende Kraut an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit behaarten, eirunden, ganzen Blättern und gelben Blumen mit violetter unterer Lippe, welche einzeln in den Blattachseln auf langen fadenförmigen Stielen sitzen.

2) *Linaria vulgaris, Moe.*; gemeines gelbes Flachskraut, Leinkraut, Frauenflachs; Linaire commune (*Gal.*); Common toad flax (*Ang.*); Vild torskemand (*D.*); Linaria (*His.*); Linaria, Lino selvatico; Urinaria (*I.*); Het gemeene vlachskruid (*Bel.*), Lennek panng maigi (*Pol.*); Flysblomster (*Suec.*).

Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax†. Wir†. *M†.* Fer. Gal. Gen. His3. *B. Br. Gr. Sp.*

♃ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 115. *Zorn* Ic. pl. t. 442.)

Man wendet das blühende Kraut (herba et flores Linariae s. Antirrhini) an; es besteht aus einem einfachen glatten Stängel mit vielen lanzettförmigen, sitzenden, blaugrünen Blättern und gelben eine dichte endständige Aehre bildenden Blüthen. Es hat einen etwas unangenehmen Geruch, welchen es durch Trocknen verliert. Der Geschmack ist bitter und widerlich.

Linimentum antihaemorrhoidale, Unguentum Linariae s. de Linaria. (Ba†. Bor5† Br†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Sar. *Gr. Pie. Sp.*)

℞. Herb. rec. Linar. cum flor.
libram unam.
Axungiae Porci . . libras duas.
Coque lente donec humidum evanuerit, cola et exprime. (Ba†. Bor5†. Han†. HassP†. HN†. O†. Sax†.)

HC†. Herbae libram dimidiam, Adipis unam contundere et coquere etc.; — Sax2. Herbae uncias quatuor in Adipis sulli liquati octo per biduum digerere, deinde coquere ad humidi consumptionem; — Br†. Wir†. *Gr.* Herbae et Axungiae part. aeq.; — Li†. Herbae partem unam et Adipis tres; — *Pie.* quantitates non indicat.

℞. Herbae Linariae uncias duodecim.
— Sedi minoris uncias duas.
— Hyoscyami unciam unam.
Butyri . . . uncias octodecim.
Macera per dies aliquot, coque tunc ad humidi usque consumptionem et cola exprimendo. (*Sp.*)

℞. Herbae Linariae cum floribus,
Axung. Porci, sing. libram unam.
Coque donec humidum evanuerit, cola cum expressione et adde
Ol. Ovorum . . . semunciam.
— Semin. Hyosc. expr.
drachmas duas.
Succi Sedi minoris drachmas tres.
Misce. (Sar.)

Bei schmerzhaften Hämorrhoiden ꝛc.

Linum.

In der Medicin werden angewendet:

1) *Linum usitatissimum*, *L.*; Lein, Lin ordinaire (*Gal.*); Flax (*Ang.*); Buzruk (*Ar.*); Len (*B. Pol.*); Linzaad (*Be.*); Haer (*D.*); Ulsikebinge (*Duk.*); Lino (*Hi.*); Pisi, Pahaha (*Hin.*); Vlasch (*Bel.*); Bidgerammi (*Mal.*); Tokhemkutan (*Pe.*); Linhaça, Linho (*Lus.*); Uma, Atasi (*Sa.*); Lin (*Suec.*); Alleverei, Serru samulverei (*Tam.*); Alivitul (*Tel.*)

A†. Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Ham†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. WW†. A.†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. Gen. HisS LH. LonN LP. LPC. Lus. Pm. Pol. R. RC Suec. Taur. *A. Be. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sp. Z.*

⊙ (Pentandria Digynia, L.; Lineae, *Cant.*) Eine wahrscheinlich im Orient ursprünglich einheimische, durch einen großen Theil Europa's verbreitete Pflanze. (*Blackw.* t. 160. *Plenck* t 243. *Hayne* VIII. t 17. Düss. off. Pfl. VIII. t. 6. *Bert.* Bild II. 55. f 1. *Zorn* Ic. pl. t. 251.)

Der Saame (semen s. semina Lini s. Lin vulgaris s usitatissimi) ist braun, glänzend, eirund, länglich, spitzig, platt, ganz glatt, an den Rändern scharf. Er enthält unter einer schleimigen Schaale einen weißen, öligen Kern von unangenehmem Geschmack.

Der Kern enthält viel Oel, die Schaale dagegen Schleim. Die Saamen sind erweichend. Das Leinkuchenmehl (Farina Lini Placentarum) dient zu Breiumschlägen, muß aber mit etwas Oel ꝛc. versetzt werden.

2) *Linum catharticum*, *L.*, *pratense*; Purgirflachs; Lin purgatif (*Gal.*); Purging Flax (*Ang.*); Liven vildhaer (*D.*); Cantilagua (*His.*); Purgeervlasch (*Bel.*); Lino purgativo (*I.*); Linho purgante (*Lus.*); Villhaer (*Suec.*).

Li†. Sax†. Wir†. *M*†. AD. Du. Gal. Gen. LonN LoP. Pm. R. Taur. *Be. CG. Gr. Par. Re. Sp.*

⊙ Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* t. 363. *Plenck* t 244. *Hayne* VIII. t. 18. *Zorn* Ic. pl t 210.)

Man wendet das Kraut (herba Lini purgativi s. cathartici) an; es besteht aus einem dünnen, in gabelige Zweige getheilten Stängel mit eirundlänglichen, entgegengesetzten, glatten Blättern. Es hat keinen Geruch, aber einen sehr bittern, widerlichen Geschmack.

Ein wenig gebrauchtes Purgirmittel.

Farinae emollientes. (Gal. GalP. *DB. Sp.*)

℞. Farin. Seminis Lini,
— Foenu gr, sing. part. aeq.
Misce. (*Sp.*)

Gal. GalP. *DB.* Farinae Lini, Frumenti et Hordei, sing partes aequales.

Species emollientes pro Cataplasmate. (BorC†. WW†.)

℞. Furfuris triticei,
Sem. Lini contus., sing. part. aeq.
Misce (BorC†.)

WW†. Seminis Lini, Farinae Frumenti, sing. partem unam et Furfuris triticei duas.

Mucilago Seminum Lini. (Gal. Sar. Taur. *Sw.*)

℞. Seminum Lini . drachmas duas.
Aquae tepidae . . sesquiunciam.

Digere super cinere calido per horas viginti quatuor, subinde agitando et cola exprimendo. (Gal.)

Sw. Triturare Aquae bull. et Seminum, sing partes aequales; — Sar. Macerare per horas duodecim Seminum partem unam in Aquae decem, coquere deinde et exprimendo colare; — Taur. Seminum unciam cum Aqferventis sex per horas duodecim digerere, identidem agitando, et sine expressione colare; — GalP. Lini unciam, Aquae bullientis uncias sex digerere per horas sex et exprimendo colare.

Pulvis pro Cataplasmate. (AD. Du.)

℞. Seminum Lini post olei expressionem remanentium
partem unam.
Farinae Avenae . . partes duas.
Misce.

Cataplasma Farinae Lini emolliens, Cataplasma simplex. (Li†. Gal. GalM. GalP. LH. LoP. LPC RC. *DB. Gr. ParC. Ra. Re. Sw.*)

℞. Farinae Seminis Lini quantum vis.
Aquae bullientis, vel
Decocti Althaeae quantum sufficit ut fiat cataplasma. (*Sw.*)

LoP. Lini pulv. libram, Aquae ebull. fluiduncias octo, infunde gradatim, opportune agitando f. bolus; — LPC. Aquae ferventis octarium, Lini semin. contrit. q. s. ut idonea fiat crassitudo; — RC Farinae Lini q. vis cum Aquae fontanae vel Lactis q. s. ad aptam crassitudinem coquere; — *Re.* Farinam cum Aqua bull. miscere et cum Adipis, Olei vel Butyri recent.

q. s. catapl. parare; — *Gr.* Farinae q placet, Aq. fervid q. s.

Sw. praeterea coquere per semihoram Seminum Lini quantitatem arbitrariam cum Aquae q s., addendo Micae Panis duri q. s. ut fiat cataplasma; — LH. Farinae Sem. Lini uncias tres, Decocti expr. Malvae q. s.; — *Ra.* Farinae Hordei et Lini, sing. part. aeq. et Aquae q. s.; — GalM. GalP. *DB.* Farinae Hordei, Frumenti et Lini partes aeq. et Aquae q. s.; — Gal. et *ParC.* Farinarum emoll. uncias quatuor, dilue in decocti emollientis q. s. et coque tunc, addendo Pulpae Specierum emollientium uncias quatuor vel earum ipsar. specier. pulv. unciam unam; — Li†. Seminis Lini pulv. et Lactis vaccini bull. partes aeq. commiscendas.

Infusum Lini s. Lini compositum s. Lini usitatissimi. (*Au*†. AD. Am. B*. Ed. GalM. LonN. LPC. RC. Suec. *C. CG. E2. Fi. Gr. ParC. Ra. Re. Sa. Sw.*)

℞. Semin. Lini contus. unciam unam.
Liquiritiae contusae semunciam.
Aquae bullientis . octarios duos.

Digere prope ignem per horas quatuor (*E2.* duas aut tres) et cola. (*Au*†. AD. Am. B*. LonN. Suec. *C. CG. E2. Gr. Re. Sa. Sw.*)

LPC. Semin. Lini contus. drachmas sex, Radic. Liquirit concis. drachmas duas, Aquae destillat. fervent. octarium; — *Fi.* Aquae libras duas, caeterum ut antea; — Ed. Liquiritiae drachmas duas, Lini unciam et Aquae libras duas; — *Ra.* Lini drachmas duas, Liquiritiae drachmam et Aquae libras duas; — GalM. Lini drachmas duas cum dimidia, Liquiritiae drachmas duas et Aquae q. s. ut librae duae colaturae obtineantur; — *ParC.* Lini, Liquiritiae, sing. drachmas duas et Aquae libras duas; — RC. Lini uncias duas, Liquiritiae semunciam, Aquae libras quatuor infundere per horas tres et colare; interdum additur Succus Citri vel Roob Oxycocci vel Oxymel simplex vel Saccharum purum ad gratum saporem.

℞. Seminum Lini . sesquiunciam.
Pulveris Liquiritiae drachmas tres.
Aquae frigidae . . libras tres.

Infunde, saepius agitando, et cola. (*Sw*.)

Erweichend, bei Leiden der Brust und der Harnwege nützlich. — Man kann anderthalb Unzen Syrupus emulsivus oder Diacodion hinzusetzen.

Decoctum Lini. (LoP.)

℞. Seminum Lini leviter contus. sesquiunciam.
Aquae . . . octarios quatuor.

F. decoctum.

Infusum Lini cathartici. (B*.)

℞. Herb. Lini cathart. drachmas duas.
Aquae bullientis . uncias duas.

Infunde et cola. — Schwach purgirend. — Auf einmal.

Fomentatio emolliens. (*Ra.*)

℞. Seminum Lini . drachmas duas.
Foliorum Malvae . uncias duas.
Aquae . . . . . libras duas.

Coque et cola.

Balneum emolliens. (*Ca.*)

℞. Specierum emoll. libras quatuor.
Seminum Lini . . semilibram.
Aquae sufficientem quantitatem.

Coque leviter et cola.

Injectio mucilaginosa. (GalM.)

℞. Seminum Lini . drachmas sex.

Coque leviter in
Aquae . . quantitate sufficiente ut librae duae colaturae obtineantur.

Potio leniens. (*Sm.*)

℞. Semin. Lini contus. drach. unam.
Aquae bullientis . . uncias sex.

Infunde, cola et post refrigerationem adde
Syr. Capit. papav. drachmas quatuor.
Aquae Flor. Aurant. drachmas duas.

Looch leniens. (*Sm.*)

℞. Semin. Lini contus semunciam.
Aquae . libram unam (chopine).

Coque ad syrupi consist. et adde
Mellis rosati . . . uncias duas.

Oleum mucilaginosum s. de Mucilaginibus. (Gal. Sar. *DB. Sp. T. Vm.*)

℞. Seminum Foenu graeci,
— Lini, sing partem unam.
Olei Olivarum . . partes octo.

Semina contusa stent per dies duos in balneo arenae; tum cola, sepone et decantha. (*Vm.*)

℞. Seminum Foenu graeci,
— Lini
Rad. Althaeae, sing. libram unam.
Aquae fervidae libras decem.

Digere, subinde agitando, per horas 24, (in temperatura 35° R. *DB.*) cola fortiter exprimendo et adde
Olei Olivarum . . libras duas.

Coque donec humidum sit evaporatum et cola absque expressione. (Gal. *T.*)

℞. Rad. rec. Althaeae uncias duas c. dimidia
— — Scillae . semunciam.
Sem. Lini,
— Foenu gr., sing. uncias duas
Aquae sufficientem quantitatem.

Coquendo fiat mucilago, cui adde
Ol. infusi Anethi,
— Chamomillae,
— — Lilior., sing unc. sedecim.

Coque ad humidi usque evaporationem et cola. (*Sp.*)

℞. Radicis Althaeae,
Bulborum Liliorum alborum,
Sem. Foenu gr., sing. . unciam.
Aquae . . . . libras duas.
Olei Olivarum,
— Lini, sing. . . libras duas.

Maceratis radice, bulbis et seminibus in Aqua ut mucilago extrahatur, olea ei admisce, coque lente ad totius usque humidi evaporationem, cola et adde
Flor. Liliorum recentium,
— Chamomillae, sing. libram

Post viginti quatuor horarum in balneo aquae digestionem cola et exprime. (Sar.)

Oleum Lini s. Lini usitatissimi s. Seminis Lini expressum s. recens paratum. (A†. Ba†. Bor5† Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal† Sax2† Wir†. AD. Ams. D. DD Du. Ed. Fenn. Gal. GalP. Gen. HssS. Lon. Lus. Pol. R. Sar. Suec. Taur *Br. CG. DB. Fi. Gr. Ptd. Re. Sw. T*)

In universum ita paratur, ut semina contusa sacco e tela confecto inclusa inter duas laminas stanneas frigide exprimantur; — HisS. nihil de laminis monet; — Gal. contusa mollia reddere, expositione per octo sexagesimas Aquae bullientis vapori; — Bor5†. HC†. (libras quatuor HC†.) HN†. et Li†. prelum Aqua bulliente calefactum adhibent (Bor5† HC†. HN†. praeterea et oleum venale indicant); — Br†. Pal†. et Wir†. pastam antequam exprimatur, parumper torrere; — Taur. Semina mundata et contusa supra cribrum coopertum exponantur vaporibus aquae bullientis, ut humectentur, per horae quadrantem circiter; mox tela densioris textus inclusa praelo subjiciantur et illico ac celeriter oleum exprimatur; — *DB. T.* Semina tosta, antequam exprimatur oleum, vapori aquae bullientis exponere*); — *Fi.* Semina contusa per cribrum trajicere, denuo contundendo in pastam redigere, quae vase ferreo, charta interne obtecto immittantur; oleum expressum per chartam filtretur; — Sax2†. GalP. ut oleum Amygdalarum dulcium.

HassP†. Oleum venale recens expressum indicat; — *Gr. Oleum Lini et Oleum Lini sine igne* habet.

Als ein specifisches Mittel gegen Seitenstechen, sowohl innerlich, zu einer halben bis ganzen Unze in Fleischbrühe als äußerlich warm mit Wolle auf die schmerzhafte Stelle aufgeschlagen, angewendet. Der nach dem Auspressen des Oels zurückbleibende Leinkuchen (Lini placenta) dient zum Füttern des Rindviehs und bei Keuchen der Pferde.

Clysma involvens s. oleosum s. emolliens s. commune, Enema domesticum. (Li†. *Au*†. LH LP. RC. *Gr. Ra. Sp Sw.*,

℞. Specierum emoll. unciam unam.
Aquae . . . . . libram unam.
Coque et colaturae adde
Olei Seminum Lini uncias duas
Misce (Li†. *Ra. Sp.*)

℞. Lactis vaccini,
Olei Lini, sing. . uncias quatuor.
Misce. (*Sp.*)

LH. Decocti Lini (drachmarum duarum) semilibram, Olei semunciam; — LP. Lactis libram unam, Olei uncias tres; — *Sw.* Olei uncias duas et octo Decocti Sem. Lini; — *Sw.* Olei uncias quatuor ad sex et Decocti Hordei tantidem; — RC. Infusi Seminum Lini sine Glycyrrhiza libram, Olei unciam Loco infusi lini recipi potest etiam Natri muriatici vel sulphurici semuncia vel Saponis sebacei drachmae duae, vel Decocti Hordei, vel Avenae, vel Radicis Althaeae, vel Infusi Florum Chamomillae, vel Aquae tepidae libra una; — *Gr.* Jusculi vervecini, Olei Lini, sing. octarii quadrantem. Sacchari rubri unciam.

℞ Herbae Malvae drachmas duas.
Aquae . . . . quantum sufficit ut unciae decem colaturae obtineantur; adde
Olei Lini . . . unciam unam.
Misce. (*Au*†.)

*) Condensatur magis, si cum parte septima vel octava ponderis sui Lithargyrii subtiliss. pulv. ad colorem rubellum usque coquatur, tunc despumatum et sepositione clarificatum decanthatur (*Oleum coctum*).

Clyster antihaemorrhoidale. (LP.)

℞. Gelatinae Gummi Lebbek uncias quatuor.
Olei Lini . . . unciam unam.
Misce. — Bei Hämorrhoidalschmerzen und Tenesmus.

Liquiritia.

Hierher gehören die Wurzeln zweier Pflanzenarten:

1) *Glycyrrhiza glabra, L.*; Süßholz Lakrizenholz; Réglisse commune (*Gal.*); Liquorice (*Ing.*); Usulsus (*Ar.*); Lekorice, Sladky koren, Sladky drewo (*B.*); Wellmie, Olinde (*Cy.*); Lakrits (*D. Sueo.*); Mittie luckerie (*Du.*); Rogaliza, Pao doce (*His.*); Jetimadh (*Hin.*); Zoethout (*Bel.*); Legorizia, Ligorizia (*I.*); Oyot manis (*Ja.*); Urat manis (*Mal.*); Bikhmekeh (*Pe.*); Korzen lakrecyawy czyli slodki (*Pol.*); Alçaçuz (*Lus.*); Dulcez solotko (*R.*); Madhuka, Yastimadhuka (*Sa.*); Addimodrum (*Tam.*).

A†. Ba†. BorC†. Bor5†. Br†. Ful†. Ham†. Hau†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. WW†. *M*†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. HisS. LH. LonN. LoP. LP. Lus. Pol. R. RG. Suec. Taur. *A. Be. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sp. Sy. Va. Z.*

♃ (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, J.) Eine Pflanze, welche in den warmen und gemäßigten Gegenden Europa's wächst. (*Hayne* VI. 41. 42. *Bert.* Bild. IV. 37. f. 1. Fl. med. VI. 293.)

Die Wurzel (radix Liquiritiae s. Glycyrrhizae) ist sehr lang, walzig, ästig, holzig, fingersdick, außen braungelbaschgrau, innen gelblich und geruchlos. Sie hat einen zuckerartigen, etwas schleimigen Geschmack, welcher, wenn man sie lange Zeit kaut, bitter und etwas widerlich wird.

Sie enthält, nach Robiquet, Satzmehl, Eiweiß, ein scharfes, flüchtiges Oel, einen eigenthümlichen zuckerartigen Stoff, Glycyrrhizin (Glycyrrhizinum), Glycyrrhizine oder Succo-gommite (*Gal.*) genannt, und einen andern crystallisirbaren Stoff, ebenfalls besonderer Art, welchen man Agedoides (Agédoide *Gal.*) nennt.

2) *Glycirrhiza echinata, L.*; Igelschotensüßholz; Réglisse épineuse (*Gal.*).
Bor5†. Hau†. Hass†. HC†. HN†. O†. *M*†. D. Fenn. R. Taur. *Gr.*

♃ Eine Pflanze Asien's und des südlichen Europa's. (*Jacq.* Hort. Vindob. I. p. 41. t. 95.)

Die Wurzel hat viel Aehnlichkeit mit der vorigen, ist aber dicker.

Die Wurzel dieser Pflanzen ist einhüllend, etwas schleimauflösend, bei Catarrhalhusten, scharfen Säften. — Gabe des Pulvers, ein Scrupel.

Species bechicae. (B.)

℞. Rad. Cheiri montani uncias duas.
— Liquiritiae . sesquiunciam.
Herb. Veronicae,
— Hederae terr., sing. manipulum.
— Hyperici . . pugillos tres.
— Centaurii min. pugillos duos.
Seminum Foeniculi drachmas tres.
Concisa et contusa misce.

Species pro Decocto s. pro Potu Infantum s. pectorales. (Pal†. Wir†. *Sp.*)

℞. Ras. Cornu Cervi uncias sedecim.
— Eboris . . uncias quatuor.
Rad. Liquiritiae uncias duodecim.
— Polypodii . uncias quatuor.
Florum Tiliae . . uncias duas.
Caricarum,
Siliquae dulcis, sing. uncias octo.
Sem. Anisi,
— Foenic., sing. uncias quatuor.
Concisa misce. (*Sp.*)

℞. Rasurae Cornu Cervi libras duas.
— Eboris . . libram unam.
Radicis Liquiritiae libras quatuor.
— Polypodii . . libras duas.
Caricarum pinguium libras quinque.
Dactylorum,
Jujubar., sing. libras duas c. dimid.
Sem. Coriandri,
— Foeniculi, sing. sesquilibram.
Flor. Boragin's,
— Buglossi,
— Violarum, sing. uncias duas.
Concisa misce. (Pal†.)

Wir†. Cornu Cervi libras duas, Eboris semilibram, Liquiritiae et Polypodii, sing. tantidem, Caricarum, Siliquae dulcis, sing. libram unam, Foeniculi, Anisi, sing. semilibram, Florum Tiliae uncias quatuor et Cornu Cervi usti libram.

Succus Glyzyrrhizae simplex s. Hispanicus s. Liquiritiae crudus s. Extractum Liquiritiae crudum, Jus Liquiritiae. (Bor5†. Br†. Ful†. Hau†. HassP†. HN†. O†. Sax†. *M*†. AD. Am. Ams. An. B. Ed. GalM. Pol. Suec. *G. Gr. Re.*)

Dieser Saft kommt im Handel in fast walzenförmigen, etwa 6 Zoll langen, höchstens einen Zoll dicken Stücken in Lorbeer-

blätter eingewickelt, vor: er hat einen süßen und zugleich etwas bittern Geschmack.

Es ist ein Extract, welches man erhält, indem man die Abkochung der Süßholzwurzel bis zur Trockenheit abdampft. Immer ist er mehr oder weniger verbrannt und enthält oft etwas Kupfer. Man bezieht ihn aus Sicilien und besonders aus Spanien.

Succus Glycyrrhizae s. Liquiritiae depuratus s. depurgatus, Extractum Liquiritiae. (Ba†. Bor5†. Han†. HassP†. HN†. Sax2†. B. Bel. D. Taur. *Gr. Vm.*)

℞. Succi Liquiritiae . quantum vis.

Solve in Aqua calida, trajice per pannum et ad massae solidae consist. consume, quae super lamina marmorea oleo obducta circumvoluta, in cylindros parvos formata, et prope ignem siccata in bacillos duorum ad trium pollicum longitudinem concidatur (*Vm*)

Bor5†. HassP†. HC†. Taur. Succus in frustula discissus in Aqua comm. solvatur (iterata vice maceretur HC†), solutus per pannum laneum colatus primo leni igne, tandem in balneo vaporis ad extracti densitatem inspissetur (tamdiu evaporet, ut in bacillos formari possit HC†. Taur. nihil de residuo); residuum loco calido siccatum in pulverem redige; — HN†. Succum crudum in Aqua dest tepida macerando solutum et per pannum lan. colatum leni igne ad extracti durioris consist. inspissare; — Sax2†. Succum crudum in Aqua frigida solvere, per cribrum setaceum colare et leni igne ad extracti durioris consistentiam inspissare; — Ba†. Macerare Succi partem unam in Aquae duodecim per horas viginti quatuor, colare cum expressione et colaturam vaporando ad siccum consumere.

Gr. Succum e radice, coquendo, exprimendo et ad siccum vaporando parare jubet.

Ein halber Scrupel mehrmals täglich bei Catarrhalhusten.

Succus Liquiritiae cum Gummi s. gummosus. (*Vm.*)

℞. Gummi Arabici,
Succi Liquirit., sing. . part. aeq.

Dissolve quodque separatim in Aqua et solutiones per pannum trajectas atque commixtas vaporando atque semper agitando, ad massae solidae consistentiam redige.

Succus Liquiritiae anisatus. (*Vm.*)

℞. Succi Liquirit. depur. refrigescentis . uncias quadraginta octo.
Olei Anisi . . . drachmas tres.

Commisce intime, et in baculos teretes super lamina marmorea oleo obducta forma, quos siccatos in parva frusta concide.

Extractum Succi Liquiritiae. (*Vm.*)

℞. Succi Liquiritiae in frusta minora concisi . . . . quantum vis.
Aquae frigidae . pondus duplum.

Macera per tres dies in vase amplo ac parum profundo, decantha absque agitatione, filtra et ad extracti consistentiam inspissa.

Extractum s. Inspissamentum Glycyrrhizae. (A†. Bor5†. Br†. Ful†. HassP†. Li†. Wür†. AD. An. Bel D Dn. Fer. Gal GalP His3 LonN. LoP. Pol. R. RC. Sar. Taur. *C. CG. DB. Gr. Pid. Re. T. Vm.*)

℞. Radicis Liquiritiae libram unam. (quatuor His3.)
Aquae bullientis . libras sedecim.

Infunde calide per horas duodecim, cola, decantha et vaporando, sub finem in aquae balneo, ad extr. consist. redige. (His3.)

Taur. ut extractum Helenii; — *DB.* ut extractum Juniperi; — An. et Bel. infundere pro duabus vicibus Liquiritiae Radicis libram unam in Aquae libris octo singula vice et colaturas conjunctas evaporando inspissare; — Fer. infundere per dies duos Liquiritiae uncias duas in Aquae libris decem et colaturam vaporando inspissare.

Bor5†. ut extractum Absinthii; — GalP. Radic. Liquiritiae concis. partes duas siccare in hypocausto et in pulverem grossiusculum redigere per molam, humectare cum Aquae destillatae frigidae parte una, et post horas duodecim ingerere in cylindrum stanneum inter duas laminas cribratas; extrahere cum aqua destillata (15—20°), dum liquores effluentes minus concentrati appareant, in balneo M. calefacere, filtrare coagulum et liquorem evaporare ad extracti consistentiam; — HassP†. ut extractum Cardui benedicti; — RC. ut extractum Gentianae luteae; — *T.* ut extractum Columbo, ubi pro coque macera est legendum.

℞. Radicis Glycyrrhizae quantum vis.

Contunde, Aquae pauxillum addendo, in mortario; succum expressum et sepositione depuratum in balneo Aquae ad extracti consist redige. (Ful†. His3.)

℞. Radicis Liquiritiae libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.

Macera in loco calido per dies quatuor et coque parumper; cola expri-

mendo et colaturam ad aptam consistentiam inspissa. (Br†.)

Sar. infusionem pro tertia parte consumere, colare et evaporare; — LonN. LoP. *C. CG.* Liquiritiae libram in Aquae octariis octo macerare per horas viginti quatuor et coquere ad quatuor, tunc ad idoneam crassitudinem inspissare; Li† Radicis libras tres infundere in Aquae bull. novem per horas duodecim, coquere deinde parumper et colaturam per horas sex sepositam inspissare.

℞. Radicis Liquiritiae partem unam.
Aquae . . . . . partes octo.
Coquendo dimidium consume, cola exprimendo et colaturam blando igne ad massae pilularis consist. redige. (Du. *Gr. Re.*)

R. Coquere Radicis sicc partem unam in Aquae sex vel unam Radicis recent. in Aquae duabus vel tribus, colare exprimendo et liquorem probe inspissare; — D. Coquere Radicis partem unam in Aquae octo, colare cum expressione et colaturam ad massae pilul. consist. consumere; — Wür†. Coquere Radicem in Aquae q. s. per horam unam et decoctum decanthatum ad mellis spissi consistentiam redigere; — *Pid.* Coquere Radicis libram unam in Aquae sex et colaturam sepositione depuratum in balneo aquae evaporare.

℞. Radicis Liquiritiae libram unam.
Aquae frigidae . . libras decem.
Macera per dies duos, subinde agitando, cola, sepone et decantha liquorem qui tunc ad extr. consist. evaporet. (A†. Pol.)

℞. Rad. Liquir grossiusc. pulv. q. vis.
Prelo de Réal submissam et Aquae frigida humectatam, post horas duodecim macerationis aquae pressioni subjice ut tinctura exprimatur, quae leni calore ad extr. consist. redigatur. (*Vm.*)

℞. Radicis Liquiritiae libram unam
Aquae frigidae . libras quatuor
Macera per horas viginti quatuor, subinde agitando et cola; residuum itidem cum nova Aqua maceratum coletur; liquores mixti ad extr. consist. evaporent. (Gal.)

Pasta s. Gelatina s. Mucilago Liquiritiae s. Glycyrrhizae, Saccharum glycyrrhizatum, Glycyrrhiza lucida, Gluten pectorale. Reglise, brauner Lebersuk-ker. (A†. Bor5†. Br†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. B*. D. Gal. Pol. R. Suec. *Fi. Sp. Vm.*)

℞. Rad. Liquirit. ras. s. concis.
unc. quatuor.
Aquae bullientis . . libras octo.
Macera per horas duodecim, cola et in colatura dissolve
Gummi Arab. libr. duas c. dimid.
Sacchari albi . . sesquilibram.
Colata iterum lente consume, donec guttula, supra laminam vitream frigidam effusa in gelatinam concrescat; tunc pelliculâ sublata in cistulas e laminis ferreis, stanno obductis paratas et oleo inunctas effunde, leni calore sicca et in taleolas concide. (Bor†. Han†. HassP†. HN†. O†. Pol.)

Bor5†. Radicis uncias duas, caeterum ut antea; — HC†. Radicis uncias duas, Aquae fervidae libras tres, Gummi Mimosae electi libras duas cum dimidia, Sacchari albi libram unam cum dimidia; — Li†. Radicis uncias duas, Aquae libras quatuor cum dimidia, Gummi et Sacchari, sing. libras duas; — R. Radicis uncias octo, Aquae libras quatuor, Gummi et Sacchari, sing. libras duas cum dimidia; — Sax2†. Radicis partem unam, Aquae viginti duas (duodeviginti Sax2), Gummi novem et sex Sacchari; — Fenn. Radicis libram unam, Aquae q. s., Gummi libras tres et Sacchari duas cum dimidia; — D. Radicis unciam unam, Aquae libras quinque, Gummi quatuor et Sacchari duas; — Wür†. Liquiritiae unciam unam, Aquae libras quatuor, Gummi et Sacchari, sing. uncias sedecim; — *Sp.* Liquiritiae unciam unam, Aquae centum viginti, Gummi sexaginta et Sacchari quadraginta.

℞. Radicis Liquiritiae uncias quatuor.
Aquae . . uncias triginta duas.
Decoque ad uncias viginti quatuor et in colatura dissolve
Gummi Arabici . . libras duas.
Sacchari albi . . sesquilibram.
Coque leviter ad consist. requisitam. (Br†.)

Suec. Radicis uncias novem, Aquae sedecim ad decem redigendas, Gummi et Sacchari, sing. libras tres

℞. Radicis Liquiritiae . s unciam.
Aquae bullientis . . libras tres.
Post horarum duodecim infusionem in colatura dissolve
Gummi Arabici . libram unam.
Sacchari albi . . libras quatuor.
Cola, vaporando dimidium consume, despuma et adde
Aquae Flor. Aurant. semunciam.
In modulos effunde. (A†.)

Fi. Easdem ingredientium quantitates sed Gummi et Saccharo in infusione dissolutis, despumare, colare, decoquere ad librarum sex materiae re-

manent. et ab igne remoto Aquam Flor. Aurant. addere

℞. Radicis Liquiritiae partem unam.
Aquae . partes septuaginta sex.

Infunde radicem frigidè parte quarta, tunc calide reliqua aqua; post refrigerationem cola et in colatura solve

G. Arab. partes quadraginta octo.
Sacchari cryst.
partes viginti quatuor.

Albumine clarificata probe inspissa et in modulos effunde. (*Vm.*)

℞. Radicis Liquiritiae uncias quatuor.
Aquae . . . . libras quinque.

Post horas duodecim infusionis in colatura solve

Gummi Arabici loti,
Sacchari albi, sing. . libras duas.

Per linteum arcte textum trajecta ad extr. consist. consume, subige fortiter, pedetentim pro libris quinque massae addendo

Albumina Ovorum . . no. 12.
Aquae Flor. Aurant.
uncias quatuor.

Insp'sa lente et in tabulam marmoream Amylo conspersam extende. (Gal.)

Pal†. et Wir†. Radicis uncias quatuor, Aquae libras octo coquendo ad quatuor redigendas, Gummi libras duas cum dimidia, Sacchari tantidem et Albumina cum Aqua Flor. Aurant. subacta no. 6.

Pasta Glycyrrhizae gummata et anisata s. Liquiritiae fusca s. anisata, Succus Liquiritiae de Blois. (Gal. GalP. *Re. Sp. T.*)

℞. Extracti Liquiritiae,
Sacchari albi, sing. libram unam.
Gummi Senegalensis libras duas.
Rad. Irid. Flor. drachmam unam.
Ol. ess. Anisi gr. viginti quatuor.

Dissolve gummi in Aquae q. s., solutionem cola et ei extractum adde, consume lente ad mellis consist., adde pulverem iridis et continua evaporationem ad extr. consist., oleum supremum addendo. (Gal.)

℞. Succi Liquiritiae . uncias tres.
Gummi Arabici . . libras tres.
Sacchari albi . . . libras duas.
Aquae communis libras quinque.
Extracti Opii . grana octodecim.

Solve succum in aqua, filtra per linteum, adde gummi et saccharum et evapora ut pastam lichenis. (GalP.)

Re Iridis drachmas duas, caet. ut antea; — *T.* Extracti, Sacchari et Gummi Arab. ut antea, Iridis Florent. scrupulos duos et grana sex, Essentiae Anisi guttas octodecim.

℞. Extract. Liquiritiae . . libram,
solve in B. M. in
Aquae fontan. . . . . s. q.,
evapora in B. M. ad consistentiam syrupi, adde deinde
Sacchari albi pulv. . . libram.
Gummi Senegal. in Aquae s. q.
soluti . . . . . libras duas.

Ebullire per horam quadrantem, refrigerare, spumare, addere Olei Anisi scrupulum et Sacchari albi semunciam et in formas e ferro laminato effundere etc. (*DB.*)

℞. Gummi Arab. uncias triginta duas.
Aquae fontanae . . . . q. s.

Solutionem cola et in colatura solve

Succi Liquiritiae . uncias novem.
Sacchari albi . uncias sedecim.

Evaporent lente ad syrupi spissi consistentiam; adde deinde

Pulv. Rad. Irid. Florent.,
— — Inulae, sing.
semunciam.

Vaporando continua, donec massa non ultra digitis adhaereat et adde

Olei ess. Anisi . scrupulos duos.

Effunde in tabulam marmoream oleo obductam. (*Sp.*)

Refined Liquorice (*Par.*): Extract. Liquiritiae purum cum Gummi Arabico pondere dimidio lente evaporatum et in formam cylindricam redactum.

Pasta Liquiritiae opiacea s. cum Opio. (GalH.)

℞. Gummi Senegalensis,
Sacchari albi, sing.
part. quingentas.
Aquae Flor. Aurant.
partes triginta.
Extr. Liquir. frigide par.
part. sexaginta.
— Opii aquosi . partes duas.

Solutioni gummi et sacchari inspissatae infunde extracta antea in Aquae parva quantitate dissoluta.

Tabellae Liquiritiae. (*Vm.*)

℞. Extracti Liquiritiae partem unam.
Sacch. super igne liq.
part. sedecim.

Extracto pulverato cum saccharo commixto fiant tabellae Amylo conspergendae.

Trochisci bechici s. bechici albi s. Glycyrrhizae s. e Glycyrrhiza, Confectio de rebecha. (Fal†. Li† *Au*†. Suec. *Sp.*)

℞. Pulv. Rad. Liquiritiae
unciam unam.
— — Irid. Flor. semunciam.

Pulv. Sacch. cryst. flavi libram unam.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s. ut fiant trochisci. (Li†.)

℞. Pulv. Rad Liquiritiae drachmas tres.
— — Irid. Flor. drachmas sex.
— Amyli . . . semunciam.
— Sacchari albi . uncias octo.
Mucilag. Gummi Tragacanth. q. s.
Fiant trochisci. (Suec.)

Ful†. Liquiritiae uncias octo, Iridis quatuor, Amyli unam cum dimidia, Sacchari sex et Mucil. G Tragacanthae.

℞. Pulv. Rad. Liquiritiae sesquiunciam.
— — Irid. Flor.,
— G. Arab., sing. semunciam.
— Sacch. albi unc. quadraginta octo.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiant trochisci. (*Sp.*)

Baculi Liquiritiae albi. (Wir†. *Sp.*)

℞. Gummi Arabici,
Spec. Diaereos simplicium,
— Diatragacanth., sing. semunciam.
Radicis Liquiritiae,
Amyli, singulorum . . unciam.
Sacchari albi . . . libras duas.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiant baculi.

Trochisci bechici citrini s. flavi, Liquiritia cocta citrina, Tabellae Glycyrrhizae glabrae compositae. (Pal†. Wir†. An. Suec. *Gr. Sp.*)

℞. Rad. Liquiritiae,
— Irid. Flor, sing. . unciam.
Croci . . . . scrupulos duos.
Sacchari albi . . libram unam.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiant trochisci. (Pal†. Wir†. *Sp.*)

℞. Pulv. Rad. Liquiritiae uncias octo.
— G. Tragacanthae comp.
— Irid. Flor. comp., sing. sesquiunciam.
— Croci . . scrupulos octo.
— Sacchari . . . libras sex.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiant trochisci. (*Sp.*)

Suec. *Gr.* Liquiritiae drachmas tres, Iridis sex, Amyli semunciam, Croci scrupulos duos, Sacchari uncias octo et Mucilaginem G. Tragacanth.

Bacilli Liquiritiae crocati s. citrini, Liquiritia cocta. (HC†. O†. Sax†. Wir†. *Pid.*)

℞. Sacchari albi . partes duodecim.
Radicis Liquiritiae partem unam.
Radicis Irid. Flor. partem quartam.
Croci . . . . partem octavam.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiat massa mollis in baculos dividenda, qui super cribro siccentur. (O†. Sax†.)

℞. Sacchari albi . . . . libram.
Radicis Liquiritiae . . unciam.
— Iridis Florentinae,
Amyli, singulorum . semunciam.
Croci . . . . semiscrupulum.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiant bacilli. (Wir†. *Pid.*)

HC†. Croci scrupulum dimidium, caetera ut antea. Bacilli pondus drachmarum duarum habeant.

Trochisci bechici s. bechici nigri s. Liquiritiae s. Liquiritiae nigri s. pectorales s. Glyzyrrhizae s. Glyzyrrhizae glabrae s. Liquiritiae cum Gummi, Tabellae Anisi compositae. (Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. *Au*†. AD. Ams. An. B. Bel. Fer. Lus. Taur. *Br. C. Db. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Succi Liquiritiae,
Gummi Arab., sing. . part. aeq.
Dissolve succum et gummi quodque separatim in Aqua, liquores commisce et vaporando ita consume, ut fiant trochisci. (Fer.)

℞. Extracti Liquiritiae,
Gummi Arab., sing. partem unam.
Sacchari . . . . partes duas.
Aquae (calidae *Gr.*) . q. sufficit.
Solutionem probe inspissa, ut fiant trochisci. (*C. Ed. Gr. Re.*)

GalP. Extracti et Sacchari, sing. partem unam, Gummi partes duas et Aquae partes quatuor; — Taur. Succi concreti, Sacchari, sing. libras duas, G. Arabici libras tres, Aquae communis libras duodecim; — *Gr.* sec. Lon. post 1745. Extr. Glyzyrrh., Sacchari, sing. unc. decem, G. Tragac. semilibram (Troch. bech. nigri) vel uncias tres (Tr. Glyzyrrh.), Aq. q. s.; — Lon. ante 1745. *Gr.* Extr., Sacch., sing unc. decem, G. Tragac. Amygd. dulc. decort., sing. sex, Mucil. Semin. Cydon c. Aq. Ros. part. q. s

℞. Pulv. Succi Liquir. partem unam.
— Sacch. crystall albi part. sedecim.
Mannae . . . partes quatuor.
Contritis adde
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
ut fiant trochisci. (*Vm.*)

℞. Pulv. Extr. Liquiritiae uncias octo.
— Sacchari . . . . libram.
— Gummi Arabici uncias tres.

Aquae Florum Aurantiorum q. s.
Fiant trochisci. (*Br.*)
Fi. Aquam aromaticam Citri adhibet.
℞. Pulv. Succi Liquiritiae,
— Gummi Arab., sing. part. tres.
Aquae fontanae quantum sufficit.
Solutioni adde
Sacchari pulverati . partes sex.
Evaporent lente ad aptam consist. (Ful†. Li†. Wir†. Ams. B. Bel. Lus. *DB. Sw.*) (trochisci granorum duodecim *DB.*)
℞. Pulv. Radicis Iridis Florentinae,
— Rad. Liquiritiae,
— Anisi,
— Foeniculi, sing. . unciam.
Succi Liquiritiae in Aqua Hyssopi dissoluti . . uncias quatuor.
Sacchari albi . uncias sedecim.
Mucilag. G. Tragacanth. (in Aq. Ros. solut. HN†.) . . . q. s.
Fiant trochisci. (Br†. Han†. HC†. HN†. Wir†.)
HC†. Aquam destillatam; — Pal†. saccharum omittit; — Lus. foeniculum omittit, reliquis formulae immutatis; — O†. et Sax†. Saccharum in Aqua Foeniculi dissolvi jubent.
℞. Pulv. Rad. Glycyrrhizae,
— — Irid. Flor., sing. unc. tres.
— Anisi,
— Foeniculi, sing. semilibram.
Extracti Glycyrrhizae libras duas et uncias octo.
Sacchari albi . libras duodecim.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiant tabellae. (An.)
Bor5†. G. Mimosae uncias duas, Irid., Glycyrrh., Foenic., Anis., sing. quatuor, Succi Liquirit. libram, Sacch. libras novem, G. Trag. c. Aq. comm. q. s. in mucilag. redacti q. requiritur, ut f. l. a. massa, e qua formentur trochisci; — Sax2† Rad. Irid. Flor., Liquir., Sem. Anis., Foenic., sing. unciam, Succi Liq. depur. unc. quatuor, Sacch. alb. sedecim, pulverata ope Mucilag. Trag. f. trochisci, qui leni calore exsiccandi sunt.
℞. Amygdal. dulc. excort. uncias duas.
Contusis, pastae adde
Pulv. Succi Liquir. uncias quatuor.
— Foeniculi . . semunciam.
— Sacchari . . uncias octo.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiant trochisci (*Au*† *Pid.*)
℞. Storacis Calamita . partes sex.
Sacchari albi partes centum quadraginta quatuor.
Contritis adde
Amygdalarum dulcium excort.,
Rad. Irid. Flor., sing. partes duas.
G. Tragacanthae . partem unam.
Extr. Liquirit. liq . . . q. s.
Fiant trochisci. (*Vm.*)

Vm. praeterea trochi corum albor. partes triginta sex et unam Storacis Calamita ut fiat cum dissolutionis aquosae Extracti Liquiritiae massa.
℞. Rad. Iridis Florent. uncias tres.
— Liquiritiae,
Anisi,
Foeniculi, sing. . uncias quinque.
Succi Liquiritiae . uncias novem.
Storacis Calamita . . unciam.
Sacchari albi uncias nonaginta sex.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiant trochisci. (*Sp.*)
Trochisci Glycyrrhizae cum Opio s. thebaici, Trochisci sedativo-balsamici s. pectorales Regis Danorum. (AD. Ed. Lus. Suec. *Br. DB. E2. Gr. Sp. Vm.*)
℞. Succi Liquiritiae,
Sacchari albi, sing. . . unciam.
Extracti Opii . . grana quatuor.
Fiant trochisci. (*Sp.*)
DB. Eadem praeparatio ut trochiscorum Liquiritiae *DB.* cum additamento Extracti Opii aquosi scrupulorum quinque.
℞. Rad. Liquiritiae,
— Althaeae, sing. drachm. novem.
Rad. Iridis Florentinae,
G. Tragacanthae, sing. drachmas sex.
Opii . . . . . scrupulum.
Sacchari . . . uncias sedecim.
Aquae . . quantum sufficit.
Fiant trochisci. (*Vm.*)
℞. Succi Liquiritiae,
Gummi Arab., sing. uncias quinque.
Opii . . . . . drachmas duas.
Tinct. Bals. Tolut. . semunciam.
Syrupi Sacchari . . uncias octo.
Opio cum tinctura contritis adde sensim syrupum et saccharum caloris ope mollefactum, dein de gummi et trochiscos septingentos viginti forma. (Ed. Lus. Suec. *Br. Gr. Sw.*)
℞. Gummi Arabici,
Extracti Liquiritiae,
Sacchari albi, sing. drachmas duas.
Opii . . . . . grana sex.
Olei Anisi . . . guttas quatuor.
Aquae . . . quantum sufficit.
Fiant trochisci quadraginta. Ein Stück drei oder vier Mal täglich im Munde aufgelöst. (*E2.*)

Die letztern Trochisken sind bei den Engländern unter dem Namen Cough Lozenges of Wistar berühmt.

Looch sanum et expertum. (Pal†. Wir†. *Pid. Sp.*)
℞. Aquae dest. Looch sani et exp. unciam.

Nucleorum Pineae mundatorum,
Amygdalarum excorticatarum,
Sem. Papav. albi, sing. semunciam.
Fiat emulsio, cujus colaturae adde
Sacchari albi . . uncias viginti.
Pulveris Liquiritiae
— Gummi Tragacanthae,
— — Arabici,
— Amyli, sing. drachmas tres.
— Iridis Flor. drachmas duas.
Misce diu et celeriter agitando. (Wir†.)

℞. Radicis Liquiritiae,
Herbae Hyssopi,
— Capilli Veneris Monspeliaci,
— Calaminth. mont., sing. semunciam.
Anisi,
Foeniculi, sing. . drachmas duas.
Aquae font. uncias viginti quatuor.
Coctis parumper, cum decocto et
Amygdalarum excorticatarum,
Nucleorum Pineae mundatorum,
Sem. Papav. albi, sing. . uncia
emulsionem para, cujus colaturae adde
Pulveris Liquiritiae,
— Gummi Tragacanthae,
— — Arabici
— Amyli,
— Irid. Flor., sing drachmas sex.
Sacchari albi uncias quadraginta.
Aquae Cinnamomi . uncias duas.
Misce. (*Sp.*)

℞. Cinnamomi,
Hyssopi,
Calaminthae,
Iridis Florentinae,
Anisi,
Foeniculi, singulorum semunciam.
Capilli Vener. Monsp. manipulum.
Aquae fontanae . . libras duas.
Macera per horas 24, destillet deinde liquidi libra una, cum qua et
Nucleor. Pineae mund. drachmis quinque,
Amygd. dulc. excort. drachmis tribus.
emulsionem para, cujus colaturae adde
Sacchari albi . . . libras duas.
Pulveris Liquiritiae.
— Gummi Tragacanthae,
— — Arabici,
— Amyli, sing. drachmas tres.
— Iridis . . drachmas duas.
Misce. (Pal†.)

℞ Pulv. Rad. Liquiritiae,
— — Althaeae, sing. unciam.
— — Irid. Flor. drachmas sex.
Pulv. G. Tragacanth. . unciam.
Fiat pulvis, cujus scrupulos quatuor ex tempore cum Syrupi emulsivi unciis duabus commisce. (*Pid.*)

Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe Unze.

Electuarium pectorale. (L. P.)

℞. Confectionis Sambuci uncias sex.
Pulveris Radicis Liquiritiae uncias duas.
Extracti Glycyrrhizae sesquiunciam.
Gummi Acaciae . . . unciam.
Mellis . . . . . q. s.
ut f. electuarium.

Looch pulmonale s. de pulmone Vulpis. (Li†. Wir† *Sp.*)

℞. Pulmonis Vulpis pulverati,
Pulveris Succi Liquiritiae,
— Herbae Capilli Veneris Monspeliaci,
— Anisi,
— Foeniculi, sing. . unciam.
Sacchari clarif. uncias quindecim.
Misce. (Wir†. *Sp.*)

℞. Extracti Liquiritiae . semunciam.
Aquae Foeniculi . . uncias duas.
Solutioni adde
Pulveris Hederae terrestris,
— Anisi.
— Foenic., sing. drachm. duas.
Syrupi Sacchari . . uncias sex.
Misce. (Li†.)

Dieses Looch, von Mesue eingeführt, war bei Husten und Lungenschwindsucht sehr berühmt. — Gabe, zwei bis drei Drachmen.

Elixir pectorale simplex. (Br†. Ham†.)

℞. Succi Liquiritiae drachmas tres.
Aquae Foeniculi uncias quatuor.
Dissolve. (Ham†.)

Br† Aquae Foeniculi libram et Succi Liquiritiae uncias sex.

Infusum Radicis Glycyrrhizae s. Liquiritiae. (BorC†. WW†. *Au*†. *T.*)

℞. Rad. Liquiritiae concis. unciam.
Aquae bull. unc. novem ad decem.
Digesta vase tecto per semihoram, cola.

T. Liquiritiae sesquiunciam, Aquae bull. libram; stent per horas duas in infusione, tunc colentur.

Decoctum Glycyrrhizae. (AD. Du. LoP. *Re.*)

℞. Radicis Liquiritiae sesquiunciam.
Aquae mens. libram (octarium).
Coque per sexagesimas decem et exprime.

HN†. Unciam unam et alteram in decocto aquoso librae unius pro die.

Mel glycyrrhizatum s. Liquiritiae. (Ham†. HC†. Pal†. GalF.)

℞. Radicis Liquiritiae uncias octo.
Aquae bullientis . . libras tres.
Macera per horam unam, cola exprimendo, vaporando ad uncias quatuordecim inspissa et adde
Mellis albi . . libras quinque.
Coque leni igne ad syrupi consistentiam. (GalF. Pol.)

Ham†. HC†. infundere per semihoram Liquiritiae sesquiunciam in Aquae ferv. q. s., ut unciae decem colaturae obtineantur, huic addere Mellis despum. duplum et coctione ad syrupi consist. redigere.

Syrupus Glycyrrhizae s. Liquiritiae. (Bor5†. Br†. Han†. HC†. HN†. Wir†. *Gr. Sp. Sw*. Vm.*)

℞. Rad. Liquirit. ras. et contus. partem unam.
Aquae . . . . . partes tres.
Infunde in aquae balneo tepido per horam, tunc in colatura frigida solve
Mellis albi* . . . . partes duas
et in calida
Sacchari albi . . . partes duas.
Serva. (*Vm.*)

*Sw**. eandem formulam, sed colaturam cum Melle et Saccharo ad syr. consist. coquere.

℞. Rad. Liquiritiae concis. uncias octo.
Aquae bullientis . . libras tres.
Macera, tunc coque leniter per horae quadrantem; cola et evaporatis ad unciarum quatuordecim liquidi remanentiam, adde
Sacchari albissimi,
Mellis despum., sing. libras duas.
Ebulliant. (Bor5†. Han†. HassP†. HN†.)

Bor5†. nihil de maceratione; — HC†. Aquae fervidae libras sex, macerationem per horas 2, evaporationem ad unciarum 28 remanentiam et Sacchari libras quatuor absque melle caeterum ut antea.

℞. Radicis Liquiritiae uncias duas.
Capilli Vener. Monsp. . unciam.
Hyssopi . . . . . semunciam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde per horas 24, tunc ebullitione ad dimid. redactis colaturae adde
Mellis despumati . uncias octo.
Sacchari albi . uncias sedecim.
Aquae Rosarum uncias quatuor.
Fiat syrupus. (Br†. Wir†. *Sp.*)

Gr. Aquae libras tres, Mellis, Sacch., sing. uncias decem, absque aq. rosar., caeterum ut antea.

Decoctum pectorale. (*Sw.*)

℞. Radicis Liquiritiae,
Herbae Farfarae,
— Hederae terr., sing. unc. duas.
Radicis Inulae . . . . unciam.
Aquae . . . . . libras novem.
Decoque ad colaturae unius libras remanentiam. — Gabe, drei oder vier Unzen, mehrmals täglich. — Man versüßt diese Tisane mit Zucker, oder besser, mit Honig.

Tinctura s. Essentia Liquiritiae. (Br†. HC†.)

℞. Rad. Liquirit. concis. unciam.
Aquae Vitae . . . uncias tres.
Post sufficientem extractionem cola et exprime. (Br†.)

HC†. Radicis uncias quinque, Spir. rectif. libras duas, digestionem per octiduum, expressionem et filtrationem, ut sit colatura unciarum viginti.

Elixir pectorale s. pectorale Regis Daniae s. Danorum s. Ringelmanni s. ex Succo Liquiritiae s. pectorale dulce s. Glycyrrhizae s. e Succo Liquiritiae. (BorC†. Bor5†. Ful†. Han†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. D. DD. Pol. *Sp. Vm.*)

1) Ohne Opium.

℞. Succi Liquiritiae . partem unam.
Aquae Foeniculi . . partes duas.
Alcoholis ammon acalis partes sex.
Digere blando calore per horas tres et cola. (DD.)

Li†. Succi partem unam, Aquae Foeniculi quatuor et duas Alcoholis ammoniacalis; — Sax†. Succi duas, Aquae Foeniculi sex et duas Alcoholis ammoniac.; — Ful†. Succi duas, Aquae Foeniculi sex et tres Alcoholis ammon.; — Bor5†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Succi duas, Aquae Foeniculi sex et Alcolis ammon. anisati duas; — *Sp.* Succi unam, Aquae Foeniculi duas et sex Alcoholis ammon. anis.; — *Vm.* Succi duas, Aquae Foeniculi octo et duas Alcoholis ammon. anis.

℞. Succi Liquiritiae . . partes sex.
Aquae Foeniculi partes duodecim.
Semin. virid. Anisi partem unam.
Alcohol. ammon. partes triginta sex.
Stent in digestione per horas viginti quatuor et colentur. (D.)

Vm. digerere Anisi partem unam in Alcoholis ammon. sex, addere deinde Aquae Foeniculi partes duodecim, Succi Liquiritiae sex et post aliquot dies filtrare.

℞. Succi Liquir. depur. . . unciam.
Aquae Foeniculi . . uncias octo.
Liq. Ammonii subcarb.
semidrachmam.
Misce. (BorC†.)

℞. Radicis Angelicae . uncias tres.
— Levistici . . semunciam.
Flor. Chamomill. Rom.
sesquiunciam.
Anisi . . . . . uncias octo.
Foeniculi . . . uncias quinque.
Macidis . . . . drachmas tres.
Nucis moschatae,
Myrrhae, sing. . . . unciam.
Kali subcarb. . uncias octodecim.
Alcoholis . . . libras quatuor.
Aquae fontanae . . libras duas.
Stent in digestione per tres dies, tunc adde
Salis Ammon. pulv. . . libram.
Destillent lente ad librae unius liquidi reman., productum commisce cum
Succi Liquiritiae unciis quinque solutis in
Aquae Foeniculi . . . . libra.
Adde deinde
Croci orientalis . drachmas duas.
Digere per aliquot dies et filtra. (Wir†.)

Sax2†. Rad. Angelicae, Levistici, Flor. Cham Rom., Semin. Foeniculi, Anisi, Macidis, Nucum mosch., Myrrhae, Croci, Succi Liquiritiae, sing. nonnisi dimidiam illorum a Wir†. praescriptorum partem, Aquae Foeniculi uncias decem cum dimidia, Liquoris Ammon. caust. sesquiunciam, Spirit. rectif. libras tres absque kali subcarb.

2) Mit Opium. *Elixir ammoniato-opiatum*, *Extractum thebaicum ammoniacale*. (Bor†. HC†. O†. Pol. *Vm.*)

℞. Succi Liquir. depur. semunciam.
Aquae Foeniculi . . semilibram.
Dissolve et colaturae adde
Spir. Salis Ammon. anis.
drachmas duas.
Tincturae thebaicae
semidrachmam.
Misce bene. (O†.)

Bor†. et Pol. Succi uncias duas, Aquae Foeniculi sex, Spir. Ammonii anis. duas et Laudani drachmas duas; — *Vm.* Succi partes octo, Aquae Foeniculi viginti quatuor, Spir. Ammonii anis. et Laudani liq. sing. octo; — HC†. Elixir e Succo Liquiritiae uncias quinque, Tincturae Opii crocatae drachmam (quaelibet uncia continet solubile ex Opii granis duobus).

Reizend, besonders ehedem bei chronischen Brustleiden empfohlen und für bruftlindernd, Auswurf befördernd, blähungtreibend, kolikwidrig, magenstärkend, harntreibend gehalten. — Gabe, sechs und dreißig bis funfzig Tropfen. — Ein einer Menge Veränderungen fähiges Präparat, welches wohl verdient, der Vergessenheit entrissen zu werden.

Liriodendron

Liriodendron tulipifera, *L.*; Tulpenbaum, Tulipier de Virginie (*Gal.*); Virginian tuliptree, American Poplar, Tulip-tree (*Ang.*); Tulpboom (*Bel.*); Tulipeiro (*Lus.*); Kametraed (*Suec.*).

AD. Am. *C. Gr. Re.*

Ein Baum (Polyandria Polygynia, L.; Magnolieae, J.) Südamerica's. (*Cat* Carol. I. t. 48. *Duh.* éd. nouv. III. t. 18. *Big.* II. t. 31. *Schk.* t. 147. *Bert.* Bild. III. 14 f. 1.)

Man wendet die Rinde, besonders die der Wurzel an; sie ist bitter und gewürzhaft.

Lithospermum.

Lithospermum officinale, *L.*; Steinsaame; Herbe aux perles, Grémil (*Gal.*); Gromwell (*Ang.*); Steenklinte (*D.*); Ackensteensaad (*Bel.*); Stenfrae (*Suec.*).

Br†. Wir†. *M*†. Gal. His3. *Gr. Re. Sp.*

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Boragineae, J.) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t 341.)

Man wendet den Saamen (semen Lithospermi s. Milii Solis) an; er ist klein, sehr hart und hat eine harte, glänzende, perlgraue Schaale. Er besitzt keinen Geruch, aber einen süßlichen, öligen, etwas adstringirenden Geschmack.

Ehedem wurde er für ein lithontripticum gehalten, auch bei Ruhr empfohlen; vielleicht könnte er als Linderungs- und schmerzstillendes Mittel bisweilen von Nutzen seyn.

Lobelia.

Man wendet in der Medicin an:

1) *Lobelia syphilitica*, *L.*; gemeine Lobelie, blaue Cardinalsblume; Cardinale bleue (*Gal.*); Blue Lobelie (*Ang.*); Pokkige lobelia (*Bel.*); Lobelia (*Lus.*).

Br†. Ful†. Hass†. Li†. Sax†. Wir†. Wür†. *M*†. Ams. LP. R. *Gr. Re. Sy. Vo.*)

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Lobeliaceae, J.) Eine Pflanze Nordamerica's. (*Plenck* t. 649. *Schk.* t. 269. Düss.

off. Pfl. I. 24. Dict. d. Sc. nat. cah 3. Zorn Ic. pl. t 368).

Man wendet die Wurzel (radix Lobeliae) an; sie besteht aus dünnen, weißen, mehrere Finger langen Fasern. Sie hat einen unangenehmen, widerlichen Geruch. Der Geschmack derselben ist, wenn sie frisch ist, sehr scharf, bei der getrockneten weniger; er wird alsdann tabacksähnlich und hält lange an.

Reizend, Brechen und Purgiren bewirkend; als Mittel gegen Syphilis.

2) *Lobelia inflata*, *Willd.*; Indischer Taback; Lobélie renflée (*Gal.*); Indian Tobacco (*Ang.*).

AD Am. LPC *C. Gr. Re.*

⊙ Eine Nordamericanische Pflanze (*Big.* Am. Med Bot. t. I. t. 19)

Die Blätter sind länglich, sitzend, schwach gezähnelt. Sie sind anfangs geschmacklos, entwickeln aber bald einen stechenden Geschmack und erregen einen beträchtlichen Speichelfluß. In den Vereinigten Staaten wendet man sie als brech- und schweißtreibendes Mittel, in der Gabe von zehn bis zwanzig Gran, in Pulverform an. (Vergl. v. Froriep's Not. d. Nat. u. Heilk. V. 99.)

Gr. führt noch L. urens, circiifolia, tupa und longiflora an; der Saft der meisten ist scharf; L. cardinalis, Wurzel wurmtreibend.

Decoctum Lobeliae syphiliticae. (B*. *E2. Sy.*)

℞. Rad Lobeliae syph. sicc. semunciam.
Aquae fontanae libras duodecim.

Coquendo tertiâ parte consumtâ cola. — Glasweise zu trinken. *E2.* fängt mit einer halben Pinte täglich an und steigt bis auf zwei Pinten, bis gehöriges Purgiren bewirkt ist, dann läßt man es drei oder vier Tage weg, worauf wieder angefangen und bis zur Beendigung fortgefahren wird.

Tinctura Lobeliae inflatae. (AD. Am. B*. *DB. Re.*)

℞. Herb. Lobeliae inflat. sicc. uncias duas.
Alcoholis tenuis. . octarium.

Post decem dies digestionis filtra.

AD. Macerare per quatuordecim dies; — *DB.* Lobeliae uncias duas cum dimidia, Alcoholis 18° B. uncias duodecim.

Reizmittel, welches nach Cutlet besonders von Thacher, bei convulsivischem Asthma, als ein gutes Mittel, die Respirationsbeschwerden zu heben, gerühmt wird. — Gabe, 30—40 Tropfen mehreremal täglich.

Lunaria.

Botrychium Lunaria, *L.*; Mondraute; Lunaire (*Gal.*); Moonwort (*Ang.*); Maanerude (*D.*); Maankruid (*Bel.*); Lunaria (*I.*); Lasgraes (*Suec.*).

Wir†. Gal. *Gr, Sp.*

♃ (Cryptogamia . L.; Filices, *J.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 65.)

Man wendet das Kraut (herba Osmundae Lunariae s. Lunariae s Lunariae Botrytidos) an; es stellt sich als ein gefiedertes, aus acht bis zehen halbmondförmigen Blättchen bestehendes Laub dar. Es hat einen schwach styptischen Geschmack.

Schwach adstringirend.

Lupinus.

Lupinus albus, *L.*; Wolfsbohne; Lupin blanc (*Gal.*); White Lupine (*Ang.*); Kzjmsky oneb sskrkawičný hrach (*B.*); Witte tygebone (*Bel.*); Lupino officinale (*I.*).

Br†. Sax†. Wir†. *M*†. Fer. Gal. GalP. HisS. Taur. *Fi. G. Gr. Re. Sp.*

⊙ (Diadelphia Hexandria, L.; Leguminosae, *J.*) Eine wahrscheinlich ursprünglich in der Levante einheimische, im südl. Europa naturalisirte Pflanze. (*Blackw.* t. 282. *Zorn* Ic. pl. t. 321)

Man wendet den Saamen (semen Lupini) an; er ist groß, scheibenförmig, platt und weiß. Die Mandel, welche er enthält, ist gelb und bitter, ohne Geruch und hat einen mehligen, bittern und unangenehmen Geschmack.

Ehedem kam er zu dem Mehl von Breiumschlägen.

L. sylvestris, *varius* (*Gr.*), variabilis (GalP.).

Lupulus.

Humulus Lupulus, *L.*; Hopfen; Houblon (*Gal.*); Hope (*Ang.*); Humle (*D. Suec.*); Lupulo (*His. I.*); Hoppe (*Bel.*); Chmiel (*Pol*); Hombrecillo (*Lus.*).

A†. Ba†. Bor5†. Br†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax†. Wir†. Würt. *M*†. AD. Am. Ams. Ed. Fenn. Gal. GalM. GalP Gen. HisS. LH. LonN. LPC. RC. Suec. Taur. *Be. Br. C. CG. G. Gr Par. Pid. Re. Sp. Va.*

♃ (Dioecia Pentandria, L.; Urticeae, *J.*) Eine in ganz Europa gebaute Pflanze. (*Hayne* VIII. 36. *Bull.* t 234. *Plenck* t 707. *Schk.* t. 326. *Zorn* Ic. pl. t. 522. 541.).

Man wendet die Sprossen der weiblichen Blüthen (strobili s. coni s. flores Lupuli) an; sie sind eiförmig und bestehen aus häutigen, eirunden, hohlen, geschindelten, gelblichen Schuppen. Sie haben einen sehr starken, gewürzhaften Geruch und einen bittern Geschmack.

Sie enthalten, nach Yves, einen eigenthümlichen, bittern Stoff, das Lupulin (Lupulina, Lupulinum, AD. *DB.*), in welchem die Wirksamkeit liegt.

Tonisch, etwas narkotisch, besonders bei scrophulösen Krankheiten, Rhachitis und Drüsenverstopfungen gebraucht, aber auch als Fieber- und beruhigendes Mittel gerühmt. — Gabe des Pulvers, eine halbe bis zwei Drachmen; von dem ausgedrückten Safte zwei bis vier Unzen. In Kräutersäckchen als Zertheilungsmittel und um Schlaf zu bewirken; vom Lupulin, sechs bis zwölf Gran.

Species aromaticae s. ad fomentum. (B*. Bor5†. Pal†. Sar†.)

℞. Lupuli . . . . . libram.
Florum Chamomillae,
— Lavandulae,
Herbae Rorismarini,
— Serpylli,
— Tanaceti, sing. uncias tres.
Concisa misce.
Bor5†. HN†. Tanacetum omittunt.

Pilulae Humuli Lupuli. (RC.)

℞. Pulv. conor. Lupuli scrupulos duos.
Micae Panis et Syrupi vel
Mucilaginis Gummi Arabici q. s. ut fiat massa in pilulas triginta aequales dividenda. — Gabe, Abends zwei bis drei Stück. — Wirken wie Opium.

Succus Lupuli. (*DB.*)

Paratur ut succus Centaurii minoris.

Extractum Lupuli s. Humili (aquosum). (Han†. HN†. Li†. AD. An. LonN. LPC. Suec. *C. CG. DB. Gr. Re. Vm.*)

℞. Lupuli,
Aquae frigid., sing. partem unam.
Macera per horas duodecim et adde deinde
Aquae bullientis duplum pondus totius massae; refrigerata cola, Albumine clarificata supra ignem colloca et quum liquor spissescere coeperit, per pannum colata, agitando continuè vaporando probe consume. (*Vm.*)
℞. Humuli . . . . partem unam
Aquae bullientis . . partes octo.
Coque per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor et itidem coletur, liquores commixti et post sufficientem sepositionem decanthati leni igne ad extracti consist. evaporent. (Han†. HN†.)

Suec. Coquere parumper Lupulum cum Aquae duplo, exprimere, et residuo cum nova Aqua cocto, liquores commixtos in aquae balneo inspissare; — Li†. Macerare per horas duodecim Lupuli libras tres in Aquae bull. novem, coquere deinde, exprimere et vaporando consumere.
℞. Lupuli . . . . . libras duas.
Aquae communis . libras decem.
Coque per horae quadrantem, cola exprimendo, sepone et liquorem decanthatum ad consist. requisitam consume. (An.)

AD. Lon. LonN. *C. CG. Gr. Re.* coquere Lupuli uncias quatuor in Aquae octariis octo ad quatuor redigendis et colaturam ad idoneam crassitudinem evaporare; — *DB.* ut extractum Chamomillae; — LPC. ut extractum Gentianae.

Gabe, eine halbe bis eine Drachme.

Extractum Lupuli alcoholicum. (A†. GalP.)

℞. Lupuli . . . . . partes duas.
Alcoholis (0 910) . . partes tres.
Aquae communis . partes novem.
Digere in Aquae balneo, cola exprimendo, alcoholem destillatione extrahe et quod restat, in balneo aquae ad extracti consistentiam consume (A†.); — GalP. ut extractum Cicutae alcoholicum.

Die Gabe ist wie bei'm vorigen.

Tinctura Humuli s. Lupuli s. Humuli Lupuli s. Lupuli strobilorum. (Han†. HN† AD. Am. An. B*. Ed. Lon. LonN. LPC. RC. Suec. *C. CG. E2. Gr. Re. Sw. Vm.*)

℞. Lupuli . . . uncias quinque.
Alcoholis (0 935)
libr duas c. dimidia.
Digere per dies octo et filtra. (Ed. Suec.)

AD. Lon. LonN. *Gr. Re.* Lupuli uncias quinque et Alcoholis (0,930) octarios duos, macerationem per dies quatuordecim (AD. exprimere); — LPC. Lupuli uncias sex, Spirit. tennioris octarios duos; — B. et *Sw.* Lupuli semunciam et Aquae Vitae semilibram; — An. Lupuli partem unam et Alcoholis (20°) octo; — Han†. HN†. RC. Lupuli partem unam et sex Alcoholis (sufficientem digestionem HN†.) (vel deficiente hac tinctura, Pulv. Conor. Lu-

puli grana tria, hora decubitus, superbibendo Succi Citri Medicae vel Acidi acetici impuri cochlear sum. RC.); — Am et C. Lupuli uncias quinque et Alcoholis octarium.

Narkotisch. — Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen.

Infusum Lupuli. (E2. Ba. LPC.)

℞. Lupuli . . . . . unciam.
Aquae bullientis libras duas (octarium 2.)

Infunde et cola.

℞. Lupuli . . . . drachmas sex
Aquae destillat. ferventis octarium.

Macera per horas quatuor in vase leviter clauso et cola. (LPC.)

Gewürzhaft und bitter, bei Scropheln, Scorbut und sogenannten asthenischen Krankheiten empfohlen.

Ein wirksameres Präparat erhält man durch Infusion des Hopfens in Wein, nachdem man ihn mit einer hinlänglichen Menge Weingeist befeuchtet hat.

Oleum Lupuli destillatum a *Gr.* indicatur.

Aqua Lupuli. (Han†. B*. *Vm.*)

℞. Lupuli . . . . . partes octo.
Aquae sufficientem quantitatem.

Destillent partes viginti quatuor. (Han†. B*.)

℞. Lupuli . . . . partes quatuor.
Aquae Vitae . partem quartam.
Aquae . . . . partes triginta.

Destillent partes sex. (*Vm.*)

Magenstärkend und etwas narkotisch. — Gabe, ein Löffel.

Mixtura e Lupulo s. stomachica. (B*.)

℞. Extr. Lupuli aquosi drach. duas ad tres
Aquae Lupuli . uncias septem
Solutioni adde
Tinct. Lupuli semunc. ad unciam.
Syrupi Cort. Aurant. . . unciam.

Gabe, alle drei Stunden einen Löffel.

Unguentum Lupuli. (*Sw**.)

℞. Lupuli siccati . . uncias duas.
Axungiae Porci . uncias decem.

Digere blando calore per horas aliquot et cola cum expressione.

Beim Krebs, um die Schmerzen zu stillen, empfohlen.

Pulvis Lupulini s. Lupulinae. (GalF. GalH. *Ma. Re. Va.*)

℞. Lupulini . . . partem unam.

Tere in mortario porcellaneo, sensim addendo

Sacchari albi . . . partes duas.

Pilulae Lupulinae. (E2. *Ma. Re. Va.*)

℞. Lupulinae . . . quantum libet.

Tritura (tempore frigido mortarium calefaciens) in massam et in pil. pond. gr. trium divide. — Zwei bis vier bei erschöpfter Erregbarkeit, Verdauungsbeschwerden und Nervenaufregung, um Schlaf zu erregen. Sie machen keine Verstopfung.

Ma. Va. Lupulini drachmas duas cum dimid., G. Arab. unam, Extr. Cichor. q. s. ut f. pil. pond. gr. 4. — 2 bis 4 täglich gegen Scropheln.

Unguentum s. Pomatum Lupulini. (GalH. *T. Va.*)

℞. Lupulini . . . . . drachmam.
Axungiae . . . drachmas tres.

Infunde in aquae balneo et per pannum e tela arcte textum (setaceum *T.*) cola. (Freake.)

Tinctura Lupulini s. Lupulinae. (AD. Fer. GalF. *E2. DB. Gr. Ma. Re. T.*)

℞. Lupulini contusi . . unciam.
Alcoholis (36°) . . uncias duas.

Digere in vase tecto per dies sex, cola fortiter exprimendo et adde

Alcoholis (36°) . quantum sufficit ut tincturae unciae tres obtineantur.

T. Lupulini drachmas tres, Alcoholis (35° B.) unciam; digere, post dies duos exprime et operatione cum residuo repetita, liquores commixti filtrentur; — AD. Lupulinae uncias quatuor, Alcoholis octarios duos, macerare per quatuordecim dies.

Gewürzhaft, bitter und tonisch, nach Ives außerdem auch narkotisch. — Die Gabe ist eine halbe bis zwei Drachmen. *T.* schreibt von seiner Tinctur 40 bis 80 Tropfen vor, in einem passenden Vehikel zu nehmen.

Syrupus Lupulini s. Lupulinae. (GalF. *Gr. Ma. Re. T.*)

℞. Tinct. Lupulini alcoh. partem unam.
Syrupi communis partes septem.

Misce.

Extractum Lupulini (*Gr.*): e Lupulino, infusionis in Aqua frigida ope.

Extractum Lupulini coctione paratum. (*Gr.*)

Extractum resinosum vel alcoholicum Lupulini. (*T.*)

Obtinetur evaporatione tincturae, solis vel evaporatorii calore, in laminis vitreatis.

Gabe, drei bis vier Gran.

Lycopodium.

Lycopodium clavatum, complanatum et annotinum, L.; Streupulvermoos, Bärlapp; Lycopode commun (*Gal.*); Club Moss (*Ang.*); Mechowe Seweno (*B.*); Joramos, Ulvefod, Lusegraes (*D.*); Licopodio (*His. I. Lus.*); Geknodstaardmos (*Bel.*); Proszek koltunowy (*Pol.*); Gulnicht (*Suec.*).

Ba†. Bor5† Br†. Ful†. Ham†. Hass†. HC†. HN†. L†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. *M*†. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal GalP. Gen. His3. Pol. R. Suec. Taur. *B. Br. G. Gr. Pid. Re. Sp. Z.*

♃ (Cryptogamia, L.; Musci, *J.*) Eine in ganz Deutschland sehr gemeine Pflanze. (*Hayne* VIII. 47. *Zorn* c. pl. t. 54.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Musci clavati s. terrestris s. Lycopodii clavati) besteht aus einem sehr ästigen Stängel mit zerstreuten, rippenlosen, gebogenen, in eine Borste endigenden Blättern. Es hat weder Geruch, noch Geschmack. — Der Saame (farina s. pulvis s. semen s. sulphur Lycopodii, Sulphur veg tabile; Bärlappsaamen, Hexenmehl, Trutenmehl Alpmehl, Pillenmehl, Wurmmehl, Kiepfpulver, Blitzpulver, Moospulver, Streupulver, Bärlappenpulver) ist ein außerordentlich feines, blaßgelbes, leichtes, einigermaaßen fettig anzufühlendes Pulver, welches sich an die Finger hängt, weder Geruch noch Geschmack besitzt, sich leicht entzündet und aus kleinen, rundlichen, etwas platten und halbdurchsichtigen Körnern besteht.

Aeußerlich austrocknend, innerlich harntreibend. — Gabe, zehen Gran Morgens und Abends, bei Harnstrenge der Kinder.

Mixtura Lycopodii s. diuretica. (*Au*†. B*.)

℞. Lycopodii . . drachmas duas.
Aquae purae . . . uncias duas.
Syrupi Althaeae . sesquiunciam.

Misce. — Gabe, alle zwei Stunden einen halben Löffel. (*Au*†. B*.)

℞. Magnesiae subcarb. drachmas duas.
Satura
Aceti concentrati . . . . q. s.
Adde deinde
Aquae Menthae,
Syrupi Opii, sing. . uncias duas.
Pulveris Lycopodii drachmas duas.

Gabe, alle zwei Stunden zwei Eßlöffel. (*Au*†. B*.)

℞. Lycopodii . . . . semunciam.
Syrupi Papaveris quantum sufficit ut fiat looch. — Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel.

Lycopus.

1) *Lycopus europaeus, L.*; palustris, *Lam.*, vulgaris, *Pers.*; gemeiner Wolfsfuß, Zigeunerkraut, Sumpf- oder Wasserandorn; Bugle-weed (*Ang.*).

Taur.

(Diandria Monogynia, L.; Labiatae, *J.*) Eine in Europa an Bächen und Sümpfen wachsende Pflanze.

Man wendet das Kraut (herba Marrubii aquatici) vorzüglich in Italien seit langen Zeiten gegen kalte Fieber an, weßhalb es, als Stellvertreter der China, daselbst Erba China heißt.

2) *Lycopus virginicus, L.*; rubellus, *Moe.*; virginischer Wolfsfuß

AD.

Dem vorigen sehr ähnlich und in denselben Krankheiten, auch bei Blutungen mit Glück angewendet.

Lysimachia.

In den Pharmacopöen findet man zwei Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Lysimachia vulgaris, L.*; gelber Weiderich; Lysimaque commune, Chasse-bosse (*Gal.*); Common Loose-strife (*Ang.*); Bastard dueurt (*D.*); Lis de tintureros (*His.*); Gemeene weiderik (*Suec.*).

Wir†. Gal. *Gr. Re Sp. Z.*

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Primulaceae, *J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 278. *Hayne* VIII t 15. *Oed.* Fl. Dan. t. 689.)

Man wendet das blühende Kraut (herba et flores Lysimachiae luteae) an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit lanzettigen, fast sitzenden, gegenüberstehenden, drei- oder vierzeiligen Blättern und goldgelben, eine endständige Rispe bildenden Blüthen. Es hat fast gar keinen Geruch; der Geschmack ist etwas bitter und styptisch.

Schwach adstringirend

2) *Lysimachia Nummularia, L.*; Pfennigkraut; Nummulaire (*Gal.*); Moneywort (*Ang.*); Pengekrud (*D.*); Numularia (*His. I. Lus.*); Penning kruid (*Bel.*); Pieniecznik (*Pol.*); Penningeaert (*Suec.*).

Br†. Wir†. *M*† Gal. Gen. *Be. Gr. Sp.*

♃ Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* t. 542. *Hayne* VIII. t. 16. *Zorn* Ic. pl. t. 20.)

Man wendet das Kraut (herba Num-

mulariae s. Centummorbiae) an; es besteht aus einem meist einfachen, schwach vierkantigen Stängel mit entgegengesetzten eirunden, rundlichen, kurzgestielten Blättern. Es hat keinen Geruch. Der Geschmack ist etwas styptisch.

Ehedem wendete man es bei Durchfall und Blutungn an.

M.

Magnesium.

Ein ungebräuchliches Metall, von dem man aber folgende Zusammensetzungen anwendet:

Oxydum Magnesii, Magnesia calcinata s. alba calcinata, Magnesia pura s. usta, Oxydum Magnesii; gebrannte Magnesia. (A†. Ba†. Bor5†. Ful† Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D Du. Ed. Fenn. Fer. GalM. GalP. Gen. HisS. LH. LonN. LPC. Pm. Pol. R. RC. Suec. *Br. C. CG. DB. Fi. Gr. Re. Sp. Sw. T. Va. Vm.*)

℞. Magnesiae subcarbonicae q. libet.

Calcina igne maxime aucto, in crucibulo, donec particula Acidi cujusvis (muriatici Pm.) immissa non amplius effervescentiam producat. (Ba†. Bor5†. Han†. HN† O†. Sax2†. AD. Ams GalP. GalM. Pol. *DB.*)

HC†. Magnesiam carb. igne fortiori per horam et ultra urere; — LPC. per horas duas; — *T* Solutioni filtratae e Magnesiae sulphuricae venalis libris duabus in Aquae bull. libris duodecim infundere Kali subcarb. liquidum, donec mixturam chartam curcuma tinctam non rubefaciat; praecipitatum cum Aqua communi tam diu lotum, donec lotionum aqua illam chartam non amplius rubefaciat et solis vel balnei vaporis ope siccatum ure inter prunas ut antea etc.; — *Fi.* Magnesiam carbonicam inter prunas ad diminutionem ponderis ejus partium duarum calcinare.

Die Probe auf Säuren allein ist hinlänglich, um die Reinheit der Magnesia zu prüfen; die einstündliche (HassP†. Fenn RC. *Br.*), einstündliche und längere (Bor†.), ein- bis zweistündliche (R.), zweistündliche (A†. B. Bel. D. Du. Ed. HisS. LonN *CG. Re. Sw. Sp.*), dreistündliche (*Br*. Re.*) Dauer der Calcination kann hierzu nicht genügen, da der Stärkegrad des Feuers sehr verschieden gewesen seyn kann.

Im Allgemeinen zieht man die gereinigte Magnesia der kohlensauren vor, welche denselben Nutzen gewährt.

Protocarbonas Magnesii, Magnesia communis s. alba s. aërata s. subcarbonica s. carbonica s. anglica s. mitis s. Nitri s. Edinburgensis s. Salis Ebshamensis s. Epsomensis s. Salis amari s. cretosa s. dulcis s. effervescens, Carbonas Magnesiae s. magnesicum s. magnesicus cum Aqua s. cum Aqua et Hydrate magnesico, Lac terrae, Hypocarbonas Magnesiae, Subcarbonas s. Subprotocarbonas Oxydi Magnesii s. Magnesiae, Terra amara s. amara aërata s. absorbens mineralis s. talcosa oxyanthracodes; weiße, kohlensaure Magnesia, kohlensaure Talkerde, Bittererde; Carbonate de magnésie (*Gal.*); Subcarbonate of Magnesia, Common Magnesia (*Ang.*); Magnesia non abbruciata, Carbonato di Magnesia (*I.*); Carbonato de Magnesia (*His.*).

1) So, wie sie in der Natur vorkömmt, *Magnesia carbonica emitita s. venalis.*

Bor5†. HC†. Am. DD. Gal. GalM. GalP. LH *C. Gr. Par. Sa. Va.*

Weiß, geschmack- und geruchlos, von erdigem Ansehen, einem etwas derben Gefüge und einem feinen, sehr zähen Korn.

2) Im Ganzen bereitet.

A†. Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HN†. Li† O†. Pal†. Sax†. Wir†. Wür†. AD. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer Gal. Gen. HisS. LH LonN. LPC. Lus. Pm. Pol. R. RC. Sar Suec. Taur. *Br. C. Gr. Pid. Re. Sp. Sw T. Va. Vm.*

℞. Magnesiae sulphuricae libras duas.

Aquae bullientis . . libras octo.

Solutioni filtratae infunde pedetentim aliam Solutionem cum Kali subcarb. libra una et quatuor Aquae font. paratam, donec non ultra turbetur; lava praecipitatum Aquâ fontana, et quum haec Plumbo acetico adjecto non amplius turbatur, pulverem sicca.

HN† venalem ex officinis chemicis indicat; — HisS. Sulphatis et Carbonatis Potassae vel Sodae, singulorum libras duas seorsim in Aquae libris decem soluta et filtrata miscere, coquere, liquorem adhuc calentem rursus colare, pulverem album aqua calida abluere et per setaceum trajicere etc.; — Pm. Solutionem filtratam et bullientem Subcarbonatis Potassae librarum octo in Aquae pluvialis sedecim in aliam item filtratam et bullientem e Sulphatis Magnesiae libris de-