auf die hand-wurtzel oder gelencke, nachdem du dieselbe wohl gerieben hast.

N.33. Auf den nabel zu legen.

Schneide hundszungen-wurtzel länglicht, und binde sie alle 12 stunden auf den nabel.

N.34. Ein ander mittel.

Stecke zwischen iede zehe an füssen ein stück gesaltzenen speck, so lang als die zehen sind, und verbinde die füsse mit tüchern.

N.35. Ein anders.

Rieche öffters in ein fäßgen voll wagenschmiere.

Das dritte Capitel
Von viertägigen fiebern.
Innerlich.

N.1. Ein tranck.

Gieß auf 1 quentgen cardobenedicten-samen warmen weissen wein, laß es 7 stunden darauf stehen, gieß es ab, trincke es 2 stunden vor dem paroxysmo, mache dir darauf eine starcke bewegung, oder halte dich im bette warm, und verwahre den magen mit warmen tüchern. *Fouquet.*

N.2. Ein anderer.

Laß einen frischen eyerdotter in weissen wein zergehen, und trincke es, wenn der frost anfängt. *Fouquet.*

N.3. Ein anderer.

Nimm cardobenedicten, 1½ hand voll, katzenschwantz oder glaßkraut, ½ hand voll rothe dosten oder haselwurtz, 1 hand voll, koche es in wein oder bier. *Helmontius.*

N.4. Ein anderer.

Nimm w[illegible] dem ausgepreßten safft von selerie, 4 loth, etliche tage des morgens ein.

N.5. Ein anderer.

Nimm rhabarb. monach. 4 loth, spargel-maußdorn-petersilien-engelsüßwurtzel, iedes 2 loth, die mittlere rinde von eschenbaum und tamariß-ken, iedes 1 loth, odermenig, ceterach, frauenhaar, iedes 1 hand voll, sennes-blätter in 6 loth weissen wein eingeweichet, 3 loth, tymseld, 1 loth, agaric. trochisc. ½ loth, fenchel-saamen, 4 scrupel, koche es in 1½ nössel brunnen-wasser, zuletzt thue darzu pommerantzen-safft, 6 loth, seige es durch, thue darzu rhabarber-safft, und syr. ad melanchol. iedes 3 loth, trincke davon alle morgen ½ nössel. *Sydenham.*

N.6. Ein anderer.

Nimm china china 4 loth, rheinwein 1 kanne, laß es eine zeitlang darauf stehen, gieß es etliche mahl durch, und trincke davon des tages 8 loth. *Sydenham.*

N.7. Ein tränklein.

Nimm frischen wermuth-safft, theriac, iedes 1 quentgen, weissen starcken wein, 2 loth. Nimm es 3 stunden vor dem paroxysmo 3 oder 4 mahl ein.

N.8. Ein pulver.

Nimm ½ scrupel von frischer entzian-wurtzel 2 biß 3 mahl des tages vor oder bey der mahlzeit ein. *Boyle.*

N.9. Ein anderes.

Nimm wermuth-saltz, præparirte rothe corallen, iedes 1 scrupel, aur. fulmin. 6 gran. *Ettmüller.*

N.10. Ein anderes.

Nimm nitr. fix. 1 loth, schwefel-blumen, 3 quentgen, salmiac, 1 quentgen, rothen santel, 1½ loth, weissen zucker, ½ loth, davon nimm ½ biß 1 quentlein.

N.11. Ein anderes.

Nimm zuckerkant, 3 quentgen, ingber, ½ loth, campher, 2 loth, nimm davon 1 quentgen in warmen wasser ein. *Riverius.*

N.12. Ein anderes.

Nimm zimmet, pfeffer, iedes 1 quentlein, myrrhe, styrax, sagapenum, iedes ½ quentgen, benzoes 2 scrupel, entzian, 1½ quentlein, nimm davon 1½ quentlein in wein, darinnen rosmarien-blätter und ceterach gekocht sind. *Primerosius.*

N.13. Eine mixtur.

Nimm hindläufft-wasser, 6 loth, wermuth-saltz, ½ quentlein, schwefel- oder kupffer-wasser-spiritus, 1 scrupel, nimm es 2 stunden vor dem paroxysmo ein. *Ettmüller.*

N.14. Eine lattwerge.

Nimm china china, 2 loth, nelcken- oder trockener rosen-syrup, so viel nöthig, theile sie in 12 theile, und nimm alle 4 stunden einen davon nach dem fieber ein. *Sydenham.*

N.15. Ein julep vor kinder.

Nimm schwartz kirsch-wasser, rheinwein, iedes 4 loth, china china, 3 quentgen, nelcken-syrup, 2 loth, nimm alle 4 stunden 1 oder 2 löffel voll ein. *Sydenham.*

N.16.

N.16. Pillen.

Nimm myrrhe, bibergeil, opopanax, entzian, wermuth, iedes 1 scrupel, mithridat und entzian-safft, gleich viel, mache 28 pillen daraus, und verschlucke davon 7, 2 stunden vor dem fieber.

N.17. Andere.

Nimm lerchenschwamm, entzian, bibergeil, myrrhe, raute, iedes ½ loth, langen pfeffer calmus, saffran, iedes 4 scrupel, alten theriac, 3 quentgen, süssen granat-syrup, so viel nöthig.

N.18. Küchlein.

Nimm rauten-petrosilien-saamen, myrrhe, theriac, iedes 1 quentgen, opium, ½ scrupel. *Heurnius.*

N.19. Eine tinctur.

Nimm die tinctur Cap. 64 N. 1 ein.

N.20. Ein pulver.

Stoß entzian- oder angelicken-wurtzel zu pulver, nimm es in wein, oder hollunder-safft messerspitzen weise ein.

N.21. Ein anders.

Nimm die rinde vom frantzosen-holtz, und von eschen-holtz, iedes 1 quentgen, entzian-wurtzel-extract, angelicken-wurtzel, iedes 25 gran, salmiac blumen, 1 scrupel, myrrhen, 2 scrupel, stoß und misch es unter einander, theil es in 8 theil, und nimm alle tage eines in einer warmen brühe ein.

N.22. Eine tinctur.

Nimm öffters 50 tropffen von Johanniskraut-tinctur ein.

N.23. Ein tranck.

Nimm beyfuß, 2 hände voll, cardobenedicten-johannis-kraut, iedes 1 hand voll. Schneids klein, sieds in weissen wein, 1 kanne, den dritten theil ein, davon nimm morgens und abends 1 becherlein voll.

N.24. Ein pulver.

Nimm myrrhen, 1 quentgen, in einem glaß weissen wein, bey anwandelung des fiebers ein.

Aeusserlich.

N.25. Ein öl.

Nimm lorbeer-fuchs-lavendel-muscat-nuß-terpentin-öl, iedes ½ loth, streich es auf den rückgrad.

N.26. Ein anders.

Nimm lorbeer-fuchs-euphorb. lavendel-muscat-nuß-terpentin-öl, iedes ½ loth, streich damit den rückgrad. *Ferrara.*

N.27.

N.27. Ein pflaster.

Nimm terpentin, 2 loth, laß es in einem küpffern kessel zergehen, thue darzu grosse lebendige spinnen, N. 20. rühre es unter einander, alsdenn thue darzu das fleisch von getrockneten kröten, 1 loth, weinstein, 2 loth, sadebaum ½ loth, scorpion-öl Matthioli, so viel nöthig.

N.28. Ein pflaster auf die miltz zu legen.

Koche tabacks-blätter in wein ½ stunde lang, drucke sie durch, thue dazu dickgemachten taback-safft, wachs, baumöl, iedes gleich viel. *Ettmüller.*

N.29. Ein anders.

Nimm wachs, 2 loth, styrac. calamit. ½ loth, ladani liquidi, 1 loth, benzoe, olibanum, iedes 3 loth. *Helmontius.*

N.30. Ein äusserliches mittel.

Nimm ½ loth büchsen-pulver, feuchte es mit ein wenig eßig an, binde es mit einem tüchlein um den gold-finger, und laß es 8 tage darauf liegen. *Fouquet.*

N.31. Auf den pulß zu legen.

Nimm einen grossen spinnenkopff, oder 2 kleine, mithridat, terpentin, iedes 1 messerspitze voll, ein wenig gantzen saffran, mische es auf einen zinnern teller, und lege es auf beyde pulß.

N.32. *Ein mittel auf die pulß zu legen.*

Nimm das kräutgen hanefuß, binde es auf beyde pulße der hände, ehe der paroxysmus kommt, dreymahl nach einander, wenn das fieber kommen will, und laß es iedesmahl 24 stunden lang darauf liegen, alsdenn nimm es ab, und wirffs ins feuer.

N.33. Ein mitel auf den nabel zu binden.

Wenn dir am bösen tage allmählich die haut schauret, so nimm ein aus dem ofen kommendes heisses brodt, schneide am boden ein rund loch darein, gieß brandtewein hinein, und leg es mit dem loch auf den nabel; wenn der paroxysmus vorbey, nimm es ab, und gieb es einer sau zu fressen.

N.34. Eine salbe.

Nimm lorbeer-öl ½ loth, rauten-safft, 1 loth, rühr es unter einander zu einem sälblein, damit schmiere abends und morgens den rückgrad und die lincke seite.

N.35. Ein ander mittel.

Nimm gelbe nelcken-blättter, und blumen, stoß sie wohl mit ein wenig saltz, und wenn der frost kommen will, so leg es zwischen 2 tücher auf die hirnschaal, und laß es 24 stunden liegen.

N.36.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-135197-p0018-3 DFG

N.36. Auf den magen zu legen.

Weiche die gantze pflantze von täschel-kraut mit 5 fingern voll saltz in eßig, und binde sie 24 stunden vor dem fieber auf den magen.

Das vierdte Capitel
Von hitzigen fiebern.
Innerlich.

N.1. Ein tranck.

Nimm saudisteln-ringelblumen-und geißrauten-safft, gleichviel, in einer hühner-brühe ein, und schwitze darauf. *Boccone.*

N.2. Ein anderer.

Nimm sauerampff-wurtzel mit den blättern, 2 hände voll, erdbeer-kraut, violen-blätter, iedes 1 hand voll, koche es in gersten-wasser, seige es durch, thue zu 40 loth syr. acetos. citr. 6 loth, spirit. nitr. dulc. ½ scrupel. *Ettmüller.*

N.3. Ein stärcktranck.

Nimm von dem stärcktranck Cap. 5. N. 8 alle stunden ein paar löffel ein.

N.4. Ein anderer.

Nimm borretsch-ochsenzungen-berbißbeer, erdbeer-wasser, iedes 4 loth, wermuth-saltz, ½ quentlein, confectio de hiacyntho, 1½ quentlein, limonien-oder granaten-syrup, 4 loth, kupffer-wasser-spiritus, 30 tropffen, mische es und nimm alle stunden ein paar löffel davon. *Helvetius.*

N.5. Ein milch-wasser.

Nimm cardobenedicten 2 hände voll, raute, geiß-raute, H. Geistswurtz-kraut, wermuth, krausemüntze, melisse, iedes 1 hand voll, milch, 4 kannen, ziehe das dünne aus einem zinnernen destillir-zeug herüber, davon trincke ein glas mit zucker süsse gemacht auf einmahl.

N.6. Ein pulver.

Nimm nitr. antimoniat. 2 scrupel, antim. diaph. 1 scrupel, mische es und nimm es auf 2 mahl ein. *Ettmüller.*

N.7. Ein anderes.

Nimm salpeter mit alcali oder regul. antim. præparirt und vom alcali separirt, 1 loth antimon. diaph. bley-zucker, iedes 1½ quentl. bezoard. jovial. ½ quentl. campher, 24. gran, nimm es auf 12 mahl ein.

N.8. Ein anderes.

Nimm von dem pulver Cap. 63 N. 1.