Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0001-7
DFG

K N° 0564

Mit 85 Kupfern auf 83 Tafeln
und 1 Frontispiz.

Nissen, BBI 1222. Einzige Ausgabe
(Text S. 80)

Dv 1942

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0002-3
DFG

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
– Medizinische Abt. –
DÜSSELDORF
V 2025.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0003-9
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0004-5
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0005-1
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0006-6
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0007-2
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0008-8
DFG

FLORA PRUSSICA, SIVE PLANTÆ IN REGNO PRUSSIÆ SPONTE NASCENTES.

Qvarum Catalogum & Nomina

JOHANNES LOESELIUS
Phil. & Med. Doct. & P.P. Ordinar.
Olim disseruit,

Nunc additis nitidissimis Iconibus Rariorum, partim ab aliis nondum delineatarum plerarumq; Prussiæ propriarum & inqvilinarum Plantarum, Earundemque accuratâ descriptione,

NEC NON

Adjectis Synonymiis Veterum Botanicorum, interspersisq; Observationibus Historico-Philologico-Criticis & Medico-Practicis noviter efflorescentes,

Curante

JOHANNE GOTTSCHED,
Phil. & Med. D. hujusq; Extraord. Phys. Ord. P.P.
Regiæ Scientiarum Societatis Brandenburgicæ Membro.

REGIOMONTI, Anno MDCCIII.
SUMPTIBUS TYPOGRAPHIÆ GEORGIANÆ.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0009-6
DFG

Rara
Du 1842

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0010-7
DFG

AUGUSTISSIMO,
SERENISSIMO ac POTENTISSIMO
PRINCIPI
AC
DOMINO,
DOMINO
FRIDERICO,
REGI
IN PRUSSIA,
MARCHIONI BRANDENBURGICO
SAC. ROM. IMP.
ARCHI - CAMERARIO
ET
PRINCIPI ELECTORI,
SUPREMO ARAUSIONUM
PRINCIPI.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0011-3
DFG

MAGDEBURGI, CLIVIÆ, JULIÆ, MONTIUM, STETINI, POMERANORUM, CASSUBIORUM, VANDALORUM, ITEM IN SILESIA CROSNÆ

DUCI.

PRINCIPI HALBERSTADII, MINDÆ ET CAMINI.

COMITI IN HOHENZOLLERN, MARCÆ ET RAVENSBERGÆ,

LINGÆ, MOERSIÆ, BÜRÆ ET LEERDAMI,

MARCHIONI VERIARUM ET FLISSINGÆ.

DOMINO IN RAVENSTEIN, NEC NON TERRARUM LAUENBURG ET BÜTAU, ARLAIÆ AC BREDÆ, &c. &c. &c.

REGI OPTIMO,

PIO, FELICI, AUGUSTO.

DOMINO MEO CLEMENTISSIMO.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0012-9
DFG

AUGUSTISSIME, SERENISSIME ac POTENTISSIME REX,

Domine Clementissime, Nutritie Munificentissime.

SAcratissimo Regiæ Majestatis Tuæ Throno humillimè advolutam, quam cernis, *REX Serenissime*, FLORA PRUSSICA est. Nudis quondam verborum linteis involuta, nunc verò & splendidiori apparatu &

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0013-5 DFG

ampliori ſyrmate feliciùs refulgeſcens. A Gratiâ *Serenitatis Tuæ* ſplendorem omnem mutuata, quam tot decoribus, quot nitidiſſimis iconibus, gravi ære redemptis, donare & exornare voluiſti: Coronaturus hôc ipsô quaſi Divam hanc Patriam tùm temporis, cùm à Deo Immortali conceſſam, Regiam Tibi adaptares Coronam. Idem jam olim Sereniſſimus Parens, Magnus ille FRIDERICUS WILHELMUS, glorioſiſſimæ memoriæ, meditatus, niſi camporum eô tempore devaſtator & Floræ hoſtis infenſiſſimus Mars, Floram hanc tùm Adoleſcentem, alumnum verò ejus, cujus curæ Flora erat concredita, mors præcox contumulâſſent. Volentibus ſic Fatis, ut Plantæ Pruſſicæ non niſi tùm demum in apricum prodirent, cùm circumſævientibus undique & ubiq; Bellorum procellis in ſolâ

ferè

ferè Pruſſiâ exoptatiſſimæ pacis ſpirarent Eteſiæ. Auſpice Rege, cujus pietas eſſet campus, immarceſcibiles quarumcunque Regiarum Virtutum flores alens; quas inter ſumma in Muſas Clementia eminet, non ſtipendiorum ſaltem augmentatione, ſed & Academiarum & Societatum Scientiarum novâ fundatione nuperrimé demonſtrata. Hâc ſpe animatus, fœtum hunc Botanicum, non totum quidem meum, impigro tamen labore partum, Sacratiſſimis Regiæ Tuæ Majeſtatis pedibus ſubſterno; felicius pullulaturum, ſi gratioſiſſimis Clementiæ Tuæ radiis eum fovere fueris dignatus. Mihi verò hæc Gratia pro ſemente erit, ex quâ DEO benedicente, plurimus quondam fructus germinet. DEUS Ter Optimus Maximus TUAM REGIAM

MA-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0015-6 DFG

MAJESTATEM, Totamque DOMUM REGIAM *ſempervivo flore* coronet, faciatque, ut Thronum Tuum Regium meræ ſemper ſtipent CONSOLIDÆ REGALES & CORONÆ IMPERIALES!

Ita vovet

S. R. M. T.

Regiomonti
Die 1. Octobr. M DCC III.

ſubjectiſſimus

JOHANNES GOTTSCHED.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0016-2
DFG

Ad Lectorem.

MEdium ferè Seculum, dempto anno, elapsum, ex quo Johannes Lœselius, Johannis Filius, Juvenis adhuc, ob Parentis adversam tunc valetudinem, ex manuscripto ejusdem, PLANTAS IN BORUSSIA SPONTE NASCENTES divulgavit; certò pollicitus, fore, ut, quamprimùm Parens sanitati restitutus fuisset; Descriptiones Rariorum Plantarum unà cum Iconibus publici juris fierent. Sed, cùm Anno sequente, Parens ipse, *Anatomiæ & Botanices P. P. Ordinar. Celeberrimus*, Deo animam redderet, factum, ut opus hoc diu desideratum, mancum, mutilum & imperfectum ingemisceret. Solo igitur Plantarum Catalogo, Anno 1654. divulgato, contenta vixit Juventus Medica, nec, distractis magis magisq; & disjectis injuriâ temporis manuscriptis, cùm Filius relicto medico Jurisprudentiæ studium amplecteretur, quicquam perfecti sperare unquam potuit. Cumq; exemplaria annuatim rariora, tandem omnia ferè essent divendita, vix meo jam tempore, unum atq; alterum, quibus uteremur Botanices Studiosi, exstitit. Defectum tamen hunc facilè fidelis, assidua & freqventata manuductio *Prænobilissimi, Excellentiss. atq; Exper. Dni. Doct. Joh. Heinr. Starckii, S.R.M. in Prussia Consiliarii Aulici & Archiatri, Anatomiæ & Botanices tùm temporis, nunc Theoretices P.P. Ord. celeberrimi*, Præceptoris & Patroni summoperè honorandi, resarcivit. Singulis quippe annis freqventissimè nobiscum in campos excurrere solitus, singulari quâ utebatur encheiresi

resi, fidelitate & humanitate effecit, ut tanquam aliud agendo, summo animi cum prolubio, cognitionem Plantarum Patriarum nobis compararemus. Regiomonto dehinc Bartensteinium, ad Praxin ibi Medicam exercendam delatus, tantum abfuit, ut studium Botanices neglexerim, quin potius majori ardore horis subcisivis, per aliquot æstates in id juxta incubuerim, comitem mihi adsciscens Pharmacopœum, hospitem meum, rei herbariæ perquam gnarum. Evolvendo quoque Antiquiorum Botanicorum Pandectas, Synonymicas appellationes herbarum excerpendo, rem totam familiariorem mihi reddidi. Cumque deinde, DEO sic dirigente, Regiomontum repeterem, indeptis in Academiâ Patriâ, ante Novennium, summis in Medicinâ honoribus, adeptâ quoque à Serenissimo Rege Professione Extraordinariâ, calcar mihi valdissimum fuit additum, de Arte Medicâ quocunq; modo benè merendi. Cui demùm Soceri mei, *Domini Hermanni Dieterici Hessen; S. R. M. in Prussiâ Secretarii intimi, & Xenodochii Regii Præfecti benè meriti, Agentis quondam Brandenburgici apud Invictissimum Magnæ Russiæ CZARRIUM fidelissimi*, (qui secunda repetens vota in thalamum duxerat laudatissimi Domini Doct. Lœselii Filiam,) ante septennium & quod excurrit, accessit cohortatio, qui manuscripta Botanica Doct. Lœselii, sed heu! quadraginta jam annorum injuriam passa, manca, adeoque fragmenta saltem, unà cum Iconibus æri incisis mecum communicans, maximè institit, ut manum tandem operi admoverem, nec opportunam adeò Publico inserviendi occasionem prætermitterem. Cujus precibus eò lubentiùs obtempe-

ravi,

ravi, quò majori ipſe, ne opus toties expetitum planè interiret, flagrabam deſiderio. Tempus itaq; reliqvum, quantum à frequentatâ praxi & privatis Collegiis reſtabat, huic negotio impendi, Catalogumq; plantarum olim editum, cum fragmentis manuſcriptis, meisque excerptis conferendo, hâc tandem formâ, quâ in publicum prodire poſſet, FLORAM PRUSSICAM indui. Prodiiſſetq; jam ante Triennium, & amplius, niſi Icones ænei ab Hæredibus redimendi obicem poſuiſſent, quem tamen Gratia Sereniſſimi Regis facilè ſuſtulit. Ipſis ſiquidem *Coronationis Regiæ ſuæ Majeſtatis Feriis*, ante biennium cum dimidio, ad ſupplicem mei inſtantiam, & humillimam Excellentiſſimorum Dominorum Archiatrorum commendationem, Munificentiſſimus Rex Icones æneos ab hæredibus pretio non levi coëmit, mihiq;, ut iisdem uterer, ſingulari Reſcriptô Regiô, *clementiſſimè* conceſſit & demandavit. Nec ſubſiſtebat hîc inexhauſta Regis Sereniſſimi Clementia, ſed, ut ſummum mihi *Rerum Pruſſiæ Naturalium* amorem & ſtimulum adderet, Profeſſione Phyſices Ordinariâ Philoſophicâ gratioſiſſimè me mactabat. Quam ſingularem & immeritam Clementiſſimi Regis Gratiam ſubmiſſiſſimâ cum veneratione exoſculatus, nolui amplius & Regi & Publico deeſſe, ſed FLORAM hanc PRUSSICAM, tanquam *Primam partem Hiſtoriæ Naturalis Pruſſiæ*, Erudito Orbi in præſens communicare & præmittere; certò ratus, fore, ut, DEO vitam & vires, Rege autoritatem & Gratiam ſufficientibus, *Pars ſecunda de Pruſſiæ Animalibus, & Tertia de ejusdem Mineralibus*, (ſubnexâ aut præfixâ Parte Meteorologicâ, cujus gratiâ

 obſer-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0019-2 DFG

obſervationes quotidianas condo) Totaq; adeò *Hiſtoria Pruſſiæ Naturalis*, Opus utut à Profeſſione meâ tum Medicâ, cum Phyſicâ inprimis non alienum, multisq; Eruditis expetitum, maximè tamen arduum, aliquando ſubſequatur. Hiſce Benevolum Lectorem morari neceſſarium duxi, tùm, ut Sereniſſimi Regis Gratiam & Munificentiam, quem non Orbis angulum pervagantem? deprædicando, omnibus & ſingulis commendatiſſimam redderem, cùm ut veniam impetrarem apud Eruditos, ſi opus hoc minùs exaſciatum & perfectum judicarent. Idem huic FLORÆ factum obtigiſſe arbitrati, quod orphanis, quos rarò tàm feliciter Tutores educant quàm Parentes. Synonymias Veterum Botanicorum proptereà adjunxi, ut omnibus conſtaret, quam plantæ ſpeciem ſub titulo noſtro palmario intelligamus? Eandem enim plantam diverſi Autores & populi diverſimodè nominant. Indices, tàm Germanicus quàm Latinus, ob eandem rationem fuſiores facti, ut ſub quâlibet ſynonymicâ appellatione quælibet Planta facilè reperiri poſſet. Qvô ipsô illos quoq;, qui lingvæ Latinæ gnari non ſunt, adjutos puto, ne deſiderio ſuo excidant. Eruditiones quasdam Philologicas, Criticas & Hiſtoricas, nec non ſeriis jocoſeria quædam interſperſi, ne nimia rei Botanicæ (hortô vivô ſi deſtituatur) ariditas, curioſos Lectores deterreret. Icones omnes ad exemplar vivum, quantum fieri potuit, accuratiſſimè delineati & inciſi ſunt. Cæterùm etiam atq; etiam Lectorem Benevolum rogo, velit qualemcunq; hunc noſtrum laborem æqui boniq; conſulere, meq; non niſi de Publico ſollicitum, ſincero ſemper favore fovere & complecti.

INDEX

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0020-3 DFG

INDEX AUTORUM
in hoc libro citatorum.

Ægin. Paulus Ægineta.
Aët. Aëtii Amideni Tetrabiblos.
A. Gell. Aulus Gellius.
Alex. Alexis Fabulæ.
Alexand. Alexandrides.
Anthol. Anthologia Magna.
Anthologia Græcorum Epigrammatum.
Anſerius de Busbeck.
Apollod. Apollodorus de Deorum Originibus.
Apul. Apulejus.
Arnob. Arnobius.
Athen. Athenæus.
Auguſt. Auguſtinus de Civitate Dei.
Baal Hatturim. *Vid.* Hatturim.
Bauh. Caſpar. Bauhin. Prodromus Theatri Botanici.
Pinax.
In Matthiolum.
Bock. Hieronymus Bock. *vid.* Tragus.
Brunf. Otto Brunsfelſius. Herbarium c. Vivis Iconibus. Latinè (& Germanicè.
Bubikir Volumen Elhavi.
Busbeck. Anſerius de Busbeck.
Cæſalp. Cæſalpinus Andreas, De Plantis. Lib. XVI.
Camerar. Joachimus Camerarius, Joh. Filius, in Matthiolum.
Hortus medicus.
Hercyniæ ſtirpes,
ſive Sylva Hercynia.
Carrichter. Bartholomæus. Kräuter- und Artzeney-Buch.
Caryſtius. Antigoni Caryſtii Hiſtor. mirabilis.
Cicero.
Cluſ. Cluſius, Pannon.
Hiſtoria Rariorum Plantarum.
Editio Hiſpanica.

INDEX AUTORUM.

Column. Fabius Columna in Phytobasano.
min. Cogn. stirp. & rar. Minus cognitarum stirpium & rariorum. Part. II.
Cord. Hist. Valerius Cordus. Historia Stirpium lib. IV.
Hispan. Lingvâ Hispanicâ editus.
in Diosc. In Dioscoridem Commentarius.
Dalecampius. Jacobus. in Plinium Commentar.
Dodon. Dodonæus Idiomate Latino, Germanico, Pannonico, Batavo.
Drexelius. Lib. de Æternitate.
Eusebius de Præparatione Evangelicâ.
Eystett. Eystettensis Hortus.
Fer. M. M. Augerius Ferrerius Method. medendi.
Fern. Johan. Fernelii Opera Medicinalia.
Fuchs. Leonhardus Fuchsius. Comment. (de Historiâ stirpium)
Galen. Galeni Opera varia. (in Matthiolum.
Gellius.
Gesn. Hort. Conradus Gesnerus de Hortis Germaniæ.
in monte fracto. Descriptio montis fracti s. montis Pilati propè Lucernam in Helvetiâ.
Catalogus Plantarum Latin. Græc. Germ. & Gallicè descriptus.
Gyraldus.
Hatturim (Baal) Marginal. in Biblia Venet.
Henricus ab Heer. Observationes Medicæ.
Hesychius de Illustr. Philosophis.
Horstii Gregorii Senioris Observationes Medicinales.
Juvenalis.
Kyber. David Kyberus in Tragum. Cujus Commentariorum lib. 3. Latinè vertit 1552. 4to. Argentorati
Lactantius.
Laërtius.
Landinus. Christophorus, in Georgic. Virgil.
Lobel. Lœbel. Matthias de Lobel. seu Lobelius. Icones.
J. L. Joh. Lœs. Johannes Lœselius. } Adversaria.
Lonicer. Joh. Lonicerus in Diosc. Schola nova. } Observationes.
Lucanus.
Lucretius.
Lugdunensis Hortus.

Mar-

INDEX AUTORUM.

Martialis.
Matthiol. Petrus Andreas Matthiolus Latinè, Germanicè.
Nicetas.
Ovidius.
Pausanias.
Pedianus.
Pena. Petrus Pena Nova stirpium Adversaria.
Petræus. Henricus. Lib. Nos. Diss. Nosologia Dissertationibus so
Phanias de Plantis. (disceptata.
Plinius. C. Plinii Secundi Historia mundi Lib. XXXVII.
Plutarchus. Qvæstiones, Græcæ, Romanæ. Vitæ Reg. & Prin-
Porta Joh. Baptista. (cipum.
Propertius.
Prudentius.
Ruellius. Joh. de Naturâ Stirpium.
Scaliger. Exercitationes.
Schwenck. Lib. Stirp. Casparus Schwenckfeldius Stirpium &
Fossilium Silesiæ Catalogus.
Sebizius Melchior in Tragum Latinè & Germanicè.
Servius Commentar. in Virgil.
Statius Papinius.
Sweert. Sweertius. Florilegium.
Tabern. Jacob. Theodor. Tabernæmontani Kräuter-Buch.
Tertullianus.
Thal. Sylv. Johannis Thalii Sylva Hercynia.
Theophrastus. Historia Plantarum.
Trag. Hieronymus Tragus (Germanicè Bock) de Stirpibus
Villanovanus Comment. in Galenum. (Commentar. lib. 3.
Virgilius.
Vitruvius.
Vopiscus.

NB. Herbæ Asterismo * notatæ, illæ sunt; quarum Icones exstant. Icones ipsi numeris, ad quam paginam pertineant, insigniti sunt, ut eò meliùs loco debito inseri possint.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0023-0
DFG

* * * * * *

GEORGII WOSEGINII,

Phil. ac Medicinæ Doct P. P. Primarii,
Academiæ Senioris,
Ac p. t.
Pro-Rectoris Magnifici,
SENIS OCTOGENARII,
Ad
VIRUM
JOHANNEM Gottsched/
Phil. ac Med. Doct. Hujusque Extraord.
Physices Ordinar. P. P.
Regiæ Societatis Scientiarum Brandenburgicæ
MEMBRUM,
Floram Prussicam
publici juris facientem,

EPIGRAMMA.

PRUSSIA dat Patriam *Floræ*, sed nomine vulgi,
Quod tamen expoliit Gratia LOESELII.
GOTTSCHEDIUS lucem affundens congessit amœ-
Utile doctrinæ consiliique decus. (num
Multa dedêre alii *Floræ*, stat Gloria in uno;
Qui *Floræ* vultum contulit, Omne dedit.

(o)

PLAN-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0024-6
DFG

PLANTÆ IN PRUSSIA SPONTE NASCENTES.

I.

ABies, Bauh. in Matth. f. 102. Lob. ic. 231. o. Tab. lib. 3. fol. 640. Picea Dod. Lat. 863. Grähnen-Holtz Thuringis. Abies Plinii, & fœmina Theophrasti, Clus. Pann. p. 21. Clus. Hist. lib. 1. fol. 34. Abies alba sive fœmina C. B. πιν. 505. weisser Thannen-Baum ἐλάτη Græc. Thenne Germ. Im Löbenichtschen Wald/ & passim in aliis sylvis.

Caudicis abiegni ima & enodis pars *Sapinus*, superior nodosa *Fusterna* est Plinio lib. 16. c. 39. Viscum abietis Plinjus ex Theophrasto *Stelin* nominat, baccis illud est albis, notante Clusio. Cortices inter *lacryma* continetur, quam pro Therebinthina Veneta Institores sæpe distrahunt. Vim habet molliendi, dissipandi, abstergendi, vulnera solidandi, calculum expellendi. Oleum ejus stillatitium in ulceribus & vulnerationibus internis magnæ utilitatis.

Libra una vel altera resinæ abiegnæ cerevisiæ inter coqvendum admista, eam ab acore præservat; sed cum infatuandi virtute. Cacumina abietis decocta & pota, scorbuticum expugnare malum certò creduntur.

Piceam, veluti feralem arborem & Diti sacram, in lugubri domo Patriciorum, amissis fratribus, liberis & propinqvis, apponere olim mos erat. Apud nos, quæ ad funus olim pertinuit

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0025-2 DFG

nuit arbor, festivitatem nuptialem jam indicit, ante fores locata. Hanc vulgus, ubi scythissat, cantilenâ sæpius honorat: O Dannenbaum/ O Dannenbaum/ du bist ein edler Zweig ꝛc.

Strobili abiegni, copiosius pullulantes, opimas tritici messes ac largas vindemias promittunt. Ex abiete factus est eqvus Ilio fatalis, quem Lucretius lib. 1. *durateum* vocat, sive ligneum. Δοῦρον enim veteribus Græcis lignum erat, unde δούρειος & δουράτεος ligneus. Propertius verò *abiegnum* dixit lib. 4. eleg. 1. *Læserat abiegni venter apertus eqvi.* Vaccam quoque Pasiphaës abiegnam dixit idem Propertius lib. 3. eleg. 18. Dædalus è piceâ simulachrum Herculis fecit. Vide Apollodorum lib. 2. de Deor. orig. Statius 4. Thebaid. v. 425.

Nec caret umbra Deo. Nemori Latonia cultrix
Additur: hanc Piceæ, cedrique & robore in omni
Effictam sanctis occultat sylva tenebris.

II. Abrotanum campestre, C. B. πίν 136. Tab. lib. 1. fol. 62. Abrotanum sylvestre, vel 4. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch. 271. Artemisia leptophyllos, Ges. hort. fol. 248. Ambrosia Matth. deutsch, 359. Ambrosia altera, Bauh. in Matth. 619. Besemkraut/ Wildstabwurtz mit schmallen Blättern. Caules alit modò rubentes, modò albicantes, racemoso semine, botryos instar, refertos: Adstringit, reprimit, ac repellit: gargarisatione faucium ac tonsillarum inflammationes, insessu mulierum profluvia corrigit secundùm Matth. In der Sarckau & alibi &c.

III. Absinthium, Brunf. tom. 3. fol. 142. Sebitz in Trag. deutsch fol. 265. Matth. deutsch 276. Bauh. in Matth. 508. Absinthium latifolium. Dod. Lat. fol. 23. Absinthium vulgare Fuch. fol. 1. Lob. Ic. p. 752. Tab. lib. 1. fol. 1. Absinthium Ponticum. Ruell. lib. 3. fol. 493. Absinthium Ponticum seu Romanum officinarum, seu Dioscoridis. C. B. πίν 138. Wermuth/

muth/ Gemeiner Wermuth. Pol. Piolin Polny. Passim. Aperit, detergit, jecur & ventriculum adstrictione roborat, appetitum excitat, humoresq; biliosos ac pituitosos vacuat, tùm per alvum, tùm per urinas: vermes evocat; ac lienosos, fæculentum sangvinem ἄνω καὶ κάτω magnô impetu sæpè egerentes, egregiè juvat, Dod. Radix dulcis est ac insipida ferè, quod mirum, cum succum tanti amaroris è terrâ sorbeat.

IV. Acer major Cordi, Lob. ic. p. 199. o. Borusis Leitt-Baum/ Maßholder/ Ahorn. Ligni Materies tenera ac fissilis. Folia petiolo longo insistentia ampla sunt, profundiùs incisa, seu crenata. Flores fert in umbellis mense Majo, quibus succedunt siliqvæ binæ circa connexum duræ & à fructu extumidæ. Effigie scarabæorum alas exprimentes. Cortex vernô tempore sauciatus, liqvorem fundit limpidum, quò nonnulli aqvæ betulinæ locô utuntur. Radix tusa & foris affirmata, dolores compescere repertum, Auctore Ruelliô lib. 1. c. 47. Auff den Huben bey Königsberg.

Acer operum elegantiâ ac subtilitate cedro secundum, teste Pliniô lib. XVI. Natur. Hist. c. 15. Vertumnus acernus de se apud Propertium lib. IV. Eleg. 2.

Stipes acernus eram, properanti falce dolatus,
Ante Numam grata pauper in urbe Deus.

Ovidius lib. I. de arte, vaccam *acernam* dixit, quæ Propertio abiegna bos dicebatur. Ovidius deniq; in Ibin, equi acerni meminit,

Utq; loqvax in equô est elisus guttura acernô.

V. Acetosa pratensis, C. B. πίν 114. Oxalis, Trag. Seb. in Trag. deutsch 249. Matth. deutsch 151. b. Fuch. 464. Dod. Lat. 648. Bauh. in Matth. 353. Oxalis, Acetosa 1. Tab. lib. 2. fol. 149. Oxalis sive laparsum oxalida, Lob. ic. 290. Gemein Saurampff. Szczáw Polonis.

Jecur & lienem aperit, renum infractus expedit & crassa incidit. Hinc ictero medetur, lienem aperit, arenulas expurgat, & menses moderatè citat. Semen malignitati obsistit, lumbricos necat, dysenterias, alvi profluvia & sangvinis sputa adstrictione leni coërcet, ac robur æstuanti ventriculo, hepati ac cordi confert. Bey Holland & passim in pratis copiosè.

Radix acetosæ, prout in Officinis divenditur decocta, cerevisiam & colore & supernatante pulcherrimâ spumâ exactissimè æmulatur & incautos fallit. Præterea addito parùm Cinamomi potum egregium extemporaneum, biliosis præsertim, porrigit, quô ægri nonnulli per annum integrum & quod excurrit, usitantes, ab oppilatione hepatis liberati fuerunt. Æstatis tempore, peregrinantes, decocto ejus, locô cerevisiæ utplurimùm acescentis, ruri uti poterunt.

VI. Acetosa arvensis lanceolata, C. B. πίν 114. Acetosella, Lon. deutsch. 119. Oxalis minima, Trag. Sebiz. in Trag. 249. Dod. Lat. 650. Oxalis minor, Bauhin. Matth. 354. Oxalis tenuifolia sinuata vervecina, Adv. Lob. 120. Oxalis ovina Tab. lib. 2. fol. 150. klein Saurampff/Schaaff-Saurampff/ Szczáwik Polonis. Pingvius & aridius solum plantæ magnitudinem variat. Eadem, quæ prior agit, nec infirmioribus pollet viribus. Rufuli ejus flores elegantissimam dant tincturam, rosis vix cedentem, quam foriolis in febribus malignis salutarem censeo. Am Tragheimschen Walle copiosè.

VII. Aconitum racemosum. C. B. πίν 183. Christophoriana. Dod. Lat. 402. Lob. Ic. 682. Tab. lib. 2. fol. 454. St. Christoffels Kraut Omieg Polon. Baccæ ejus Augusto aut seriùs, maturantur. Exitialis ac novercalis est planta. Bey der Neuhäusischen Mühl am Berge. Item beym Penartischen Walde.

VIII.

VIII. Aconitum cœruleum C. Napellus I, C. B. πίν. 183. Napellus, Bauh. Matth. 768. Dod. Lat. fol. 442. Napellus verus Cæruleus. Adv. Lob. 301. Napellus maj. Latifol. & angusti foliº, Tab. lib. 2. fol. 286. Eysenhart/ Narrenkap/ Münchskap. Foliis est modò latioribus, modò angustioribus: flore sæpiùs cœruleô, aliqvando purpureô vel albô. Tota internecina animalibus, exceptô muscarum genere, cantharidibus haud absimili, quod turmatim napello insidere scribitur; Flores ejus rostellô delibans. Bey Rogitten. Item Bey der Hoppenbruchschen Mühl in Districtu Balgensi. It. Bey der Creutzburgschen Papier-Mühl am Flüß. Provenerat etiam olim bey Margen/ am Berge beym Haff/ sed post à rusticis effossus, in hortum translatus ac coronamentis additus, vocatus est Königsblum. Napelli radicem unam vel alteram eqvisones antidoto præsentissimo porrigunt eqvis in detestabili affectu, quem nominant die Wurstsucht/ den fließenden Wurm. Malum hoc tubera qvædam farcimina facie imitantia, ac depilia sæpè, excludit, quæ temporis tractu in sinuosa & maligna abeunt ulcera. Exstantias has fertiles in qvibusdam locis vanescere, in aliis iterum extumescere haud rarò conspicies, antequam congressu sordidam sui exulcerationem ostendunt. Sunt, qui opinantur, vivos vermiculos carnem inter & tergus eqvitare, tubera excitare, eademq; exedere, qui acu exempti, & ad lychnum positi, deorsum sursum cursitent. Hos Aqvâ Forti immissâ necant, ac vino adusto sinuosas mox eluunt ulcerationes.

Aconitum olim pœna. Aristoteles ob Pœana fusum ad Hermiam Evnuchum socerum suum, judicum sententiis damnatus, aconiti poculo interiit. Hesych. Illustr. de Philosophis.

IX. Acorus verus, sive calamus aromaticus officinarum

C. B. πίν. 34. Acorus Dioſc. & Acoros Theophraſti, officinis falsò calamus, Lob. ic. 57. Acorum, & Acorum cum ſuo julo, Tab. lib. 3. fol. 329. Acorum legitimum Clus. Hiſpan. p. 121. Ackerwurtz oder Calmus.

Caleſacit & ſiccat ordine tertiò, Gal. 6. ſimpl. Radix alexipharmaca eſt, attenuat, incidit, abſtergit, aperit, urinas movet. In alveis apum ſuſpenſa facit, ne examinent, Apulejus. Zu Schwanis bey der Mühl copiosè, cum nucamentis, quæ Matthiol. ſe non vidiſſe confitetur. It. zu Brandenburg am Haff/ ubi absq; julis provenit. Anſerius de Busbeck Cluſio retulit, quod nec ſemen, nec florem proferat, ubi ſponte naſcitur, ſed duntaxat qvædam nucamenta. Cluſ. Hiſp. Inqvirendum hoc exactiùs.

X. Acorus adulterinus C. B. πίν 34. Acorum officinarum, Fuch. fol. 12. Pſeudoacorus, Bauhin. Matth. 21. Acorum adulterinum. Trag. Seb. in Trag. deutſch 555. Acorus paluſtris, & Butomon Theophr. Lob. ic. 58. Iris paluſtris lutea, Tab. lib. 2. fol. 330. Pſeudoiris Dod. Lat. 248. Butomon, Cluſ. hiſt. fol. 232. Fœmellis Anckerwurtz. Aliàs Geel Waßer-Lilgen / Drachen-wurtz. Polonis Kosaciec dziki zolty. In foſſis, in der Hollen-Grund.

Radix ſiccat, adſtringit, unde magnas obtinet vires in ſiſtendo ſangvine, undecunq; erumpente, Dod. Sunt, qui radice, Majo menſe eradicatâ, collo (ut ſcrobiculum cordis attingat) appenſâ pòſt in rivum conjectâ foriolos, & ad laſanum crebriùs conqviniſcentes, reſtituere ſatagunt. An robur concipiendi mulieribus adimat, ut opinatus eſt ille apud Cluſium Medicus, affirmare non poſſum.

XI. Adianthum aureum minus, Tab. lib. 2. fol. 476. Polytrichon Apuleji, vel 2. Lonic. deutſch 249. Muſcus capillaris, Dod. Lat. 475. Polytrichum aureum medium C. B.

πίν

πίν. 356. Wiedertodt/ Güldenwiedertodt/ Jungfrauenhaar. Mátky Bozey wloshi zlotek Pol. Siccat ac discutit aliqvantulum, adeoq; σύμμετρον est & temperatum. In locis muscosis, carieq; exesis lignis sæpiùs visitur.

XII. Alcea Matth. Bauhin. in Matth. fol. 663. Fuch. fol. 80. Tab. lib. 2. fol. 446. Alcea & herba Simeonis Brunf. tom. 1. fol. 197. Alcea malvæ roseæ sylv. genus, Trag. Kyb. in Trag. Lat. 365. Alcea vulgaris Dod. Lat. fol. 656. Lob. Observ. 374. adv. 295. Alcea vulgaris major C. B. πίν 316. Sygmarswurtz/ Simarswurtz. Lentum ac viscidum quod obtinet planta, potissimùm radix, quæ glutinosa, dulcis & modicè constringens est degustata. Dysentericis ac ruptis medetur radix, ex vino vel aqvâ pota. Sunt, qui radicibus alceæ, altheæ locó utuntur in tumoribus emolliendis ac solvendis. Collo suspensa radix aciem oculorum tueri creditur vulgò. In der Hollen-Grund.

XIII. Alchimilla, Trag. Seb. in Trag. deutsch 408. Dod. Lat. 140. Tab. lib. 1. fol. 308. Pes leonis, Brunf. tom. 3. fol. 79. Fuchs. 612. Lonic. deutsch 245. Stellaria Matth. deutsch 513. Bauhin. Matth. 819. Δροσερὰ Δρόσιον sive Φιάδδον, Cord. hisp. fol. 147. Sinnaw/ Sonnentaw. Lewenfuß. Unser Frauen Mantel. Przywrot Pol. Bey der Altstädtschen Ziegel-Scheün & alibi passim. Flores communiter pallidi ac herbacei, rariùs albi. Foliis ros sæpè, in guttulas coactus, perlarum modo insidet. Abstergit, mundat, adstringit & solidat, unde vulneraria audit.

XIV. Alga marina Lob. lc. 248. o. Fucus marinus alter, Dod. Lat. 479. Alga angustifolia vitrariorum C. B. πίν 364. Meergraß. An der See hin und wieder. Folia, nunc latiora, nunc angustiora, initiò saturatè viridia, post exsiccata prorsus candida. Algâ marinâ in fasciculum collectâ & pi-

& pileis aptatâ, levis armaturæ milites cristarum locô, quas sub vertice gerunt, quondam utebantur. Superbiusculi algâ succo baccarum rubi Idæi infectâ, incedebant. In Insulâ Jarsay, vel Gerzey, Vnglorum Imperio subjecta, cum exiguum ignis alimentum ferat, pro lignis algâ marinâ (Uraje vocant) utuntur incolæ.

XV. Alliaria Seb. in Trag. deutsch fol. 67. Fuch. 104. Lob. ic. p. 530. Bauhin. in Matth. 613. Alliastrum. Gesn. hort. 245. b. Knobloch-Kraut / Lauchel / Saltz-Kraut. wsnaczech Polon. Im Domnauschen Walde. Aperit, incidit, tenuat, digerit, putredini resistit, abstergit, mundatq; Primô vere decerpta folia intinctibus ac salsamentis adduntur. Semine viscidos in pectore incidit humores, ac herbæ succo febribus ulceribusq; succurrit malignis. Cit sternutamentum succô vel semine naribus immissô, uteriq; strangulatum tollit, cervici inditum semen linteo conclusum. Succus mense Majô expressus, seu liqvidus, seu inspissatus, ut & sal magmatis, in gangrænâ, & ulceribus sordidis ac malignis perutilis.

XVI, Allium ursinum, Bauh. in Matth. fol. 422. Fuchs. 739. Com. in Matth. 173. A. Clus. hist. lib. 1. fol. 190. Allium ursinum latifolium, Lob. ic. p. 159. Allium sylv. Brunf. tom. 3. fol. 137. Seb. in Trag. deutsch 594. Allium sylv. latifolium C. B. πίν 74. Molus, sive Allium ursinum, Florib. Swert. part. 1. fol. 61. Wald-Knoblauch / Hunds-Knoblauch Acker-Knoblauch. Czosnech Babczy Pol. Hinter Lattenwalde.

Allium ursinum totum theriacæ locô ingerunt rustici Lithvani, cum modico salis & paucillo panis, parvi ritum facientes Veterum. Olim allium qui gustâsset, à delubro & sacris arcebatur. Hinc Stilpon Philosophus somnians, Deam adstantem

ſtantem allii eſum ſibi exprobrare, reſpondit hæc in ſomniis: *Præbe mihi quod edam, & allio non veſcar.* Factum hoc fuerat ob graviſſimum allii odorem, unde σκοροδίζειν, moleſtiâ & dolore eſt afficere. Ariſtophanes in eqvitibus ſub perſonâ Populi Athenienſis, φάσκων φιλεῖν μ' ἐυσκορόδισας h. e. dum ais te diligere me, alliaſti me, Affine eſt huic Xenophontis κρομμίων ὄζειν, cepe olore, quod in ſordidos & illotos quadrat. Allium quantùm calculoſis proſit, in vulgus notum eſt; facilè enim reliquis omnibus antinephriticis palmam præripit.

XVII. Allium montanum bicorne anguſtifolium flore purpuraſcente, C. B. πίν p. 74. Ampelopraſſon proliferum, Lob. Ic. 156. Allium ſive Moly montanum 2. Cluſ. Hiſt. lib. 2. fol. 193. Moly montanum carmeſino colore, Swert. Zweyhörnichter ſchmalblätterichter Berg-Knoblauch mit Purpurfarber Blüht. In montoſis.

XVIII. *Allium montanum capite rotundo*, C. B. πίν. 75. Allium ſeu Moly montanum 5. Cluſ. Pann. p. 219. (Cui & Moly montanum purpureo elegantiſſimo flore) & hiſt. lib. 2. fol. 195. Bergknoblauch mit runden Purpurfarben Köpfflein. Cauli viridi, rotundo, duorum vel trium cubitorum altitudine excreſcente, ac tribus vel quatuor ſæpè oblongis tenuibusq; foliis ornato, capitulum inſidet ſphærale φύσιγξ dictum ex pluſculis floribus, petiolis fultis, congeſtum, qui ſex foliola, elegantiore purpurâ nitentia, & nunquam ſe explicantia obtinent. Semina mox adſunt copioſa rotunditate oblonga, candida, glumis ex nigro purpuraſcentibus induta. Radix bulboſa ἀγλιθας, ſeu nucleos quosdam tunicâ veſtitos, ad latera interdum egerit. In der Hollen-Grund. Floruit menſe Julio. Notandum

hic, quod φύσιγξ propriè folliculus sit turgidus in allii capite, quo semen continetur. Allio coronatus est Andronicus Imperator Orientalis, ab Isaacio Angelo victus, & post atrocissimos cruciatus, præcisâ dextrâ, oculo altero effosso, pedibus vivus suspensus. Nicetas & ex eo Drexel. l. de Æternitate.

XIX. Alnus. Brunf. tom. 3. fol. 235. Seb. in Trag. deutsch 860. Bauh. in Matth. 132. Lob. ic. o. 191. Tab. lib. 3. fol. 690. Alnus vulgaris, Clus. hist. lib. 1. fol. 12. Alnus rotundifolia glutinosa viridis C. B. πίν pag. 428. Elrenbaum. Bey den Huben. Siccat, refrigerat, & adstringit, cortice ac foliis. Lassitudinem viatorum levant folia, calceis imposita. Cortex cum nucamentis & ferri scoriâ aquâ maceratus atrum suppeditat colorem coria tingentibus utilem. Aqua alni, ex foliis prolecta, expertum est medicamentum in arthritide, dolores quippe velut incantamento quodam aufert, foris admota. Eo nomine secretò ut habeatur, sunt ἀλωπεκίζοντες, cum vulpe vulpinantes, qui *aquam alni* transnominant & *aqvilanam* vocant.

**Alnus mense Aprili inter julos copiosissimos, eò tempore defluos, semine plenos, corpora quædam edit nana, κονοειδῆ, ruffa ac sqvammata, petiolis fulta suis, quæ gemini sunt alni flores, & conos post se relinqvunt subvirides initio, tandem ad nigrorem abeuntes, & hiscentes.* Verrucæ alni tubercula sunt globosa, & inæqvalia sæpe, arbori clavorum instar defixa, quo levi brachio, immisso cultro, eximi possunt. His pueri globorum utuntur loco, ruri lusitantes. Lintres, lembi ac scaphæ initio ex alno parabantur juxta illud Virg. 1. Georg.

Tunc alnos primùm fluvii sensere cavatos.

Emplastrum Lœselii ex Alno ita habet: R. ol. veteris libr. 1. cortic. verrucarum alni, radicum alni ana libr. ½ gemmarum alni

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0035-8
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0036-3
DFG

alni Uncias 4. fructuum alni auctumn. coll. Uncias 2. ebulliant, ac ſtent in aheno per 4. dies ac noctes, colato & expreſſo oleo adde Lithargyr. aurei triti ac creti Unc. 15. Coqvantur aliqvamdiu ſpatulâ debitè materiam agitando, & inter coqvendum affunde: Succi foliorum alni, corticum, radicum alni, aquæ foliorū alni ana libram 1. Ultimò ubi adverteris juſtam ferè emplaſtri conſiſtentiam, adde per incerniculum pulveris florum alni, julorum alni, foliorum alni, fructuum alni autumno collector. ana Unc. 2. M. F. l. a. absq; cerâ emplaſtrum. Uſus diſcutit, dolores ac cruciatus arthriticos egregiè ſiſtit. Eryſipelata, omnesq; partium intemperaturas fervidas potentiſſimè exſtingvit. Tumores reſolvit, vulnera cruenta placat, ac ulcera haud ſordidata, nec non oſſa fracta optumè ſolidat. Eô nomine cerato diachalcitidis Galeni, ſeu Diapalmæ, hoc longè præferendum exiſtimo.

XX. Alnus nigra baccifera, C. B. πίν. p. 428. Frangula Bauh. in Matth. 875. Dod. Lat. 784. Tab. lib. 3. fol. 753. Arbor fœtida, Lon. deutſch 60. Faulbaum Trag. Kyb. in Trag. p. 981. Hüneraugen Boruſſis. In der Hollen-Grund.

Vaccæ foliorum paſtu lac reddunt copioſius. Cortex interior luteus, vere delibratus, & ſiccatus obſtructa expedit viſcera & humores bilioſos, pituitoſos, ac ſeroſos fortiter educit drachm. ½ vel Scrup. 2. pondere cum correctore maci, vel zingibere ſumptus. Aceto miſtus & impoſitus ſcabiem aufert humidam, *Seb. in Tragum.*

XXI. Aloë paluſtris C. B. Pin. pag. 286 Stratiotes ſive militaris aizoides Adv. Lob. 334. Sedum aquatile, ſive ſtratiotes potamios Dod. Lateiniſch fol. 589. Waſſerſegen / Waſſerſichel. Im Graben bey dem kleinen Brückchen / nach Jeruſalem zu.

XXII. *Alsine marina foliis portulacæ. Joh. Lœsel. „Plantula est longissimâ radice albicante, sub terrâ repente, „quæ novis subinde radiculis constitutis horsum vorsum ra„dicationem instituit, ac nova alsines germina excludit: Thyr„sulis est succosioribus, rotundis, geniculatis, albicantibus, „nonnunquam & rubentibus, quorum geniculis ministeria „præstant, bina exadversum folia crassa, succo plena, viri„dia, ex oblongo acuminata, gustu ferè fatua. Flosculos „alit qvinq; foliis candidos, mense Julio, aliis quinis foli„olis intervirentibus suffultos, quorum singulis assistit sta„minulum subluteum. Capsæ post succedunt virides, orbi„culatæ, quinis locis extumidæ, aliquantulum fastigiatæ, „ac in meditullio tenuissimis filamentis instructæ, quæ dif„fractæ, septem semina offerunt lutea, parte convexâ ro„tunda, simâ compressiunculis ternis, & pluribus insignita, „& plana. Meerhünerdarm mit dicken Gartenbürtzels Blät„tern. In der Sarkau.

XXIII. Alsine major, C. B. Pin. pag. 250. Alsine, sive Hippia major, Lob. ic. 459. Centunculus, Cæs. lib. 6. c. 53. p. 259. Groß Hünerbiß / Meyerkraut / Vogelkraut / Meyer. Bey Königsberg.

XXIV. Alsine minor repens. Joh. Lœsel. Klein krichender Hünerdarm / oder Vogelkraut. Hinter Lattenwalde nach Kuntzen zu. Aviarii oscines suas aves, cibum fastidientes, herbulâ hâc recreant.

XXV. Alsine minor multicaulis, C. B. Pin. pag. 250. Alsine minor, Fuchs. fol. 23. Lon. deutsch 203. Tab. lib. 2. fol. 382. Alsine minima, Dod. lateinisch fol. 30. Adv. Lob. fol. 193. Centunculus minutissimis caudiculis, Cæs. lib. 6. cap. 53. pag. 259. Klein vielstengelicht Vogelkraut / oder Meyer. Am Wall.

XXVI.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0039-3
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0040-4
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0041-0
DFG

Alsine bifolia fructu Coriandri radice geniculatâ.

Num. 3 ad pag. 33.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0042-6
DFG

XXVI. Alſine triphyllos cærulea, C. B. Pin. pag. 250. Händelkraut cœruleis floſculis, Trag. Kyber. in Trag. pag. 401. Alſine parva recta, folio Alſines hederaceæ, ſed rutæ modo diviſo. Lob. ic. pag. 464. Alſine recta, Tab. lib. 2. fol. 383. Händelkraut / Hünerrauten / Dreyblättericht Vogel-Meyer mit blauen Blümlein. Auff den Aeckern.

XXVII. Alſine veronicæ foliis, floſculis caudicalis adhærentibus, C. B. Pin. p. 250. Alſine folio veronicæ, Tab. lib. 2. fol. 384. Alyſſon, Colum. in Phytobas. p. 28. Hünerdarm mit Ehrenpreiß-Blättern. Auff den Aeckern.

XXVIII. Alſine hederulæ folio, C. B. Pin. p. 250. Alſine mas. Geſn. hort. fol. 245. Alſine ſpuria prior, ſive morſus gallinæ, Dod. lateiniſch fol. 31. Morſus gallinæ folio hederulæ, Lob. ic. 463. Centunculus hirſutior, Cæſ. lib. 6. cap. 53. pag. 259 & ſeq. Alſine hederacea. Tab. lib. 2. fol. 384. Hünerdarm mit Epheu-Blättern. Am Wall.

XXIX. Alſine ſpergula dicta major. C. B. Pin. pag. 257. Saginæ ſpergula. Lob. ic. pag. 803. Spergula, Dod. lateiniſch. fol. 573. Waſſerperlen Boruſſis. Unter dem Getreidig.

XXX. Alſine foliis Triſſaginis, Lob. ic. p. 464. Tab. lib. 2. fol. 384. Alſine chamædrifolia floſculis pediculis oblongis inſidentibus C. B. Pin. pag. 250. Alſine media, Fuchſ. fol. 22. Alſine ſpuria altera, Dod. lateiniſch. fol. 31. Hünerdarm mit Gamanderlein-Blättern / deſſen Blüht auff länglichten Stengeln. Am Steindamſchen Wall.

XXXI. *Alſine bifolia fructu Coriandri radice geniculatâ. Joh. Lœſelii. Vogelkraut mit Coriander Saamen. Plantula eſt triuncialis, & ſæpè major, thyrſulis inſtructa " ſuis, quorum ſingulis geniculis bina aſſiſtunt foliola in acu- " tiem abeuntia, floſculos fert dilutè purpureos, foliis pro- "

„ximè assidentes, quibus succedunt conceptacula, seu vascula „rotunda, acuminata Coriandri facie, minutulum semen, „nigricans & triangulum, concludentia. Radice nititur ge„niculatâ, filamentis comitatâ. Bey Kahlholtz in districtu Balgensi auff der Wiesen. Floret mense Junio.

XXXII. Anagallis mas phœnicea, Lob. ic. pag. 465. Anagallis mas, Sebit. in Trag. deutsch fol. 307. Bauh. in Matth. 464. Fuchs. fol. 18. Dod. lateinisch fol. 32. Lon. deutsch fol. 204. Anagallis phæniceo flore, C. B. Pin. pag. 252. Clus. hist. lib. 6. fol. 182. Rother Gauchheil. Rother Meyer Borussis. Unter dem Getreidigt. Anagallis mas in sistendo sangvine adeò efficax, ut in volâ duntaxat manûs servata eundem sufflaminet. Lonicerus addit fol. 204. Venam in brachio sectam sangvinem haut fundere, herbulâ hâc manu detentâ. Immensium nimio fluxu collo affirmetur, ut scrobiculum cordis attingat.

XXXIII. Anagallis aquatica major folio oblongo, C. B. Pin. pag. 252. Berula major. Tab. lib. 2. fol. 389. Grosse Bachbungen / mit länglichten Blättern. An den Flüssen hin und wieder.

XXXIV. Anagallis aquatica minor foliô oblongô, C. B. Pin. pag. 252. Anagallis aquatica minor 2. Tab. lib. 2. fol. 389. Kleine Bachbungen mit Poley-Blättern. Rivulis ac fossis assistit.

XXXV. Anagallis aquatica folio subrotundo, reptante cauliculo. Joh. Lœsel. Kleine krichende Wasserbungen. Auff der Wiesen gegen Jerusalem über. Convenit cum reliquis cum anagallide aquaticâ minore foliô subrotundô, C. B. Pin. pag. 252. nisi quod hæc cauliculos obtineat in superficie terræ longiùs reptantes, & ex intervallo quodam fibris radicationem impetrantes.

XXXVI.

XXXVI. Anagallis aquatica breviore oblongô foliô semine biscutato, J. Lœsel. **Kleine Bachbungen mit kurtzen länglichten Blättern/deßen Saam in doppeltē Schildlein.** Tota radix capillata, quæ cauliculos numerosissimos quaquaversum sparsos gestat, humi jacentes ac reptantes, quorum nonnulli reptatu novas subinde acquirunt fibras, in rectum radicantes. Foliis est curtis, oblongis & acuminatis, articulis thyrsulorum pari responso affirmatis. Semen in scutigerulâ delitescit thecâ. **Im Dorff Sarkau nach dem Curischen Hafe zu** in loco arenoso.

XXXVII. Anagallis aquatica longiore angusto folio, semine biscutato. Joh. Lœsel. **Kleine Bachbungen mit langen schmallen Blättern / deßen Saam in doppelten Schildlein.** Radice crescit nodosâ, villis instructa suis: cauliculo geniculato ac levi, bina longiora, angustissima & tenuiter serrata, situ adverso præstò sunt folia, ex quorum sinu emergunt pediculi in tenellos alios pedicellos inordinatos abeuntes, qui flosculos alunt quadrifolios, parvos ex rubro albicantes, quos vanescentes scutulæ geminæ, Thlaspios instar, tenuissimâ instructæ aristâ, seqvuntur, seminis servatores Magnitudine variat: pumila sæpius est, vix spithamam alta rariùs cubitalis & procerior. **Hinter dem Tragheimischen Wall / nicht weit vom Oberteich.**

XXXVIII. Angelica aquatica, C. B. Pin. pag. 156. Archangelica, Lob. ic. pag. 701. Dod. **lateinisch.** fol. 318. Clus. Pann. pag. 695. Clus. hist. lib. 6. fol. 195. Cam. pag. 17. **Wasser-Angelicke**, Arcydziegiel Pol. **In der Wiesen nach Lochstädt zu** copiosè. Floret circa finem Junij. Ulnas sæpe quinque longitudine suâ excedit. Angelica sub elevatione poli 47. 48. 49. nata, ac ☉le. 5. ♋. occupante effossa, efficaciter operari creditur.

XXXIX.

XXXIX. Angelica ſylveſtris major hyrſuta. Joh. Lœſel. Wilde rauhe Angelick / Hundgierſch / Boruſſ. Ra-
„dix craſſa & fibroſa, nigricans foris, intus albicans, cau-
„lem effert bicubitalem, & ulterius ſæpè productum, ro-
„tundum, medullâ intus albicante, hirſutie aſperum, viridē,
„in alas brachiatum, qui digitis tritus odoris eſt nonnihil
„aromatici. Foliis creſcit podagrariæ, ſed profundius in
„ambitu inciſis, hiſpidis, atrovirentibus, & in acutiem
„abeuntibus, quæ ſimiliter comminuta odorem hyſſopi
„ferè ſpirant. Flos in umbellis albicat, ſemine nigro poſt
„ſe relicto. Radix inodora ferè & exiguè acris calefacit &
„ſiccat. Im Penartiſchen Walde.

XL. Angelica ſylveſtris minor ſive erratica, C. B. Pin. p. 155. Pycnocomos. Brunf. tom. 3. fol. 165. Podagaria. Adv. Lob. fol. 311. Ægopodium, Tab. lib. 1. fol. 301. Herba Gerardi, Dod. lateiniſch. fol. 320. Angelica ſylveſtris communis, peſtis hortorum, Cam. pag. 17. Angelica vitium, & oſteritium ſylveſtre, Sebit. in Trag. deutſch / 333. Geußfuß. Noſtratibus, Gierſch. Girz Pol. Succulenti ejus thyrſuli, abjectis foliis verno tempore edules ſunt, & creberrimi uſûs. Tota vulneraria eſt, arthriticos unà inſigniter juvans foris & intus adminiſtrata. Radix ſudorem movet aliquot dies cum vino hauſta, ac febres fugat. In ſylvis umbroſis paſſim.

XLI. Anonis ſpinoſa flore purpureô, C. B. Pin. 389. Ononis, Bauh. Matth. fol. 501. Ononis, Anonis, Reſta bovis, Cam. Matth. fol. 227. Reſta bovis, Sebit. in Trag. deutſch / fol. 683. Lon. deutſch / fol. 103. Anonis. Fuchſ. fol. 60. Dod. Lateiniſch. fol. 743. Dod. Niederländiſch fol. 1164. Ononis, Cord. in Dioſc. fol. 51. Geſn. hort. fol. 269. Lob. Obſerv. fol. 492. Adv. Lob. fol. 378. Thal. ſylv. 81. Ononis I.

Tab.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0046-9 DFG

Tab. lib. 2. fol. 226. Remora aratri quibusdam. Braun Hauhechel / stachlicht Stallkraut / Ochsenbrech. Cortices radicum vino decocti præstantissimi sunt in frangendo calculo, & lotio ciendo, *Diosc. & Plin.* Infarctus quoque jecoris & lienis expediunt, ictericis & hydropicis summoperè utiles. Novi quendam, (inquit Matth.) qui radicis pulvere duntaxat plurimis mensibus sumpto carnosum ramicem absumpsit & sanatus est: licet à Medicis nullo alio medicamento, quàm solâ sectione ustioneq; hunc curari posse antea statutum esset. Equis porrigitur decoctum Ononidis ischuriâ laborantibus. Olim planta adhuc tenera muriatica erat ex genere condimentario, quam sale conditam diutulè servabant edulem, cui anima fœtebat. Lævis est vere, & primâ æstatis parte, pòst aculeos contrahit. In hortis coli non debet Ononis, ne fiat Anonis, hoc est inutilis, & noxia aliis herbis, Gesn. Bey der Pillau auff dem Haacken. Floret mense Julio. Resta bovis efficacissima creditur sub elevatione Poli 48 nata & collecta Sole 8 ♌ occupante.

XLII. Anonis spinis carens purpurea, C. B. Pin. 389. Braune Hauhechel ohne Stacheln. Anonis mitior prima, Clus. histor. lib. 1. fol. 99. Anonis non spinosa, Clus. Pann. p. 52. Eystett. Ononis perpetuò lævis, Ges. hort. fol. 269. Ononis 3. non spinosa purpurea, Tab. lib. 2. fol. 227. Anonis sive Ononis sine spinis, Camer. hort. p. 17. Bey Elbing copiosè.

XLIII. Aparine, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 393. Bauh. Matth. fol. 590. Fuchs. fol. 50. Dod. lateinisch. fol. 353. Cord. in Diosc. fol. 57. Lon. deutsch 270. Lob. ic. pag. 800. Cæs. lib. 8. c. 9. pag. 324. Aparine aspera. Thal. pag. 10. Aparine vulgaris. C. B. Pin. pag. 334. φιλάνθρωπος, Diosc. Kelbkraut Ostrzyca Pol. Am Kneiphöfischen Wall passim. Phalangiorum

& viperarum morſiunculis auxiliatur, Trag. Aqua in puncturis & doloribus hypochondriorum perutilis.

XLIV. Aparine paluſtris lævis, Thal. pag. 10. Gallium album Tab. lib. 1. fol. 537. Gallium paluſtre Dod. lateiniſch fol. 355. Gallium paluſtre album, C. B. Pin. p. 335. Weiß glatt Meyerkraut. In locis paluſtribus paſſim circa Regiomontum.

XLV. Apium montanum folio ampliore, C. B. Pin. 153. Oreoſelinum ſive Veelgutta, id eſt multibona, Dod. lateiniſch 696. Oreoſelinum, Lob. ic. pag. 707. Cluſ. hiſt. lib. 1. 195. Oreoſelinum 1. Tab. lib. 1. fol. 342. Bergpeterlein / Bergeppich / Samlod Bor. Zu Qvednau aufm Berge. Opych gorny, Pol. Ruſticis in frequenti eſt uſu in ſanandis pecoribus.

XLVI. Aqvilegia ſylveſtris, C. B. Pin. p. 144. Aquilegia Sebitz. in Trag. deutſch fol. 108. Fuchſ. fol. 102. Lon. deutſch fol. 116. Cæſ. lib. 15. cap. 38. fol. 589. Aqvilegia ſimplex, Cam. pag. 19. Aqvilina, Bauh. in Matth. fol. 469. Lob. ic. pag. 761. Tab. lib. 1. fol. 118. Wilde Agley / Cynowod Pol. In der Oſterodiſchen Heyde hinter dem Schilling (lacus eſt). Item in der Johansburgſchen Heyde am Wege. Semen drachmæ unius pondere cum pauxillo croci ſumptum obſtructa referat viſcera, & experimentum eſt in ictero, *Trag.* Variolas quoq; & morbillos egregiè provocat. *Cam.* Flores cordiales ſunt. Aqua ejus ſtillatitia faciem emaculat & nitidam reddit, aciem oculorum firmat, & caliginem fugat. Aquilegiæ radix & folia colliguntur ſole in 1. ♋ exiſtente: flores, ſole in ultimo ♊ gradu: ſemen, ex ultimo ♌ gradu emigrante.

XLVII. Artemiſia vulgaris major, C. B. Pin. 137. Artemiſia, Trag. Sebitz. in Trag. deutſch / 273. Bauh. in Matth. fol. 617. Cord. in Dioſc. fol. 58. Cam. pag. 21. Artemiſia latioris folii Dod. lateiniſch fol. 33. Artemiſia mater herbarum,

Lob.

Lob. ic. 764. Artemisia rubra & alba, Tab. lib. 1. fol. 34. Beyfuß. Bylicá Pol. An den Zäunen passim.

Menses movet, secundinas fœtusq; extrahit, & uteri præclusioni confert. Carbo sub radice, æstivô solstitio, & maximè Divi Johannis Baptistæ pro Festo, erutâ, inventus, singularis est virtutis in epilepsiâ, teste Fernel. & aliis. Ejus rei experimentum Matrem Illustr. Hassiæ Principis Wilhelmi semel atq; iterum fecisse tradit Petræus, lib. 1. Nos. diss. 6. §. 53. Artemisiæ decoctum veterinarii jumentis tussi devexatis utiliter porrigunt.

XLVIII. Arundo palustris, Bauh. in Matth. fol. 137. Tab. lib. 1. fol. 703. Harundo phragmitis, Ruell. lib. 1. fol. 129. Arundo vulgaris sive φραγμίτης, Diosc. C. B. Pin. 17. Calamus sive arundo alia gracilis, Cæs. lib. 4. cap. 59. fol. 186. Gemein Rohr / Deckrohr. Vitetur ejus ἀνθήλη seu ἄνθος ἐκπαππόμενον flos nempe lanosus, qui sæpissimè aures exsurdat. Am frischen und Curischen Haafe it. in Königsberg in locis palustribus copiosissimè. *Arundo coronat.* Arundine Lacedæmonii coronabantur festis Promachiorum diebus. Quodnam id festum sit, certò dicere non possum. Existimo ἀμυστὶ καὶ ἀπνευστὶ, ac sine inspiratione bibentes festo eo honorari. Προμάχοι quippe antesignani sunt, qui aliis bibendo præeunt. Arundine autem utebantur, ob dolorem & gravitatem capitis, á vini potu molestam. Vinculum enim quodvis temporibus admotum prodesse credebant veteres. *Arundo mortem infert.* Alexinus Philosophus, qui διὰ τὸ φιλονεικότατος εἶναι, h. e. ob contentionis studium ἐλεγξῖνος dicebatur, è vulnere arundine puncto, mortem oppetiit, in Alphæo amne natans.

XLIX. Asarum, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 50.

Fuchſ. fol. 10. Bauh. in Matth. fol. 36. Dod. lateiniſch fol. 358. Geſn. hort. fol. 249. Lon. deutſch fol. 156. C. B. Pin. pag. 197. Tab. lib. 2. fol. 423. Aſarum Baccaris ſive baccatus, Lob. ic. pag. 601. Haſelwurtz, Kopytnik Pol. Floret menſe Aprili. Beym Lautſchen Teich am Berge / in locis umbroſis.

Virtutes emeticæ, ſi crudum aut infuſum ſumatur; diureticæ & diaphoreticæ ſi decoqvatur, utroq; autem modo antifebriles in vulgus notæ ſunt. Aſarum virtutibus maximè potens cenſetur, ſub elevatione Poli 45. 46. 47. 48. proveniens. Colligatur ☉le 15. ♉ occupante.

L. Aſclepias albo flore, C. B. Pin. p. 303. Hirundinaria, Trag. Sebitz. in Trag. fol. 144. Lon. deutſch fol. 163. Vincetoxicum, Matth. deutſch fol. 336. Dod. lateiniſch fol. 407. Aſclepias, Fuchſ. fol. 130. Geſn. hort. fol. 249. Cæſ. lib. 6. c. 72. fol. 269. Schwalbenwurtz. Zwycie zyiad, Pol. In der Hollen-Grund hinter der Bleich am Berge. Item bey S. Albrecht an den Seebergen copioſiſſimè.

LI. Aſparagus maritimus Dioſcoridis, Lob. ic. p. 786. Aſparagus marinus, Cluſ. Hiſp. pag. 462. Cluſ. hiſt. lib. 5. fol. 179. Aſparagus paluſtris, Tab. lib. 1. fol. 515. Bauh. in Matth. fol. 373. Aſparagus maritimus craſſiore folio, C. B. Pin. 490. Spargen / Corallenkraut / Jablonki Pol. Bey S. Lorentz an der See. Item in der Sarckau / ubi à nobilium miniſtris ſæpiuſculè effoditur & in hortum defertur. Moderatè refrigerat, ſiccat & abſtergit. Jecur ac renes infarctu liberat tùm radice, tùm ſemine, regioq; morbo ſuccurrit. Urinam ciet, calculos exturbat, ſemen genitale auget, Veneremq; ſtimulat. Turiones ejus in acetariis ſumpti alvum emolliunt. Aſparagus in ſolo etiam infelici uberat, cornua ovilla, hircina aut arietina vel integra, vel in pollinem acta, radici ſi addideris.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0051-6
DFG

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0052-2
DFG

deris. Crescit quoq; Asparagus in campis & pascuis ad digiti majoris crassitiem, sed saporis amariusculi. Bey Ragnit auf den Kampen und Wiesen copiosè.

LII. Asperula, sive Rubeola montana odora, C. B. Pin. p. 334. Matrisylva, Trag. Sebitz. in Trag. fol. 394. Lon. deutsch fol. 270. Matrisylvia vulgaris, Thal. p. 77. Asperula aut Asperula odora nostras, Lob. ic. 801. Asperula odorata. Dod. lateinisch fol. 355. Asperula odorato flore, Clus. hist. lib. 5. fol. 175. Aspergula odora nostras. Adv. Lob. fol. 357. Hepatica stellata Tab. lib. 2. fol. 489. Stern-Leberkraut / Waldmeister / Hertzfreude / Meeßke Nostratibus. Beym Lautschen Teich am Berge. Floret mens. Maji. Wotrobie ziele gwiázdziste Polonis.

LIII. Aster montanus luteus salicis glabro folio, C. B. Pin. 266. Aster Atticus secundus, Clus. Pann. pag. 528. Bubonium luteum, Tab. lib. 2. fol. 50. Arnica item Alisma, Officinis. Gelb Weydenblättericht unrauhes Sternkraut / Wolsferley mulierculis. Radix odorata, & folia subamara adstringunt, siccant & in herniis ac ingvinum tumoribus celebrantur. Vulgus ex præcipitio lapsum iisdem sæpiuscule utitur ad grumos sangvinis dissolvendos, & internas læsiones persanandas. Bey Wießdehlen im Gerdauischen am Berge. Flor. circa fin. julij. Hirsuties notanda, quam Tab. quoque ei tribuit, Clus. detrahit. Folia aspera sunt, & ex atro virent.

LIV. Aster luteus hirsuto salicis folio, C. B. Pin. 266. Aster Pannonicus tertius, Clus. Pann. pag. 530. Aster flore luteo, Tab. Lib. 2. fol. 51. Gelb Weydenblättericht rauhes Sternkraut mit gelben Blumen. Bey Olenberg (pagus est.) item bey Bladaw am Teich. Floret circa fin. mens. Julij.

LV. *Artractylis aculeata foliis maximè laciniatis,

capitulis albis. Joh. Lœſ. **Stachlichte weißköpfichte Fliegen-Diſtel / Mückendiſtel mit ſehr zerſchnittenen Blättern.** Ex „radice multis & craſſis fibris aſſurgit caulis bicubitalis, ro-„tundus, ſtriatus pallidè virens, cui ad radicem paucula„aſſiſtunt folia maximè laciniata, cardui inſtar ſpinoſa, dorſo „triangulo, pronâ parte excavato, his conſimilia ſuccedunt „folia, unum alterum ex intervallo fotu ſuo caulem ambi-„ens: in ſummitate caulis nonnihil brachiatus capitula effert „hirſuta, foliis diffulta ſuis, quibus floſculi inſiſtunt purpu-„raſcentes, ætatis tractu albicantes, capillacei, ſemen poſt „ſe minutum albicans, pappo inſtructum, velut in ſcolymo „relinqventes. Caulium ſummitati muſcæ numeroſæ ad-„hærent quandoque, & capitella florum ſiccata, ac concuſſa „pulverem reddunt ſubalbidum, qui, num ſeminium ſit in-ſectorum, judicet alius. **Bey Königsberg** copiosè.

LVI. Atriplex ſylveſtris folio ſinuato candicante, C.B. Pin. 119. Atriplex ſylveſtris ſinuata, Lob. ic. pag. 254. Atriplex ſylveſtris 2. Bauh. in Matth. fol. 362. Atriplex ſylveſtris, Cord. in Dioſc. fol. 44. Cæſ. lib. 4. cap. 23. pag 160. Tab. lib. 2. fol. 135. Atriplex ſimeteria major, Thal. p. 8. **Wilde Schweiß-milde mit weißlichten Blättern.**

Alternat herba ſoli natalis reſpectu: Folia modò tota ex nigro virent, modò averſâ parte albicant, nunc integra ea-dem ſunt, nunc laciniata, & parùm in ambitu inciſa. **Bey Königsberg** paſſim.

LVII. Atriplex ſylveſtris prima, Matth. **deutſch** fol. 158. Atriplex ſylveſtris Polygoni aut Helxines foliis, Lob. ic. 257. Atriplex ſylveſtris Polygoni folio, Cam. pag. 24. Atriplex ſylveſtris humillima, Dod. **lateiniſch** 015. **Kleine wilde Pur-gir-Mülde.** Foliis eſt craſſis, ſucculentis, ſeminibus in folli-

culis

culis herbaceis. Semen ictericos juvat. Beym Altstädtschen Wall nicht weit vom Baum.

LVIII. Atriplex sylvestris latifolia acutiore folio, C. B. Pin. 119. Blitum 5. & Atriolicis sylv. genus, Trag. Sebitz. in Trag. 568. Chenopodium 2. Tab. lib. 2. fol. 136. Breitblätteriger Pitzer / Gänse-Fuß / oder Säwtodt. Sues interimit, Tab. Bey Königsberg passim.

LIX. Balsamine lutea, seu, Noli me tangere, C.B. Pin. 306. Mercurialis sylvestris altera, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 152. Tithymalus sylvestris, Lon. deutsch fol. 130. Noli me tangere, Gesn. hort. fol. 268. Cam. pag. 106. Tab. lib. 2. fol. 540. Persicaria siliqvosa, sive noli me tangere, Lob. ic. 318. Persicaria siliqvosa Lœbelii Cam. pag. 122. Impatiens herba Dod. lateinisch fol. 659. Catanance altera, Cæs. lib. 6. cap. 68. pag. 266. Springsaamenkraut / Springkraut / Waldwolffs-Milch / Hirschmälde / Borussis.

Rustici hâc plantulâ æstivô tempore aucupium instituunt, & attagenes herbâ allectos tendiculis suis illaqveant. Hinter dem alten Hammer / in locis umbrosis.

LX. Barba capræ floribus compactis, C. B. Pin. 164. Barbula caprina prior, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 224. Barba caprina 1. Lon. deutsch fol. 127. Barbicapra & Ulmaria vulgi, Lob. ic. p. 711. Adv. Lob. fol. 318. Regina prati, Dod. lateinisch fol. 57. Pann. pag. 699. Clus. hist. libr. 6. fol. 198. Cam. pag. 182. Tab. lib. 2. fol. 452. Argentilla major, Thal. p. 5. Greißbart / Wurmkraut / Meedesüß Borus. Jlmowna Pol. Bey Königsberg in pratis passim.

LXI. Bellis sylvestris caule folioso major, C. B. Pin. 261. Oculus bovis, Brunf. tom. 1. fol. 259. Buphtalmum majus, Lon. deutsch fol. 120. Bellis major, Trag. Sebitz. in Trag.

deutsch

deutsch 114. Matth. deutsch fol. 388. Fuchs. fol. 148. Dod. lateinisch fol. 265. Cæs. lib. 12. cap. 26. fol. 494. Cam. p. 27. Lob. ic. 478. Bellis sylvestris major, Gesn. hort. 250. Bellium majus, Tab. lib. 2. fol. 45. Große Gänseblum / S. Johansblum / grosse Maßlieben oder Zeitlosen. S. Iana glowka Pol. Hinter dem Königsbergschen Wall in locis arenosis passim.

LXII. Bellis sylvestris minor. C. B. Pin. 261. Primula veris Cæs. lib. 2. c. 26. pag. 493. Bellis minor Bauh. in Matth. fol. 654. Bellis minor sylvestris, Fuchs. fol. 147. Gesn. hort. 250. Tab. lib. 2. fol. 43. Kleine wilde Maßlieben / oder Zeitlosen Stoikroc, Pol. Beym Oberteich in locis palustribus.

Plantula hæc experimentum singulare est, ubi quis medios inter æstus, siti exagitatus, aquam frigidam ἀμυστὶ καὶ ἀπνευστὶ, h. e. raptim ductimq; sineq; interrespiratione hausit, viperibus damno inæstimabili inde attracto. Hoc casu bellidis folia emundata, & cum olivo, aceto & pauxillo salis, in acetarium componat, totam miscellam ingerat bibo. Quâ sumptâ præsentaneum auxilium visceribus à tono dejectis accessurum brevi cognoscet spatio. Remedium hoc tanto in honore habuit Mindererus de Medic. militari, c. 2. p. 71. & seqq. ut seriò svadeat, valvis foribusq; in universum omnibus, publicis & privatis, id affirmandum esse, quò messores miseri, hemerodromi, & hujus gentilitatis plures, scirent, se malo pressos ab interitu vindicare.

LXIII. Bellis lutea foliis profundè incisis major, C. B. Pin. 262. Bellis major lutea, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 114. Chrysanthemum, Dod. lateinisch fol. 263. Chrysanthemum folio virentiore, & plures divisuras habente, Camp. hort. pag. 41. Chrysanthemum segetum folio multiscisso, Adv. Lob. 237. Chrysanthemum segetum, Lob. ic.

pag.

pag. 552. Chrysanthemum arvense, Tab. lib. 1. fol. 454. Grosse gelbe Maßlieben mit tieff zerschnittenen Blättern. Steatomata floribus dissolvit, & dolores sistit podagricos. Nach Lauten inter segetes. In hortum translatum foliis floribusq; oppidò luxuriat.

LXIV. Betonica purpurea, C. B. Pin. pag. 235. Betonica. Brunf. tom. 1. fol. 88. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 157. Bauh. in Matth. fol. 672. Fuchs. fol. 350. Dod. lateinisch fol. 40. Gesn. hort. fol. 250. Lob. ic. pag. 532. Cæs. lib. 11. cap. 21. pag. 444. Thal. pag. 19. Tab. lib. 2. fol. 245. Betonica vulgaris, Clus. hist. lib. 4. fol. 39. Vetonica, Cord. in Diosc. fol. 61. Cord. hist. fol. 165 Braun Betonien. Potenge Nostratib⁹. Bukwika Brunatna, Pol. Duplex est: altera spicâ breviore, altera longiore. Bey Straubeck copiosè. Beym Penartischen Walde/ Item in pratis editioribus passim.

Betonica omnium efficacissima, ☉le 30 ♊ visitante: flores colligendi sole sextum vel decimũ gradum ♋ occupaturo.

LXV. Betonica alba, C. B. Pin. pag. 235. Brunf. tom. 3. fol. 180. Tab. lib. 2. fol. 245. Betonica albo flore, Dod. lateinisch fol. 39. Clus. Pann. pag. 598. Clus. hist. lib. 4. fol. 38. Cam. hort. pag. 28. Betonica candida, Trag. Kyber. in Trag. lateinisch 197. Vetonica alba, Cord. hist. fol. 165. Weiß Betonien. Bukwika Biala, Pol. Hinter Fischhausen im Rosenpusch.

LXVI. Betula virgulis erectis, Joh. Lœsel. Gemeine Birck. passim. Folia calefaciunt, siccant, resolvunt, attenuant, abstergunt & aperiunt. Cortex bituminosus emollit ac discutit. Ex foliis pingviter succosis propolis apum exstruitur, & ablactantium tergo imposita lactis ubertatem disturbat, & in arthritide humores crucios egregiè discutit. Folia

betulæ, antequam vergente autumno decidua fiunt, marcida ac vieta, luteo ex marcore jam contracto colore, si diutius in arbore hæreant, hyemem promittunt conclamati frigoris. Res hæc ad trutinam experientiæ ulterius vocetur, quò constet, utrum rusticorum standum sit effatis.

LXVII. Betula pendulis virgulis, Joh. Lœsel. Betula, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch / fol. 881. Lob. ic. p. 190. Dod. lateinisch fol. 839. Hangelbirck. Zu Bladau auffm Berge & alibi passim.

Caudex arboris Martio mense sauciatus dulcem reddit aquam, facilè in acorem abeuntem. Diuretica est, ac lithontriptica, sanatq; icterum. Refrigerat acore contracto. Destillata omnem amittit gratiam, unde cocta potius cum succo citri miscetur. Bircken-Wasser. Sunt autem audaculi satis rustici nostrates in betulis promiscuè vulnerandis, liqvoris causa, nescientes capitale olim fuisse supplicium arbores alienas incidere, juxta Servium ad illud Virgilij: atq; malâ vites incidere falce *novellas*. *Plinius hist. natur.* lib. XVIII. c. 1. Fuit & arborum cura legibus priscis, cautumq; è XII tabulis, ut qui injuriâ cecidisset alienas, lueret in singulas æris XXV. Virgæ accensæ, & in pelvim positæ succum fundunt pingvitudine oculorum albugines & cicatrices emaculantem, Lob. in Obs. Dum gemmat arbor, nonnulli gemmulas lectas & siccatas in pollinem agunt, emplastrum confecturi; arthriticas cruciabilitates frangens. Ex foliis colorem eliciunt pictores, Schüttgelb dictum, hôc modô: Folia tenera ac minuscula adhuc, in aheno affusâ aquâ per horam ac diutius decoqvunt, mox aliquantulo cretæ, in porphyrite pistilli circumactu cominutæ, & aluminis addito, iterum coqvunt & colatum decoctum in fictili asservant, ut subsidat spissius.

Id

Id paulò post, abjectâ aquâ, in umbrâ exsiccant, & usui servant. Dum coquitur materies, spathâ δοκιμαστῇ sæpe pauxillum ejus frusto cretæ immittitur, & plus cretæ addit, dilucior si expetatur flavedo. Stymma incolo reliqvum tritum, ex fusco flavum suppeditat colorem.

Eadem folia absque cretâ decocta pauxillo alumine juncto, colorem alium pictoribus conferunt, quem Sütgrün nuncupant.

Axungiam quoq; betula fundit, quam vulgo *dagget* nominant. Eâ saucia ac phthiriasi infestata pecora unguntur à veterinariis. Plebs infantulorum umbilico eam immittit, cum vermiculantur, quin & aliquot guttas internè propinat. Cortex molâ confractus cerdonum materies est, Loh dicta, coriis præparandis destinata. Betula terribilis erat Magistratuum virgis: nam fasces olim ex eâ constabant. Cur autem Magistratuum virgæ sint colligatæ, appendentibus & securibus, hanc reddit causam Plutarchus quæstionum Romanarum 82. quia vitia alia sunt sanabilia, alia insanabilia: virgæ eos corrigant, qui in melius mutari possunt, secures præcidunt id, quod corrigi non potest.

LXVIII. Betula pumila. Joh. Lœsel. Kleine niedrige Bircke. Cubitalis & productior sæpe est, foliis subrotundis, julis crassis & curtis. Im Gebrüch bey Lautenmühl.

LXIX. Bistorta major radice minus intorta, C. B. Pin. 192. Colubrina & Dracunculus major, Brunf. tom. 1. fol. 64. Bistorta major, Trag. Sebitz. in Trag. german. fol. 253. Thal. pag. 19. Tab. lib. 2. fol. 143. Clus. histor. libr. 4. fol. 69. Bistorta Cord. hist. fol. 87. Bauh. in Matth. fol. 674. Dod. lateinisch fol. 333. Cæs. lib. 4. cap. 23. fol. 167. Bistorta Britannica, Lob. ic. pag. 292. Colubrina Lon. deutsch fol. 132.

Limonium, Gesn. hort. fol. 265. Grosse Schlangen- oder Natterwurtz.

LXX. Blitum polyspermon à seminis copiâ, C. B. Pin. 118. Blitum 3. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 568. Blitum sylvestre, Cam. in Matth. 134. Polyspermon, Lob. ic. pag. 256. Tab. lib. 2. fol. 506. Blitum polyspermum, Bauh. in Matth. fol. 358. Vielsaamen / Fischmolde / wilder Meyer.

Est piscibus gratissima esca. In fimetis & pingvioribus locis majus in siccioribus minus conspicitur. Iconismus verior apud Lobelium & Cam. in Matth. Braunius qui alteram Tabernæmontani partem edi accuravit, Polyspermon hoc Dioscoridis vel Tragi Lithospermum esse falsò existimat.

LXXI. Blitum rubrum majus, C. B. Pin. 118. Blitum rubeum, Bauh. in Matth. 357. Blitum rubrum, Lob. ic. p. 249. Adv. Lob. fol. 94. Cam. hort. pag. 29. Cæs. lib. 4. cap. 26. pag. 161. Blitum rubens, Dod. lateinisch. fol. 617. Blitum Tab. lib. 2. fol. 141. Lob. Observ. fol. 125. Grosser rother Meyer / Blutkraut. Vulgus semine ruffô utitur in dysenteriâ, & mensium immoderato fluxu, Tab.

LXXII. Blitum rubrum minus. C. B. Pin. p. 118. Blitum nigrum, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 567. Blitum sylvestre rubrum. Gesn. hort. fol. 250. Blitum rubrum supinum, Lob. ic. p. 250. Blitum alterum sylvestre. Cæs. lib. 4. cap. 26. pag. 161. Kleiner liegender rother Meyer.

Crassis & succulentis est foliis, sinuatis, pronâ parte virentibus, supinâ albicantibus: caulibus humi jacentibus, rotundis & viridibus, & rubicundis insignitis. Sæpe etiam prorsus ruffescunt caules, quandoq; & folia, cum racemoso semine. Nach dem Bleichgarten bey der Hospitahl-Wiesen in fimetis.

LXXIII.

LXXIII. Brassica campestris perfoliata flore luteo. Joh. Lœsel. Brassica sylvestris perfoliata, Dod. lateinisch 626. Perfoliata altera, Trag. Kyb. in Trag. pag. 483. Perfoliata minor, Gesn. hort. fol. 271. Brassica campestris 1. Clus. Hisp. p. 409. Clus. hist. lib. 5. fol. 127. Perfoliata Napifolia Anglorum siliquosa, Lob. ic. 396. Perfoliata siliquosa, Adv. Lob. 172. obs. Lob. 215. Perfoliata Napifolia, Tab. lib. 2. fol. 433. Brassica campestris perfoliata flore albô, C. B. Pin. 112. Gelber Durchwachs mit Steckrüben-Blättern. Kapusta Ptonna, Pol. Inter segetes passim. Provenit apud nos flore luteo.

LXXIV. Brassica sylvestris foliis circa radicem cichoraceis C. B. Pin. 112. Brassica sylvestris virgata, Cord. hist. fol. 96. Brassica Sylvestris major latifolia. Thal. pag. 16. Wiezyczki, Polonis. Ad viarum margines sæpe.

LXXV. Bryonia alba baccis nigris, C. B. Pin. 297. Bryonia nigra, Dod. lateinisch fol. 399. Cord. hist. fol. 116. Vitis nigra, Cord. in Diosc. 76. Hundeskürbs / Hundesräben / schwartze Teuffelskirschen. Ad sepes hortorum bey Lautenmühl; item bey dem Brandenburgischen Schloß.

LXXVI. Buglossum vulgare, Bauh. in Matth. fol. 825. Buglossa vulgaris, Tab. lib. 2. fol. 128. Buglossum angustifolium majus, C. B. Pin. pag. 256. Buglossa, Cæs. lib. 11. cap. 2. p. 432. Buglossa Italica, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 186. Lon. deutsch fol. 176. Buglossa longifolia, Card. hist. 135. Cirsium Italicum, Fuchs. fol. 343. Echium Italicum spinosum, Fuchs. ic. 196. Anchusa Alcibiadion, Dod. lateinisch fol. 629. Buglossum vulgare angustifolium, Adv. Lob. fol. 246. Buglossum Italicum, & Hispanicum grande, Cam. hort. 30. Buglossum Italicum flore cæruleo. Eystett. Grosse schmalblättrige gemeine Ochsenzunge. Wolowy Język, Pol. Bey

Königsberg passim in locis campestribus & sabulosis. Flos interdum totus rubet.

LXXVII. Buglossum sylvestre flore albo. Joh. Lœsel. Bey Kragau in districtu Fischhusiensi, item bey Holland.

LXXVIII. Buglossum sylvestre minus alterum & asperius C. B. Pin. 256. Buglossa sylvestris Trag. Sebitz. in Trag. fol. 188. Anchusa minima Cord. hist. fol. 93. Lycopsis, Lon. deutsch fol. 176. Waldochsenzung. In agris cultis sæpe reperitur flore cyaneo. Radix vulneribus medetur. Trag. & Lon.

LXXIX. Buglossum sylvestre caulibus procumbentibus, C.B. Pin. 257. Alysson germanicum Echioides. Lob. ic. p. 803. Aparine major Plinij, Tab. lib. 2. fol. 467. Buglossæ sylvestris species, Thal. pag. 19. Crucialis quædam, Cæs. lib. 8. cap. 12. pag. 325. Asperugo spuria, Dod. Niederländisch / fol. 578. Wilde Ochsenzunge mit liegenden Stengeln / Schlangenäuglein. Am Kneiphöfischen Wall passim.

LXXX. Bursa pastoris major folio sinuato, C. B. Pin. 108. Bursa pastoris major, Brunf. tom. 3. fol. 30. Trag. Sebitz. in Trag. fol. 171. Gesn. hort. fol. 251. Bursa pastoris, Matth. deutsch fol. 213. Adv. Lob. fol. 76. Lob. ic. p. 221. Lon. deutsch 168. Thal. pag. 20. Cæs. lib. 8. cap. 74. pag. 365. Pastoria bursa, Fuchs. fol. 611. Dod. lateinisch fol. 103. Bursa Pastoris major, Tab. lib. 1. fol. 632. Groß Teschelkraut / Hirtentasch Hirtenseckel / Seckelkraut. Tobotky Pol. Bey Königsberg passim in locis arenosis.

Bursa pastoris manibus contrectata vel pedibus conculcata, ut incalescat, narium hæmorrhogiam certò sistere dicitur. Verior medela hæc: è gradibus gemoniarum scalarum ligneolum latum, quò signo erecto altrinsecus affirmantur gradus (das Verzwickhöltzlein) eximatur, sangvine stillantium narium

rium cruentetur, & inversum in locum pristinum deferatur, tudide id fortiter impellendo. Remedio hoc hæmorrhagiam tolli, deprehenditur experimento. Bursæ pastoris sub elevatione Poli 45. 46. 47. 48. 49. efficacissima est.

LXXXI. Bursa pastoris minor loculo oblongo, C. B. Pin. 108. Bursa pastoris sexta, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 172. Paronychia Alsinefolia, Lob. ic. pag. 469. Paronychia vulgaris, Dod. lateinisch. fol. 112. Humilis herba affinis Bursæ pastoris, Cæs. lib. 8. cap. 75. pag. 366. Thlaspios minima species, Thal. pag. 122. Alsine minima, Tab. lib. 2. fol. 382. Gänseblum / Brunf. lateinisch tom. 2. fol. 34. Klein Teschelkraut mit langlächtigen Schöttlein Zanokcica, Pol. Primo prodit vere in locis arenosis & sabulosis circa Regiomontum passim.

LXXXII. Calamintha arvensis verticillata, C. B. Pin. 229. Nepeta agrestis, vel 4. Trag. Kyber. in Trag. p. 17. Calamintha aquatica, Matth. Bauh. in Matth. 529. Calamintha aquatica Belgarum & Matthioli, Lob. ic. 595. Pulegium agreste officinarum, Lob. Obs. fol. 270. Calaminthæ secundum genus Fuchs. fol. 435. Calamintha arvensis, Gesn. hort. fol. 251. Tab. lib. 2. fol. 68. Nepeta Lon. deutsch fol. 142. Ackermüntz / Kornmüntz / wilde Poley. Grati & acris est odoris. Tenuium est partium, incidendo & abstergendo infarctus omnes expedit, urinas ac menses expellit, regium morbum & asthma expugnat. Bey Königsberg passim.

LXXXIII. Caltha palustris flore simplici, C. B. Pin. 176. Caltha Virgilii, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 113. Tussilago altera, sive farfugium, Bauh. in Matth. fol. 616. Chelidonia palustris, Cord. hist. 122. Caltha palustris, Gesn. hort. fol. 251. Dod. lateinisch, fol. 598. Lob. ic. pag. 594. Cam.

hort.

hort. pag. 33. Caltha paluſtris vulgaris, Cluſ. hiſt. lib. 5. fol. 114. Chryſanthemum, Lon. deutſch. fol. 119. Epimedium Dodonæi pag. 42. Populago, Tab. lib. 2. fol 422. Goldwieſen Blum / Schmaltzblum / Mooßblum / Mottblum / Gelbwieſen Blum / oder Dotterblum / Kuhbluhmen Noſtratibus, Kniec' Pol.

Menſe Majo in pratis copioſiſſimè. Prudentius lib. Cathemerin. hymn. V. Caltha dixit numero plurium, eaq; vocat pingvia.

Illic purpureis tecta roſariis
Omnis fragrat humus, calthaq; pingvia
Et molles violas, &c.

LXXXIV. Campanula vulgatior foliis urticæ, vel major & aſperior. C. B. Pin. 94. Uvularia major. Trag. Sebitz. in Trag. deutſch fol. 727. Campanula, Fuchſ. fol. 432. Cervicaria, Lon. deutſch fol. 206. Cervicaria major, Dod. lateiniſch fol. 164. Cervicaria major ſecunda, Tab. lib. 2. fol. 121. Trachelion, Cervicaria & Uvularia Tragi & Herbariorum Lob. ic. 326. Trachelium foliis urticæ, Cluſ. Pann. pag. 687. Trachelium vulgare, Cluſ. hiſt. lib. 5. fol. 170. Archangelica, Cæſ. lib. 9. cap. 29. pag. 386. Rapi ſylveſtris genus foliis ferè urticæ, Geſ. hort. 276. Cervicaria maxima Thal. pag. 32. Gemein Näßelblättericht ſcharffes Halßkraut. Semel etiam trachelium hoc viri longitudine reperi. Nach dem Penartiſchen Walde zu. Caulis eodem tempore mihi idem præſtabat, qvod Naſtos vel farcta militibus. Siccat, refrigerat, abſtergit ſolidat & adſtringit. In ulceribus & inflammationibus faucium, caſu uvulæ, tonſillarum tumore, gargariſatu celebris. In locis montoſis bey Königsberg.

LXXXV. Campanula vulgaris μονόκλων foliis urticæ

ticæ flore candido. Joh. Lœſ. Neſſelblättericht Halßkraut mit weiſſer Blüth. Priori aſſimilis, ſed unicaulis. Hinter Lattenwald im Gebirg.

LXXXVI. Campanula pratenſis flore conglomerato C. B. Pin. 94. Uvularia exigua, Trag. Sebitz. in Trag. deutſch 727. Rapi ſylv. genus, Uvularia in pratis, Geſn. hort. 276. Trachelium minus, Lob. ic. pag. 326. Adv. Lob. 139. Cluſ. hiſt. lib. 2. fol. 171. Cervicaria tertia, ſive minor, Dod. lateiniſch 165. Klein Halßkraut mit deicht an einander geſetzten Blumen. In der Hollen-Grund.

Flores vel in ſummitate caulis in orbem ſunt congeſti, vel ſingulares per caulem ſparſi. Bracchiata adeò nonnunquam eſt, ut ſedecim in uno caule notârim ramos, floribus calathyformibus onuſtos. Bey Lautenmühl in locis arenoſis.

LXXXVII. Campanula oblongifolia flore cæruleo in ſummis cauliculis, Joh. Lœſ. Blaue Glockenblum mit länglichten Blättern/ deſſen Blümlein auf den oberſten Stengeln. Vid. Num. 418. Beym Penardſchen Wald. Floret menſe Junio & Julio.

LXXXVIII. Campanula oblongifolia flore albo in ſummis cauliculis. Joh. Lœſel. Weiſſe Glockenblum mit länglichten Blättern/deſſen Blümlein auf den oberſten Stengeln. Bey Cumainen in locis montoſis & umbroſis. Floret menſe Junio.

LXXXIX. Cannabis erratica C. B. Pin. pag. 320. Cannabis fœmella Trag. Sebitz. in Trag. deutſch 279. Cannabis erratica paludoſa ſylv. Lob. ic. 526. Adv. Lob. 227. Obſ. Lob. 284. Cannabis ſterilis, Dod. lateiniſch fol. 535. Wilder Hanff. Am Kneiphöfiſchen Wall copioſiſſimè. Cannabis hujus erraticæ decoctum cimices necat. Cannabina aquatica folio

tripartitò diviso C.B. Pin. Hepatorium aquaticum Dod. verbena supina vel. 3. Trag. Sebitz. in Trag. Bidens foliis tripartitò divisis Cæs. Conyza palustris foliis tripartitò divisis. J.L. Wasserdürwurtz mit tieff zerschnittenen Blättern.

Plantula est vulneraria, sed à nostris chirurgis negligitur. In humidis & squalidis passim exit. Floret Jul. & Aug.

XC. Carduus in avenâ proveniens, C. B. Pin. 377. Carduus syl. in avenâ Trag. Sebitz. in Trag. 674. Carduus avenarius Thal. pag. 34. Carduus arvensis Tab. lib. 2. fol. 375. Ackerdistel / Haberdistel. Osat Pawloczwy, Pol. Flosculis est purpureis. Inter segetes passim.

XCI. Carduus lanceolatus, Tab. lib. 2. fol. 374. Carduus lanceatus latifolius C. B. Pin. 385. Breitblätterig Speerdistel. Secus vias sæpissimè reperitur.

XCII. *Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris, C. B. Pin. 385. Agriacantha, Ruel. fol. 18. lin. 9. Carduus sylvestris tertius, Dod. lateinisch fol. 740. Carduus spinosissimus vulgaris. Polycantha Theophrasti, Lob. ic. 21. o. Aculeosa Gazæ, Adv. Lob. fol. 374. Polyacantha Theophrasti Tab. lib. 2. fol. 376. Vielstachlichte Ackerdistel mit schmallen Blättern/klein Wegdistel/ wilde sehr stechende Distel. Passim.

„ Radix ex numerosis filamentis, crassis, longis, rotundis, „ fibratis, albis, constituta, caulem emittit digiti crassitie, „ bicubitalem, viridem, striatum, quinis locis fimbriatum, „ aculeatum, strenuè brachiatum, concavum: folia in solo „ humidiore luxuriantia, ac terræ proxima, duodecim un- „ cias longa sunt, tres lata, in ambitu profundè satis incisa „ hirsuta, pronâ parte atrovirentia, supinâ cum lanugine „ pallentia: ramulorum singulorum exortui subservit folium „ spinosum, cujus generis alia ex intervallo exadversum ra-

mulis

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0067-6
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0068-2
DFG

mulis assistunt folia, minus profundè in circuitu secta ac“
hirta: flores ramulorum apicibus inhærent purpurei, ex“
concursu capitulorum squamosorum trium, quatuor, quin-“
que vel sex interdum glomerati, tractu ætatis in pappos abe-“
untes: semen oblongum & album est pappis remotis.“

XCIII. Carduus spinosissimus angustifolius pratensis. Joh. Læs. Vielstachlichte Wiesen-Distel mit schmallen Blättern. Diversitas est in hoc carduo ratione ætatis. Qui an-“
nosâ est radice, unicaulis sæpissimè visitur, rarò multicau-“
lis, quatuor ulnarum proceritate, crassitie unciali, & quod“
excedit. Thyrsus est egregiè striatus, quibusdam in locis“
fimbriatus, foris viridis, quandoq; atrorubens, spinis hor-“
ridus, intus concavus, in fastigio ramosus, floribus purpu-“
reis congestis, in pappos dilapsis, oppidò luxurians. Fo-“
lia proximè terram majora sunt, profundius incisa, aculeata,“
hirsuta, queis inordinatè disposita, succedunt folia, cauli“
adhærentia, ex nigro viridia, carduo lanceolato effigie pro-“
xima, aversâ parte lanugine tecta. Radix ex multis fila-“
mentis rotundis, crassis & candidis constituta, sapore est“
aromatico, modicè adstringente & siccante. Tenerior ra-“
dice carduus, ætate majori cedens, ramulorum ferè expers“
est, foliis paucioribus, ad nervum usq; Jaceæ instar, pro-“
fundissimè dissectis, quorum infima intrinsecus dilutè vi-“
ridia & minora. Seminis figura rotunda. In der Hollen-“
Grund hinter der Bleich auff der Wiese.

XCIV. Carlina acaulos magno flore, C.B.Pin. 380. Ebermwurtz / Brunf. deutsch fol. 218. Chamæleon albus, Bauh. in Matth. fol. 490. Cord. in Diosc. fol. 50. Cerdopatium caule nullo, Gesn. hort. 251. Carlina herbariorum. Lob. Obs. fol. 479. Chamæleon albus Dioscoridis, Lob. ic. 4. 0. Clus.

Clus. histor. lib. 5. fol. 155. Carlina altera, Dod. lateinisch fol. 727. Carlina vulgo, Cæs. lib. 13. cap. 38. pag. 527. Carlina sessili flore ἄκαυλος. Cam. hort. 35. Weisse ohnstängliche Eberwurtz. Osetek Pol. Sudo cœlo floris capitulum hiscit, ac patulum perstat, imbrico ac pluvio clauditur. Partium est tenuium, sudores movet, jecoris ac lienis obstructiones solvit, saccatum humorem mensesq; citat, ac latas interaneorum tineas expellit. In der Osterodischen Heyde hinter dem Schilling gegen Werlitten (pagus est) über. Floret circa finem Julii.

XCV. Carum. Bauh. in Matth. fol. 553. Cord. in Diosc. fol. 54. Lob. ic. pag. 724. Dod. lateinisch fol. 299. Tab. lib. 1. fol. 171. Cuminum pratense, carui officinarum, C. B. Pin. 158. Caros, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 361. Carus, Caros, vulgo carui, Gesn. hort. fol. 251. Careum, Fuchs. ic. pag. 224. Carui, Lon. deutsch fol. 260. Cæs. lib. 7. cap. 25. pag. 291. Thal. p. 28. Wiesenkümmel. Kmin pólny. Pol. Calefacit & siccat, aperit, incidit, digerit, concoquit & dissolvit. Radix pastinacæ instar edulis est, apris admodum expetita. In pratis & campestribus pingvibus. Zu Langkayn & Wießdehlen / in Districtu Gerdaviensi aliquot modii sæpe colliguntur seminis.

XCVI. Caryophyllata vulgaris, C. B. Pin. pag. 321. Garyophyllata, Burnf. lateinisch tom. 3. fol. 24. Trag. Kyber. in Trag. 67. Lon. deutsch fol. 156. Caryophyllata Matth. Bauh. in Matth. fol. 697. Dod. Niederländisch 198. Tab. lib. 1. fol. 403. Caryophillata vulgaris, Cam. hort. 35. Clus. hist. lib. 5. 102. Vulgaris Caryophyllata, Lob. ic. pag. 693. Adv. Lob. 309. Caryophyllata seu benedicta herba, Thal. 28. Benedicta Gesn. hort. fol. 250. Gariofilata, Cæs. lib. 14. c. 12. pag. 550. Benedictenwurtz / Benedictenkraut / Nardenwurtz / Ha-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0070-1 DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0071-7
DFG

No. 6. ad pag. 37

Caryophyllata prolifera, flosculis elegantissimis.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0072-3
DFG

Hasenaug / Heyl aller Welt. In der Hollen-Grund passim.

Radix Caryophyllatæ eruatur ☉le 1. ♌ occupante: flores, ☉le 30. ♊ inhabitante. Caryophyllatæ & hyperici radices taffetto insutæ, & collo appensæ, melancholiam avertunt, memoriam & oculorum aciem firmant, & catharros absumunt. Radices effodiantur, Sole 1. ♌ tenente; taffetto vel sindoni includantur, ☉le 15. ♓ inhabitante: collo appendantur, ☉le 1. ♉ occupante.

XCVII. Caryophyllata aquatica nutante flore, C. B. Pin. 321. Benedicta sylvestris, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 412. Geum rivale, Gesn. hort. fol. 260. Caryophyllata septentrionalium rotundifolia papposo flore, Lob. ic. 694. Adv. Lob. 309. Caryophyllata montana Dalechampii, Eystett. Caryophyllata montana prima Clus. Pann. pag. 434. Clus. hist. lib. 5. fol. 103. Caryophyllata palustris major seu purpurea, Thal. pag. 28. Caryophyllata palustris, Cam. hort. pag. 36. Waßer-Benedicten Wurtzel / Wald-Benedicten Wurtz mit hangender Blüth. In locis uliginosis bey Königsb. passim.

XCVIII.* Caryophyllata prolifera flosculis elegantissimis Joh. Læs. Fruchtbar Benedicten Würtz mit herrlicher Blüth. Planta est cubitalis ferè, quandoq; minor caule sub- " hirsuto foliis circa radicem majusculis, Caryophyllatæ mon- " tanæ æmulis: flosculos fert sedecim, quandoq; pauciores, " qui è tenui origine sensim producti dilatantur & in summita- " te crenatâ conspiciuntur. Flores hi caulem ambiunt susten- " tati à foliolis octo vel duodecim. Caulis è medio flosculo- " rum ulterius progrediens iterum flosculis ornatur, foliolis " proximè subvectis. Radice nititur longiusculâ foris subrufâ " ac filamentis suis instructâ. Zu Birckenfeld. Item in Schacken.

Caryophyllata hæc καλλίπυργος benè dici potest, h. e.

pulchrè turrita, cùm florem turris instar extrudat. Vocanda est ex agro in urbem ob florum elegantiam, veluti puellæ illæ rusticanæ καλλίπυγοι dictæ, ob natium pulchritudinem in urbem accersebantur, de quibus hæc memoriæ proditur historia: Rustici viri formosæ duæ filiæ in publicam viam egressæ, ambitiosius inter se decertabant, utri pulchriores nates essent. Prætereunti juveni, cujus pater senior erat, inspiciendas se ambæ obtulerunt. Utramq; ille conspicatus, natu majoris pulchriores esse judicavit, & ejus amore captus est. Reversus in urbem, cum æger decubuisset, juniori fratri exposuit, quod acciderat. Rus ille profectus, & puellas contuitus, alteram amavit. Juvenum pater cum instaret, ut splendidius matrimonium sibi quærerent, idq; persvadere non posset, puellarum non invito parente, illas evocat ex agro, & cum filiis collocat. Eas cives καλλιπύγους, natibus & clunibus pulchras vocârunt, & eo nomine templum Veneri, quam & Callipygon nominârunt, exstruxerunt. Cæterum inter laudes mulierum etiam fuêre olim καλλιπλόκαμος καὶ καλλίσφυρος: inter vitia, compernis, vulgò, valga extritus talus, crura exiliora. Quibus erant extriti tali, λαγοποδίας vocabant, tenuiora crura crotila quasi κωτίλα.

XCIX. Caryophyllus arvensis glaber flore majore, C. B. Pin. pag. 210. Euphrasia gramen, Trag. Kyber. in Trag. 329. Gramen Fuchs. fol. 136. Gramen Leucanthemum, Dod. lateinisch p. 365. Gramen λευκάνθεμον Dodonæi, Cam. in Matth. fol. 345. Thal. 49. Gramen alterũ Bauh. in Matth. fol. 708. Holosteum Diosc. floribus albis, vel ὁλόστεον Ægineta, Adv. Lob. 17. Holostium Ruellii, Lob. ic. p. 46. Euphrasia major, Lon. deutsch fol. 133. Gramen floridum Tab. l. 1. f. 667. Gramẽ floridũ majus Tab. ic. 232. Unrauche Acker-Näglein mit grosser Blüth/

Augen-

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0075-0
DFG

No. 7 ad pag. 39.

Caryophyllus arvensis calyculo florum numerosa.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0076-6
DFG

Augentrost-Graß / Teuffelsbluhmen / Brustkraut. Sitna Trawa, Pol. In sylvis passim.

C. Caryophyllus arvensis hirsutus flore majore C. B. Pin. 210. Caryophyllus holostius, Lob. ic. pag. 446. Holostium Caryophyllæum Tab. lib. 1. fol. 668. Rauge Acker-Näglein mit grosser Blüth / Weiß Näglein-Graß / Hertz-Rößlein-Graß. Am Kneiphöfischen Wall passim.

CI. Caryophyllus arvensis hirsutus flore minore. Joh. Lœs. Holostium caryophyllæum arvense, Tab. lib. 1. fol. 668. Rauges weiß Acker-Näglein-Graß mit kleiner Blüth. NB. Hirsuties apud Tab. desideratur.

CII. Caryophyllus barbatus sylvestris, C. B. Pin. 209. Armeria sylvestris altera, Lob. ic. pag. 448. Caryophyllæa sylvestris prima, Thal. pag. 25. Flos Gariofilus sylvestris minimi floris saturatæ purpuræ, Cæs. lib. 6. c. 45. pag. 253 & 254. Wilde rothe bartige Näglein / Thiernäglein Nostratibus. Calyculi ejus cincti sunt foliis fastigiatis. Flosculi rubei. Bey der Balga am Hafe. Item bey dem alten Hammer.

CIII. *Caryophyllus arvensis calyculo florum numeroso. Joh. Lœs. Radice est subnigrâ, aliquantulum fi-" bratâ, cauliculis subasperis, ad genicula foliis duobus tenuis-" simis, quorum summo insident calyculi florum plures pur-" purascentes. Convenit ferè cum Caryophyllo barbato sylvestri C. B. nisi quod hic obtineat folia tenuiora, & calices florum minus foliis stipatis. Bey Holland in arvis copiosè.

CIV. Caryophyllus minimus muralis, C. B. Pin. p. 211. Tunica minima, Lugdun. Kleine Maur- oder Weg-näglein. In sylvis propè vias sæpiusculè observatur.

CV. Caryophyllus plumarius albus, Tab. ic. pag. 286. Caryophyllus flore tenuissimè dissecto. C. B. Pin. 209. Superba,

perba. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 459. Lon. deutsch, fol. 218 Superba, Tragi. Thal. pag. 105. Cam. hort. 165. Betonica sylvestris altera, Fuchs. icon. p. 201. Caryophyllæus minor Dod. lateinisch 174. Superba recentiorum, Adv. Lob. 198. Superba alba, medio corollâ purpureo-violaceâ obsoletâ cincta Lob. ic. 450. Caryophyllei sylvestris qvinti species tertia, Clus. hist. lib. 3. fol. 284. Caryophyllus sylvestris flore albo picto Eystett. superba alba corollâ purpureo-rubrâ. Swert. florileg. part. 2. fol. 18. Weiß Pflaum-näglein Tab. Hochmuth und Muthwillen / Lon. Feder-Nägelchen Borussis. Svavissimi est odoris. In der Brandenburgischen Heyde copiosè.

CVI. Caryophillus sylvestris vulgaris angustifolius, C. B. Pin. 209. Caryophyllus montanus albus, Tab. ic. pag. 288. Flore est candido, purpurascente, in medio variegato engblätterige Waldnägelein / dessen Blüht bald weiß / bald purpurfarb / bald sprenglicht. Weiße wilde Steinnägelein / Tab. Heydnägelchen Nostratibus. In der Brandenburgischen Heyde passim.

CVII. Caryophyllus montanus minor, C. B. Pin. 211. Pseudomoly Dodonæi, Gesn. hort. fol. 268. Gramen polyanthemum minus, Dod. lateinisch, 564. Dod. Niederländisch 896. Gramen marinum minus Clus. Pann. pag. 327. Tab. lib. 1. fol. 664. Caryophillus marinus omnium minimus. Lob. 452. Adv. Lob. 189: Amerius montanus tenuifolius minor. Clus. hist. lib. 3. fol. 287. Klein Meer-Graß / Tab. See-Graß / Meernäglein / Meer oder See-Graß-Bluhmen vulgò. Auf der Curischen Nährung zwischen Lattenwald und Kuntzen im Gebirge. Floret mense Augusto.

CVIII. Caryophyllus pratensis flore laciniato simplici, seu

ſeu floſculi C. B. Pin. 210. Flos cuculi pratenſis, Trag. Sebitz. in Trag. deutſch 319. Flos cuculi, Lon. deutſch. fol. 207. Tab. lib. 2. fol. 13. Odontitis Plinii, Geſn. hort. fol. 269. Odontis quorundam. Cam. pag. 169. Odontitis Plinii ſimplici flore, Cluſ. hiſt. lib. 3. fol. 292. Armerius ſylveſtris, Dod. lateiniſch fol. 177. Armoraria pratenſis ſylveſtris. Flos cuculi, Lob. ic. 451. Armoraria ſylveſtris pratenſis, Adv. Lob. fol. 189. ἑξόκαυλος altera, Thal. pag. 59. Gauchblum. Tab. Lon. Sebitz. in Trag. Guckgucksbluhme Noſtratibus. Eſt & flore albo. In pratis paſſim bey Königsberg.

CIX. Centaurium minus, C. B. Pin. 278. Centaurea, Brunf. lateiniſch. Tom. 3. fol. 125. Cæſ. lib. 6. c. 63. pag. 264. Centaurium minus, Trag. Kyber. in Trag. pag. 140. Bauh. in Matth. fol. 488. Matth. deutſch, fol. 255. Fuchſ. fol. 387. Dod. lateiniſch 336. Dod. Niederländiſch / 541. Cord. in Dioſc. fol. 50. Cam. hort. pag. 37. Thal. pag. 26. Centaurium minus flore rubro. Eyſtett. Centaurium parvum, Lob. Obſ. fol. 218. Centaureum minus, Lon. deutſch 117. Klein Tauſendgülden / Fuchſ. Seb. in Trag. Lon. Gemein Tauſendgülden und Erdgall / Matth. deutſch. Fieberkraut / Bieberkraut / Tauſendgüldenkraut. Aurin vulgò. Laurin Noſtratibus.

Calefacit & ſiccat, abſtergit, attenuat, aperit. Bilem & craſſos humores per alvum exigit, menſes movet, & alvi tineas pellit. Recens tuſa illitu vulnera conglutinat, ulcera purgat, & cicatrice obducit, Dioſc.

Ex plantulâ recente lege artis ſpiritus maximè igneus elicitur ſine additamento. Beym Penartiſchen Walde. It. bey Mülhauſen und Holland copioſiſſimè in agris incultis, præſertim editioribus.

CX. Centaurium minus floribus albis. Joh. Lœſel.

Fieberkraut mit weissen Bluhmen. Rarius occurrit, hortis digna planta.

CXI. Cerasus avium racemosa, Lob. ic. 174. o. Cerasus racemosa, Adv. Lob. fol. 436. Pseudoligustrum, Dod. lateinisch fol. 777. Cerasia racemosa rubra & nigra, Tab. lib. 3. fol. 695 & 696. Cerasus avium, Clus. hist. lib. 1. fol. 65. Cerasus racemosa sylvestris, Eystett. An Cerasus sylvestris? Cæs. lib. 2. cap. 20. pag. 51. Cerasus racemosa sylvestris fructu non eduli, C. B. Pin. 451. Arbuscula sylvestris Cerasi foliis, fructu virgæ sangvineæ ferè, Gesn. hort. fol. 248. Schwartze und rothe Vogel-Kirschen Tab. Arbor Borussis Faulbaum/ baccæ Ahlkirschen dicuntur. Nuclei, qui in ossiculis continentur, cerasi nucleos sapore referunt. Temperatè sunt calidi, & urinam movent, Dod. Fructus in racemis nigricans etiamsi sit dulcis, facilè tamen nauseam parit. Astringens est & alvum cohibens. Estur à pueris innoxiè. In der Hollen-Grund passim.

CXII. *Chamæcerasus dumetorum* fructu gemino rubrô, C. B. Pin. 451. Halimus Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 780. Lon. deutsch fol. 63. Periclymeno cognatus sylvestris fructus, Gesn. hort. fol. 271. Xilosteum, Dod. lateinisch fol. 412. Cam. hort. pag. 183. Xylosteon, Dodonæi, Thal. pag. 133. Periclymenum alterum Allobrogum, cornus fœminæ effigie, Adv. Lob. 280. Periclymenon Allobrogum, sive Periclymenum rectum, Lob. ic. 633. Periclymenum rectum fructu rubro, Clus. Pann. 87. Periclymenum rectum primum, Clus. hist. lib. 1. fol. 57. Periclimenum rectum. Tab. ic. 899. Xylostium floribus albis vulgatius, Eystett. Aufrichte Waldrinde/ oder Zäunling/ Tab. Beinhöltzen Helvetiis, Gesn. hort. Hundskirschen/ Teuffelskirschen vulgò. Bey Brandenburg

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0081-3
DFG

Nō 8 ad pag. 43.

Chamæcistus vulgaris flore luteo, C.B.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0082-9
DFG

denburg auff dem Lentzenberge. It. im Neuhausischen Schloßgraben.

CXIII.*Chamæcistus vulgaris flore luteo. C.B.Pin.465. Hyssopus campestris, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 177. Panax chironium, sive flos Solis. Bauh. in Matth. 546. Gratia Dei. Gesn. hort. 261. Helianthemon Plinii. Clus. Hisp. 153. Chamæcistus primus. Clus. hist. lib. 1. fol. 73. Flos solis. Dod. lateinisch 193. Flos solis Matth. Cam. hort. pag. 61. Helianthemum secundum Germanicum Tab. lib. 3. fol. 767. Helianthemum, Cord. hist. fol. 89. Lob. ic. pag. 117. o. Helianthemum flore luteo, Eystett. Consolida aurea Chirurgis quibusdam, Cord. hist. 89. Hyssopus montanus sive sylvestris, Lon. deutsch 150. Chironica, Cæs. lib. 10. cap. 46 pag. 397. Gülden Heylkraut. Heiden- oder Berg-Ysopp/ Lon. Sonnen-Blum oder Sonnengüntzel/ Tab. Heiden-Ysopp oder Elisabeth-Kraut vulgò. Bey dem Penartischen Walde in locis incultis.

Plantula est cubitalis, succulosa, radiculis lignosis, contortulis sæpè, foris atrorubentibus, intus candidis, fibris pluscul is: Cauliculis rotundis, virentibus; ætatis tractu rufescentibus, hirsutis ac nodosis: foliis ad genicula binis majusculis, oblongis, viridibus, hispidis, alia minora sub se habentibus: flosculis croceis, quinq; foliolis, in ambitu leviter crispatis constantibus, ac in meditullio luteolæ stamina, petiolum ambientia, foventibus. Vanescentibus floribus succedit semen minutum ac ruffulum, pericarpiis oblongis, triangulis, ternis glumis striatis circumdatis, inclusum.

CXIV. Chamædris spuria major altera s. frutescens C.B. Pin. 248. Teucrium quartum, Clus. hist. lib. fol. 349. Teucrium 1. vel teucrium majus Pannonicum latifolium, Clus.

Pann. 612. Susankenkraut / Mutterkraut / Borussis. Aperit, incidit, abstergit, lotium mensesq; citat, jecur & lienem infractu expedit. In ascensu valli Palæopolitani passim. Decoctum ejus frequentissimi & saluberrimi usûs est rusticis fœmellis, in præfocatione uteri.

CXV. Chamæmelum vulgare, Leucanthemum Diosc. C. B. Pin. 135. Chamæmelon Leucanthemum Fuchs. fol. 25. Chamæmelum Leucanthemum, Ges. hort. 252. Anthemis vulgatior, sive Chamæmilla, Adv. Lob. 342. Chamomilla 3, & sylv. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 118. Anthemis Cord. in Diosc. fol. 59. Anthemis, sive Chamæmelon. Bauh. in Matth. 649. Chamillen / Brunf. deutsch fol. 136. Chamæmelon Thal. p. 33. Chamæmelon. Tab. lib. 1. fol. 71. Chamillen-Blum Tab. Camillen, Fuchs. Chamillen / Seb. in Trag. Magdt-Blum / Haugen-Blum / vulgò. Romey Nostratibus. Ad sepes hortorum.

CXVI. Chamæmelon Fœtidum, C.B. Pin. 135. Cotula fœtida, Gesn. hort. fol. 271. Lon. deutsch. fol. 121. Cam. hort. pag. 49. Eustett. Chamomilla secunda & Sylv. Trag. Seb. in Trag. deutsch 118. Cotula alba, Dod. lateinisch 258. Parthenium Fuchs. fol. 583. Adv. Lob. fol. 344. Parthenium Dioscoridis Tab. lib. i fol. 84. Cotula fœtida Parthenii 4. species. Brunf. lateinisch tom. I. fol. 255. Buphthalmũ minus, Cord. in Diosc. fol. 60. Cotula fœtida officinarum est Parthenium vel Virginea, Lob ic. 773. Chamæmelum album, seu fœtidum Thal. 33. Cota vulgò, Buphthalmon Diosc. Gall. & Plinij. Cæs. l. 12. c. 23. p. 492. Krottendill / Tab. Lon. Seb. in Trag. Fuchs. Hundsdill und Hundsblumen Cord. Diosc. Hundromey Borussis. Calefacit, incidit, aperit, sangvinis grumos dissolvit, tineas expellit, ac fœminas præfocatas, ab utero juvat. Jumentis

tis ac ovibus porrigitur asthmate correptis. Cæterum apibus infensa est, fugatq; pulices in loca pulicosa conjecta. Inter segetes passim.

CXVII. Chamæmelon inodorum C. B. Pin. 135. Cotula alba non fœtida. an Melandrium Plinii? Dod. lateinisch. fol. 258. 259. Buphthalmum Fuchs. fol. 144. Buphthalmum majus. Cord. in Diosc. 60. Chamomilla fatua & 4. Trag. Seb. in Trag. deutsch/ 119. Cotula inodora. Adv. Lob. 345. Cotula, Tab. lib. 1. fol. 86. Rindsaugen oder wilde Chamillen/ und Streich-Blum/ Tab. Kuhdill/ Hundsaug/ Kuhaug Dod. in locis arenosis & sabulosis bey Königsberg.

CXVIII. Chelidonium majus vulgare C. B. Pin. 144. Chelidonium majus Trag. Seb. in Trag. deutsch 82. Matth. deutsch. 246. Dod. lateinisch. fol. 48. Gesn. hort. fol. 252. Fuchs. fol. 865. Cord. in Diosc. 49. Lob. ic. pag. 760. Tab. lib. 1. fol. 122. Cæs. lib. 6. cap. 73. pag. 269. Thal. p. 33. Chelidonium majus. Hirundinaria major. Adv. Lob. 399. Chelidonia (quam hirundo ἐαρινὴ ζεφύρου πρωτάγγελος ἔρνις, eruptuam nunciat) Brunf. lateinisch/ tom. 1. fol. 236: Schelwurtz oder Schwalbenkraut. Tab. Groß Schwalbenkraut. Matth. Goldwurtz. Dod. Schin-Kraut. Borussis.

Ejus usus insignis est in pluribus morbis, de quibus apud Practicos. Succus verrucas sanat illitus. Difficulter abluitur partes corporis commaculans. Ut Chelidonium manus croceo inficit colore, difficulter abluendo, sic pulvisculus est, argentum absq; hydrargiro verè ac constanter inaurans. Res hæc cum scitu sit digna, eam lectori detegere hic stat sententia. Modus talis est: Auri obryzi, antimonii ope perpurgati, drachmis duab⁹ affunde, vel spirit⁹ salis, pauxillo Spiritûs nitri fortificati, vel aquæ Regis, s. q. soluto auro adde salis nitri candi-

dissimi scrupulos quatuor. Eliqvatonitro, linteum purissimum auro soluto imitte, quò omnem imbibat tincturam. Imprægnatum mox linteum in tigillum defer, structo carbonum igne circulari, & exure sensim omnia, ut candescant vi ignis, nõ liquescant. Pulveri in fundo relicto in vase vitreo limpidam infunde aquam, & plenè dulcatum & siccatum serva auraturæ. Usus: pauxillum pulveris humectati alutâ, excipiatur ac deaurando inducatur argento. Bey Königsberg passim. It. an den Zäunen in Gärten. Chelidoniæ majoris vis excellens sub elevatione Poli 45. 46. 47. 48. Radix eluenda, ☉le in primo ♋ gradu versante: folia colligenda 20. ♋, sole occupante, semen in ultimo ♋ gradu constituto sole.

CXIX. Chelidonia rotundi folia minor. C.B.Pin. 309. Chelidonium minus Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 89. Matth. deutsch. 248. Cord. in Diosc. fol. 49. Cord. hist. fol. 121. Lon. deutsch fol. 291. Dod. lateinisch fol. 49. Fuchs. fol. 867. Ges. hort. fol. 252. Tab. lib. 2. fol. 427. Thal. p. 33. Lob. ic. p. 539. *Chelidonium minus, sive hirundinaria minor.* Adv. Lob. 257. Favagello. Cæs. lib. 14. cap. 7. pag. 546. Feigwartzen-Kraut / klein Schöl-Kraut / Matth. Feigblätter-Eppig Seb. in Trag. Kleine Schelwurtz. Lon. Schörbocks-Kraut / Biber-Hödlein / Pfaffen-Hödlein / Blatern-Kraut und Meyen-Kraut vulgò Geßelblum Nostratibus.

Causticum non est, nec calefacit excessu, ut quidam existimant, cùm inter acetaria sæpiusculè in usum veniat, & omnis acrimoniæ prorsus sit expers. Diversum itaq; est nostrum Chelidonium minus à Chelidonio Veterum, cui Galenus 8. simpl. causticam assignat vim, idq; calidius chelidonio majore pronunciat. Erumpit primo vere, sæpius Martio Mense, quò tempore Rhodiis olim illud medicandi genus

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0087-7
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0088-3
DFG

nus erat usitatum, χελιδονίζειν h. e. hirundinare, vel hirundinis nomine stipem rogare, nominabant, ubi acclamabatur:

Venit tandem, venit hirundo, quæ pulchra
Tempora, & annos adducit pulchros
Alvo candida, tergo nigra.

Tempus hoc etiam illi Leporum generi quos Chelidonios appellabant veteres, nomen dedit. Existimo lepores esse Martio Mense natos, vel captos, quorum sangvis dysentericis perutilis. Circa Regiomontum passim. Item in der Hollen-Grund.

CXX. *Chrysanthemum foliis tanaceti. Joh. Lœsel. Goldblum mit Reinfahr-Blättern.

Radix lignosa & fibrosa cauliculos edit rotundos subhirsutos, ramosos: folia multifida tanaceti instar levi hirsutie incana propè terram numerosa, post alternatim cauliculis adhærentia: flores fert aureos in caulium summitatibus velut Chrysanthemum Matth. Bey Lanckheim circa viam am Berge It. Bey Wießdehlen am Berge.

CXXI. Cichorium Sylvestre sive officinarum C. B. Pin. 125. Cichorium agreste. Lon. deutsch. fol. 125. Cichorium sylvestre, Picris, Dod. lateinisch. fol. 635. Cichorium, Cord. hist. 141. Tab. lib. 1. fol. 577. Cæs. lib. 13. c. 2. fol. 506. Solsequium Brunf. tom. 3. fol. 94. Intybum agreste Gesn. hort. fol. 262. Intubum sylvestre Fuchs. fol. 679. Seris Sylvestris Picris, Cichorium, Adv. Lob. 82. Seris Picris. Sylvestre Cichorium. Lob. ic. 228. Cichorea sylvestris, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 216. Intybus erraticus, sive cichorium sylvestre, Matth. deutsch 176. Feldwegwart/ Matth. Wegwart. Tab. Brunf. wilde Wegwart. Sebitz. in Trag. Sonnenwirbel und Hundläufft/ Lon. Sonnenwend / Sonnenkraut

nen-Kraut/ und Sonnen-Braut vulgò. verfluchte Jungfrau Borussis. Hinter dem Kneiphöfischen Wall. Item zwischen Pinnau und Brandenburg circa vias copiosè.

Caulis cichorii, scrobiculo prius terrâ erutâ facto, proximè radicem exscindatur, post ictericus radicem lotio perpluat, abscissum caulem in locum natalem componat, ac terrâ iterum obruat, liberandus ab aurugine, remedio si sit fidens.

CXXII. Cichorium sylvestre flore albo. Joh. Lœsel. wilder Wegwart mit weißen Blumen. Hinter Morungen circa vias. It. Beym Ritter-Kruge im Balgischen.

CXXIII. Cicutaria palustris latifolia alba. C. B. Pin. 161. Cicutaria palustris, flore candido. Cam. pag. 41. Breitblätteriger Wasser-Schirling/ Witscherling/ Gerstkraut/ quia pecora ab ejus usu intumescunt. Groß Wehdendunck Nostratibus. In locis palustribus bey Königsberg passim.

Pœna legis Corneliæ tenebantur pigmentarii, si cui temerè cicutam, aconitum & mandragoram dedissent. l. ejusd. ff. ad legem Corneliam de sicariis, & veneficiis. Apud Athenienses publica pœna frequens cicuta, aut venenum erat. Plin. lib. XXV. c. 13. Laërtius in Socrate, &c. Antocles & Epicles, postquam magnas Niciæ & Pergasei divitias dilapidâssent, ad paupertatem redacti, vitæ tædium epotâ cicutâ finierunt. Attalus Philomator pro oblectamento habuit, cicutam, helleborum & aconitum, venenosasq; herbas plantare, ut fructum inde legeret. Plutarchus in vitâ Demetrii & Justin. lib. 36.

CXXIV. Cicutaria palustris tenuifolia, C. B. Pin. 161. Phellandrium, Dod. lateinisch fol. 591. Cicutaria palustris Lob. ic. 735. Tab. lib. 2. fol. 460. Cicuta aquatica Gesn. hort. fol. 253. Cicutaria palustris alia, sive Phellandrium. Cam. 41.

Li-

Ligusticum & Phæniculum sylvestre, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 336. Silaus Plinii, Cæs. lib. 67. c. 26. p. 291. Schmalblätteriger Wasserschierling / Tab. Bartzenkraut Saxonibus. Gesn. hort. Wilder Liebstock / Sebitz. in Trag. Kleim Wedendunck fæmellis. In paludum marginibus passim bey Königsberg.

Vetulæ utuntur herbâ in discutiendis tumoribus, axungiæ porcinæ veteri mistâ.

CXXV. Cistus Ledon foliis rorismarini ferrugineis C. B. Pin. 467. Rosmarinum sylvestre. Dod. niederländisch fol. 437. Matth. Bauh. in Matth. fol. 576. Tab. lib. 3. fol. 772. Ledum Silesiacum, Clus. Pann. pag. 68. Clus. hist. lib. 1. fol. 83. Chamæpeuce, Cord. in Diosc. fol. 71. Cord. hist. fol. 111. Ledum foliis Rosmarini alterum. Lob. ic. pag. 124. o. Wilde Roßmarin. Dod. Niederländisch. Porsch Borussis.

Multibibis fœmellis Ledum potandum sæpe offertur temulentiæ accelerandæ causâ. His svavia danda esse vult Cato. Plin. lib. 14. c. 13. causam addit: Cato ideò propinquis fœmellis osculum dare jussit, ut scirent, an temetum olerent. Rustici Ledum in porcile seu haram congerunt, porcis phthyriasi infestatis. Im Gebrüch bey Schwanis copiosè. Item bey Judenkirch in ericetis uliginosis.

CXXVI. Clinopodium origano simile. C. B. Pin. 224. Clinopodium vulgare, Matth. Bauh. in Matth. 595. Clinopodium majus Matthioli, Cam. hort. 44. Clinopodium 1. Matth. deutsch fol. 337. Clus. Pann. pag. 624. Origanum minus Trag. Sebitz. in Trag. deutsch / 29. Origanum verticillatum Thal. pag. 81. Pulegium montanum Lon. deutsch 146. Clinopodium. Cord. in Diosc. fol. 57. Clinopodium 1. Tab. lib. 2. fol. 69. Clinopodium vel Polycmenum, Gesn. hort.

254. Acinos, Lob. ic. 504. Acynus, sive sterilis, Adv. Lob. 215. Wirbeldost/Matth. Tab. Klein Wolgemuth/Seb. in Trag. Wald-Poley/oder Berg-Poley Lon. In der Hollen-Grund.

CXXVII. Cnicus sylvestris spinosior, C. B. Pin. 378. Heracantha, Tab. lib. 2. fol. 372. Atractylis, sive Carthamus sylv. Trag. Seb. in Trag. deutsch 676. Cartamus sylv. Lon. deutsch fol. 100. Carduus vulg. Matth. Bauh. in Matth. fol. 497. Atractylis sylvestris, seu Cnici sylvestris species, Thal. 6. Atractylis media, Gesn. hort. fol. 249. Atractylis mitior Fuchs. fol. 121. Cirsium luteum Sequanorum, Lob. ic. 14. o. Carlina sylvestris, Dod. lateinisch 728. Carlina sylv. vulgaris, Clus. hist. lib. 5. fol. 156. Colus rustica, Cord. in Diosc. fol. 57. Wilder stachlichter Feld-Saffran/ Dreumdistel/ und Schönhärlein/Tab. Dreydistel. Sebitz. in Trag. Wilder Feld-Saffran/ Fuchs. Wilde Stichwurtz fæmellis.

Lixivio decocta pilos nitescere, ac lendes marcescere facit. In locis montanis & aridioribus bey Qvednau.

CXXVIII. Consolida media pratensis cœrulea, C. B. Pin. 260. Bugula, Dod. lateinisch fol. 135. Clus. Pann. p. 609. Güldengüntzel/Brunf. deutsch fol. 90. Consolida media Matth. deutsch fol. 402. Fuchs. fol. 391. Eystett. Symphytum medium Lon. deutsch 179. Bugula, quibusdam Prunella Obs. Lob. 252. Prunella cærulea prior Trag. Kyber. in Trag. 309. Consolida media prima, Tab. lib. 2. fol. 257. Consolida media major Thal. pag. 28. Chamæcisi alterum genus, Cæs. lib. 11. c. 36. p. 453. Blau Güldengünsel/ Tab. Matth. Bey dem Penartischen Walde. It. bey Haberstroh.

CXXIX. Consolida media pratensis purpurea, C. B. Pin. 260. Roht Güldengünsel. Rubris floribus reperta. Bey Haberstroh. Item im Penartischen Walde/ ubi flos ex rubro cœruleus fuit.

CXXX.

CXXX. Consolida regalis arvensis. C. B. Pin. 142. Tab. ic. p. 61. Consolida regalis, Brunf. tom. 1. fol. 84. Gesn. hort. fol. 255. & 256. Consolida regalis flore cœruleo minore Cam. 46. Consolida regia, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 453. Fuchs. ic. pag. 15. Lon. deutsch fol. 217. Flos regius 2. vel sylvestris, Dod. lateinisch 252. Chamæmelum eranthemon, Fuchs. fol. 27. Segetum consolida regia strigosior tota, Lob. ic. 739. Delphinium vulgare, Clus. hist. lib. 6. fol. 207. Cuminum sylvestre alterum Dioscoridis, Gesn. hort. 256. Wild Rittensporen / Tab. Rittersporen / Lon. Sebitz. in Trag. S. Otilien-Kraut oder Blum / Ritterblum und Lerchen-Klaw / vulgò.

Temperata est, siccans cum adstrictione. Vulnera sanat, ardores qvarumcunq; partium mitigat, visum acuit, venenis obsistit, calculos atterit, & interaneorum expellit vermes. Semen viribus haud cedit plantaginis semini, undeforiolos juvat & sangvinem reddentes. Eligitur hanc in rem flore cæruleo, & sativa. Am Kneiphöfischen Wall. It. beym Tümpel-Krug inter segetes copiose.

CXXXI. Convolvulus major albus. C. B. Pin. 294. Convolvulus major flore albo, Eystett. Convolvulus major Gesn. hort. fol. 255. Smilax lævis vel lenis major, Lob. ic. 619. Volubilis major, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 634. Lon. deutsch. fol. 236. Tab. lib. 2. fol. 550. Thal. pag. 131, Campanula alba sylvestris, Swert. florileg. part. 2. fol. 14. Helxine cissampelos, Cord. in Diosc. fol. 64. Smilax lævis, Matth. Bauh. in Matth. 839. Fuchs. fol. 720. Smilax lævis major, Dod. lateinsch 392. Große Winde Tab. Groß weiß Windglocken / Seb. in Trag. Groß glatt Winden / weiß Winden. Zaunglocken / und Qvackenkraut / Lon. In der Hollen-Grund.

 CXXXII.

CXXXII. Convolvulus minor arvensis. C. B. Pin. 294. Volubilis arvensis flore roseo, Tab. lib. 2. fol. 551. Smilax lævis minor, Dod. lateinisch fol. 393. Volubilis minor, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 635. Lon. deutsch fol. 136. Thal. pag. 131. Helxine in segetibus nascens, Cord. in Diosc. fol. 64. Convolvulus minor, Gesn. hort. fol. 255. Cæs. lib. 9. c. 24. p. 383. Clus. hist. lib. 4. fol. 50. Helxine Cissampelos, Matth. Bauh. in Matth. 715. Fuchs. fol. 258. Convolvulus minor purpureus, Lob. ic. 619. kleine winde Tab. kleine weiße Ackerwinde / oder Glocken / Sebitz. in Trag. Weidenwinden / Wein-Gart-winden / Zaun-winden und kleine Glattwinde Lon. Mittel-winde / Fuchs. Inter segetes passim.

CXXXIII. Convolvulus minor semine triangulo. C. B. Pin. 295. kleine Winde mit dreykantigem Saamen. Convolvulo similis herba, Gesn. hort. fol. 255. Volubilis media, seu nigra Thal. 131. Orobanche seu Cussus alter Serapionis, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 527. Volubilis nigra Tab. lib. 2. fol. 552. *Helxine Cissampelos altera* Atriplicis effigie, Lob. ic. 624. Elatine, Cord. in Diosc. fol. 64. Convolvulum nigrum, Dod. lateinisch 396. Formentone alterum genus Cæs. lib. 4. cap. 31. pag. 166. Schwartze Winde / Seb. in Trag. Buchwinde. Tab. In der Hollen-Grund.

CXXXIV. Conyza cœrulea acris. C. B. Pin. pag. 265. Dentelaria Gesn. hort. fol. 256. Conyza cærulea Tab. ic. pag. 861. ubi hirsuties omissa. Erigerum qvartum, Dod. lateinisch, 641. Conyzæ genus tenuifolium, Thal. 21. Tinctorius flos alter, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 123. Scharffe blawe dürwurtz, Tab.

Cubitalis & procerior quandoq; est planta summitatem versùs brachiata, thyrsulis tenellis striatis, ex nigro ruffulis, hirsutie

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0095-5
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0096-1
DFG

tie insigni, quorum singulis exortibus subservit folium oblongum, angustum, hirtum, gustu acre: flosculis tenuissimarum exilitatum in caulium fastigiis apud nos albis, meditullium ex staminulis luteis constitutum festivè ac copiosè circumdantibus, ocissimè, ac sæpe intra horæ spatium vanescentibus, succedente mox papposâ lanugine. Radix ex nigro flavescens, capillamentis instructa suis, ubi manditur acritate linguam ferit. Floret Mense Julio. In locis arenosis & petrosis passim bey Königsberg.

CXXXV. Conyza aquatica laciniata, C. B. Pin. p. 266. Conyza Helenitis foliis laciniatis, Lob. ic. 347. Conyzæ mediæ species altera, Dod. lateinisch 52. Wasser-Dürwurtz mit zerschnittenen Blättern. In locis aquosis beym Brandenburgischen Schloß. Item bey Nordenburg im Stadt-Graben copiosè.

CXXXVI. Conyza major flore globoso. C. B. Pin. p. 266. Dürwurtz mit Kugelrunder Blüth. Conyza minor Trag. Kyber. in Trag. 166. Matth. deutsch fol. 365. Tab. ic. p. 860. Conyza minima Lob. ic. 345. Dod. lateinisch, fol. 52. Thal. pag. 21. Conyza minor seu fœmina, Lon. deutsch 160. Psyllium, Cord. hist. fol. 154. Kleine Dürwurtz Matth. Tab. Flöhkraut und Hunds-Augen aliàs. Vetulis Kerstinckenkraut aut Kröstincken-Kraut. Major est & minor. Ictericis tussientibus & suspiriosis salutaris. In locis irriguis bey Königsberg.

CXXXVII. *Conyza palustris foliis tripartitò divisis, Joh. Lœs. Bidens foliis tripartitò divisis, Cæsalp. lib. 12. cap. 17. p. 488. Hepatorium aquatile, Dod. lateinisch fol. 595. Verbena supina vel tertia, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch. 168. Verbenaca recta Cord. in Diosc. 66. Forbelina Benoniensis

Gesn. hort. fol. 259. Pseudohepatorium alterum Dodonæi seu fœmina, Thal. 85. Cannabina aqvatica folio tripartitò diviso C.B.Pin.p.321. Waßer-Dürrwürtz mit tieff zerschnittenẽ Blättern / Hanenkamp Germanis. Cord. in Diosc. Stuppars Moravis & Silesiis, Ges. in hort. Radix ex multis filamentis sub albidis constituta, caules promit rotundos, ramosos, rectos ruffescentes, qvibus folia in tres, qvinq; vel sex profundas lacinias, in circuitu serratas, digitorum instar, dirempta adnascuntur. Cacumina caulium excipiunt florum capitula globosa ex numerosissimis calyculis luteis, in summitate parùm incisis, ac in meditullio lingulam bifidam, exilem nigricantem foventib⁹ exstructa, qvorum ambitum luteoli exornant flores. His succedunt oblonga ac pulla semina, in apice ternis hispidulis aculeis, qvorum intermedius brevior, horrida. Horum ope vestibus, & contrectantium digitis facilè adhærescunt. Passim in locis udis bey Königsberg.

CXXXVIII. *Conyza palustris foliis serratis. Joh. Lœsel. Eupatorium cannabinum chrysanthemum, Tab. Lib. 1. fol. 418. Bidens folio non dissecto, Cæsalp. l. c. Eupatorium cannabinum fœmina Septentrionalium, stellato & odoro flore, Lob. ic. 529. Fœmina cannabina septentrionalium, stellato & odoro flore, Adverf. fol. 227. Waßer-Dürwurtz mit schlecht zerschnittenen Blättern. Priori assimilis est demptis foliis. Caules alit ramosos, pallidè virentes & exiguè hirsutos quib⁹ folia oblonga, in ambitu duntaxat crenata serviunt. Conyza palustris. Hort. Eyst. Cannabina aqvatica folio non diviso, C. B. Pin. 321. Waßer-Wundkraut / Waßersternkraut / Geel-Fieberkraut und Kunigundtkraut Weible. Tab. Bey der Laute. Auch unter dem Getreidigt an feuchten Oertern.

CXXXIX. Cornus fœmina C. B. Pin. p. 447. Hartriegel.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0099-1
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0100-7
DFG

riegel. Trag. Kyber. in Trag. 1004. Virga Sangvinea, Matth. Bauh. in Matth. 214. Gesn. hort. fol. 286. Dod. lateinisch. 782. Sangven vulgò, Cæs. lib. 3. cap. 26. p. 110. Ossea, Lon. deutsch fol. 65. Cornus fœmina. Gesn. hort. f. 255. Lob. ic. p. 169. o. Thal: p. 33. Tab. lib. 3. fol. 752. Pseudocrania, Cord. hist. fol. 187. Hartriegel Matth. Cornelbaum Tab. Kürbeeren aliàs. Bey Fischausen im Rosen-Busch.

CXL. Corylus sylvestris, C. B. Pin. 418. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 868. Lob. ic. p. 192. o. Clus. hist. lib. 1. fol. 11. Lon. deutsch fol. 46. Avellana nux sylvestris Fuchs. fol. 398. Avellana, Corylus sylvestris, Gesn. hort. fol. 249. Nux avellana agrestis, Brunf. lateinisch tom. 3. fol. 225. Nux avellana sylvestris Matth. Bauh. in Matth. fol. 229. Nux avellana, sive Corylus Dod. lateinisch fol. 816. Pontica nux in corylo vulgari, Cord. in Diosc. fol. 25. Wilde Haselnuß Sebitz. in Trag. Haselbaum / Haselnußbaum / oder Haselstrauch Lon. Haselnuß / Fuchs.

Adeò fructifera sæpe est Corylus apud nos, ut modò septendecim, modò viginti unam, imò simul viginti duas nuces, uno pediculo fultas, & glomeramen quasi quoddam constituentes, hic observârim. Ejusmodi nucum glomeramina ex concursu multorum florum exorta credo. Cæterùm 4 numero differentias sæpe notavi: 1. nux est calyculo clauso. 2. Calyculo aperto. 3. Calyculo semiaperto. 4. Calyculo curto. Oblongiores citius, rotundæ tardius in nucleum maturescunt, omnium verò primò, quæ Augstnüß salutantur.

Corylus ipsa ligno est vel fragili vel obsequioso. Hoc ob lentitiam finditur & ex eo textiles sellarum sedes, & circuli vasis ligneis firmandis deservientes, parantur.

Falluntur, qui coryli flores credunt esse julos, quippe flo-

flosculos edit, in gemellarum summo constitutos, staminum instar, ruffulos, laccam Florentinam colore æmulantes, & quidem apud nos inclinante Aprili, aut Majo Mense inchoante. Juli ejus, dum Corylus floret, concussi, pulvisculum reddunt luteum, pictoribus Schüttgelb / Bleygelb vocatum. Deservit hic pulvis pictoribus elegantissimo colore, tonsoribus vi consolidante, siccante, refrigerante & adstringente, vulneribus insperſus. Notandum: Corylus quò magis julis abundat, eò copiosiores alit flores, destituta iisdem paucissimos ostendit. Arbor hæc materies est virgulæ metallorum indagatricis, Wünschelrut dictæ, quam Nicolaus Niger Hapelius (ita se transnominavit Raphaël Eglinus Iconius, Theol. D. & Prof. olim Marburgicus) in Disquis. Helianâ ita vult cædi & tractari: *Cædatur virga bifurcata horna, i. e. unius anni, ex corylo vel quercu, cujus cornua sint æqualia, & sine vitio, (quidam eandem putant ante solis exortum, maximè crescente lunâ, & quidem potissimum circa diem Annunciationis Mariæ cædendam) hoc facto sumantur duæ furculæ in utramq; obversam manum, cœlum versus digitis compressis, utrinq; videlicet extremitatibus flagellorum furcæ ad utrumq; compressum pollicem extra manum prominentibus: ipse autem furcæ caudex extrinsecus intra duas manus vergat. Quodsi quis argenteos globulos thoraci præfixos gestet, etiamsi omni nixu comprimat virgam utrâq; manu, tamen gyrum movendo per se faciet, & versus thoracem sese introrsum usq; ad globos cæsa illa caudicis pars vertet: sin verò omni metallo exutus, argentum aurumve ponas in terram, tunc etiam renitente & invito te, qui tenes virgam, pars caudicis cæsa extrorsum verget, donec validissimo indicio & motu metallum percutiat.* Quâ de re passim Autores Chymici & Physici consulantur.

Nuci-

Nucibus ludunt pueri. Catullus in epithalamio Julii & Mallii:

Da nucem pueris, iners
Concubina, satis diu
Lusisti nucibus.

Ovidius lib. de nuce, sigillatim multos declarat ludos, qui nucibus fiunt:

Has puer aut certo rectas diverberat ictu,
Aut pronas digito bisve semelve petit.

Augustus laxandi animi causâ cum pueris facie liberali ocellatis nucibus lusisse dicitur à Tranqvillo. Hîc per nuces ocellatas exaudiunt nonnulli carystias seu avellanas, alii amygdalas. Alexander ab Alexandro lib. 3. genial. dier. c. 21. nucleos esse affirmat, qui in Persicis pomis inveniuntur, dictasq; ocellatas nuces existimat propter ocellos, & foramina, quibus muniuntur undiq;. Corylus eò fructuosior, quò pejus tractatur. Veterum adagium est: Corylus nucleis dives, nuptiarum præsaga est: Existimo exaudiendum hoc esse de furtivis, quibus se commaculant sæpe, coryleta inter aqualiculantes nucum collegæ. Aliàs memini priscos, nuptiarum solemnibus, nuces sparsisse, vel sponsum pueritiæ jam renunciâsse indicantes, vel jactu tripudium excitantes, vel deniq; gemino nucum operimento, totidem involucris fœtus novæ nuptæ circumdatum iri, significantes.

Melancholici & qui tristitiæ dissolvenda dederunt pectora, περιαπτον hoc confici curant in multis expertum. In nucem avellanam, cæstro excavatam & enucleatam κατόπτρον seu speculum pavonis deferatur, superstructo hydrargyro: mox foramine cerâ virgineâ obturatô nux syndone involvatur, ac collo appendatur.

Nux ludicræ rei materies: Notabilem hîc in memoriam

mihi revocant historiam nuces, qvæ in Regio apud nos monte quondam acciderat. Ex sartorum genere quidam epulum Magistrale Meister-Kost tribulibus suis apparaturus, alia inter edulia tenebatur vigore statutorum & consvetudinis inveteratæ carnes croco tinctas, amygdalis consperſas, apponere. Quid fit? nuces hic elegit amygdalarum loco. Renano integro elapso divulgatâ, nuces pro amygdalis appositas fuisse stomachari incipit tota opificum tribus, hominem de integro ad dapes magistrales apparandas durâ verborum gravitate cogens. Ab insolenti hoc postulato junior ille Magistellus ad Senatum urbicum se recipit, sententiam hâc super re tristiculo expectans animo. Senatus rem pensiculatiùs trutinans decernit., cum in epulo Magistrali nil præter amygdalas desideratum sit amplius, æqvum esse, ut sartorum tribules adjiciales seu adipales parent cœnas, easque crocatas, ipse verò addat amygdalas. Ita litigium optuma sententiâ sublatum. De carnibus crocatis Vulgare est dicterium;

Kuhfleisch in gelber Brüh/
Ein Ritter ohne Müh /
An diesen beyden ist verlohren
Der Saffran und die gülden Sporen.

Taubmannus ita:

Caro crocata Vaccæ,
Expers eques labore,
Fraudique sunt probroque
Calcaribus crocoque.

Nux miraculum præbuit. De Sebastiano Vogelsbergo hæc memoriæ prodidit Melissus:

Fortis erat bello vir & acribus inclytus armis,
Cui volucris *nomen* monsque *perenne dabat.*

Jusse-

Jusserat huic Quintus caputâ cervice recidi,
Cæde fora Augustæ nunc quoque tincta rubent.
Ille sibi cernens ensemque necemque paratam
Carnifici intrepidà talia voce refert:
En morior, moriarq;, jubet quia Cæsaris ira:
Quod precor, hoc votis parce negare meis,
Truncus ubi gelidà fuero tellure sepultus
In tumulo fœtum consere ritè nucis.
Nux ea, si merui pœnas, arescet; at insons
Si plector, crescet; grandis & arbor erit.
Vota valent, arbos succrevit, & alta sub auras
Explicuit patulis brachia densa comis.

CXLI. Cuscuta major. C. B. Pin. pag. 219. Cassytha Plinii vel Theophrasti, Gesn. hort: fol. 251. Cassytha Plinii, Cuscuta officinarum, Lob. ic. 427. Cassutha. Fuchs. fol: 384. Tab. lib. 2. fol. 592. Dod. lateinisch fol: 554. Thal. pag. 28. Androsaces, vulgò Cuscuta Trag. Kyber. in Trag. 810. Cuscuta Matth. Bauh. in Matth. fol. 879. Lon. deutsch. fol. 236. Cæs. lib. 8. c. 41. fol. 343. Seiden-Kraut / Tab. Filtz-Kraut Flachs-Seiden / Flachs-Dottern Lonic. Neßel-Rancken Borussis. Bey Königsberg passim. Urticæ præsertim majori adhæret.

CXLII. Cyanus segetum C. B. Pin. 273. Cyanus cœruleus, Gesn. hort. fol. 256. Cyanus, Lon. deutsch fol. 216. Cæs. lib. 13. cap. 52. f. 538. Cyanus flos Dod. lateinisch fol. 251. Baptisecula, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 450. Cyanus vulgaris Lob. ic. pag. 546. Adv. Lob. fol. 236. Obs. Lob. 296. Cyanus major Matth. Bauh. in Matth. fol. 389. Cam. hort. pag. 51. Cyanus cœruleus arvensis, Tab. lib. 1. fol. 531. Cyanus arvensis cœruleus Thal. pag. 29. Eystett.

NB. Incisuræ apud Lon. Matth. & Sebitz. in Trag. omissæ. Blau Kornblum/ Tab. Groſse Korn-Blum Matth. Rocken-Blum und Zacharias-Blum/ aliàs. Inter segetes passim. Flores cyani cœruleum pictoribus suppeditant colorem. In mortario lapideo, flores pistillo contunduntur ligneo, adjecto aluminis pauxillo: contusorum pars linteo terso & extenso inducitur, ac involvitur: mox alia portio eidem linteo superinducitur, ac rursum involvitur, & sic ulterius cum florum minutali agitur, strato super strato constituto. Portiones ita linteo inductæ ac involutæ, præsto lævi manu committuntur, qvò succus omnes lintei partes æqvabiliter imprægnet. Post crassamentum abjicitur, ac linteum siccatur. Usûs Tempore lintei particula aquæ, in quâ gummi Arabicum dissolutum immergitur, & colorem reddit amœnulè cœruleum, qvem pictores Tüchlein-blau nominant. NB. Cyanus in quibusdam infantum morbis remedium expertissimum est.

CXLIII. Cynoglossum majus vulgare, C. B. Pin. p. 257. Cynoglossus vulgaris, Gesn. hort. fol. 256. Cynoglossum cum flore Dod. lateinisch. fol. 54. Cynoglossum, Adv. Lob. fol. 250. Cynoglossum cum flore. Tab. lib. 2. fol. 408. Cynoglossum vulgare, Matth. deutsch fol. 570. Cynoglossum vulgare cum flore, Lob. ic. 580. Cynoglossum vulgare, Clus. hist. lib. 5. fol. 161. Eystett. Groſse Hunds-Zunge/ Brunf. deutsch fol. 169. Gemeine Hunds-Zung Matth. Hunds-Zung mit Blumen/ Tab. am Kneiphöfischen Wall passim.

CXLIV. Cynoglossum minus. C. B. Pin. pag. 257. Elatine Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 156. Lon. deutsch fol. 166. Klettenkraut / Seb. in Trag. Lon.

Apud nos cubitalis sæpè est planta, secus ac in Angliâ, ubi vix semipalmaris reperitur. In Neüendorff am Tham copiose

piosè. It. am Kneiphöfischen Wall/nach dem Schießhause zu.

Siccat, adstringit & solidat. Decocta dysentericos & foriolos juvat, & dolores compescit. Gargarismis additur.

CXLV. Dens leonis latiore folio C. B. Pin. 126. Dens leonis vulgi, sive Urinaria, Lob. ic. p. 232. Dens leonis. Brunf lateinisch tom. 3. fol. 70. Matth. Bauh. in. Matth. fol. 388. Dod. lateinisch. fol. 636. Dens leonis 1. Tab. lib. 1. fol. 595. Taraxacon minus Lon. deutsch 123. Hieracium majus, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch. 209. Hieracium parvum Cord. in Diosc. fol. 55. Hieracium minus, Gesn. hort. fol. 262. Caput Monachi, Matth. deutsch fol. 178. Hedypnois, dens leonis, Fuchs. ic. pag. 387. Aphaco Cæs. lib. 13. cap. 3. pag. 508. Pfaffenblatt / oder Röhrlein-Kraut / Tab. Pfaffen-rörlein/ Klein Habichtskraut/ Lon. Pfaffenkraut / Löwen-Zahn / Saurüßel / Sauschnabel/ Saublum/ Pfaffenstiel/ Hundsblum / Eyerblum / Münchsblatt/ Weglattich / Wiesenlattich/ Hundslattich/ und Mertzenblum vulgò. Sommerdorn Hassis. Bey Königsberg/ in locis sabulosis passim. Radix Taraxaci collo suspensa in oculorum caligine efficax creditur.

CXLVI. Dentaria heptaphyllos baccifera, C. B. Pin. 322. Dentaria bulbifera, Lob. ic. 687. Dentaria baccifera, Clus. Pann. Clus. Hist. Dentaria septifolia, Tab. Siebenblätteriger Schuppenwurtz mit schwartzen Beeren. In der Sarkau in fruticetis ac locis umbrosis.

CXLVII. Digitalis lutea magno flore, C. B. Pin. 244. Digitalis lutea, Fuchs. f. 894. Tab. lib. 1. fol. 270. Cam. hort. p. 55. Lon. deutsch. fol. 105. Thal. 38. Digitalis flore luteo. Eystett. Digitalis 3. Dod. lateinisch f. 169. Campanula sylvestris, seu Digitalis flore luteo, Trag. Kyber. in Trag. 889. Geelfingerhutt/ Tab. Fuchs. Geeler Finger-Hutt oder Wald-Glöcklein/ Lon.

Hinter Qvednau auff dem Berge in locis umbrosis. Item in der Osterodischen Heyde copiosè.

CXLVIII. Dipsacus sylv. aut virga pastoris major, C. B. Pin. 385. Dipsacus Lon. deutsch fol. 99. Dipsacus purpureus Fuchs. fol. 225. Dipsacus primus Tab. lib. 2. fol. 366. Carduus fullonum, Brunf. lateinisch / tom. 3. fol. 32. Labrum Veneris, Cord. in Diosc. fol. 50. Lob. ic. p. 18. o. Lob. Obs. fol. 487. Carduus fullonius erraticus, Trag. Seb. in Trag. deutsch 667. Labrum Veneris flore purpurascente, Cæs. lib. 13. c. 27. p. 519. Labrum Veneris alterum, Matth. Bauh. in Matth. fol. 493. Groß Gartendistel / oder Weberkarten / Bubenstreel und Wolffstreel / Lon. Braun Kartendistel Fuchs. In elegantem nonnunquam excrescit magnitudinem, ita ut 4 ulnas sæpe apud nos exæqvet. Bey der Neuhäusischen Mühl. Item im Werder hinter Elbing in agrorum limitibus copiosè.

CXLIX. Dracunculus palustris sive radice arundinaceâ Plinii C. B. Pin. 195. Aron palustre, Ges. hort. fol. 248. Dracunculus aquaticus, Matth. deutsch fol. 228. Dracunculus aquaticus Plinii, Cam. hort. p. 56. Dracunculus aquatilis, Dod. lateinisch 331. Dracunculus palustris minor, Lon. deutsch fol. 232. Angvina aquatica, sive Dracunculus, Lob. ic. p. 600. Dracontium palustre Tab. lib. 2. fol. 417. Wasser-Schlangenkraut Matth. Klein Schlangenkraut Lon. Wasser-Aron und Drachenwurtz vulgò. Schweinkraut Nostratibus. Folia quippe concisa porculatores aquâ macerant, furfures addunt & miscelâ hâc porcos saginant. Calefacit, siccat & subtilium est partium, hinc suspiriosis utilis est radix, quæ degustata, fucum quasi lingvæ divendit, mox eandem insigniter suâ acrimoniâ ferit. Aro perlimile quiddam obtinet, auctore Gal. 6. simpl. Viscera expurgat, lenta ac viscida incidit, opti-

optimumq; remedium est contumacium ulcerum. Baccæ ex vino sumptæ ἐχιοδήκτοις prosunt. Hinter Judenkirch in locis uliginosis.

CL. Dracunculus pratensis serrato folio, C. B. Pin. 98. Wiesen-Bertram mit zerkerbten Blättern. Ptarmica 1. Matth. Bauh. in Matth. fol. 441. Ptarmice, Lon. deutsch fol. 263. Ptarmica, sive Ptarmica folio Taraconis, vel sternutamentoria Lob. ic. pag. 455. Ptarmica Fuchsii Cam. hort. p. 132. Tanacetum album, seu acutum, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch / 379. Tanacetum album acutum Tab. lib. 2. fol. 454. Tarchon aquaticum, Gesn. hort. fol. 274. Draco sylv. sive Ptarmice, Dod. lateinisch 710. Ptarmica sylvestris germanica, Thal. pag. 86. Ptarmica vulgaris, Eystett. Weiß Reinfarn Tab. Wild Bertram / Lon. Matth. Bey der Altstätschen Ziegelscheine in pratis siccioribus. Item bey dem Penartischen Walde. Item in der Langkaase (pratum est) zwischen Lattenwalde und Kuntzen.

CLI. Echium scorpioïdes arvense C. B. Pin. 254. Auricula muris cœrulea Tab. lib. 1. f. 630. Auricula muris minor tertia Trag. Seb. in Trag. deutsch 221. Scorpioides tertium minus Dod. Eystett. Scorpioides aquaticum Ges. hort. f. 280. Scorpioides tertium, Dod. lateinisch fol. 72. Heliotropium min⁹ alterum Cæs. lib. 11. p. 439. Echii palustris alia species, Thal. p. 40. Alsine Myosotis, sive auricula muris, Lob. ic. 461. Myosotis hirsuta reptans, Adv. Lob. 193. Observ. Lobel. 245. Blaue Mäus-Ohrlein / Tab. Vergiß mein nicht / Ges. hort. Circa Regiomontum passim. Variat magnitudine, aliquando vulgatâ quadruplo major est & hispidior.

CLII. Echium scorpioides arvense flosculis niveis, Joh. Lœs. Weisse Ackermäuß-Ohrlein. Am Thiergarten bey Neuhausen in locis umbrosis.

CLIII.

CLIII. Echium Scorpioïdes paluſtre C. B. Pin. 254. Euphraſia cœrulea Trag. Seb. in Trag. deutſch 260. Eufraſia cœrulea Tab. lib. 1. fol. 630. Echium paluſtre Cordi, Thal. pag. 40. Cynogloſſa minor, Brunf. lateiniſch tom. 1. fol. 176. Myoſotis ſcorpioides partim repens, partim erecta, Lob. ic. 462. Scorpioides tertium majus Dodonæi, Eyſtett. An auricula muris, Matth. deutſch fol. 249? Blaue Waſſermäus-Ohrlein / blauer Augentroſt / Tab. Kleine Hundszung / Brunf. das rechte Mäuß-Ohrlein Dioſcoridis. Matth. Bey Königsberg paſſim.

CLIV. Echium vulgare C. B. Pin. 254. Echium Matth. deutſch / 420. Dod. lateiniſch 631. Geſn. hort. fol. 257. Echiū ſive Bugloſſum ſylveſtre, Lob. ic. 579. Echium vulgare, Cluſ. hiſt. lib. 5. fol. 163. Anchuſa ſylveſtris Thal. p. 9. Bugloſſum ſylveſtre, Lon. deutſch 175. Echium, bugloſſum agreſte, Adv. Lob. fol. 249. Echium floribus purpurantibus rubellis, Obſ. Lob. 312. Lycopſis, Cord. in Dioſc. fol. 63. Wilde Ochſenzung / Matth. Lon. Bey Lautenmühl / Item beym Heydekrug / im Brandenburgiſchen in locis aridis & ſalebroſis copiosè.

CLV. Elichryſum ſeu Stœchas citrina anguſtifolia, C. B. Pin. 264. Stœchas citrina, Matth. Bauh. in Matth. fol. 736. Dod. lateiniſch fol. 268. Geſn. hort. fol. 283. Tab. lib. 2. fol. 103. Coma aurea, Lob. ic. pag. 485. Chryſocome aureave coma, Adv. Lob. fol. 203. Amarantus luteus Fuchſ. fol. 99. Amaranthus luteus, Lon. deutſch fol. 134. Chryſocome prima vulgaris, Cluſ. hiſt. lib. 3. fol. 326. Helichryſon, & Amaranthus Galeni, Cæſ. lib. 12. c. 13. pag. 484 & 485. Schmalblätterige gelbe Rheinblumen. Rheinblume / Tab. Matth. Rheinblumen oder Mottenblumen / Lon. Mottenblumen /

Winter-

Winterblumen / vulgò Winterblümchen. Kattenpoten Nostratibus.

Amariusculo & aromatico est sapore. Excalfacit, siccat, aperit, & abstergit. Flores decocti cachecticos, & aurugiosos juvant: furfures capitis abstergunt, & pediculos enecant. Vestimentis associati tineas pellunt. In locis aridioribus & siccioribus beym Altstädtschen Gericht. Flores cum pane Butyraceo vitulis dati certissimum diarrhœæ remedium esse rusticis creduntur.

CLVI. Equisetum palustre tenuissimis & longissimis setis: 3. in Prodr. C. B. pag. 24. Wasser-Roß-Schwantz mit sehr dünnen langen Blättern. In palustribus bey Königsberg passim.

CLVII. Equisetum sylvaticum tenuissimis setis C. B. p. 16. Equisetum sylvaticum, Tab. lib. 1. fol. 699. Hipparis minor altera, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 550. Klein Schaffthew / oder Katzenschwantz / Trag. Wald-Schaffenthew / Wald-Roß-Schwantz / in locis umbrosis passim.

CLVIII. Equisetum palustre brevioribus foliis polyspermon: πολύγονον θῆλυ C. B. Pin. pag. 15. Polygonum fœmina Matth. Bauh. in Matth. fol. 676. Polygonus fœminea Gesn. hort. fol. 273. Dod. lateinischrtz. Tab. l. 2. fol. 505. Equisetum tertium, Cæs. lib. 16. c. 15. p. 599. Polygonon fœmina semine vidua Lob. ic. p. 792. Adv. Lob. fol. 354. Sangvinalis fœmina Cord. in Diosc. fol. 61. Limnopeuce Cord. hist. fol. 150. Polygonon fœmineum, Thal. p. 87. Vielsaamiger Wasser-Roßschwantz mit kleinen Blättern. Thannenwädel / Tab. Matth. Klein Katzenwädel / nonnullis. In locis uliginosis bey der Altstätschen Klapperwiesen. ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ sine semine reperitur, quandoq; polyspermon est.

CLIX. Equisetum foliis tractu ætatis nudum, Joh. Lœs. Equisetum foliis nudum non ramosum sive junceum. ἵππουρις ἄφυλλος C. B. Pin. pag. 16. Hippuris major, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 548. Hippuris nuda, Equisetum nudum Tab. ic. pag. 251. Hippuris major altera, Lon. deutsch fol. 212. Polygonon fœmineum ἀφυλλόκαυλον, Thal. p. 87. Ohnblätteriger Roßschwantz nach Länge der Zeit. Schaffthew ohne Blätter / Tab. ic. Groß Schaffthew / oder Roß-Schwantz / Lon.

Equisetum hoc foliosum est primâ ætate. Senescens verò & quidem mense Julio, foliis prorsus exuitur, & nudum conspicitur. Id sæpiusculè αὐτόπτης notavi. Reliqvias foliorum icon apud Tragum monstrat. In locis palustribus in Königsberg passim.

CLX. Equisetum foliis nudum, ramosum C. B. Pin. 16. Equisetum tertium, Matth. Germ. fol. 441. Hippuris minor, Lob. ic. pag. 794. Vielästiger Katzenzagel oder Schaffthen ohne Blätter. Im Ambt Hollandt wird das Kraut genandt Heermoß. Hinc adagium: Der Pferde Brodt / der Kühe Todt. Equis gratissimum & salutare est pabulum, contrà ovibus & vaccis noxium. Vaccæ eo saturatæ denticidio urgentur, foriolæ fiunt, & fordæ ab ejus esu abortiunt ac persæpe moriuntur. Hinc fœnum sumentes vaccæ, particulam fœni (cui immistum esse sentiunt equisetum hoc) rursum ore projiciunt, ut noxia herba, hoc modo excutiatur. Oves ab esu hujus herbæ prorsus abhorrent, ac oris lingvæq; dexteritate illum ab utili pabulo separare sciunt.

CLXI. Equisetum fœtidum sub aquâ repens. 5. in Prodr. C. B. 25. Stinckend Schaffthen so unter dem Wasser kreucht. Equisetum pini foliis simile apud Plinium & Hippuris minima à Diosc. non descripta, Dalech. in Plinio fol. 547.

&

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0113-0
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0114-6
DFG

& 548. Cauliculis provenit tenuissimis, rotundis, per obliqvum, ut saccharum penidium, striatis. Odoris est lutosi ac sulphurei. Siccata planta friabilis est, ac digitis facilè in pollinem redigitur. Bey Osterrode in fundo lacûs Schilling, ad pagum Werlitten.

CLXII. *Equisetum sub aquâ repens foliis bifurcis. Joh. Lœs. Kriechend Wasser-Schafftheu mit vielen zweyzänckichten kleinen Blättern.

Cauliculis est rotundis geniculatis non striatis; foliis te- "
nuissimis, summum versûs bifurcis ad genicula concurren- "
tibus. Friabilis est exsiccata, ac digitis facilè atteritur. In "
piscinis passim, ex quibus sagenâ sæpius evellitur. "

CLXIII. Erica vulgaris glabra. C. B. Pin. 485. Erica vulgaris Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 747. Thal. p. 40. Erica folio Myricæ, Clus. Pann. p. 35. Clus. hist. lib. 1. p. 41. Erica vulgatior folio Myricæ, Adv. Lob. fol. 447. Erice Fuchs. fol. 255. Erica Tab. lib. 3. fol. 809. Cord. in Dios. fol. 18. Lon. deutsch fol. 53. Erica prima Matth. Bauh. in Matth. fol. 141. Erica prior Dod. lateinisch fol. 767. Heyd, Tab. Matth. Heiden. Sebitz. in Trag. Lon. Fuchs. In locis arenosis passim.

CLXIV. Erica baccifera tenuifolia baccis nigris. Joh. Lœs. Foliis assimilis est ericæ bacciferæ tenuifoliæ, Tab. lib. 3. fol. 810. Schmallblätterichte Heide mit schwartzen Beeren. Auff der Curischen Nährung hinter Kuntzen copiosè. Kräenbeeren Nostratibus. Item hinter Schreittlacken.

CLXV. Eruca lutea latifolia, sive Barbarea, C. B. Pin. 98. Barbarea fœmina Tab. lib. 2. fol. 165. Barbarea seu Pseudobunias Lob. icon. pag. 207. Barbarea Dod. lateinisch fol. 712. Herba S. Barbaræ. Trag. Kyber. in Trag. pag. 101. Lon. deutsch fol. 201. Bunium adulterinum Cam. hort.

p. 31. Nasturtium palustre Gesn. hort. fol. 268. Nasturtium hybernum Thal. pag. 80. S. Barbaræ herba Fuchs. fol. 746. Gelb breitblätterichte Senffkraut oder S. Barbellkraut Weiblein. Tab. S. Barbara-Kraut. Fuchs. Lon. Senffkraut oder Barbelkraut Sebitz. in Trag. Rapuntzel nostratibus. Winterkreß nonnullis. Propè pratorum fossas bey Königsberg.

CLXVI. Eruca sylv. minor luteo parvoq; flore C. B. Pin. 98. Eruca palustris minor, Tab. lib. 2. fol. 159. Eruca sylvestris Fuchs. fol. 263. Sinapi primum genus Fuchs. ic. p. 304. Kleiner wilder Senff mit gelber und kleiner Blüth. Klein Wasserraucken Tab. Wild weiß Senff. Fuchs. In locis uliginosis passim.

CLXVII. Eruca maritima Italica siliquâ hastæ cuspidi simili. C. B. Pin. 99. Erucæ genus in maritimis. Cæs. lib. 8. c. 63. fol. 360. Cakile Serapionis Erucæ folio, Napi flore; vulgò eruca marina. Lob. ic. p. 223. Cakile Serapionis. Cam. hort. p. 32. Meerkresse vulgò. Ad littus maris passim.

CLXVIII. Eruca sylv. minor foliis subasperis in orbem sparsis. Joh. Lœs. In der Fischhausischen Heide. Item bey Kuntzen in montosis. Kleiner wilder Senff mit scharffen Blättern / so an der Erde in die Runde herumb liegen.

Radice nititur exili, subflavescente, villis instructa suis: cui succedunt folia laciniata, subaspera, humi circumcirca strata, quorum infima majora sunt ac viridiuscula, his incumbentia, & in meditullio constituta incana ac minora. Cauliculos edit hirsutos & brachiatos, quorum summo insident flosculi nivei: Hos deciduos seqvuntur siliquæ teretes, exile ac subruffum semen gustu acre continentes.

CLXIX. *Eruca sylvestris major foliis subasperis in orbem sparsis. Joh. Lœs. Grosser wilder Senff mit scharffen

No. 13. ad pag 68.

Eruca sylvestris minor folus
Subasperis in orbem sparsis.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0117-3
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0118-9
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0119-7
DFG

No. 14 ad pag. 69.

Erysimum hirsutum
Siliqvis Erucæ.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0120-9
DFG

sen Blättern / so an der Erde in die Runde herumb liegen.

Cum erucâ sylv. minore convenit quidem, foliis tamen " hæc vehementissimè luxuriat, ita, ut vel sexaginta obser- " vârim semel in unicâ plantâ, humi in orbem sparsa, incisa " & subaspera. In der Wange an den Seebergen copiosè.

CLXX. Eryngium maritinum C. B. Pin. p. 386. Eryngium marinum Matth. deutsch fol. 273. Lob. ic. pag. 210. Lob. obs. fol. 490. Dod. lateinisch 730. Clus. hist. lib. 5. fol. 159. Eystett. Cam. hort. p. 58. Cæs. lib. 13. cap. 29. pag. 521. Meermans-Treue / Matth. Seemans-Treue und Meerwurtzel vulgò. Circa portum Pillaviensem copiosè.

CLXXI. Erysimum. Irio. 1. Tab. ic. p. 448. Erysimum vulgare C. B. Pin. pag. 100. Irio. 1. Matth. Bauh. in Matth. fol. 431. Cæs. lib. 8. c. 64. pag. 360. Irio Cord. in Diosc. fol. 46. Lon. deutsch fol. 201. Verbena fœmina & sinapi 7. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 79. Verbenaca recta, sive mas. Fuchs. fol. 592. Irio, sive Erysimum Dioscoridis, Lob. ic. 206. Adv. Lob. 69. Irio, sive Erysimum Dod. lateinisch fol. 714. Erysimum Nostras. Thal. p. 40. Wegsenff / Hederich 1. Tab. Ic. Eysenkraut-Weiblein Lon. Schnödsenff / Schürsenff und Steinsenff / Cord. in Diosc. Eysenkraut-Männle / Fuchs. Bey Königsberg in locis præsertim salebrosis passim.

CLXXII. *Erysimum hirsutum siliqvis Erucæ. Joh. Læs. härichter Wegsenff.

Radix subflavescens, ac fibris instructa caulem effert ro- " tundum, viridem, hirsutie asperum, cui folia profundè " incisa & hispida annata, quæ propiùs terram longis pedicu- " lis innituntur. In caulium summo flosculi parvi, conglomerati " ac luteoli visuntur, siliqvas minusculas in apice clypeatas, " longis ac hirsutis petiolis insistentes, post se relinqventes. "

„Facie prorsus assimili est Erysimo 2. Tab. lib. 2. p. 162. „descripto, hirsutie demptâ. Reperi id mense Junio zu Dantzig am Wall.

CLXXIII. Evonymus vulgaris granis rubentibus. C. B. Pin. 428. Evonymus. Matth. deutsch. fol. 83. Dod. lateinisch. fol. 783. Tab. lib. 3. fol. 754. Gesn. hort. fol. 258. Evonymus Theophrasti Lob. ic. pag. 168. o. Adv. Lob. fol. 435. Obs. Lob. 591. Carpinus Theophrasti. Trag. Kyber. in Trag. pag. 983. Lon. deutsch fol. 60. Siler Plinii Cæs. lib. 3. c. 50. p. 128. Anonymus, aliis Evonymus. Cord. hist. fol. 176. Spindelbaum Matth. Tab. Spindelbaum Hanhödlein Kyber. in Trag. Pinnholtz nonnullis. Zwickholtz Nostratibus.

Carbones Evonymi usurpant pictores in rebus delineandis, vel in horum defectu carbones Coryli. In der Hollen-Grund.

CLXXIV. Eupatorium Cannabinum flore purpureo Joh. Lœs. Eupatorium cannabinum C. B. Pin. pag. 320. Evpatorium Avicennæ. Gesn. hort. fol. 258. Lon. deutsch 246. Cam. hor. 58. Eupatorium adulterinum, Fuchs. fol. 265. Herba S. Kunigundis, Trag. Seb. in Trag. deutsch 390. Herba Kunigundis prima, Tab. lib. 1. fol. 417. Eupatorium Avicennæ seu vulgare Matth. deutsch 432. Hepatorium vulgare, Dod. lateinisch fol. 28. Cannabina aquatica, sive Eupatorium mas, Lob. ic. 528. Pseudohepatorium mas, Herba Cunegundis, seu Hepatorium Avicennæ quorundam. Thal. fol. 85. Wasser-Dost mit Purpurfarben Blumen / Kunigundkraut / Tab. Matth. Hirtzklee / oder Wasserdost / Lon. Sebitz. in Trag. Hirtzgunstel und S. Kunigundskraut / Dosenkraut / Albkraut / und Hirtz-Wundkraut vulgò.

Cervis

Cervis sauciis sacrum. Amarum est, abstergit, incidit, aperit, expurgat, lotiumq; movet. Hepaticis, lienosis, icterici, fœdâ scabie, ac productis tertianis divexatis perutilis. Chirurgis vulneraria est planta, qui radicis pulvisculum cum εὐφορβίᾳ offerunt, unde & Bruchwurtz quibusdam dicitur. In uliginosis in der Hollen-Grund.

Colligenda ☉le 15. ♏ occupante sub elevatione Poli 46, 47, 48, 49.

CLXXV. Eupatorium cannabinum flore candido. Johann. Lœsel. Weiß Wasserdost.

Priori assimile est structurâ, foliorum cauliumq; colore nonnihil dissimile. Quippe prius foliis gaudet ex fusco viridibus, thyrsulis rubicundis: hoc foliis & caulibus pallidè virentibus. In der Hollen-Grund.

CLXXVI. Eupatorium Veterum sive Agrimonia, C. B. Pin. 321. Agrimonia, Brunf. lateinisch Tom. 3. fol. 68. Lon. deutsch fol. 245. Cæs. lib. 8. c. 4. p. 319. Agrimonia, sive Eupatorium. Dod. lateinisch fol. 28. Eupatorium Dioscoridis & aliorum Græcorum. Gesn. hort. 258. Eupatorium Græcorum, Agrimonia officinarum Lob. ic. 692. Adv. Lob. 308. Eupatorium vulgare Trag. Kyber. in Trag. pag. 513. Eupatorium Matth. Bauh. in Matth. fol. 717. Cord. in Diosc. fol. 64. Tab. lib. 1. fol. 409. Fuchs. 244. Odermennig / Tab. Fuchs. Odermeng / Lon. Adermennig / Agrimonien / Bruchwurtz / Leberkletten und Königskraut. In der Hollen-Grund.

CLXXVII. Euphrasia officinarum C. B. Pin. 233. Euphrasia, Fuchs. fol. 246. Eufrasia, Tab. lib. 2. fol. 533. Dod. lateinisch 54. Euphrasia sive Euphrosine. Ocularis. Lob. ic. 496. Eufragia Matth. deutsch fol. 438. Cæs. lib. 8. c. 34. pag. 339. Euphragia altera major Thal. pag. 40. Euphrasia Argentinensium

ſium vel 2. & 6. Trag. Seb. in Trag. deutſch fol. 259. Augentroſt / Tab. Seb. in Trag. Matth. In pratis bey Königsberg paſſim. Item bey der Altſtädtſchen Kalckſchein auf der Mauer ſemel hanc plantam inveni.

CLXXVIII. Euphraſia pratenſis rubra C. B. Pin. 234 Odontites prima. Tab. lib. 1. fol. 681. Eufraſia altera Dod. lateiniſch 55. Euphraſia 2. Dodonæi Lob. ic. p. 496. Ericoides rubrum Thal. pag. 40. Brauner Augentroſt. Tab.

In locis uliginoſis ſæpe & aridis. Spithamas duas nonnunquam alta eſt. Flos communiter rubicundus. Semel pumilam inveni flore albo, bey Wartnicken in locis incultis. Phthiriaſin jumentis accerſit crebrius eſitata.

CLXXIX. Fagus, Brunf. tom. 3. fol. 235. Bauh. in Matth. 180. Cam. in Matth. 66. Matth. deutſch 72. Trag. Sebitz. in Trag. deutſch 876. Dod. lateiniſch 832. Lob. Obſ. fol. 587. Adv. Lob. fol. 433. Lon. deutſch 49. Tab. lib. 3. fol. 683. Rothe Büche oder Buchbaum / Tab.

Folia refrigerant, ſiccant, & parùm adſtringunt. Glans fagea dulci nucleo diuretica eſt, ſuemq; facit hilarem. Largius eſitata dementat ac inebriat ruſticos. Cinis deſervit pannis tingendis, ac vitris conflandis. Hinter Brandenburg copiosè. Et alibi. Circa diem Omnium Sanctorum aſſula ex fago arbore exciſa, ſicca exiſtens, modeſtiam hyemis, humida ferociam ejus ſignat vulgo. Fagus olim etiam ſerviebat ſimulacris faciendis. Anthologia Græcor. Epigrammat. lib. 1. cap. 68. meminit faginei Coloſſi Herculis. Faginus guttus gutturnium eſt ex fago, quo olim ſacrificabant. Plinius lib. VI. cap. 38.

CLXXX. Feſtuca avenacea ſterilis elatior, C. B. Pin. pag. 9. Ægylop 1. & avena fatua, Tab. ic. p. 234. Lolii primum

mum genus. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 530. Ægylops. 1. Matth. deutsch fol. 119. Ægylops vera Gesn. hort. fol. 245. Bromos herba, Dod. lateinisch 540. Bromos sterilis, Lob. ic. p. 32. Avena græca, Cæs. lib. 4. c. 48. p. 178. Festuca & avena græca, Lon. deutsch 285. Avena sterilis, Adv. Lob. 9. Thal. p. 14. Gerstenthwalch / Gauchhaber / und Habergraß / Tab. ic. Gauchhaber und Maußhaber / Trag. Seb. in Trag. Gauchhaber und Taubhaber / Lon. Inter segetes passim. Vitium plerumq; hordei est.

CLXXXI. Filipendia, Trag. Seb. in Trag. deutsch 695. Matth. deutsch fol. 364. Dod. lateinisch 56. Lon. deutsch fol. 248. Gesn. hort. 259. Cord. hist. 94. Thal. p. 42. Filipendula prima & saxifraga rubra, Tab. lib. 1. fol. 521. Filipendula vulgaris, Eystett. Oenanthe, Fuchs. fol. 562. Cord. in Diosc. 58. Oenanthe filipendula Lob. ic. 729 Oenanthe vulgaris. Adv. Lob. 325. Rother Steinbrech. Tab. Matth. Roth Steinbrech / oder Erdeichel und Erdeiche / Lon. Bey Lautenmühl im Gepüsch. Item hinter Fischhausen nacher Lochstätt zu / in montosis.

Calefacit radix, siccat, aperit, discutit, & parùm adstringit. Lotium movet, calculos atterit, tormina ventris sedat, & epilepticos mirè juvat.

CLXXXII. Filix non ramosa dentata, C. B. Pin. p. 358. Filix mas, Matth. deutsch fol. 539. Dod. lateinisch fol. 462. Fuchs. fol. 595. Adv. Lob. fol. 362. Tab. lib. 2. fol. 471. Lon. deutsch fol. 250. Waldfar / Brunf. deutsch fol. 305. Filix vulgaris Trag. Kyber. in Trag. fol. 546. Filix mas secunda, Thal. p. 43. Filix fœmina, Gesn. hort. fol. 259. Cæs. lib. 16. c. 3. pag. 592. Filix mascula, Cord. in Diosc. fol. 76. Cord. hist. fol. 169. Ohnästiges gezähntes Farnkraut. Farnkraut-Mänlein / Matth. Tab. Lon. Waldfarn-Mänlein /

Fuchſ. Waldfarn Kyber. in Trag. In der Hollen-Grund in umbroſis.

CLXXXIII. Filix ramoſa major pinnulis obtuſis non dentatis. C. B. pin. 357. Filix fœmina. Matth. Deutſch fol. 539. Lob. ic. p. 812. Adv. Lob. fol. 362. Fuchſ. fol. 569. Tab. lib. 2. fol. 471. Dod. Lateiniſch fol. 462. Filix ſylv. Brunf. Lateiniſch tom. 3. fol. 127. Filix mas major ſive fœmina credita vulgò, Cluſ. Pann. 705. Filicis majoris primum genus, Trag. Kyber. in Trag. 542. Filix. Cæſ. lib. 16. c. 2. p. 591. Thilypteris filix fœmina, Cord. in Dioſc. fol. 76. Filix mas, Geſ. hort. fol. 259. Großäſtiges ohngezähntes Farnkraut. Farenkraut weiblein/ Tab. Matth. Waldfarn weiblein/ Fuchſ. in der hollen Grund. it. in agris incultis paſſim.

CLXXXIV. Filix ramoſa pinnulis dentatis. C. B. Pin. 358. Filicula petræa fœmina 4. Tab. ic. p. 794. Pteridion maſculum, Cord. hiſt. fol. 169. Filix fœmina altera tenuifolia, Thal. p. 43. Kleinäſtiges gezähntes Fahrn-Kraut. Klein Steinfahrn weiblein. Tab. Im Neuhauſchen Schloß-Graben in ſaxis muſcô obſitis.

CLXXXV. Filix paluſtris maxima. Joh. Loeſ. Radix rotunda, quæ diſſecta genuinæ aqvilæ figuram exhibet. Herba in pollinem acta, & vulneribus inſperſa, vulnera ſolidat. Hinc pecori & armentis perutilis eſt herba, in mictu ſangvineo, certiſſimo ruſticis remedio. Wenn es friſch/ iſt es grün/ wenn es trocken/ wird es braun. Wächſt im Löbnichtſchen Walde im Elren-Bruch. Filix paluſtris maxima dentata, C. B. in Prodromo. Radix diſſecta, formam ſemihominis & literas C. I. exhibet. Gezähntes Waſſer-Fahren-Kraut/ ſo hoch wächſet. *

CLXXXVI. Filum marinum. Joh. Loeſ. Meerfaden oder

oder Meerstrang. Ejectamentum hoc maris chordis seu filis sonantibus assimile est formâ. Constat autem ex longissimis filis, crassis, rotundis, concavis, multifariè inter se complicatis, ac viscoso qvôdam humore inunctis: quæ exsiccata partim subflavescunt, partim nigricant, visciditate prorsus exutâ. In littore maris bey der Wange.

CLXXXVII. Folliculus marinus. Joh. Lœs. Waßer-Gall. Lacus Curonicus hujusmodi ejicit folliculos, rotundos, membraneos, aqvâ turgidos, qui siccati planissimi sunt & viridantis coloris.

CLXXXVIII. Fragaria vulgaris C.B. Pin. 326. Fragaria. Trag. Seb. in Trag. deutsch 398. Matth. Bauh. in Matth. fol. 721. Fuchs. icon. pag. 487. Lon. deutsch fol. 242. Erdbeer-Kraut, Brunf. deutsch fol. 200. Fragaria & Fraga. Lob. ic. pag. 697. Lob. obs. fol. 396. Dod. Lateinisch fol. 672. Fragum 1. & Trifolium frugiferum. Tab. ic. p. 118. Fraga fructu rubro Eystett. Fragula Cord. hist. fol. 173. Fragaria major, Thal. pag. 43. Erdbeer-Kraut/ Matth. Erdbeer. Tab. Lon. Gemeine Erdbeer Thal. Fraga circa festum Pentecostes jam maturrima, vindemiam pollicentur uberem. In sylvis & loois apricis passim.

CLXXXIX. Fragaria cauliculis maximè reptantibus. Joh. Lœs. Weitkriechend Erdbeer-Kraut.

Radix multô capillitiô fibrata, & ex atro ruffa, cauliculos spargit horsum vorsum teretes subrubicundos hirsutos quatuor & plurium ulnarum longitudine, humi jacentes, & ex intervallo radicationem filamentis suis multoties iterantes, ac nova subinde folia excludentes, hirsuta, per ambitum incisa, supinâ parte incana, pronâ viridia, ætatis tractu ruffescentia. Auff der Curischen Nährung/ in pago Lattenwalde.

CXC. Fraxinus, Brunf. Lateinisch Tom. 3. fol. 237. Lon. deutsch Trag. Sebitz. in Trag fol. 888. Dodon. latin. fol. 833. fol. 66. Lob. ic. pag. 107. o. Adv. Lob. fol. 415. Matth. deutsch fol. 39. Gesn. hort. fol. 259. Tab. lib. 3. fol. 722 Fraxinus excelsior. C. B. Pin. 416. Eschbaum. Tab. Deschen-Baum. Brunf. Eschern-Holtz. Seb. in Trag. Esch-Baum. Eschern/ oder Steinäschern/ Lon. Eschren-Baum/ Matth. auff den Huben. Ejus fructus vel semen officinis lingva avis & lingva passerina nominatur. Calefacit & siccat, lotium citat, ac Venerem stimulat. Cortex & folia cum moderato calore efficaciter siccant. Τυρνέυματα τȣ ξύλȣ, ligni ramenta potu exitiosa credi tradit Dioscorides. Sunt tamen, qui decocto ejus vice ligni Gvajaci felicissimo utuntur successu, autore Cæsalpino. Vulnera quoq; consolidat, Lignum certô tempore ab arbore resectum, vulnere cruentatum, ac debitè pòst tractatum. Cæditur circa Festum Divo Johanni sacrum, 3. vel 4. à novilunio die. Alii resecant tempore Solstitii æstivalis in ipsô meridie. Sunt, qui id factitant ante exortum Solis ipsô Baptistæ die veteris styli. Modus facilis est: Lignum fraxini, orientem versùs ab arbore pendens, ante Solis exortum, die Johannis Baptistæ, cædatur unicô ac fervidô ictu. Catamitus vel venereus haut sit, qui cædit. Decorticans ita lignum servet, ne vel humectetur, vel à muliere, menstrua solvente, contrectetur. Usus: Ensiculus seu ferrum, quô quis vulneratus, acie suâ singulis diebus per lignum sæpiùs traducatur, lignum locô blanditer calidô ac tersô servetur, vulneratæ parti curationem brevi spondens. Stupendum quid est, lignum ferrô oblidenti semel inductum, improviso vulnerum hæmorrhagiam ac dolores sistere. Hiantia vulnera fraxinei ligni interiore cortice deligata, ita angustantur, ut suturâ opus haud sit.

CXCI.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0129-3
DFG

N(o). 15. ad pag 77.

Fucus marinus πολυχιδής.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0130-4
DFG

CXCI. *Fucus marinus πολυχιδής. Joh. Lœsel. Rundblätteriges / und in der Spitz zweyspaltiges Meer-Graß.

Fucus hic littore maris ejectus subviridis est, mox siccatus " horridum nigrorem induit. Ex rotundiusculis filamentis " constituitur, quæ in progressu multifariam dirempta, tan- " dem in extremitate utplurimùm bifida redduntur. Radix " capillamentis tenuissimis & numerosis constructa est, quæ " implicatione variâ invicem firmissimè cohærent. Circa lit- " tus maris passim.

CXCII. Fumaria, Trag. Sebiz in Trag. deutsch fol. 86. Cord. in Diosc. fol. 70. Fuchs. fol. 338. Lon. deutsch fol. 202. Dod. Lateinisch fol. 59. Gesn. hort. fol. 259. Capnos fumaria. Adv. Lob. fol. 338. Fumaria fumus terræ, Matth. deutsch 507. Fumus terræ, Brunf. Lateinisch / tom. 1. fol. 99. Thal. p. 43. Cam. hort. 62. Fumaria officinarum & Dioscoridis. C. B. Pin. 143. Erdrauch / Fuchs. Seb. in Trag. Erdrauch / Tauben-Kropff Matth. Erdrauch / Tauben-Kropff / Katzenkörbel-Kraut / und Feld-Kraut / vulgò inter segetes nach Lauten-Mühl zu.

Fumaria sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. 49. efficax. Colligenda ☉le 1. ♊ inhabitante, ac recens usurpanda.

CXCIII. Fumaria bulbosa radice cavâ major, C. B. Pin. 143. Aristolochia rotunda, Brunf. Lateinisch tom. 1. fol. 49. Aristolochia rotunda vulgaris, Trag. Seb. in Trag. 608. Gesn. hort. fol. 248. Aristolochia rotunda vulgaris, Fuchs. Cam. hort. 21. Pistolochia Fuchs. fol. 91. Radix cava major, Dod. Lateinisch 327. Clus. hist. libr. 2. fol. 271. Radix cava Herbariorum, Lob. ic. pag. 759. Adv. Lob. fol. 338. Radix cava. Clus. Pann. pag. 242. Fumaria altera

Matth. Bauh. in Matth. fol. 807. Aristolochia vulgaris flore purpureô, Eystett. Capnos, sive capnium phragmites majus & Pes Gallinaceus Cord. in Diosc. fol. 70. Chelidonia phragmitis altera, Cord. hist. fol. 122. Radix cava herbariorum, sive Aristolochia flore purpureô, Floril. Swert. part. 2. fol. 7. Capnos chelidonia, Lon. deutsch. 162. Leontopetalon alterum, Cæs. lib. 6. c. 75. pag. 270. & 271. Runde Hollwurtz das Weiblein. Brunf. deutsch/ 147. Groß Erdrauch mit runder holer Wurtzel. Rund Hollwurtz/ Seb. in Trag. Fuchs. Gemein Hollwurtz/ Lon. Hollwurtz/ Biberwurtz/ und Hirsch-Kraut/ Brunf. Radix insigni est amarore. Calefacit, abstergit, mundat & adstringit, sudores lotiumq; movet, ac ulcera sanat sinuosa, durities quoq; & tumores inveteratos faucium ac tonsillarum discutit. Officinæ radice utuntur locô Aristolochiæ rotundæ veræ, quæ foliis crescit hederæ, aut brassicæ marinæ in Montanis Montis Pessulani. Hinter Neuendorff im Walde.

CXCIV. *Fumaria bulbosa*, radice non cavâ. C. B. Pin. 144. Aristolochia rotunda vulgaris radice majore solidâ Trag. Kyber. in Trag. 766. Chelidonia capnitis radice nigrâ, Thal. pag. 33. Aristolochiæ rotundæ fabæ altera species solida, Gesn. hort. 248. Aristolochia rotunda flore albô, Eystett. Capnos sive capnium phragmites minus, Cord. in Diosc. fol. 70. Erdrauch mit runder dichter Wurtzel. Runde feste Hollwurtz. Solidâ quæ est radice, nunquam reperitur illis in illis, ubi fumaria radice cavâ pullulat. Diversum namq; amat solum. Semen potum herniosis pueris commendatur. Hinter Brandenburg auff dem Lentzken-Berge. Item in der Hollen-Grund. Erumpit primô vere, ubi

suum

ſuum tireli tiritirlire tractim
Candida per vernum ludit alauda ſolum.

CXCV. Fungus veſcus I. Joh. Lœſ. Fungi favaginoſi, ſive fungi rugoſi favis mellis ſimiles, Lob. ic. 274. o. Morcheln. Fungus eſt vernalis, rugoſus, cute membraneaceâ, in cellulas fari inſtar diſtincta, capitello & petiolo, quo ſuſtinetur, concavis. In fruſta conciſus, lotus, ebullitus, expreſſus, & in ſartagine cum butyro frixus, delicatulum eſt ferculum, & ex fungino genere optumum. Im Morungſchen. it. im Ortelsburgſchen.

Hunc & alios fungos, tanquam νωγαλεύματα ſeu lauta edulia ſumentes vulgus indoctum apud Boruſſos vinum bibere jubet, legem Zaleuci flocci habens, *ne quis injuſſu Medici vino utatur ſub pœnâ capitis*, quæ Locris Epizephyriis duntaxat poſita. Idem Medici ſvadent, ſed ἀκρατέστερον vel meracius vinum eligunt, jubentq; τραπεζοποιὸς menſarum ſtructores, fungos apponant ante alios cibos. Creſcunt in agris menſe Aprili & Majô. zu Robitten.

CXCVI. Fungus veſcus II. Fungi 4. genus. Trag. Seb. in Trag. deutſch fol. 736. Capreolini Tab. lib. 3. fol. 814. Reitzken. Duplex eſt, in pinetis alius, alius ſub abietibus. Uterq; totus eſt flavus, capitello inferiùs ſtriato, ſuccum fundens croceum & acrem. Ille craſſior eſt, & oras habet ſæpiuſculé rurſum reflexas, hic tenuior: utriusq; capitulum ſæpè nonnihil æruginoſi ſuprà in meditullio obtinet, ſæpè etiam albicat. Repperi eundem quoq; inter juniperi fruteta. Puteo dùm anima intertrahitur, pauxillo ejus abluuntur, elixantur, mox abjectô jure de integro cum cepis coqvuntur, tandem coctione abſumptâ aqvâ, cum butyro & pipere friguntur. Itali abjectis petiolis, eorum cavo oleum affundunt,

dunt, additô sale & pipere, & in craticulis vel prunis integros assant. Sæpius ebulliti, Sale conditi, ac ligneis inclusi vasculis, venundantur in forô. Minusculi autem delicatissimi sunt, grandiores, quorum diameter secuncialis sæpè, viliores.

CXCVII. Fungus vescus III. Joh. Lœs. Stein-Reitzken. Capitellum hujus suprà flavescit, & sæpè contortulum est, infrà albescit, sulcis veris destitutum, sed nonnihil inæqvale. Substantiâ est crassiore, & solidiore, pediculô crassiore, flavo. Freqventissimè aliquot connascuntur, figurâ prorsus inæqvali. Succum reddunt copiosum croceum & acrem. Unum ex his prorsus degenerem vidi, ἄκαυλον, sex uncias longum, cymbii formâ, substantiâ crassitudine unciali, & solidâ, quæ diffracta æruginosi quid contraxerat. Inter abietes. Minutal horum in sartagine frixum, sapore & melius est, nec ita viscosum, ac Capreolinorum. Calculosos juvant ex vetularum arbitratu.

CXCVIII. *Fungus vescus IV. Joh. Lœs.* Eich-Reitzken. Duorum generum. 1. superiore parte ex rubro lateritio fuscum, inferiore flavum & sulcatum, pediculô crassô. 2. Capitellum summâ parte croceum est, imâ ex albo flavescens & sulcata, sed ex meris tenellulis & profundis plicis constitutum, quod diffractum lacteum, sæpè etiam croceum fundit succum. Pediculus ochræ, vel curcumenæ est colore, propiùs radicem crassus. Coctus hic fungus, recens acrimoniæ est alicujus, palato ingratus. Lentitiemq; seu lentorem obtinet. Werden roh gegessen von den Weibern.

CXCIX. Fungus vescus V. Joh. Lœs. Bruch-Reitzken. Triplex est: Unus supernè ex rubedine & fuscedine flavescit, infernè subalbicat, pediculô flavulô & longulô, geele

Bruch-

Bruchreitzke. Alter ſupernè cœruleus eſt ex albo cum pediculo, infernè albidus, blau Bruchreitzken. Prior crudus ingeritur â vulgo, & quidem cum ſale, uterq; lacteſcit digitis preſſus, & acris eſt ſaporis, lingvam vellicantis. Tertius totus eſt lateritius colore, etiam diffractus, thyrsulo unciali, tenui. Rothe Bruch-Reitzken. Guſtu fatuus. Et hic nonnihil lacteſcit.

CC. Fungus veſcus VI. Joh. Lœſ. Geelöhrchen/ totus flaveſcit, ſtrias habet in pediculum radiatim deſinentes, nec putreſcit, ſed ætatis tractu areſcit. In ſenio ubi conſtituitur, oræ incurvantur, & criſpantur, ſurſum totæ cum reliquâ parte abeuntes. Grati eſt odoris, & ſubacris ſaporis. Muſcoſa eligit loca betulas inter & abietes.

CCI. Fungus veſcus VII. Joh. Lœſ. Süßling/ multigenus eſt. 1. ſupernè balauſtii inſtar rubeſcit cum petiolo, infernè albicat. 2. ſuprà ex rubedine fuſcus eſt, infrà albus. 3. ſuperiori parte flavus, inferiore albus cum pediculo. 4. ſuprà ex viridi totus cœruleus, infrà cum Pediculo candidulus. 5. in meditullio ſupernè ex viridi cœruleus, circumcirca albus. Priores duo tardius, poſteriores citiùs vermiculantur. Omnes dulcis ſaporis. In locis udis: quale ſolum omnes ferè exoptant fungi. Hinc Ariſtæus proverbio dixit: *Fungos concupiſcit lapidoſus ager.* Convenit illis, qui ambiunt & optant, ad quod non ſunt apti. Fungi enim naſcuntur in molli & humidâ terrâ, non inter ſaxa. Simile adagium eſt, *Optat ephippia bos piger.*

CCII. Fungus veſcus VIII. Joh. Lœſ. Stöbling. Fungus eſt orbicularis & planus, ſtriis parte inferiore ad petiolum longum radiatim excurrentibus, ſupernè pallidè fuſcus, oras versùs tenuiter ſtriatus, infernè ſubalbus.

Tenellus adhuc pileolo ex fusco flavescente, & punctato est suprà. Succulentus & gustu subacriusculus. Cæduis lignis copiosè innascitur.

CCIII. Fungus vescus IX. Joh. Lœs. fungus albus acris. C. B. fungus piperitis, quia instar piperis lingvam vellicat, Porta. Pfefferling oder Bitterling.

De fungis notandum, quod pro incolarum diversitate & regionum diversis quoq; nominibus insigniantur. Nos itaq; & nomina & descriptiones fungorum, prout in nostris terris figurantur & nominantur, hic tantùm apposuimus.

Totus est candidus, lacteum succum fundens, ferventissimi saporis. Carpinis & quercubus se associat. Lac ejus cum Syrupo de Altheâ sumptum, experimento certo calculum frangit, & urinam citat. Verrucas aufert illitu.

CCIV. Fungus vescus X. Joh. Lœs. Herbstling. Candidus est totus effigie fungi piperitidis. Subacris saporis. Ostryas amat, & qvercus.

CCV. *Fungus vescus XI. Joh. Lœs.* Birckling, Trium est generum 1. supernè ex albo & fusco ruffescit, & lanuginem ostendit circa oras incurvas maximè conspicuam: infernè strias alit subalbidas, & pediculum dilutè ruffescentem. Concisus succum fundit lacteum, acredine suâ lingvā maximè vellicantem. 2. Parte supernâ albicat viscoso nonnunquam humore inunctus, oris externis deorsum incurvatis in lanuginem fermè abeuntibus: infernâ parte sulcatur & albicat, pediculô albô fultus. Acredine cedit priori, & degustantium naribus odorem ireos ferè ingerit. Succus ejus initiò albicat, mox luteolus est, ac sulphuris colore. 3. Dilutè capitellô suo parte supernâ flavescit, oris ut in cæteris incurvatis, pediculum versùs crassus, infernâ albescit, & totus succum reddit sulphureum concisus, gustu acrem. gelbe Birckling.

CCVI.

CCVI. Fungus vescus XII. Joh. Læs. Glattling. Suprà fusci est coloris, infrà subalbidi, pediculo candido. Acris saporis. Aquâ coctus cum pauxillo piperis, salis & butyi, additis cepis non contemnendum est ferculum. In ericetis & locis muscosis.

CCVII. Fungus vescus XIII. Joh. Læs. Lahcke/ jure suo Beisserling. Incurvus est capitello pediculum versùs crassum & brevem, supernè ex fusco subalbus, striis infernè albicantibus. Dentibus diutulè comminutus, acris & piperi proximus prorsus igneæ est naturæ, cæteros acumine vincens. Pulpa intus satis firma albicat.

CCVIII. Fungus vescus XIV. Joh. Læs. Stein-Pültzke. Supernè infusci est coloris, infernè candidi, crassiore pediculo. Senescens colorem mutat, & infernè ex viridi flavescit. Substantia ejus solidior est, ac in cæteris fungis. Inveteratus etiam nomen mutat, & vocatur Kühe-Pülske. Fungum hunc κυμινοκίμβιξ ἢ κυμινοπρίστης auctumni tempore in schidia dissecat, siccat, usui servat, post ablutum, ebullitum, & in minutal redactum, cum vino, additis butyro, pipere & cepis de integro coquit, ut ferculum existat helluantium, vel potiùs ex heluco malè habentium. Succus ejus putridus cimices interficit, parietum & lectulorum rimis immissus. Siccatus fungus, aqvâ emollitus & impositus tumorem discutit.

CCIX. Fungus vescus XV. Joh. Læs. Heide-Stein-Pültzke. Croceus est parte superiore, & nonnihil maculosus, inferiore itid. flavus & porosus, pediculo longiore flavescente. In musæo meo diem unum servatus totus abiit in succum qvendam glutinosum, horridum, atramento prorsùs similem, cui myrias vermiculorum jungebatur. Vulgus proinde temperet gulæ in hoc ancipiti cibo. CCX.

CCX. Fungus vescus XVI. Joh. Lœs. Koszelarke. Duplex: unus suprà & infrà albicat, puritate suâ haud cedens priori, weiß Kozelarke. Alter parte summâ infusci est coloris, imâ candidi, pediculo candido, maculis quibusdam nigris asperso, ei vocamen: Schwartze Kozelarke. Locis oblectatur muscosis & udis.

CCXI. Fungus vescus XVII. Joh. Lœs. Roth-köpffchen. Pediculo modò crasso, modò longiore, & maculis nigris velut à muscis conspurcato, pileolus insistit ex fusco lateritius, sæpé nonnihil miniatus, infernâ parte candidus, substantiâ durâ, & in senescentibus quasi spongiosâ. Est & aliud genus superiore parte flavescens, aliqvantillum Curcuminæ coloris particeps. Pressus re qvâpiam ærugineum quasi quendam contrahit colorem. Graminosum eligit solum.

CCXII. Fungus vescus XIIX. Joh. Lœs. Ziegen-Pültzke. Duplex & hic est. 1. totus flavescit, pileolo maculis fuscis variato, petiolo longiore, qui interdum aliquid rubedinis contrahit. Tener & uncialis, ubi est adhuc capitello, subtus amœnulé croceus est. 2. superné lateritio est colore, inferné flavo pediculo fultus & subflavescente, & nigris punctis notato. Ericeta & muscosa amat.

CCXIII. Fungus vescus XIX. Joh. Lœs. Astiger Ziegenbart. Ramosa est planta, musci feré Ceratoidis formâ, caudice suo albicans, reliqvâ sui parte flavescens: Ætatis tractu mutat colorem, & ruffulus seu pallidè incarnatus existit. Im Eichen-Walde in locis incultis.

CCXIV. Fungus vescus XX. Joh. Lœs. Bock. Duplex est, alius Eich-Bock/ alius Hasel-Bock/ quercinus radice alba ex multis latiusculis agglutinamentis, circa oras partim con-

contortulis, partim laceris, imbricatim quasi cohærentibus, constituitur, supernâ parte infuscis, infernâ candidis & spongiosis. Autumno exit, & in tantam sæpé excrescit molem, ut voratus aliquot satiet homines. Aqveus, & gustu subacris. In coryleto natus æstivis diebus, longé minor est, coloris marini, radice candidâ.

CCXV. Fungus vescus XXI. Joh. Lœs. viel-köpffigter grauer Bock. Est radice latâ, sessili & albicante, ramuli oriuntur numerosissimi, brachiati, qvorum summitatibus capitula parva, unciam lata, & minora, insident, convexâ parte fuscâ, imâ sine striis alba, pediculis candidis fulta. Servatus in conclavi aliquot dies, ramusculos inter, & ad radicem teneram quandam acqvirit lanam, eamq; albicantem, quæ pòst horridum induit nigrorem. Gustu acris est.

CCXVI. Fungus vescus XXII. Joh. Lœsel. Borusken. Tenuis est. & inerné coloris infusci, superné subflavi. *Exilis & subdulcis est ligni* παρεφυὰς *in locis udis, qui omnium citissimé pullulat.*

CCXVII. Fungus vescus XXIII. Joh. Lœs. Kuhmilden. Novellus adhuc terræ ita affigitur, ut faciem mentiatur crepitus lupi, integer namq; est, & inerné clausus, pediculo brevi. Mox hiscit parte infernâ, & pediculo fimbriam relinquit. Strias inferiùs habet infuscas ad pediculum excurrentes, alutamento quasi quodam crasso, & albicante superiùs vestitus, quô abstracto pulpam ostendit albicantem saporis subacris. Fungus hic, & alter piperinus, ubi ê terrâ erumpunt, reliqui vanescunt. In locis sæpé stercorosis equorum culpâ.

De hoc vesco fungô idem affirmare nobis licet, quod Dorioni tibicini olim de pisce Rajâ. Qvippe dicenti cuidam,

ſvavem in cibo Rajam eſſe, reſpondit ille: perinde ac detrito pallio ſi quis elixo veſcatur.

CCXVIII. Fungus veſcus XXIV. Schweinichen. Parte ſuperiore ex albo fuſcus exiſtit, inferiore candidus, ſulcis ad pediculum excurrentibus, qui longior eſt ac colore ceruſſatus. Guſtu ferè fatuo eſt. Cuticula capitellum cingens abraditur, antequam in uſum trahitur.

CCXIX. Fungus veſcus XXV. Joh. Lœſ. Pömpchen. Tenellus ac recens adhuc, faſtigiatus leviter eſt parte ſupernâ rufula ſplendente, ac madidâ pingvi ungvine, tunicâ cinctus parte infernâ hymene ſeu membranulâ albicante clauſus, quâ ruptâ flaveſcens ac poroſa viſui ingeritur pulpa. Fractus, aut tunicâ ſuâ, quæ levi brachio abſtrahitur, ſpoliatus, candidâ intus eſt ſubſtantiâ, ac ſapore mucilaginoſus. Pediculus in novello longior, & albidi coloris, in ſeneſcente ſubflavus, & maculoſus.

CCXX. Fungus veſcus XXVI. Joh. Lœſ. Grüßling. *Totus albicat cum pediculo, parte inferiore* ſtriatus, & oris incurvis. Acris eſt, & linguam vellicans. Plebi totus in craticulâ commendabilis. Querceta amat.

CCXXI. Fungus veſcus XXVII. Joh. Lœſ. Gänſichen/ Pol. Prozonke geele Schweinichen/ quod & Polonicum nomen indicat. Capitellum ex fuſco-viridi flaveſcens eſt ſupra, ſulcatum infra & dilutè flavum, cum pediculo longiore. Colorem illum pictores Schüttgelb nominant. Condiuntur ut capreolini, & guſtu ſunt aqvei.

CCXXII. Fungus veſcus XXIIX. Abreitzchen. Joh. Lœſ. Fungus vetuſtis lignis aſſidens eſt, capitello nunc majore, nunc minore, ſupernâ parte circumcirca pallidi, quandoque atrorubicantis, in meditullio ſubalbidi, & ad flavedinem tenden-

dentis coloris. Ambitus hujus, ſucceſſu temporis criſpari aſſolet. Inferna capitis pars terram versùs folioſa eſt; foliolis ac ſulcis profundis ſuper pediculo ad extimam circumferentiam excurrentibus, fuſci coloris. Pediculo nititur rotundo, ſtriato, partim albi, faſtigium versùs, partim ex ruffo fuſci, radicem versùs coloris. Aqvoſi & ad acredinem quandam tendentis eſt ſaporis. Edulium ſæpius à me eſitatum nec contemnendum, ſi elixatus abjecto jure iterum coqvatur, cepis priùs quoq; coctis, pipere & butyrô adjectis. Creſcit menſe Junio.

Cæterùm omnes fungi veſci parcè ingerendi, cum terræ ſint ulcera, & ſucci pravi. Ariſtonicus olim legem tulit, de piſcatoribus, 1.) ſi plus licerent piſces, in carcerem deducerentur, relictis in foro piſcibus, ut marceſcant, nec venundari poſſint. 2.) ne ſedentes vendant piſces, ſed recti ſtent perpetuò. 3.) ut appenſis tabulis pretium ſcribant, quô citiùs mercaturi reverterentur domum. Fungivendis vetulis lex imponenda, ut non niſi prægustatos à ſe venditent fungos ingenti pretiô, tabulasq; in forum adducant hortatrices: *Ab ancipiti cibo abſtinendum omninò!*

CCXXIII. Fungus non veſcus I. Schwartzer reh-haarichter Fliegen-Schwam. Pileus, cujus diameter ſeptem unciarum, parte ſuperiore fuſcus & ſcaber eſt: inferius cinereus piloſus, pilis ſuis capreoli animantis prorſus ſimiles, pediculo biunciali craſſo, & cinereo nitri capite. Hunc & ſubſeqventes qui degulant fungos, fungi ſunt, h. e. ſtulti & ſtolidi, quibus remedio eſt illud, de quo Bubikir Zachariæ Erraſis filius in volumine, Elhavi ſeu continens in ſcripto, lib. 21. c. 1. num. 25. *Stercus humanum*, inqvit, *ſumptum per os curat nocumentum eveniens ex uſu fungorum lethalium.*

Volu-

Volumen hoc Brixiæ impressum est per Jacobum Britannicum Brixianum anno 1486, nec citatum planè (quod miror) in Bibliothecâ universali à magno Gesnero.

CCXXIV. Fungus non vescus II. Rother Fliegen-Schwam. Capitulo est summâ parte miniatuli, vel balaustini coloris, numerosis maculis, iisq; albis insignito, infimâ parte candido, & striato, pediculo crasso, rubente & sæpè fimbriato. Maculæ nil nisi partes membranulæ sunt senescente fungo laceratione factæ. Credo fungum tenellum adhuc totum membranulâ albâ vestiri, quæ paulò pòst in plusculas disrumpitur partes, fungo augmentum intumescendo sumente. Subtus interdum ex albo flavescit cum pediculo. Loca amat fungorum der Stein-Piltzchen. Siccatus & aceto rursum mollitus, utiliter peste laborantium imponitur tuberculis. Fungo hoc non ita pridem sex Lithvani in Districtu Insterburgensi suffocati. Fortè, & Evripides poëta in Icarum profectus, hujus fungi esu uxorem cum duobus filiis adultis, & unâ puellâ olim amisit. Quo de spolio seqvens epigramma composuisse fertur ab Eparchide:

O Sol, qui sempiternum cœli verticem peragras,
Adeone indignum facinus oculis tuis antehac conspexisti?
Matrem, virginem filiam, & fratres duos consangvineos,
Eodem die fato ereptos.

Hinc Junius adagio: *tanquam fungus suffocat.*

CCXXV. Fungus non vescus III. Geeler Fliegen-Schwam/ Eichen-Fliegen-Schwam. Totus est croceus, maculis purpurascentibus in pileoli parte superiori intercurrentibus, pediculo crassiore. Inter abietes & qvercûs.

CCXXVI. Fungus non vescus IV. Hasel-Fliegen-Schwam/ Grau-Fliegen-Schwam. Capitellum parte supernâ

pernâ murini ferè coloris, infernâ ſubalbum, & ſulcatum, pediculo craſſo. Diffractus pulpam intùs oſtendit niveam. Capitellum eſt ex fuſco murinum ſuprá, fruſtulis membranaceis, & punctulis quibusdam conſtans. Oræ ejus ſæpe ſurſum ita abeunt, ut tubulum quaſi quendam exhibeant.

CCXXVII. Fungus non veſcus V. Weiſſer Fliegen-Schwam. Albicat ſuprà ex dilutâ flavedine, infrà prorſus nivei coloris, & pediculo nititur longiore, albicante & fimbriato.

CCXXVIII. Fungus non veſcus VI. Heide Fliegen-Schwam. Triplex eſt: ſupernè ex albo flavus, infernè fuſcus, ſtrias habens, pediculo craſſiore & ſubalbo, in ſummo velut fimbriato. 2. Suprà ex viridi albicans, infernè candidus, pediculo ad capitellum fimbriato. 3. Supernâ parte flavus, infernâ albus, pediculo flaveſcente. Muſcæ hos & antè recenſitos amant fungos, ſed cum exitio.

CCXXIX. Fungus non veſcus VII. Weiſſer Kolbenächtiger Fliegen-Schwam. Typhæ paluſtris ferè eſt capitello, rotundato, oblongo, unciarum quatuor longitudine, duarum craſſitudine, foris tunicâ pallente primùm cinctus, quâ diſruptâ incrementis augeſcente fungo, pluſcula fruſtilla, tunicæ pileolo albido adhærentia advertuntur: intùs initiò albulus eſt, mox horridè nigreſcit ſulcis ſuis, oris laceris, ac fimbriam pediculo relinqventibus, ſurſum actis, ac latum capitulum efformantibus. Petiolo nititur longiore, ſemunciam craſſo, albicante. Graveolentiâ totus eſt moleſtus.

CCXXX. Fungus non veſcus VIII. Schwolſtpültzken. Totus candidus, pediculo imâ parte craſſo. Digitis preſſus extemplò colorem acqvirit cyaneum, viſu elegantiſſimum. Italis *azurro oltramarino* dictum. Diutulè du-

rat, nec facilè corrumpitur. In sylvis abiegnis. Siccatus, aceto maceratus, & carbunculis pestilentibus affirmatus, venenum certo experimento evocat.

CCXXXI. Fungus non vescus IX. Blutpülzken. Crassus est, hepatis ferè effigie, initiò foris albicans, post manibus contrectatus ruffescens ac tenuissimis maculis sangvineis insignitus. Dissectus pulpâ est rubicundâ, quæ digitis pressa, succum reddit sangvinolentum, loturæ carnium assimilem.

CCXXXII. Fungus non vescus X. Holtzschwämme. Capitulum summâ parte luridum est, cum pediculo propè terram crasso, infimâ subalbum. Lignis assistit, in cæduis sylvis.

CCXXXIII. Fungus non vescus XI. Holtz-Geelörchen. Arborum trunculis adnatus, nunc ex flavo albicat, nunc totus flavescit, & capitulo superiùs est molli velut alutâ investito, inferiùs copiosis villis instructo, thyrsulo longiore.

CCXXXIV. Fungus non vescus XII. Fungus ovatus, & crepitus lupi, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 737. Fungus glomeratæ rotunditatis, Lob. ic. p. 275. o. Weiberfist / Pawenfist / terrâ primùm erumpens eximii candoris est, post pallescit, & fuligine quasi obducitur. Tener adhuc pulpam intus habet caseosam ferè, quæ tractu ætatis in fumantem abit pulverem. In cæduis sylvis & siccioribus pratis. Am Kneiphöfischen Wall aufm Haberberg. Fungum hunc repperi insolitæ magnitudinis, cujus perimeter cubitum, ac duos quadrantes superabat. Sanctè mihi est contestatus chirurgus quidam, fungum hunc se repperisse aliqvando, tricubitali in ambitu crassitudine. Fungus

hic,

hic, ubi putret, ac in furno siccationem sustinere cogitur, fœtorem initiò naribus injicit, qualem asellantis πυρδὴ τρῶυλον ἱεῖσα μέλῳ. Ab eo fortè vocamen Posist / vel Pawensist. Pulverulenta ejus substantia cum pauxillo vitrioli albi, beneficio calami scriptorii, jumentorum oculis immittitur, lippitudine discruciatis. Hæmorrhoides, & sangvinem undecunq; fluentem sistit, partesq; sanat ulceratas. Vitulis ac jumentis communiter porrigitur, diarrhæâ infestatis.

CCXXXV. Fungus non vescus XIII. Fungus virilis penis arrecti facie, Lob. ic. 275. o. Fungus fœtidus penis imaginem referens, C. B. Pin. 374. Fungi perniciosi 23 generis, species 5. Clus. CCLXXXVII. Pintchen / Erdschmeer. Tuberis facie primùm emergit, post ruptâ extimâ tunicâ coles exilit albus, glande instructus suo, ex atro virescente. Muscæ eô gustato intereunt, cujus causâ honoratur hic phallus à vetulis. *Olim alteri phallo alius habebatur honos.* Figuram membri virilis priscis temporibus, mense Augusto, matronæ divinis colebant honoribus, eam extrà portam Collinam, ad ædem Veneris, cum pompâ sacrorum deferentes: mox à castissimâ & spectatæ pudicitiæ matronâ, præter matronale decus, in sinum Veneris dabatur. Vide Christoph. Landinum in Georg. Virgilii fol. 47. p. 2. Divum Augustin. de civitate Dei lib. 7. c. 21. Gyraldum item de Diis Gentilium, Arnobium, Tertullianum, Lucanum, & Lactantium. Bacchi etiam festa dùm celebrabantur, virile membrum plaustro per forum vehebatur, cui matronæ spectatæ pudicitiæ, velut sancto numini coronam imponebant.

CCXXXVI. Fungus non vescus XIV. Fungus membranaceus auriculam referens, sive sambucinus, C. B. Pin.

372. Fungus ad ſambucum. Trag. Kyber. in Trag. 941. Fungorum perniciosorum 1. genus, Cluſ. hiſt. CCLXXVI. Auricula Judæ vulgò. Hollunderſchwäm / Flöderörchen. Membranaceus eſt, ac ſinuoſus, coloris ex cinereo nigricantis. Arboris caudici innaſcitur, dùm folia erumpunt. Siccat, adſtringit, & in tumoribus, ac inflammationibus faucium, oculorum & aliarum partium perutilis, molleſcit, aquâ maceratus ac intumeſcit.

CCXXXVII. Fungus non veſcus XV. Straßling. Exilis eſt fungus capitulo unciali, totus ſubalbus, lentâ & alutaceâ ſubſtantiâ, infrà ſulcatus, pediculo rotundo & oblongo. Unus alteri ſæpe & capitello & radice connaſcitur.

CCXXXVIII. Fungus non veſcus XVI. Gekrauſter Ziegenbart. Ramoſus non eſt, velut alter edulis, ſed ramulorum loco membranulas obtinet anfractibus multis, tortuoſas & ſinuoſas, viſu elegantiſſimas, agninas lactes apertus jam & in globum convolutas effigie ſuâ imitantes. Foris ſubflavus eſt, intus candidus, radice craſſâ: Inter corylos.

CCXXXIX. Fungus non veſcus XVII. Mäußörchen. Suprà & infra ruber eſt ac lævis, pediculo tenuiſſimo fili inſtar, lignis vetuſtis annatus, in locis graminoſis.

CCXL. Fungus non veſcus XVIII. Haſen-örchen. Fungus eſt, externis folliculis circa extrema & connatis & hiantibus ſurſum prorrectis conſtitutus, foris exfuſcus, intus albus, thyrſulo unciali, ſæpe & productiore, ex fuſco albicante. Tota planta concava eſt pediculo, ferè tiaram referens. Octobri menſe collecta, quæ vernô tempore inter abietes provenit.

CCXLI. Fungus non veſcus XIX. Schlangenpültzcken.

cken. Orbiculare eſt capitellum ſuprà ex fuſco glaucum, versùs oras nonnunquam ſtriatum, infrà cretaceum & ſulcatum, petiolo longiore albo non cavo.

CCXLII. Fungus non veſcus XX. Groſſer Krottenſtuel. Variat. 1.) latitudine ſecunciali eſt, caput orbiculare, ſuprà ex fuſco variegato flaveſcens, infrà ex aquilo fuſcum, plicaturis latiunculis, ad pediculum longum ex fuſco-flavo ruffeſcentem abeuntibus. 2.) Pileus, cujus diameter ſexuncialis, ſuprâ ex flavo albicat, & alutamento quaſi quodam veſtitur, oris deorſum inæqualiter & ſinuosè flexis: infrà ſtriis ad pediculum brevem excurrentibus, colore ex fuſco flavo. 3.) Capitulo, cujus diameter quatuor unciarum ſummâ parte eſt ex fuſco lateritio, oris in tenello pediculum versùs magis inflexis, in adultiore minus: imâ ſulcato, & ex fuſco viridi: petiolo in juniore albicante, in ſeniore ex fuſco ruffeſcente & ſplendente. 4.) Biunciale ejus capitulum ſuprà ex fuſco album, infra pallidè ſtriatum, & pallidè fuſcum cum pediculo.

CCXLIII. Fungus non veſcus XXI. Klein Krottenſtuel. Fungus eſt unciali capitello, & minore pediculo longiore. Ejus aliquot ſpecies. 1.) totus ex albo violaceo fuſcus, infrà ſtriatus, caule non cavô. 2.) ſuperiori parte ex violaceo albicans, inferiore violaceus, petiolo non cavo. 3.) capitello rotundiuſculo, ſubalbo, infernè ruffulus ſeu ex albo incarnatus. 4.) Supra ex albo flavus, & velut alutamento quodam inveſtitus, infrà ex cinereo fuſcus. Seneſcens parte inferiore prorſus infuſci eſt coloris. 5.) totus ex croceo ruffus, pediculo longiore contortô. 6.) Croceus ex toto, pediculo longiore recto. 7.) capitello ſuprà candidus, oris ſurſum reflexis ſubalbidis, infrà ſtriatus & albus. 8.) Su-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0147-0 DFG

prà ſubalbus ac lævis, infrà ſulcatus & candidus, thyrſulo nonnihil incurvo. Sui generis adſtites habet ſæpiuſculé ſibi annatos. Omnes in locis incultis beym Penartſchen Walde.

CCXLIV. Fungus non veſcus XXII. Groß Poggenſtuel. Capite eſt ſuprà albido, infrà horridè nigro, petiolo longiore candido. In fimetis & agris. In agro enatus orbes ſæpe noſtros majores magnitudine exæqvat.

CCXLV. Fungus non veſcus XXIII. Klein Poggenſtuel. Exilis eſt fungus & varius. 1.) totus ex flavo fuſcus, internè ſulcatus, pediculo longiore non cavo. Cum vitriolo coctus in elephantiaſi & ſcabie fœdâ à vetulis extollitur. Sæpe ex butyro frixus illinitur in achoribus & malignâ capitis ſcabie. 2.) Ex fuſco cinereus ſuprá, infrà ex atro fuſcus, petiolo longiore tenui & concavo. 3.) in primâ ætate totus ſubalbus, poſt ex cinereo fuſcus, pediculo longiore, tenuiſſimo & concavo. 4.) Capitello eſt ſuprà ex fuſco flaveſcente, infrá ſtriato, conſimilis coloris, thyrſulo longiore ſubcroceo. *Omnium capitella nonnihil* faſtigiantur.

CCXLVI. Fungus non veſcus XXIV. Fungus πολυκέφαλος caulibus ad radicem connatis. Vielköpfichter Poggenſtuel. Ex numeroſis conſtituitur fungis (viginti ſex ſemel, ſemel quadraginta tres connatos notavi magnitudine differentes) concurſu pediculorum unam radicem exſtruentibus: Petioli longitudine ſeptem unciarum, craſſitudine ſemunciali, candiduli & contortuli ſunt, rotundi partim, partim lati: capitella, quorum diameter ſæpe quatuor unciarum, vel longior, cretata veluti ſuprá exiſtunt, infrà ſulcata & albida, quæ altitudo ætatis tractu ſuperiore capitum parte in fuſcedinem abit. Radici ſuccus quandoq; adhæ-

adhærescit, qui insiccatus nitet & pellucidus est. Bey dem Zollhause am Kneiphöfischen Wall.

CCXLVII. Fungus non vescus XXV. Fungus biorchis anthracinus, Schwartling. Ater est in qvercu natus, gravis, biuncialis magnitudine, ex duobus quasi fungis orbiculatis constitutus, radice brevissimâ. Sauciatus & confossus succum reddit horridè nigrum, gustu modicè adstringentem. Ad lancem recens positus drachmas quinq; pondere exhibuit.

CCXLVIII. Fungus non vescus XXVI. Fungus turundæ effigie langlächtiger Klöschen-Schwam. Biuncialis est altitudine, oblongus, subrotundus, digiti minimi crassitudine, totus infuscus, radicem versùs curtam attenuatus. Pennato musco annatus. Hinter Lattenwalde im Gebirge.

CCXLIX. Fungus non vescus XXVII. Reitzkenblüt. Capitellum ejus orbiculatum, ligneolæ ferè est indolis, parte superiore circinationes quasdam exhibens, ex albo fusco flavescentes. Inferius tenuiter porosum est, ex fusco subalbum, pediculo unciali, biunciali & longiùs producto, ex fusco flavescente fultum. Morbidus aliquando fungus, & ad interitum vergens, suprà viridiusculus est maximam partem, infrà infuscus.

CCL. Fungus non vescus XXVIII. Boletus cervinus communis officinarum. Gemeine Hirschbrunst / Steinpültzken-Blüht Fœmellis. Fungus est σφαιροειδὴς, maculosus & subalbus, biunciali magnitudine, sæpe & major, petiolo carens. Interior pulpa nigricat, & compactior est primitùs, post in fuliginem abit. Repperi ex his unum candidâ prorsus intus substantiâ, cujus frusta chartâ involuta, post croceo tingebantur colore unà cum segestri. Existimo immaturum

maturum illum fuisse. Terræ affigitur crepitûs lupi instar. Libram unam horum fungorum â Belgis quatuor florenis redimunt nostrates, â fungivendis vetulis hic locorum qvatuor grossis impetrandam. Ἀφροδίσιον quid est, sistitq; sangvinem pulpâ vulneri immissâ. Bey Selnicken in locis muscosis.

CCLI. Fungus non vescus XXIX. Wäßerichter Galretschwam. Pediculo crasso, anguloso, plura insistunt capitula crassa, semicircularia, sinuata, supernè ad fuscedinem abeuntia, infernè veluti pilis albicantibus obsita. Totus pellucidus est carnium instar galredæ lentus, viscidus, aqvosus. Putrido ligno abiegno adnatus Octobri Mense. Im Löbenichtschen Walde.

CCLII. Fungus non vescus XXX. Flos arborum fungo affinis, Zauber-Butter Vetulis. Cremore est initio fluidus ex putrilagine abietis natus, curcumæ colore siccatus amœnissimè flavescit, & spongiosus nonnihil est. Colorem pictoribus suppeditabit. *In Sylvâ Lœbnicensi* mense Octobri.

CCLIII. Fungus non vescus XXXI. Fungus racemosis vetustis lignis adnatus Poggenaug. Fungulus, est minutus globosus, sociennos multos racematim sibi cohærentes habens, colore ex atrô fuscus, punulis minutissimis insignitus, pediculo nullo. Fractus pulvisculum, tunicâ inclusum suâ, visu elegantissimum offert, pallidè purpureum, qui cum oleô subactus hepatarius fit colore.

CCLIV. Fungus non vescus XXXII. Fungus granulosus corallinus. Körnichter Corallenschwam. Fungus omnium tenerrimus est, rotundulo capitello, thyrsulum versus longescente, papaverini seminis magnitudine, Coral-

lii qvidem colore, ſed multò amœniore, incarnato, pediculo curto & tenui, fili inſtar. Sociennos numeroſos arctè ſibi adjunctos habet, in natali ligno putrido. Succo intus turgidulus eſt, pictoribus commendabili.

CCLV. Fungus non veſcus XXXIII. Fungus granuloſus incarnatus. Körnichter Fleiſchfarber-Schwam. Priore grandior nonnihil eſt, pileolo rotundo, incarnato, minuti ſeminis magnitudine, intus cavo & ſubalbo, pediculo pertenui candido. Numeroſæ annaſcitur terræ muſcum inter pyxidatum.

CCLVI. Fungus pyxioides coccineus XXXIV. Scharlach-rother Büchſenſchwam. Coryli, aliarumq; arborum ramulis cæduis putrilaginem minitantibus inſidet, effigie pyxidulæ minutæ, intus coccinei, foris ſubalbidi coloris, pediculo exili. Repertus menſe Febr. 1648. in der Hollen-Grund/ hyeme aurâ maximè blandiente, quæ flores aſaro, erygero, taraxaco & conſimilibus plantis, hoc tempore indulſerat, præcoquam maturitatem & aëris ferventias omnibus cum ſtupore admirantibus.

CCLVII. Fungus non veſcus XXXV. Fungus cucullatus. Kappenſchwam. Cæduo & putrido ligno adnaſcitur ſerie quâdam, cuculli alicujus aut pallii muliebris formâ, foris candidus, lanuginoſus, intus ex albo flaveſcens, & rugoſus. Totus lentus ac guſtu fatuus.

CCLVIII. Fungus non veſcus XXXVI. Fungus farreus. Mehlſchwam. Ex multis fruſtis latis, ſcabratis ac camuris, imbricatim ſibi adjunctis, coaſſatur, annoſis aſſiſtensarboribus, foris ſubflavus, intus candidus, qui levi manu in pollinẽ farinæ prorſus ſimilem atteritur, ſolidandis ulceribus, additis aliis, mirificè utilem, vetularum experimento. Im Löbenichtſchen Walde in den hollen Eichen.

CCLIX. Fungus non vescus XXXVII. Fungus lignosus pediculo longiore. **Holtz-ächtiger Schwam mit einem langen Stiel.** Vetustis & aridis insistit lignis, capitulo suprà scabro, fusco, at in meditullio sæpe fossulum, cavum illud umbilici, quod γαγγαμὼν dicitur græcis, repræsentantem, oris sursum reflexis fimbriam facientibus: infrà striis ad pediculum excurrentibus, spithamum longum & productiorem sæpe, qui infimâ parte crassior, & tactu holosericus. Duos foris alveario adnatos domi servo.

CCLX. Fungus non vescus XXXVIII. **Scheibenbüchsen-Schwam.** Truncis adsistit semicirculi formâ, summâ parte circinnatâ, & sæpe tuberosâ, imâ venustè foraminulentâ, tortuosâ, plicatili, flexibus labyrinthæis, quos inter minuscula hinc inde granula. Fagorum, quercuum aliarumque arborum φηγφυὰς. Cum nitro & sulphure diutule coqvendus est, ut mollescat. **Wird zu den Scheibenbüchsen gebraucht.**

CCLXI. Fungus non vescus XXXIX. Fungus τυρκαιδὴς **Käsichter Holtzschwam.** Fungum hunc, qui domi compluitur, sæpe advertit tignis & asseribus suis annatum, rotundum sæpe, aut alterius figuræ, solidum foris, lactescentem. De homine illo proverbium est: τὸν οἴκοθεν βρεχήμωνον οὐδὲ θεὸς οἰκτείρει.

CCLXII. Fungus non vescus XL. Fungus arborum lignosus. **Harter Holtzschwam.** Tuber est ligneum semicirculi figurâ, cui novus quandoq; allabens succus incrementum largitur. Foris partim nigricat, partim ex albo flavescit, subtùs candidum prorsus est tuber, & tenuissimè fungosum.

CCLXIII. Fungus non vescus XLI. * Fungus pyxioides

Fungus pyxioides seminifer. No. 16. ad pag. 98.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0153-3
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0154-9
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0155-4
DFG

Nō. 17. ad pag. 99.

Fungus digitatus alveariorum.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0156-0
DFG

des seminifer. Kleiner saattragender Büchsenschwam. Fungus est exilis, asseri vetusto, è pino facto, plerumque (eâ sæpè serie, quâ spectantur apium locutamenta, queîs ingeritur mel) annatus, quandoq; etiam terræ assidens, radicatione fibrillis quibusdam tenellulis impetratâ. Ubi primùm erumpit, capitello est ochræ colore, reliquo corpore incano ac villoso: dissectus pulpâ intus est albicante, ostenditq; seminum rudimenta pulpæ ceu matrici suæ inhærentia, quâ medullaceâ temporis tractu absumptâ materie, hiare incipit fungus, & abjecto operculo seu velamine pyxidem formâ refert elegantem, in quâ copiosum & aspectu jucundum sistitur seminium.

CCLXIV. Fungus non vescus XLII. *Fungus digitatus alveariorum, das Händchen / das Mütterchen / Pol. Rękna, Materka Podpora. In apiario, ubi favi, cellæ, seu loculamenta apium, quandoq; reperitur fungus, ligno annatus, quem apiarii sacratissimum habent, ac veluti thesaurum pretiosissimum curatè asservant. Figurâ sæpius variat: ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, digitatus est, rarius aliâ visitur formâ. Apud Nobilem quendam ab Aulak inventum eum effigie humanâ, rettulit mihi Vir fide dignus. Wulffsdorfio, prædio nobilissimo Illustris Comitis & Burggrabii à Döhnhoff, fungum obtineo grandiusculum, mirè digitatum & cornutum, cui in unâ extremitate elongatæ, & contortulæ subserviunt portiones, fungos referentes capitatos, pediculis innitentes suis. Birckenfeldiæ duos vidi, ex alveariis primùm desumptos, quorum major κερατοειδὴς, minor χαζοειδὴς. Major ex admistâ fuscedine albus, intus candidissimus, bicornis erat, uno in latere undecim, in altero novem alia cornicula gestans. Minor fuscus totus, ac eleganti manûs effigie, tuberoso erat pollice,

lice, digitis reliqvis parùm incurvatis. Utriusq; substantia mansu lenta, ac gustu fatua, odore iridis Florentinæ, ex mellario primùm petiti. Reperitur plerumq; in alveariis juniorum apum. Usus. 1. pollen ejus haustus steriles fœcundat mulieres. 2. pueris epilepticis exhibitus fert opem. 3. Potui immissus anginá laborantes juvat. 4. colicâ passione discruciatis præsentissimo est remedio. Ita sentiunt, mellatione qui fruuntur ubere. Adhæc mella & examina copiosa promittit apiariis: Jnjuriam apum, scilicet exustionem, & florum vitiationem avertere nesciens. De exustione lex est: si, cum apes meæ ad tuas advolâssent, tu eas exusseris, legis Aqviliæ actionem competere, Celsus ait: l. si servus ff. ad legem aqviliam. De florum vitiatione id memoriæ proditum est: Pauper & dives in agro vicino erant junctis hortulis. Habebat dives in horto flores, pauper apes: qvestus est dives, flores suos decerpi ab apibus pauperis; denunciavit, ut transferret: illô non tranferente, flores suos veneno sparsit; apes pauperis omnes perierunt. Reus erat dives damni injuriâ dati. Sed hæc obiter.

CCLXV. Gallium luteum, C.B. Pin. 335. Adv. Lob. fol. 358. Gallion luteum, Thal. p. 54. Gallium primum Tab. lib. 1. fol. 536. Galion, Matth. Bauh. in Matth. fol. 793. Galion luteum: Cord. in Diosc. 69. Gallium luteum Lob. ic. p. 804. Gallium flore luteo. Cam. hort. p. 63. Gallii primum genus Trag. Seb. in Trag. deutsch p. 391. Gallium Fuchs. fol. 196. Lon. deutsch. p. 270. Dod. niederländisch 575. Meyerkraut. Tab. Lon. Unser Frauen Wegstroh Fuchs. Wallstroh/ Unser Frauen Bett- oder Wegstroh Matth. Lobkraut und Raymnytzen Saxonibus, Gliedkraut vulgò.

Subacris & siccantis est facultatis. Flos in cancro & malignis

lignis ulceribus perutilis: tusus & impositus sacris ignibus medetur; & sangvinis profluvia sistit. Lac coagulat in eodem maceratus. Fotu articulos juvat luxatos. Odore svavissimo cœlum pluvium & tempestuosum pronunciat. Svavius etiam olet Iride apparente. Ad viarum crepidines sæpe.

CCLXVI. Genista tinctoria Germanica C. B. Pin. 395. Ferula Trag. Seb. in Trag. deutsch / 480. Genista tinctoria vulgaris Clus. hist. lib. 1. fol. 101. Genista tinctoria, Dod. lateinisch fol. 763. Genistella infectoria vulgi, Lob. ic. pag. 89. o. Genistella tinctoria Tab. lib. 3. p. 803. Tinctorius flos, Fuchs. fol. 808. Flos tinctorius Lon. deutsch fol. 138. Coroneola, Cæs. lib. 6. cap. 39. p. 251. Geel-Färbkraut / Lon. Klein Ferbpfrimmen. Tab. Geel-Ferberblumen und Heydenschmuck / Seb. in Trag. Gilblum Fuchs. Galeise opilionibus. Genst oder Genster vulgò. Calfacit & siccat ordine secundo, maximè semen, quod gustu est amaricante. Lineas & laneas vestes tingit flos, hinc & tinctorius nominatur. Bey Morungen copiosè.

CCLXVII. Centiana minor sive Cruciata, Lob. ic. p. 188. Madelgeer / Brunf. deutsch fol. 139. Cruciata. Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 203. Fuchs. 420. Lon. deutsch fol. 183. Eystett. Gesn. hort. fol. 255. Cruciata, sive Gentiana minor Dod. lateinisch 343. Gentiana cruciata, C. B. Pin. p. 188. Gentiana minor Matth. Bauh. in Matth. fol. 481. Tab. lib. 2. fol. 399. Gentiana minor, cruciata recentiorum Adv. Lob 130. Gentiana III. cruciata, Clus. hist. lib. 3. fol. 313. Gentiana III. Clus. Pann. p. 283. Gentiana media, Cam. hort. p. 65. Cruciata gentianella, Thal. p. 28. Modelgeer Tab. Lon. Modelgeer / und Creutzwurtz / Matth. Klein Gentian / Speerenstich

und Heyl aller Schaden vulgò. Zu Görgenburg hinter dem Schloß / it. in Wießdehlen in locis incultis.

CCLXVIII. Gentiana paluſtris anguſtifolia. C. B. Pin. 188. Gentiana minima, Matth. deutſch fol. 258. Gentianæ 4. ſpecies, Cluſ. hiſt. lib. 3. fol. 313. Gentiana anguſtifolia vel qvarta, Cluſ. Pann. 284. Pneumonanthe Tab. lib. 2. fol. 466. Pneumonanthe Lob. ic. p. 309. Pneumonanthe Cordi Lob. Obſ. fol. 166. Calathiana viola autumnalis, Geſn. hort. 251. Lungenblumen Tab. blauer Tarant Noſtratibus. Amarore ſuo ſiccat, calfacit & abſtergit. Vulneraria eſt planta, tuſſientibus & ſuſpiriosis utilis. Cunis imponitur à credulo vulgo contrà faſcina. In diſtrictu Gerdavienſi bey Wießdehlen in pratis editioribus. It. bey Creutzburg. Herba hæc, ubi florere incipit, fœniſecium parant ruſtici.

CCLXIX. Geranium batrachioides folio Aconiti C. B. Pin. 317. Geranium ſive batrachium cæruleum, Tab. ic. pag. 58. Geranii ſpecies tertia, Geſn. hort. fol. 260. Geranium Batrachioides cæruleum & Geranium batrachioides flore albo, Eyſtett. Blaue Storchenſchnabel mit Eyſenhuts Blättern. Ad margines pratorum bey Kobbelbude.

CCLXX. Geranium batrachiodes folio Aconiti, flore ex cæruleo albicante. Joh. Lœſ. In Birckenfeld ad foſſas. It. bey Holland am Mühlfluß.

CCLXXI. Geranium columbinum, Pes Columbinus Tab. ic. p. 56. Geranium folio Malvæ rotundo, C. B. Pin. 318. Geranii vulgaris ſpecies, Geſn. hort. fol. 260. Geranium alterum, Trag. Seb. in Trag. deutſch 276. Matth. Bauh. in Matth. fol. 621. Fuchſ. fol. 205. Geranium ſecundum Thal. p. 44. Pes columbinus. Dod. lateiniſch fol. 61. Pes columbinus, ſeu alterum Geranium Dioſcoridis. Lob. ic. 658. Adv.

Lob.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0161-7
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0162-3
DFG

Lob. 296. Geranium Malvaceum sive Balsaminum Cam. hort. p. 66. Taubenfuß / Storckenschnabel Tab. ic. Taubenfuß / Fuchs. Sonnenwirbel / Rusticis, qui armentis sangvinem mingentibus, herbam in lacte ebutyrato coctam, præsentissimo remedio offerunt. Moderatè calefacit & siccat, cum adstrictione quâdam. Hinc vulneraria est planta, herniosis perutilis, foris & intus usurpata. Bey Königsberg passim in arenosis.

CCLXXII. *Geranium columbinum erectum tenuius laciniatum flore magno Joh. Lœs. Tieff zerschnittener Taubenfuß mit großer Blüth. Radix ruffula, contortula, " longius sub terrâ incedens, nova subinde germina exclu- " dens, ac gustu validè adstringens, cauliculos rectà in altum " mittit cubitales sæpius minores, teretes, egregiè hirsutos, " brachiatos, ac geniculatos; ad singula genicula, tribus glu- " mis rufescentibus firmata, folia visuntur viridia, petiolo " longo nitentia, hirsutie aspera, rotunda, in septem pro- " fundas lacinias secta, quæ in summitate plerumq; tripar- " titæ: flos mense Junio & Julio est purpurascens, siccatus " verò violaceus, ex qvinq; foliis sinuatis majusculis constru- " ctus, quibus subserviunt alia quina foliola viridia, exili in " apice filamento prædita: flori succedit acus, in qvinq; exi- " litates tenuissimas exiens, cujus semen oblongum nigricans, " ætatis tractu sursum apicem versùs tendit, ac inflectitur, ceu " videre est in geranio Columbino procumbente. Tota " planta insignis est adstrictionis, tormentillæ viribus haud ce- " dens. Hinter Qvednau aufm Berge copiosissimè. Zwischen der Liep und Sandkrug nach dem Pregel zu copiosè. Herba hæc ubi legebatur, jaculus è serpentum genere sese obtulit trucidandus, in cujus ventriculo delituere pulli quinq; degu-

degulati avium, quorum unus ferè consumptus. Ipsa avium mater mortua ibidem loci spectabatur, ex gulâ mordicùs à serpente prius fracta.

CCLXXIII. *Geranium columbinum procumbens tenuius, laciniatum flore parvo J. L. Geranium columbinum tenuius laciniatum C. B. Pin. 318. quod in prodr. 2. p. 138. Tieff zerschnittener Taubenfuß mit kleiner Blüt. Radix oblonga, „filamentis instructa luteis, cauliculos edit copiosos, pal„mares, virides, hyrsutos, ac in terram pronos, queis fo„lia rotunda, in qvinq; profundas lacinias primùm & mox „in alias dissecta, serviunt, pediculis longis fulta: flores ad „latera, thyrsulorum fert nanos, cærulos, quadrifolios, quos „vanescentes rostella, seu utriculi rostrati parvi, turgidi ex„cipiunt, quorum semen maturitate lasciviens, rotundum, „fuscum, ac glumâ vestitum, sursum ad rostri apicem refle„ctitur, capreolo quasi insidens.

CCLXXIV. Geranium cicutæ folio moschatum & inodorum C. B. Pin. 319. Myrrhida Plinii, Rostrum ciconiæ Lob. ic. 658. Geranium primum Matth. deutsch fol. 621. Lon. deutsch fol. 188. Fuchs. fol. 204. Geranium Trag. Kyber. in Trag. p. 347. Geranium supinum Dod. lateinisch 63. Geranium supinum majus Cord. hist. fol. 108. Geranium myrrhinum, Rostrum ciconiæ Tab. ic. 58. Geranium muscatum, Cam. hort. p. 66. Eystett. Geranium σκανδικόφυλλον, Thal. pag. 44. Storchen-Schnabel mit Schierlings-Blätter. Bey Lautenmühl passim.

CCLXXV. Geranium cicutæ folio minus & supinum C. B. Pin. 319. Geranium minus & primum. Trag. Seb. in Trag. deutsch 276. Geranium minus, Geranium arvense Tab. p. 57. Myrrhida Plinii, & rostrum ciconiæ inodorum vulga-

No 19. ad pag 104. Geranium Columbinum procumbens tenuius laciniatum flore parvo.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0165-0
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0166-6
DFG

vulgatum, Lob. ic. 659. Geranium ſeptimum, ſive Geranium gruinum, Dod. Lateiniſch 64. Geranium Moſchatum inodorum, Eyſtet. Kleiner liegender Storchenſchnabel mit Schirlings Blättern/ Acker-Schnabel-Kraut/ Tab. ic. Storck- oder Kranich-Schnabel. Seb. in Trag. Klein Schnabel-Kraut/ und Acker-Schnabel-Kraut vulgò. Bey Königsb. in locis arenoſis paſſim.

CCLXXVI. Geranium Robertianum, Lob. ic. 657. Dod. Lateiniſch 62. Cam. hort. p. 66. Geranium Rupertianum Tab. ic. p. 56. Geranium tertium Matth. Bauh. in Matth. 622. Fuchſ. 206. Robertiana, & herba Roberti. Lon. deutſch. 188. Geranium tertium, ſeu Robertianum Thal. pag. 44. Geranium Robertianum primum C. B. Pin. 319. Gratia Dei, vel Geranion quibusd. Trag. Kyber. in Trag. 108. Rubertiana vulgò, Cæſ. lib. 14. c. 28. p. 559. Ruprechtskraut Fuchſ. Lon. Gottes-Gnad/ Seb. in Trag. S. Ruprechts-Kraut/ Gicht-Kraut / Rothlauffen Kraut / und kleine Schöllwurtz/ oder klein Schwalben-Kraut vulgò. Bey Königsberg paſſim.

CCLXXVII. Gladiolus floribus uno verſu diſpoſitis major, C. B. Pin. 41. Victorialis rotunda & gladiolus verus, Geſn. hort. fol. 286. & 260. Xiphion-Spatha, ſeu ſegetalis gladius. Ruell. fol. 589. Victorialis rotunda, Eyſtett. Victorialis herba Lon. Germ. Victorialis fœmina, ſeu gladiolus ſylveſtris, Cord. hiſt. fol. 97. Gladiolus Germanicus. Tab. lib. 2. fol. 323. Gladiolus noſtras, Cam. hort. p. 67. Gladiolus Narbonenſis, Lob. ic p. 98. Gladiolus, Dod. Lateiniſch fol. 41. Xyphion minus, Cluſ. hiſt. lib. 2. fol. 190. Cluſ. Pann. p. 226. Groſse Braunſchwertel Thal. Runde Siegwurtz/ und Allermann Harniſch vulgò. Ad ſylvarum

declivi loco ſitarum margines bey Königsb. Vivum exemplar inſpiciendum.

CCLXXVIII. *Glaux aquatica folio ſub-rotundo. Joh. Lœſ. Glaux maritima C. B. Pin. 215. Glaux exigua maritima. An Glaux Dioſcoridis. Lob. obſ. 227. Glaux exigua maritima. Adv. Lob. 178. Glaux marina minor Tab. lib. 2. fol. 507. „Milch-Kraut mit rundlechten Blättern. Radice fulcitur „tenerâ, albicante, thyrſulos ramoſos, ſubrectos partim, par„tim humi jacentes, ac horſum prorſum ſerpentes, excluden„te, qui inter reptandum villis radicantur exiguis: hos bina „oblonga, ac rotundata ſubinde & ex adverſum excipiunt „folia, capſis rotundis, fimbriatis, ad eorum exortum ſucce„dentibus, in quibus minutiſſimum ſemen. Calida & humida eſt, ad revocandum exſtincti lactis ubertatem nutricibus „ſalutaris, auctore Dioſc. & Æginetâ. In lacunis hæſitat, ac ruffeſcit aqvis deſtituta. Hinter dem Tragheimſchen Wall.

CCLXXIX. Glyzyrrhiza ſiliqvoſa, vel Germanica. C. B. Pin. 352. Glyzyrrhiza altera, Matth. Bauh. in Matth. 486. Glyzyrrhiza vulgaris, Dod. Lateiniſch. f. 341. Liqviricia, Brunf. Lateiniſch. tom. 3. fol. 123. Glyzyrrhiza ſiliqvoſa, Lob. ic. p. 86. o. Adv. Lob. fol. 405. Obſerv. Lob. 529. Glyzyrrhiza Fuchſ. 192. Cord. hiſt. fol. 164. Gesn. hort. fol. 260. Dulcis radix, Trag. Seb. in Trag. deutſch. 733. Dulcis radix communis, Geſn. hort. fol. 257. Süßholtz Brunf. Fuchſ. Lakaritze vulgò. In der hollen Grund.

CCLXXX. Gnaphalium montanum flore rotundiore C. B. Pin. 263. Gnaphalium montanum purpureum & album Adv. Lob. 202. Gnaphalium montanum album & purpureum Tab. lib. 2. fol. 106. 107. Lagopus ſecundus, Trag. Seb. in Trag. deutſch. 263. Gnaphalium monta-

num

No. 20 ad pag. 205.

Glaux aqvatica folio Subrotundo.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0169-6
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0170-7
DFG

num ſvave rubens, Eyſtett. Piloſella minor Fuchſ. fol. 606. Piloſella minor Dodonæi. Thal. p. 83. Berg-Ruhr-Kraut mit runder Blüth. Haſen-Pfötlein/ Seb. in Trag. Weiß und braun Engelblümlein Tab. Meuß-Oehrlein Fuchſ. Rühr-Kraut vulgò. In collibus herboſis & ſalebroſis ubertim provenit bey Königsb.

CCLXXXI. Gnaphalium vulgare majus C. B. Pin. 263. Impia Plinii Geſn. hort. fol. 262. Gnaphalium vulgare, Matth. Bauh. in Matth. fol. 625. Gnaphalium vulgare, Filago, centunculus, Adv. Lob. 201. Lob. ic. p. 480. Gnaphalium vulgare minus, Thal. p. 55. Gnaphalium II. vulgare Tab. lib. 2. fol. 105. Filago, ſive impia, Dod. Lateiniſch 66. Gnaphalium. Fuchſ. fol. 222. Heliochryſos ſylveſtris, Trag. Seb. in Trag. 262. Herba impia Cæſ. lib. 12. c. 15. p. 485. Tomentum Lon. deutſch f. 210. Tomentum ſeu centunculus, Cord. Dioſc. f. 58. Groß gemein Rühr-Kraut/ Matth. Tab. Fuchſ. In locis apricis & arenoſis paſſim bey Königsb.

CCLXXXII. Gnaphalium majus anguſto oblongo folio alterum. C. B. Pin. 263. Gnaphalium Anglicum, vel Belgicum folio longiore Lob. ic. fol. 482. Gnaphalium Anglicum folio longiore, perperam Leontopodium alterum Matth. Adv. Lob. 202. Leontopodium alterum vulgare, Cam. hort. p. 86. Filago major quibusdam Groß Rühr-Kraut mit ſchmallen länglichten Blättern. In ſalebroſis paſſim bey Königsb.

CCLXXXIII. Gnaphalium medium. C. B. Pin. 263. Tab. ic. p. 390. Filago minor, Lob. ic. p. 481. Dod. Lateiniſch fol. 66. Klein Rühr-Kraut Tab. ic. In agris incultis præſertim editioribus copiosè.

CCLXXXIV. Gramen Parnaſſi albo ſimplici flore, C. B. Pin. 309. Hepatica alba, Cord. hiſt. fol. 152. Gramen

Parnassum Dod. Lateinisch. 564. Gramen Parnassi, Lob. ic. p. 603. Eystett. Gramen hederaceum, Flos hepaticus, Tab. ic. p. 214. Gramen Parnassi, hederaceum recentiorum. Adv. Lob. 263. Obs. Lob. 330. Hepatica flos Tab. 1. Weiß einfach Parnaßer Graß. Gramen Parnassi, & Enneadynamis Polonorum, Gesn. hort. 261. Parnaßer-Graß oder Leber-Blümlein Tab. Weiße Leber-Blum Nostratibus. In riguis & humidis pratis hinter Fischhausen nach Lochstädt zu copiosè.

CCLXXXV. * Gramen mannæ esculentum Pru-
„tenicum. Joh. Lœsel. Schwaden Nostratibus. Diversum
„longè est à gramine mannæ esculento. Lob. p. 24. In iconi-
„bus, quod Germanis quoq; Schwaden nuncupatur, & inter
„gramina ischæma numeratur. Nostrum verò gramen est
„paniculatum pratense, hoc, ubi rorescit, pingviusculum red-
„dit liqvorem eumq; dulcissimum mannæ instar; dulco-
„rem hunc facilè advertit is, qui roratum pitissando attin-
„git semen. Manna hæc esculenta ut fiat, ita laboratur:
„1. Escale semen in pratis incerniculo ex setis eqvinis, hor-
„sum vorsum ducto, colligitur sublucano tempore, & quidem
„mense Julio. 2. apricatione sub dio siccatur. 3. siccatum in
„fustitundinâ, supposito stramine, bacillo ligneo modestè tun-
„ditur, & à glumis extimis laboriosè admodum liberatur.
„4. Furfur & crassius purgamentum flatu dejicitur, seu venti-
„lando tollitur. 5. De integro in eodem fustuario accuratiùs
„tunditur, subjectis vel calendulæ floribus siccis, vel pomi
„vel coryli foliis, quibus nitor & color tunso accedit semini.
„6. toties ac toties in mortario fustigatum semen iterum at-
„que iterum ab apludâ, & minutissimâ paleâ, nec non folio-
„rum reliqviis, ventilatur, purgatur, ac synceritate esui a-
ptum redditur. In pratis & locis udis copiosè. Item auff
den

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0173-4
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0174-0
DFG

den Wiesen beym Naßen Garten bey Königsb. Semen, quod deglubitum est, nostrates à Polonis plerumq; parvo emunt. Ustilagine petitur nonnunquam. Furfures ejus equos juvant vermibus infestatos. Aurigæ horum loco secalis furfures porrigunt, certissimo adversùs vermes præsidio, & horis demum aliquot elapsis equos potum agunt.

CCLXXXVI. Gramen officinarum. Joh. Lœsel. Gramen caninum arvense, sive gramen Dioscoridis. C. B. Pin. p. 1. Gramen canarium, Medicatum officinarum. Adv. Lob. fol. 2. Gramen caninum I. Tab. lib. 1. fol. 637. Gramen Ruell. fol. 593. Dod. Lateinisch. fol. 558. Cord. in Dioſc. f. 63. Graminis primi Dioscoridis species major, Thal. p. 50. Gramen Dioscoridis Gesn. hort. f. 260. Hunds-graß Tab. Qvecken/ Qveck-Graß/ und Graß/ Cord. in Dioſc. Inter segetes passim: Spica variat: nonnunquam densior & compactior est, aliquando sparsa, aristis, petiolis longis innitentibus, velut in avenâ. Floret elegantissimè secalis instar.

Moderatè refrigerat, siccat & abstergit. Jecoris & renum obstructiones aperit, prodestq; regio morbo correptis, & nephriticis. Potissima vis in radice.

CCLXXXVII. Gramen caninum supinum minus. C. B. Pin. 1. Gramen caninum supinum secundum, Tab. lib. 2. fol. 637. Gramen caninum supinum Lob. ic. p. 21. klein liegend Hunds-Graß Tab. Passim bey Königsb.

CCLXXXVIII. Gramen geniculatum caninum marinum Lob. ic. p. 21. Gramen caninum maritimum spicatum. C. B. Pin. 1. Gramen caninum tertium, Tab. lib. 1. fol. 637. Geährtes Hund- und See-Graß. Am Curischen Hafe in locis arenosis.

CCLXXXIX. Gramen dactylon folio latiore, C. B.

Pin. p. 8. Ischæmon Plinii. Clus. hist. lib. 6. fol. 217. Ischæmum I. Tab. lib. 1. fol. 658. Sangvinaria. Comitis de Nevenare, seu crus Galli. Trag. Kyb. in Trag. p. 714. Ischæmon vulgare Lob. ic. p. 24. Adv. Lob. fol. 4. Fünff Finger-Graß mit breiten Blättern. Eine Graß-Art kräfftig Blut zu stillen/ Gesn. Cat. p. 46. Hahnen-Bein/ Kyber. in Trag. Blutt-Graß Tab. Subdulce est: siccantis & adstringentis naturæ. Semen sangvinem sistit & foriolos juvat. Hinter dem forderſten Kruge in der Sarckau. it. am Wege forn am Kruge. it. Zwischen Marscheinen und Forcken Kruge am Wege.

CCXC. *Gramen montanum odoratum spicatum. Joh. Lœs. Wolriechend spitziges Kornähriges Berg-Graß. „ Radix longissimis capillamentis albicans, & in cespites abi„ens, proximè terram numerosa & exilia alit folia, spargit„que culmos paucis geniculis, erectos, foliorum volvis, ex „cæsio-virescentibus, conclusos, in summitate spicam ex paniculis curtis habentes. Hinter Frauenburg.

CCXCI. Cramen arvense odoratum spicatum. Joh. Lœs. Wollriechend Kornähricht Acker-Graß. Radice nititur, tenuissimis & albicantibus filamentis, quæ in altum protrudit culmos geniculatos, in utriculis foliorum viridium & angustorum, maximam partem delitescentes, in fastigio secalis instar spicatos, læves: Odoratissimum est gramen, bonâ fragrantiâ vernali tempore, gramini Mariæ haud cedens. In incultis passim bey Königsberg.

CCXCII. *Gramen arvense spicâ compactâ divulsâ. Joh. Lœs. Acker-Graß mit dichten von einander gezogenen Aehren/ bey Königsberg.

CCXCIII. *Gramen cristatum radiculis nigricantibus.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0177-7
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0178-3
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0179-1
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0180-3
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0181-8
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0182-4
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0183-0
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0184-6
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0185-1
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0186-7
DFG

bus. Joh. Lœſ. Fadem-blättriges ſubtiles Berg-Graß mit ſehr kleinen ſchwartzen Wurtzelchen/ hinter Frauenburg.

CCXCIV. Gramen montanum paniculâ ſpadiceâ delicatiore 12. in Prodr. C. B. p. 6. lieblich Caſtanien-braunes Graß. Radix alba, brevis, cirris numeroſis, veluti è ceſpite culmos exiles, teretes, geniculatos, uno alteroq; folio veſtitos, exire patitur, in faſtigio paniculam amœnulè formatam ſpadicei coloris efferentes. Foliis adhæc proximè terram curtis eſt, ac puſillis. In arenoſis.

CCXCV. Gramen pratenſe paniculatum medium. C. B. Pin. p. 2. Mittel-Strauß-tragendes Wieſen-Graß. Gramen minus, Tab. ic. p. 201. Lob. ic. p. 1. Gramen pratenſe ſecundum, Dod. Lateiniſch. fol. 560. Klein gemein Graß. Tab. ic. paſſim in pratis & udis.

CCXCVI. *Gramen paniculatum molle paniculâ dilutè cæruleâ. Joh. Lœſ. Weiches Graß mit einem lichtblauen Strauß. Bey Königsberg.

CCXCVII. *Gramen Mariæ Boruſſorum. Joh. Lœſ. Gramen paniculatum odoratum 13. in Prodr. p. 6. C. B. Marien-Graß/ Margen-Graß Noſtratibus.

Radiculis provenit candidis, geniculatis: foliis anguſtis,“ longioribus, acuminatis, odoratis: paniculam in culmi ſum-“ mitate geſtat exiguam, leviter ſparſam, tortuoſis pedicellis “ inſiſtentem, ex virore ſubflaveſcentem, ac ſplendentem: “ Gramen hoc in faſciculos manuales colligitur ſæpè â pueris, “ & ante templi fores diebus feſtis diſtrahitur. Auff den Wie-“ ſen hinter dem Bretter-Kruge.

CCXCVIII. Gramen ſegetum altiſſimâ paniculâ ſparsâ. C. B. Pin. 3. Gramen ſegetale paniculatum Tab. lib. 1. 638.

1. 638. Gramen ſegetum paniculâ ſpecioſâ latiore, Lob. ic. p. 2. Ackerſtrauß-Graß Tab. unter dem Getreidig.

CCXCIX. Gramen ſegetum paniculâ arundinaceâ. C. B. Pin. p. 3. Gramen pratenſe tertium Dod. Lateiniſch. 561. Gramen harundinaceum arvenſe Tab. lib. 1. fol. 648. Gramen loliaceum octavum. Trag. Seb. in Trag. deutſch 531. Agrorum venti ſpica, & gramen agrorum, latiore, arundinaceâ, comosâ paniculâ, Lob. ic. Ackerwind-Graß. Tab. Ackerwindhalm/ der Hirſen nicht ungleich/ Rohr-Graß vulgò. In pratis paſſim, non raro & inter ſegetes.

CCC. Gramen leporinum. Gramen tremulum Tab. ic. 231. Gramen tremulum majus C. B. Pin. p. 2. Graminis loliacei decimum genus. Thal. p. 52. Phalaris pratenſis minor Lob. ic. p. 44. Adv. Lob. fol. 16. Lolium decimum, & Ægilops Plinii Trag. Seb. in Trag. deutſch. 532. Ægilops, Lon. deutſch fol. 287. Gesn. hort. 245. Amourettes tremblantes. Cluſ. hiſt. lib. 6. fol. 218. Zitterndes Haaſen-Graß/ Tab. Haaſen-Brodt und Haſen-Oehrlein Lon. Zitter-Graß und unſer lieben Frauen Flachs vulgò. In monte Apollinis, in Qvednau. Item im Penartſchen Walde.

CCCI. *Gramen Caryophyllatum polycarpon fructu triangulo. Joh. Lœſ. An gramen caryophyllatum montanum ſpicâ variâ? 23. in Prodr. C. B. p. 9. Fruchtreiches Näglein Graß mit dreykantichtem Saamen.

„ Radix multis filamentis nigricantibus, folia excludit angu-
„ſta, ſpithamam ſæpé longa, viridia, graminis caryophyllæi fo-
„liis Tab. lib. 1. fol. 641. aſſimilia, quæ inter culmi aliquot
„tenues, vireſcentes, foliis deſtituti aſſurgunt, geminam in
„ſummitate ſpicam ex ruffulâ volvâ exeuntem, oſtentantes,
„quarum una divulsa & polycarpos eſt, fructu triangulo,
gluma-

glumâ ſubrubenti cincto, altera compacta, & longitudine in acutiem abiens. Bey Domnau in incultis.

CCCII. Gramen hirſutum nemoroſum Lob. ic. pag. 16. Gramen ſylvaticum piloſum, Tab. ic. p. 227. Gramen hirſutum latifolium majus C. B. Pin. p. 7. Breit Wald-Graß mit härichten Blättern/ haarechtig Wald- oder Busch-Graß/ Tab. Wald-Stachel-Graß quibusdam. Hirſutie eſt copioſiſſimâ, quam nonnunquam ex parte deperditam gerit.

CCCIII. Gramen thyphoides maximum ſpicâ longiſſimâ, 25. in Prodr. C. B. pag. 10. Großes langes Kölblein- oder Fuchsſchwantz-Graß mit einer zwieblechten Wurtzel. Radici bulboſæ geniculatæ, fibris exiguis, & numeroſis inſtructæ, culmus inſiſtit rectus, bicubitalis, ſpicâ ſuperbiens, cujus longitudini menſus pollice ac indice explicato, λίχας Græcis, ſæpius exæqvatur. Spica modò longior, modò brevior. In arvis ſæpè reperitur bey Königsberg.

CCCIV. Gramen thyphoides aſperum primum. C. B. Pin. p. 4. Gramen typhinum primum Tab. ic. 217. Lieſch-Graß Tab. Scharff Kölblein-Graß. In monte Apollinis zu Qvednau.

CCCV. Gramen thyphoides ſpicâ anguſtiore C. B. Pin. p. 4. Gramen aloperuroides minus alterum. Lob. ic. p. 9. Gramen alopecurinum ſecundum Tab. lib. 1. fol. 641. Kölblein-Graß/ Fuchsſchwantz-Graß Tab. hinter der Haberbergſchen Kirchen ad margines pratorum. It. bey Schwanis im Gebrüch.

CCCVI. Gramen thyphoides culmo reclinato. C. B. Pin. p. 4. Gramen alopecurinum tertium. Tab. lib. 1. fol. 641. Kölblein Graß mit zurücktretendem Helm. Gramen alopecuroides minus. Lob. ic. p. 9. Fuchsſchwantz-Graß das dritte Tab. In arvis paſſim.

CCCVII. Gramen pratense tomentosum paniculâ sparsâ. C. B. Pin. p. 4. Baumwolltragendes Binsen-Graß. Linagrostis, Tab. lib. 1. fol. 665. Gramen tomentarium, Linum pratense. Tab. ic. p. 230. Gramen Eriophoron, Dod. Lateinisch. fol. 562. Gnaphalion, Trag. Kyber. in Trag. pag. 683. Linum pratense, Lon. deutsch fol. 210. Juncus bombycinus, Tomentum & linum pratense Cordi, & Gnaphalium Hieronymi Bockii Lob. ic. p. 87. Juncus bombycinus. Adv. Lob. fol. 44. Gramen junceum lanigerum, Thal. 55. Flachs-Graß Tab. Matten-Flachs Kyb. in Trag. Matten/ und Wiesen-Wollen/ Lon. Wiesen-Flachs und Matten-Woll/ vulgò. In pratis humectis, & vallibus uliginosis passim.

CCCVIII. Gramen junceum spicatum seu triglochin, C. B. Pin. p. 6. Binsen-Graß mit einer langen Ahr. Gramen junceum spicatum, Tab. ic. p. 224. Carex minor, Lon. deutsch fol. 209. Gramen marinum spicatum alterum, Lob. ic. 17. Gramen marinum spicatum alterum majus. Cam. hort. 69. Gramen mixtum ex junco & gramine Thal. p. 55. Gramen junceum 4. Tab. Geährt Binß-Graß. Tab. ic. klein Ried-Graß Trag. Kyber in Trag. Bintzen-Graß vulgò. In pratis humectis circa Regiomontum passim. it. Bey der Neuhäuschen Mühle am Berge.

CCCIX. Gramen junceum folio articulato sylvaticum. C. B. Pin. p. 5. Gramen junceum sylvaticum Tab. ic. p. 223. Wald-Bintzen-Graß/ und Wald-Bies-Graß mit zergliederten Blättern. In der hollen Grund in uliginosis. It. Beym Zoll-Hauß am Wall.

CCCX. *Gramen junceum aqvaticum semine racemoso. Joh. Loes. Radix est geniculata, longiuscula, fibris instructa suis, foris subflava, intùs albicans, ex quâ sub

terrâ

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0191-7
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0192-3
DFG

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0193-9
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0194-5
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0195-1
DFG

No. 29. ad pag. 115.

Gramen junceum Semine acuminato.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0196-7
DFG

terrâ longiùs incedente, & nova gramina excludente, cauli-"
culus exsurgit, paucis foliis junceis comitatus, in summitate"
nonnihil brachiatus, cujus ramusculis fructus insistit race-"
mosus. Fortè illud est, quod Bauhino fuerat missum à D."
Fleissero. Waßer-Binsen-Graß mit traubichtem Saamen.
Hinter Osterrod im Bruch.

CCCXI. *Gramen junceum semine acuminato. Joh.
Lœs. Binsen-Graß mit schwartzgespitztem Saamen. Radix"
è villis longiusculis structa, thyrsulos promit uncias novem"
altos, læves ac virides, in fastigio genicula habentes, è qui-"
bus novi & exiles coliculi, foliolis acutis rubicundisq; fulti, "
enascuntur, semen in exortu geminis pallidisq; paleis insi-"
stens, mox aliis horridè nigris vestitum, oblongum, splen-"
dens, & in acutiem tendens, sustinentes. Remotis paleis"
semen subalbidum est, escam gratissimam volucrum generi,"
ut existimo, conferens. Foliis est tenellulis, copiosis, quin-"
que vel sex unciarum longitudine, quæ ad radicem con-"
gressa bulbum quasi quendam concursu emetiuntur suo."
Flos ei purpureus mense Junio. In den Wäldern am"
Wege.

CCCXII. Gramen junceum sextum Tab. lib. 1. fol.
660. Gramen nemorosum caliculis paleaceis. C. B. Pin.
p. 7. Holosteum Matth. Lob. ic. p. 18. Gramen epigonato-
cavlon, Thal. p. 55. Holostium 1. Matth. Bauh. in Matth. f.
687. Krotten-Graß Tab. ic. Poggen-Graß quibusdam.
In der hollen Grund passim.

CCCXIII. Gramen Cyperoides palustre majus spicâ
divisâ. C. B. Pin. 6. Gramen Cyperoides parvum aqua-
ticum, Lob. ic. p. 19. Gramen cyperinum palustre minus.
Tab. ic. p. 220. Groß Waßer Ziper-Graß mit zertheilten

braun-gelben Aehren. Klein wild Galgen-Graß Quibusdam. Variat magnitudine, cùm foliis sit modò latioribus, modò majoribus, modò angustioribus, modò brevioribus. In Pratis nach dem Bretter-Kruge.

CCCXIV. *Gramen Cyperoides palustre spicâ pendulâ. Joh. Lœs. Wasser-Cyper-Graß mit hangenden „schwartz-grünen Aehren. Radix ex crassulis lignosis & ro„tundis villis maximam partem constituta, ac mirè capillata, „caules in altum egerit sesqvicubitales, acutos, triangulos, „quibus ad internodia spicæ tres, quatuor vel quinque, qua„rum binæ ultimæ sæpiusculè steriles, è capsis oblongis, tenel„lis, numerosissimis, viridibus, paleis interspersis nigris, con„stitutæ, ac sesqviunciam longæ, alternatim sibi succeden„tes, assistunt, folio circa exortum suffultæ longiore & acu„tiore. Foliis reliquis est arundinaceis sesqvicubitalibus „peracutis, è radice enascentibus, & caulem fotu quodam am„plexantibus. Notabile est, hujus graminis radici, nonnun„quam & *cauliculo, adnasci Mense Julio* corpuscula quædam „oblonga, exilia, albicantia, formicarum ovis assimilia, quæ „aperta exiguissimos intrà conclusos ostendunt vermiculos. Exsiccata ova rubrum acqvirunt colorem. Fortè ex istis vermiculis muscæ tandem generantur, quemadmodum id observavi in Ranunculo longifolio palustri majore. C. B. auff den Wiesen nach dem Bretter-Krug. It. bey Sunnicken.

CCCXV. *Gramen Cyperoides minus repens spicâ divisâ. Joh. Lœs. klein kriechend Zyper-Graß mit zertheilten braun-gelben Aehren. Hinter Frauenburg in mon„tosis. Radix fusca internodiis distincta suis, summâ tellure „reptando incedit, tenellulis aliis radiculis, ad singula geni„cula ortis, & capillaceâ quasi lanugine instructis, sustentata:

cx

Gramen Cyperoides paluſtre ſpica pendula.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0199-6
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0200-3
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0201-9
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0202-4
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0203-0
DFG

No. 32. ad pag. 117.

Gramen Cyperoides spicis curtis divulsis.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0204-6
DFG

ex geniculis paſſim cauliculi oriuntur virides, triqvetri, unci- "
arum ſex longitudine, qveis ſpicæ aliquot perbreves (formâ "
aſſimiles ſpicis, qui in gramine cyperoide paluſtri majori C.B. "
advertuntur) ſpadiceo-lutei coloris, cui & qvantillum viridis "
admixtum, alternatim diſpoſitæ, quarum prima foliolũ ſub- "
jectũ habet, adhæreſcunt: foliis eſt tenuiſſimis & acutiſſimis. "

CCCXVI. *Gramen Cyperoides ſpicis curtis divulſis Joh. Lœſ. Cyper-Graß mit kurtzen abgeſonderten Aehren. Radix villoſa & egregiè capillata thyrſulos ſemicubitales, "
majores ſæpe, ſæpè minores, acutos ac triquetros, exire pati- "
tur, quorum columina quinq; , ſex vel plures exornant ſpicæ "
curtæ, virides, ex tenellis, rubicundis, & in acutiem abeunti- "
bus granulis conſtructæ, alternatim cauli affirmatæ. Folia "
ſunt tenuia & acuta. In locis udis paſſim.

CCCXVII. Gramen Cyperoides ſpicâ variante. Joh. Lœſ. Klein Cyper-Graß mit zweyerley Aehren. Gramen hoc ex teneris radicum fibris exſurgens, thyrſos edit triangulos, ſemicubitales, & longiùs evagantes, quorum faſtigiis tres vel quatuor pumiles ſpicæ, ex viridibus & rotundatis aliquot capſis, paleisq; ad nigrorem tendentibus intermiſtis, ornamento ſunt, perexiguo à ſe diſſidentes ſpatio, & in exorto foliolo tenui & acuto firmatæ. Præter has ſpicas alia, diverſa prorſus ab illis, ac in extimâ graminis parte velut in ſpeculâ hærens, viſitur, quæ tenuis, erecta & ſqvamoſa eſt, coloris ſpadiceo-lutei. Paſſim.

CCCXVIII. Gramen exile Cyperoides ſpicis nigris. Joh. Lœſel. Klein Zyper-Graß mit ſchwartzen Aehren. In pratis nach dem Bretter-Kruge zu. Plantula hæc ferè dodrantalis radice eſt fibrosâ, lignosâ tamen ac nigricante: ex hâc foliola exſurgunt graminea, & cauliculi triqve-

tri subasperi, quorum summo insident spicæ plerumq; tres, alternatim sibi succedentes, nigricantis coloris. Flosculos habet minutissimos, subluteos.

CCCXIX. Gramen exile hirsutum Cyperoides. Lob. ic. 15. Gramen hirsutum capitulis Psyllii. C. B. Pin. 7. Gramen cyperinum pilosum Tab. lib. 1. fol. 656. Cyperella Cordi & Pseudocyperi species pumila Gesn. hort. 256. Haarechtig Cyper-Graß. Tab. Primo vere passim prodit in incultis.

CCCXX. Gramen Cyperoides hirsutum repens spicis minoribus minusq; compactis Joh. Læs. Haarechtig kriechend Cyper-Graß mit weichen Ähren. In incultis hinter der Neuen Kirch.

CCCXXI. Gramen arundinaceum enode majus montanum. C. B. Pin. 7. Groß Berg-Rohr-Graß ohne Knoten. Gramen harundinaceum montanum Tab. lib. 1. fol. 666. Juncus λυχνάνθεμος major, Thal. p. 60. Scirpi primum genus, Trag. Seb. in Trag. deutsch. fol. 542. Bintzen-Halm/ Wald-Rohr oder Schmelen / Seb. in Trag. Berggriedt/ Tab. Berg-Rohr quibusdam. Grosse Schmel Nostratibus, qui scopas seu excutias (die Kehr-Bürsten/ quibus pulveres ac paleæ excutiuntur) ex eôdem parant, frumentum ventilaturi. Gramen hoc proverbio: nodum in scirpo qværere, celebre quidem est, nodos tamen proximè radicem obtinet. Nassæ quoq; & fiscellæ ex eôdem conficiuntur. Dicitur & Motel nonnullis, unde Polonis Miotta ein Besem. Culmi ejus viri proceritatem attingunt. Hinter Mohrungen. Im Mohrungschen Walde copiosè. Item bey Lauten-Mühle. *Ex scirpo olim effigies fiebant, quæ per Virgines Vestales annis singulis jaciebantur in Tyberim. Ovid. Fastorum lib. V. v. 621.*

Tunc

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0207-3
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0208-9
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0209-7
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0210-8
DFG

Tunc quoq; priſcorum Virgo ſimulacra Virorum
Mittere roboreo ſcirpea ponte ſolet.

Apud Aſc. Pedianum in Orat. Cic. pro C. Cornelio, legimus, ſimulachra effigiesq; hominum è fœno fuiſſe facta, quibus objectis ad ſpectaculum præbendum, tauri irritabantur. Exiſtimo, fœni vocabulo ſcirpum hic eſſe exaudiendum aut ſtramen, ein Stroh-Mänchen. Wie bey uns in der Bähren-Hetze.

CCCXXII. Gramen arundinaceum enode minus ſylvaticum. C. B. Pin. 7. Juncus λυχνάνθεμος tenuis major, Thal. p. 60. Scirpi alterum genus. Trag. Seb. in Trag. deutſch fol. 542. kleine Schmel. Klein Waldrohr-Graß ohne Knoten. Corbulæ ac pileoli elegantiſſimi ex hoc ſcirpo parantur. Radiculis eſt albicantibus. Paſſim.

CCCXXIII. Gramen arundinaceum, paniculâ molli ſpadiceâ majus. C. B. Pin. p. 6. Graminis loliacei octavi alia ſpecies. Thal. p. 51. Gramen tomentoſum & aceroſum. Calamogroſtis quorundam, & vulgi gramen plumoſum, Lob. ic. p. 6. Groß Röhr-Graß mit ſeinem weichen braun-rohten Strauß. Quibusd. Schmeel/ſed falsó. Bey dem Dorff Wittenberg.

CCCXXIV. Gramen paluſtre paniculatum altiſſimum. C. B. Pin. 3. Straußtragendes ſehr hohes Waſſer-Riedgraß. Gramen aqvaticum harundinaceum paniculatum. Tab. lib. 1. fol. 653. In foſſis beym Bretter-Kruge.

CCCXXV. *Gramen arundinaceum foliis acutiſſimis paniculâ multiplici, Cyperi facie, Joh. Lœſ. Vielſtraußiges ſcharffes Cyperähriges Rohr-Graß. In locis udis.

CCCXXVI. *Gramen arundinaceum paniceum diviſâ paniculâ. Joh. Lœſ. Radice eſt lignoſâ, fibroſâ & albicante, " ex quâ culmi tricubitales, rotundi, concavi, ac geniculati, "

explan-

„explantantur, folia acuta & lata veluti per tubulos transe-
„untes, ac in summo paniculam subflavescentem, eamq; di-
„visam sustinentes. Ubi defloruit, semina fert exigua, fol-
„liculis inclusa suis, oblonga, splendentia, spadicei ferè co-
„loris, & qvidem mense Julio. Am Thamm beym Bret-
ter-Kruge zu.

CCCXXVII. Gramen paniceum spicâ simplici. Ely-
magrostis. C. B. Pin. 8. Hirsegraß mit schlechten Aehren.
Panici effigie gramen simplici spicâ, Lob. ic. p. 13. Gra-
men paniceum 1. Tab. lib. 1. fol. 663. Panicastrella, Cæs.
Lib. 4. c. 58. p. 185. Lolium 6. & Miliaria herba Plinii, Trag.
Seb. in Trag. deutsch. 531. Fenich-Graß das 1. Tab. Se-
men avibus grata esca. In der hollen Grund. It. beym
Kruge in der Sarkau.

CCCXXVIII. Gramen paniceum spicâ aristis longis
armatâ. C. B. Pin. p. 8. Hirsegraß mit langspitzigen Aeh-
ren. Gramen paniceum secundum Tab. lib. 1. fol. 663.
Panici effigie gramen aristis circumvallatum. Lob. ic. p. 14.
Fenchgraß das 2. Tab. In der hollen Grund. It. circa
vias nach dem alten Hammer zu. Nudum sæpè aristis con-
spicitur, ætatis tractu iis deciduis factis, & tum facilè pro
panico herbariorum sylvestri Lob. agnoscitur.

CCCXXIX. Gramen marinum spicâ secalinâ. Joh.
Lœs. Meergraß mit Korn-Aehren. Gramen hoc culmo ac
radice secali assimilatur, spicâ tamen est grandiore, in quâ
exusta visuntur granula oblonga, nigricantia. Circa littus
maris bey S. Albrecht. It. Bey Sarkau copiosè.

CCCXXX. Gramen latifolium spicâ triticeâ di-
vulsâ, 54. in Prodr. C. B. Pin. 18. * Breitblätterig Graß
mit zertheilten Weitzen-Aehren. Sparsim.

CCCXXXI.

CCCXXXI. Gramen loliaceum ſpicâ longiore. C. B. Pin. p. 9. Lolium & triticum temulentum, Lob. ic. p. 35. Frumentum fatuum Lon. deutſch fol. 287. Lolium. Ruell. fol. 325. Cord. in Dioſ. fol. 43. Tab. lib. 1. fol. 675. Matth. deutſch fol. 127. Cæſ. lib. 4. c. 49. fol. 179. Dod. Lateiniſch. fol. 538. Lülch oder Dort. Tab. Taubkorn Lon. Unkraut/ Dorten Matth. Dreſpe Saxonibus & Noſtratibus. Zwalch-Weitzen/ Lolch und Durt quibusd. Inter ſegetes paſſim.

CCCXXXII. Gramen montanum avenaceum ſpicatum. C. B. Pin. p. 10. Geährtes Haber-Berg-Graß. Gramen ſylvaticum ſecundum, Tab. lib. 1. fol. 661. Gramen montanum ſpicatum. Cluſ. hiſt. lib. 6. fol. 219. Wald-Graß dasander/ Tab. In monte Apollinis zu Qvednau. It. im Penartſchen Walde.

CCCXXXIII. Gloſſularia multiplici acino ſive non ſpinoſa hortenſis rubra, ſive Ribes officinarum. C. B. Pin. 455. Ribes Arabum Lob. ic. p. 202. o. Ribes rubra Adv. Lob. f. 445. Ribes Fuchſ. fol. 663. Tab. lib. 3. fol. 784. Lon. deutſch fol. 63. Ribes vulgaris Matth. deutſch 54. Ribeſium fructu rubro, Eyſtett. Ribes hortenſe, Trag. Seb. in Trag. deutſch fol. 708. Ceanothus levis, Geſn. hort. fol. 252. Ribes vulgò Cæſ. lib. 3. c. 12. pag. 99. S. Johannis Beerlein Fuchs. S. Johannis Traublein Tab. Matth. Seb. in Trag. Zahme S. Johannis Traublein. Lon. In der Hollen-Grund in umbroſis, item auff dem Lentzkenberg hinter Brandenburg.

CCCXXXIV. Groſſularia non ſpinoſa fructu nigro C. B. Pin. fol. 455. Ribes vulgaris nigro fructu Cluſ. hiſt. lib. 1. fol. 120. Ribes ſylv. Trag. Seb. in Trag. deutſch f. 780. Ribes ſylveſtris Thal. p. 96. Ribeſium fructu nigro, Dod. Niederländiſch. fol. 1172. Ribes nigra, Adv. Lob. fol. 445. Lob. ic. p. 202. o. Tab. lib. 3. fol. 784. Ribes baccis nigris

Cam. hort. p. 141. Amomum falsum & Pseudoamomum, Gesn. Hort. fol. 246. Ribes fructu nigro, Eystett. Schwartze Johannis Träublein. Tab. Gicht-Beeren und Bocks-Beeren Nostratibus. Zu Schwanis am Mühl-Fluß copiosè. It. in der Hollen-Grund.

CCCXXXV. Grossularia sylvestris rubra. C. B. Pin. 455. Ribes sylv. Cam. hort. p. 141. Ribes sylv. Matth. Bauh. in Matth. fol. 151. Lon. deutsch. fol. 63. Ceanothi levis genus sylv. Gesn. hort. fol. 252. Wilde S. Johannis Träublein Lon. Helvetiis Reoz-Beer. Wilde Corinthen Nostratibus. Hinter Latten-Walde in montibus passim. Foliis provenit oxyacanthæ ferè, pronâ parte hirsutis, supinâ lævibus, solidis & crassiusculis: Qvatuor vel quinq; baccæ utplurimùm uni pediculo assistunt, acinis duobus, vel tribus instructæ. Degustatæ baccæ dulci sunt sapore, ac viscidam humiditatem obtinent. Tussi mederi creduntur.

CCCXXXVI. Hedera helix, Matth. deutsch fol. 245. Brunf. Lateinisch tom. 2. fol. 7. & 8. Fuchs. fol. 423. Lon. deutsch fol. 235. Cæs. lib. 3. c. 5. p. 93. Tab. lib. 2. fol. 567. Dod. Lateinisch fol. 413. Cam. hort. p. 71. Helix sive provoluta sterilis Hederæ Lob. ic. p. 614. Hederæ species tertia, Helix vocata Thal. p. 57. Hederæ arboreæ sylvestre genus. Gesn. hort. 261. Hedera major sterilis. C. B. Pin. p. 305. kleiner Epheu Matth. Tab. kleiner Wald-Epheu / Lon. Baum-Epheu / Brunf. deutsch. Yloff / Nostratibus. Siccat, calefacit & nonnihil adstringit. Succum in affectibus oculorum vulgus commendat. Im Morungschen Walde / hinter dem Mohrung / lacus est, copiosè in umbrosis. It. im Bruchwalde bey Brandenburg.

CCCXXXVII. Hedera terrestris, Brunf. tom. 1. fol. 167. Tab. lib. 2. fol. 568. Cæs. lib. 2. cap. 36. p. 452. Dod. Lateinisch.

teinisch fol. 394. Matth. Bauh. in Matth. fol. 467. Hedera terrestris herbariis communiter appellata, Thal. 57. Hedera terrestris vulgaris, C. B. Pin. p. 306. Humilis hedera, Hederula, sive Chamæcissus Adv. Lob. 268. Humilis Hedera, Chamæcissus, corona terræ, terrestris hedera, Lob. ic. 613. sive Chamæcissos, seu hedera terrestris, Trag. Kyb. in Trag. 799. Chamæcissus vulgaris Hort. Cam. p. 38. Chamæcissus Fuchs. fol. 876. Chamælema, Cord. hist. fol. 160. Gundelräb/ Tab. Fuchs. Gundelräb/ oder Erd-Epheu. Matth. Gundreb oder Gundelreb/ Kyb. in Trag. Udram Nostratibus. Passim in arenosis bey Königsb. Floret Mense Majo. Foliis aliqv. tubercula adnascuntur. Hedera terrestris cum pauxillo vini contusa, succo eqvorum oculis manè & vesperi immisso albuginem certò tollit, affirmantibus hyppocamis.

CCCXXXVIII. Helenium vulgare C. B. Pin. p. 176. Helenium Matth. Bauh. in Matth. fol. 72. Cord. in Diosc. fol. 10. Gesn. hort. fol. 261. Eystett. Tab. lib. 2. fol. 264. Dod. Lateinisch f. 344. Cam. hort. p. 71. Helenion, Adv. Lob. fol. 246. Helenium & Inula, Angvillaræ Panax chironium, Lob. ic. 574. Enula campana, Brunf. tom. 3. fol. 100. Enula, Lon. deutsch fol. 161. Cæs. lib. 12. c. 34. p. 499. Elenion Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 137. Alantwurtz Tab. Alant oder Alant-Kraut/ Lon. Alantwurtzel/ Sebiz in Trag. Calefacit, aperit, attenuat. Fern. 5. M. m. Extra hortos ad sepes zu Neuhausen.

CCCXXXIX. Helleborine latifolia montana C. B. Pin. p. 186. Breit-blätterige Berg-Niesewurtz mit braunner Blüth. Helloborine, sive Epipactis recentiorum. Lob. ic. 312. Elleborine recentiorum secunda, Clus. hist. lib. 2. fol. 272. Helleborine, Dod. Lateinisch fol. 384. Hellebo rine 1. Tab. lib. 2. fol. 395. Satyrium octavum Trag. Seb. in

Trag. deutsch fol. 619. Epipactis latifolia, Eystett. Damasonium calliphyllon, Cord. hist. fol. 151. Sigillum S. Mariæ vulgò. Cæs. lib. 10. cap. 49. fol. 431. Wilde Nießwurtz Tab. Folia gustu sunt amaro & ingrato. Hinter der Sarkau im Gebirg.

CCCXL. Helleborine latifolia montana flore albo. Joh. Lœs. Wilde breitblätterige weiße Berg-Nieße-Wurtz. Foliis cum priori convenit. Hinter Osterod am Berge.

CCCXLI. Helleborine montana angustifolia purpurascens. C. B. Pin. 187. Schmalblätterige Purpurbraune Berg Niese-Wurtz. Helleborine angustifolia, Tab. lib. 2. fol. 396. Damasonium tenui- folium Cord. hist. fol. 151. Alisma tenuifolium, Thal. p. 13. Elleborine qvinta Clus. Pan. p. 275: Elleborine recentiorum sexta, Clus. hist. lib. 2. f. 273. Sigillum S. Mariæ tertium, Cæs. lib. 10. c. 49. p. 431. Wild schmalblätterig Niese-Wurtz/Tab. Hinter Osterrod am Berge.

CCCXLII. Helleborine angustifolia pratensis ex albo purpurascens. Joh. Lœs. Schmalblättrige Wiesen-Niese-Wurtz mit weiß-brauner Blüth. In pratis in der Hollen-Grund und hinter der neuen Bleich.

CCCXLIII. Hieracium foliis & facie Chondrillæ, Lob ic. p. 239. Habicht-Kraut mit Wegwart-Blättern/ Hieracium foliis & facie chondrillæ Lobelii, Cam. hort. p. 75. Hieracium chondrillæ folio hirsutum, C. B. Pin. p. 127. Hieracium secundum, Tab. lib. 1. fol. 607. Klein Habicht-Kraut/ Tab. Lævius est nostrum, infimis foliis maximè laciniatis, supremis integris corniculis duobus caulem amplectentibus. Am Kneiphöffschen Wall passim.

CCCXLIV. Hieracium Chondrillæ folio glabrum, C. B. Pin. p. 127. Unrauhes Habicht-Kraut mit Wegbreit Blät-

Blättern. Hieracium Aphacoides, Tab. ic. p. 182. Habicht-Kraut. Tab. In ſabulis paſſim bey Königsb.

CCCXLV. Hieracium phlomoides, Tab. ic. p. 184. Hieracium alpinum latifolium hirſutie incanum flore magno, C. B. Pin. 128. Hieracium latifolium Pannonicum, Cam. hort. p. 75. Hieracium primum latifolium, Cluſ. Pann. pag. 640. Cluſ. Hiſt. lib. 5. fol. 139. Wullhabichtkraut. Tab. Rauhes Habicht-Kraut mit breiten Blättern und groſſer Blüth. Foliis eſt modò ſinuatis, modò laciniatis, lividis aliquando maculis inſignitis, aliquando etiam minus hirſutis. Plura quoq; folia habet, ac in icone viſuntur apud Cluſ. & Tab. Zu Qvednau in monte Apollinis.

CCCXLVI. Hieracium montanum latifolium non ſinuatum, Joh. Lœſ. Berg-Habichts-Kraut mit breiten unzerſchnittenen Blättern. Radix exilis, nigra, filamentis comitata flavis, folia proximè terram alit; modò plura, modò pauciora, qvincunciali fermè altitudine, ſecunciali latitudine, viridia, aſpera, obtuſiùs acuminata, è quorum medio caulis rectà aſſurgit cubitalis, ſingularis, rotundus, ſtriatus, viridis, aphyllocavlos, & aſper, cujus faſtigium luteoli flores, ſinguli petiolis brevibus, incumbentes, agminatim exornant, ætatis tractu in lanugines, per aëra volitantes, tranſeuntes. Bey Gerdauen am Berge nach dem alten Hoffe zu.

CCCXLVII. Hieracium montanum hirſutum ramoſum, Joh. Lœſ. äſtiges Berg-Habicht-Kraut mit rauhen Blättern. Cubitale & longius eſt ſæpè, radice albicante, villis inſtructa: caule rotundo, ſtriato, hirſutie aſpero, ac ramoſo: foliis viridibus, hirtis, alternis thyrſum amplexantibus, ex lato in cacumen abeuntibus, & in ambitu parùm ſinuatis: floribus luteis, cacumina caulium petiolis longis occupan-

cupantibus, quibus pappoſa ſuccedit lanugo, hiante calycé avolans. Formam refert hieracii montani latifolii minoris, Tab. l. 1. f. 610. Hirſutiem aſperam ei ſi demas. In der Hollen-Grund.

CCCXLVIII. Hieracium montanum latifolium glabrum minus C. B. Pin. 129. Hieracium montanum latifolium minus. Tab. lib. 1. fol. 610. klein Berg-Habicht Kraut mit breiten Unraugen Blättern. Tab. In der Hollen-Grund.

CCCXLIX. Hieracium alterum grandius Lob. ic. p. 240. Groß-ſtaudiges Habicht-Kraut mit ſchmalen Blättern. Hieracium montanum anguſtifolium primum Tab. lib. 1. fol. 610. Hieracium alterum grandius Lobelii, Cam. hort. pag. 75. Hieracium fruticoſum anguſtifolium majus. C. B. Pin. p. 129. Hieracium primum, Dod. Lateiniſch fol. 638. Hieracium Sabaudum, Obſ. Lob. fol. 124. Hieracium majus anguſtifolium, vel tertium, Cluſ. Pann. 642. Hieracii tertii genus alterum anguſtifolium. Cluſ. hiſt. lib. 5. fol. 141. Berg-Habicht-Kraut mit ſchmalen Blättern/ Tab.

Refrigerant Hieracia, ſiccant cum adſtrictione, aperiunt, abſtergunt, ac mundant. Succus in caligine oculorum perutilis, melli ac vino edentulo miſtus & inſtillatus, Tab. In der Hollen-Grund. It. in monte Apollinis zu Qvednau.

CCCL. Hieracium dentis leonis folio monoclonon. C. B. Pin. 127. Habicht-Kraut mit Pfaffenröhrleins-Blättern. Hieracium intybaçeum Tab. ic. p. 183. Wegwarten-Habicht-Kraut Tab. Subaſpera eſt planta, thyrſulo ſæpé uno, nonnunquam pluribus, ex radice aſſurgentibus, rariſſimè brachiatis. Folia etiam nunc magis, nunc minùs ſunt inciſa. Bey Lauten-Mühl inter fruticeta.

CCCLI. Hieracium foliis oblongis in ambitu aculeatis monoclonon Joh. Lœſ. Habicht-Kraut mit langlächten

und

und am Rande stachlichten Blättern. Joh. Læs. Einstänglicht stachlichtes Habicht-Kraut mit länglächtigen Blättern. Hieracium hoc ex supellectili herbariâ D. D. Halbachii obtinuit Lœselius, ipsi nunquam visum, repertum fuit in fruticeto beym Spittel-Hoffe / floruit Julio.

CCCLII. Holosteo affinis, cauda muris, C. B. Pin. 190. Cauda murina, Dod. Lat. fol. 112. Cauda muris, Tab. lib. 1. fol. 679. Adv. Lob. fol. 187. Myosuros, cauda muris, Lob. ic. p. 440. Myosuron, quorundam Holostium, Thal. p. 79. Holostium Loniceri, Cam. hort. p. 75. Coronopus sylv. Trag. Seb. in Trag. deutsch 76. Holosteon, Lon. deutsch fol. 210. Mäus-Schwäntzlein Tab. Hunds-Graß oder Hunds-Zahn Lon. Wild Rappenfußlein Seb. in Trag. Tausent-Krohn / Adv. Lob. Mäuß-Graß / und Mäuse-Zäglein vulgò. Am Kneiphöfischen Wall passim.

CCCLIII. Hyoscyamus albus. Matth. deutsch 460. Lob. ic. p. 269. Observ. Lob. 139. Dod. Lat. fol. 451. Lon. deutsch fol. 115. Eystett. Gesn. hort. fol. 262. Cam. hort. pag. 77. Hyoscyamus candidus, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 107. Apollinaris tertia, Cord. in Diosc. fol. 66. Hyoscyami alterum genus in maritimis, Cæs. lib. 8. c. 45. p. 345. Hyoscyamus secundus, Tab. lib. 2. fol. 278. weiß Bilsen. Seb. in Trag. Bilsen-Kraut / Tab. weiß Bilsen. Lon. weiß Bilsen-Kraut Matth. Bilsen / Sawbon / Doll-Kraut / Schlaff-Kraut / Rinds-Wurtzel und Zigeuner-Kraut / vulgò. Auff der Kneiphöffschen Klapper-Wiese & circa pagos in incultis passim. Succus hyoscyami illitu aliqvantisper continuato albuginem emaculat. Aëtius tetrabibl. 2. serm. 3. c. 40.

CCCLIV. Hypericum Brunf. tom. 3. fol. 81. Matth. Bauh. in Matth. fol. 667. Lob. ic. p. 398. Adv. Lob. fol. 172.

Obser.

Obſerv. Lob. 216. Fuchſ. fol. 831. Eyſtett. Dod. Lateiniſch f. 76. Tab. lib. 2. fol. 536. Cæſ. lib. 9. c. 41. p. 394. Lon. deutſch fol. 158. Cam. hort. p. 77. Hypericum vulgare C. B. Pin. pag. 279. Aſcyron. Cord. in Dioſc. f. 61. Hypericum vulgare, & herba perforata, Trag. Seb. in Trag. deutſch f. 56. S. Joh. Kraut Tab. Lon. Fuchſ. Matth. Gemein Harthau Seb. in Trag. Unſeres Herren Gottes Wunden-Kraut Noſtratibus. In ſabuloſis bey Königsb. paſſim.

Herba hæc, quæ eo nomine fuga Dæmonum ſalutatur, vulgò ſeminis ſuffitu omnem fugat Dæmonem, corpori vel domui appropinqvantem, uti nugigerulus mulierum fabulatur ſexus. De Sexu hoc obiter cape, quod habet Baal Hatturim ad margin. Bibl. Venetor. & Baſil. Gen. 3. v. 20. Decem cabi Confabulationum, inqvit, deſcenderunt in mundum, & novem iſtorum abſtulerunt mulieres. Inde Adam vocavit nomen mulier Chavah, quia (multum) loqvitur.

Hypericum ſub elevatione Poli 45. 46. 47. optimum. Flores colligendi Sole 10. ♋ obſidente. Tota planta legatur Sole 6. ♌ occupante; ſemen, Sole 15. Libræ ingreſſo.

CCCLV. Jacea nigra ſqvamoſo capite major. C. B. Pin. 271. Jacea ſqvamato capite montana prima. Cluſ. hiſt. lib. 4. fol. 6. Jacea Auſtriaca prima, Cluſ. Pann. pag. 542. Groß Schwartz Flocken-Blum mit ſchuppichten Köpffen. Flore eſt purpureo. Vulneraria eſt planta. Hinc â Chirurgis in fracturis & vulneribus conſolidandis extollitur: ſunt, qui eâdem in faucium & tonſillarum tumoribus utuntur. Paſſim in locis ſiccioribus bey Königsb.

CCCLVI. Jacea nigra ſqvamoſo capite, flore albo. Joh. Lœſ. weiß-blühende ſchwartze Flocken-Blum mit ſchuppichten Köpffen. Hinter Germau am Berge. A priore nihil differt, niſi florum colore.

CCCLVII.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0221-0
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0222-6
DFG

CCCLVII. Jacea laciniata sqvamata, C. B. Pin. 271. Jacea sqvamato capite tertia Cretica, Clus. hist. lib. 4. fol. 6. Flocken-Blum mit zerschnittenen Blättern/ und schuppichten Köpffen. Bey Lauten-Mühl, circa vias.

CCCLVIII. Jacea latifolia capite hirsuto. C. B. Pin. 271. Jacea Austriaca secunda, vel Jacea mõtana villoso capite elatior. Clus. Pann. p. 543. Iacea Austriaca villoso capite, sive quarta elatior, Clus. hist. lib. 4. f. 6. & 7. Cyanus sylv. montanus integrifolius, Cyanus sylv. πολυγλωσσόφυλλος, Thal. p. 29. breit-blättrige Flockẽ-Blum mit harichtẽ Köpffẽ. Flore est purpureo; foliis tenuiter crenatis, & thyrsulis subrubentibus. Crenas in suo cyano prorsus abesse tradit Thal. Beym Penartschẽ Walde am Fluß.

CCCLIX. Jacea latifolia capite hirsuto flore albo. Joh. Læs. Weiß-blühende Flocken-Blum mit haarichten Köpffen. Folia cum caulibus dilutè virescens. Hinter der Löbnichtschen Wind-Mühl. Vor dem Sackheimschen Thor.

CCCLX, Jacobea. Dod. Lateinisch. fol. 642. Jacobæa vulgaris laciniata. C. B. Pin. p. 131. Jacobæa vulgaris Clus. hist. lib. 4. fol. 22. S. Jacobs-Blum. Brunf. deutsch fol. 317. Flos S. Jacobi, Trag. Seb. in Trag. deutsch. fol. 228. Lon. deutsch. fol. 128. Herba Jacobæa 1. Tab. lib. 1. fol. 576. Senecio major, sive flos S. Jacobi. Matth. Bauh. in Matth. 794. Jacobæa Senecio, & herba S. Jacobi. Lob. ic. p. 227. Jacobæa Senecio Adv. Lob. fol. 79. Herba S. Jacobi Cæs. lib. 12. c. 37. p. 500. Fuchs. fol. 742. Artemisia polyclonos Dodonæi, sive flos Jacobæus, Thal. 9. S. Jacobs-Blum. Seb. in Trag. Lon. Fuchs. Tab. S. Jacobs-Kraut vulgò. S. Jacobs-Blum/ quibusd. Abstergit & consolidat. In faucium ulceribus gargarrisatu utilis. In agrorum marginibus passim.

CCCLXI. *Jacobæa Barbareæ instar lanciniata Joh. Læs. S. Jacobs-Blum mit Winter-Kreß-Blättern. Foliis “

„ est barbareæ sive Pseudobuniados, per ambitum incisis, & post insigniter laciniatis. Bey dem Zollhause auff der Wiese.

CCCLXII. Iberis Nasturtii folio. C. B. Pin. 97. Iberis Matth. deutsch. fol. 212. Iberis secunda, Tab. lib. 2. fol. 170 Groß Besem Kraut und wilde Kreßen. Tab. Viâ quâ itur nach der neuen Brück in simetis copiosè.

CCCLXIII. Iris pratensis angustifolia humilior, C. B. Pin. 32. Kleine schmall blättrige blaue Wiesen Schwertel. Iris tenuifolia. Cord. hist. fol. 133. Gesn. hort. fol. 263. Xiphion, seu gladiolus cœruleus minor Trag. Seb. in Trag. deutsch. 557. Iridis undecimæ altera species, Clus. Pann. p. 253. Iridis Angustifoliæ secundæ species altera. Clus. Pann. lib. 2. fol. 229. Xyris minor, Cam. hort. p. 183. Kleine blaue Schwertel Seb. in Trag. Bey dem Penartschen Walde ad margines pratorum; It. bey Birckenfelde in pratis nach der Ziegelscheune zu. Iridis flores lupos nominari Philinus scribit apud Athenæum, quod lupi rictui labrisq; similes sint.

CCCLXIV. Juncus palustris major. Trag. Seb. in Trag. deutsch 542. Tab. lib. 1. fol. 695. Juncus maximus, sive scirpus major. C. B. Pin. p. 12. Juncus aqvaticus maximus. Lob. ic. pag. 85. Iuncus holoschœnos. Dod. Lateinisch. fol. 605. Juncus grandis holoschœnos, Cord. in Diosc. fol. 65. & 66. Juncus levis aquaticus maximus. Thal. p. 60. Juncus rotundus tertius. Cæs. lib. 4. c. 60. p. 188. Groß weicher Bintzen. Seb. in Trag. Tab.

Accolæ lacûs Curlandici elychnia sua ac redimicula pileorum parant ex medullâ. Aliàs ex junco sellarum fiunt sedes, ac storeæ. Im Pregel nach Jerusalem zu copiosè. It. im frischen und Curischen Haff passim.

CCCLXV. Juncus floridus major. C. B. Pin. 13.

Blü-

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0225-3
DFG



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0226-9
DFG

Blühende Waßer-Binsen. Juncus floridus, Matth. Bauh. in Matth. fol. 731. Juncus Cyperinus floridus. Tab. lib. 1. f. 696. Calamogrostis secunda, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 537. Gladiolus palustris. Cord. hist. fol. 124. Gladiolus aquatilis. Dod. Lateinisch. fol. 601. Juncus cyperoides paludosus. Eystett. Juncus cyperoides floridus paludosus. Lob. ic. p. 86. Adv. Lob. 44. Butomus, Cæs. lib. 14. c. 17. p. 553. Cyper-Schwertel. Tab. Bintzen-Schwertel quibusd. Flore quandoq; conspicitur candido. In palustribus passim bey Königsberg.

CCCLXVI. Juncus lævis paniculâ non sparsâ, C. B. Pin. p. 12. glatte Waßer-Binsen. Juncus Matth. deutsch. fol. 445. Juncus palustris minor, Tab. lib. 1. fol. 695. An juncus rotundus primus? Cæs. lib. 4. c. 60. p. 188. Juncus lævis glomerato flore, Lob. ic. p. 84. klein Waßer-Bintzen/ Tab. Bintzen Matth. klein Weyher/ oder Wasser-Bintzen/ vulgò. Passim in uliginosis.

CCCLXVII. *Juncellus cyperoides capitulo simplici. Ioh. Læs. Schlechtköpffigte kleine Cyper-Bintzen. In pratis nach dem Breter-Kruge zu passim.

CCCLXVIII. Juniperus fruticosa baccifera. Juniperus vulgaris fruticosa C. B. Pin. 488. Juniperus vulgaris, Trag. Seb. in Trag. deutsch 850. Juniperus vulgatior. Adv. Lob. 448. Juniperus. Brunf. tom. 3. fol. 182. Lob. ic. p. 222. o. Dod. Lateinisch. fol. 852. Matth. Bauh. in Matth. f. 118. Lon. deutsch. fol. 40. Juniperus, & juniperus baccifera, Tab. lib. 3. fol. 650. Juniperus minor, Cord. in Diosc. 17. Fuchs. fol. 78. Juniperi primum genus, Cæs. lib. 3. c. 58. p. 136. Juniperus humilis, Gesn. hort. f. 263. Juniperus nostras, Cam. hort. p. 81. Weckholder-Baum/ Matth. Lon. Seb. in Trag. Weckholder Tab. Brunf. Fuchs. Wacholder oder Wacholder-Baum

und Kranot-Baum vulgò. Helvetiis Rechholder/ fortè quasi Reuchholder à suffitu. Cord. in Dios. Nostratibus Kattick. Calfacit & siccat. Baccæ venenis resistunt, crassos & glutinosos humores tenuant, renes detergunt, & urinam mensesque pellunt. Pota vitiis thoracis, tussibus, inflammationibus, & torminibus auxiliantur. Lacryma Arabum est Sandaracha, officinarum vernix. In hæmoptoë, dysenteriâ, diarrhæâ, mensium ac hæmorrhoidum fluxu salutaris. Bey Brandenburg und Königsberg inter ericeta copiosissimè.

CCCLXIX. Juniperus vulgaris arbor. C. B. Pin. 488. Juniperus vulgaris celsior & arborescens. Clus. hist. 1. fol. 38. Clus. Hispan. p. 101. In districtu Insterburgicò, zu Cumetschen. Juniperus quondam annosa & vegeta visa fuit, cujus caudicis perimeter cubitorum ferè trium, altitudo sedecim cubitorum. Tres ejus rami cubitalis fuerunt crassitudinis. Baccifera exstitit adolescens, pòst ad senium devergens, spatio jam qvinqvaginta annorum, nullas ampliùs genuit baccas, attestante hoc cernuo ac decrepito quodam Sene. Gummi adhæc copiosum fudit antehinc, tunc nullum. Nascitur ibidem & alia, cubitum, & quod excedit, crassa, baccas ferens non rotundas, sed oblongas, prorsum similes iis, quas frutex juniperus excludit. Ætate fertur viginti annorum, & necdum gummifera est.

CCCLXX. Kali folio gramineo semine pastinacæ. Joh. Loes. Meerstachel-Kraut mit Pasternack Saamen. Radix oblonga, lignosa, alba, pauculis fibris, gustu modicè acris, caulem edit virescentem, cubitalem & minorem sæpè, incurvum, in plures ramos, inordinatè dispositos brachiatum, quos folia longiuscula, subhirsuta, aculeata nonnihil, ac pallidè virescentia alternatim excipiunt: Flos ex duobus foliolis nanis & candidis, Julio erumpentibus, constituitur, cui semen succedit

dit latiusculum, subnigricans, insipidum ferè, pastinacæ effigie, cauli adhærens & folio suffultum. Bey der Pillau/ und Sarckau in locis arenosis passim. An Kali sit gramineo folio C. B. quod. 2. in Prod. p. 133. subdubito.

CCCLXXI. Kali spinoso affinis C. B. Pin. p. 289. Tragum Matth. Bauh. in Matth. fol. 731. Tragon. Tab. lib. 2. fol. 377. Tragus Lon. deutsch/ fol. 93. Tragon Matth. Lob. ic. p. 797. Meerstachel-Kraut Tab. Bocks-Kraut Lon. Untreu- und Scorpion-Kraut quibusd. Bey Germau und Pillau in littore maris passim.

CCCLXXII. Lamium purpureum & album non fœtens folio oblongo, C. B. Pin. 231. Lamium sive archangelica flore albo. Lob. ic. p. 520. Adv. Lob. fol. 223. Galeopsis Matthioli seu urtica vulgaris mortua. Thal. 55. Urtica labeo fœmina. Brunf. Lateinisch Tom. 1. fol. 155. Galeopsis vera Dioscoridis, Clus. hist. lib. 4. fol. 35. Galiopsis, Matth. Bauhin Matth. fol. 791. Lamium album & purpureum, Tab. lib. 2. fol. 237. Urtica iners, sive Lamium primum, Dod. Lat. f. 153. Todte Neßeln mit weissen und blauen Blumen/ Tab. Taube oder todte Neßeln Matth. Am Kneiphöffschen Wall passim. It. secùs vias hinter der Kneiphöffschen Wind-Mühl.

CCCLXXIII. Lamium purpureum fœtidum, folio subrotundo, sive Galeopsis Dioscoridis, C. B. Pin. p. 230. Urtica non mordax vulgaris, fœtens, purpurea, Lob. ic. pag. 520. Galiopsis vulgaris fœtens purpurea, Adv. Lob. fol. 222. Urtica iners altera. Dod. Lateinisch fol. 153. Galeopsis, Cæs. lib. 8. c. 48. f. 349. Galeopsis, Cord. in Diosc. fol. 69. Lon. deutsch fol. 138. Galiopsis secunda Tab. lib. 2. f. 238. Lamium Trag. (vel urtica 8. 9. 10.) Sebitz. in Trag. deutsch fol. 3. Urtica mortua Gesn. hort. fol. 287. Taub/ oder todt Nessel Tab.

Binßauge/ Lon. Stinckende und braune Wald-Nessel/ vulgò. Am Kneiphöffschen Wall & alibi passim.

CCCLXXIV. Lamium folio oblongo luteum, C. B. Pin. 231. Lamium luteum, Lob. ic. p. 521. Adv. Lob. fol. 223. Tab. lib. 1. fol. 237. Galiopsis flore croceo, vel urtica sexta, Trag. Kyber. in Trag. p. 5. Galeopsis flore luteo, vel urtica tabea Cam. hort. p. 63. Urtica iners tertia, sive lamium luteo flore, Dod. Lateinisch 153. Leucas montana, Cæs. lib. II. c. 31. p. 450. Taube oder todte Nessel mit geelen Blumen. Geele taub/ oder todte Neßeln/ Tab.

Efficacissimum alia inter, quasvis durities, carcinomata, & strumas discutit, tumentes hæmorrhoides, imposito succo aperit, & sangvinem congestum educit, thymum circa sedem curat. Bey dem alten Hammer/ und Löbnichtschen Walde in umbrosis passim.

CCCLXXV. Lamium maximum sylvaticum fœtidum C. B. Pin. p. 231. Große stinckende taube Wald-Neßel. Urtica Herculea, Tab. ic. p. 536. Galeopsis legitima, vel vera Diosc. Clus. hist. lib. 4. fol. 35. & 36. Heraclea vel urtica undecima, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 4. Urtica fœtida maxima porphyranthemos Thal. p. 132. Wald-Neßel. Lon. deutsch fol. 139. Wald-Neßel Seb. in Trag. Tab. Hirsuta est planta, quæ hirsuties apud Tab. & Trag. à sculptore expressa non est, apud Clusium verò elegantissimè. Im Penartschen Walde/ und in der Hollen-Grund passim.

CCCLXXVI. Lamium folio caulem ambiente minus. C. B. Pin. p. 231. kleine taube Neßel/ deßen Blätter umb den Stengel herumb gehen. Morsus Gallinæ folio Hederulæ alterum, Lob. ic. p. 463. Leucas quarta, Cæs. lib. II. c. 31. p.

31. p. 456. Hüner Biß mit Gundelreb-Blättern. Inter segetes und am Kneiphöfischen Wall passim.

CCCLXXVII. Lapathum aqvaticum folio cubitali. C. B. Pin. p. 116. Waßer Grindwurtz/ deßen Blätter eine Ell lang. Hydrolapathum magnum, sive aqvaticum, Adv. Lob. 117. Hydrolapathum magnum, Lob. ic. p. 285. Rumex palustris, Trag. Seb. in Trag. deutsch. 249. Lapathum sativum, Dod. Lateinisch fol. 648. Lapathum palustre, Tab. lib. 2. fol. 147. Hippolapathum, Gesn. hort. fol. 263. Lon. deutsch fol. 119. Rumicis quintum genus, Cord. in Diosc. fol. 44. Hippolapathum sylvestre Matth. Bauh. in Matth. 354. Hippolapathum sylvestre, Hydrolapathum Thal. p. 57. Weyerampffer/ Tab. Waßerampffer oder Roßampffer, Lon. In aqvosis & uliginosis passim bey Königsberg.

CCCLXXVIII. Lapathum aqvaticum minus. C. B. Pin. 116. Klein Waßer-Grindwurtz/ Hydrolapathum minus Lob. ic. 286. Tab. lib. 2. fol. 147. Klein Weyerampffer/ Tab. Bey Pokeiten am frischen Hafe. It. auff der Altstätschen Klapper-Wiese nach dem Baum zu.

CCCLXXIX. Lapathum folio subrotundo. C. B. Pin. p. 115. Lapathum folio minus acuto. Lob. ic. p. 285. Lapathum folio retuso. Adv. Lob. 117. Hippolapathum sylv. Tab. lib. 2. fol. 146. Rumex agrestis, Cord. in Diosc. fol. 44. Grindwurtz mit hohen rundlechten Blättern/ wilde Mengolwurtz/ Tab. Hasenampffer/ Gaßenwurtz/ Butterampffer und Butterlachtig. Cord. in Diosc. Streiffwurtz/ wilder Mangold/ vulgò. Folia alvum lubricant, semina sistunt. Passim in incultis.

CCCLXXX. Lapathum folio acuto crispo. C. B. Pin. 115. Grindwurtz mit spitzen krausen Blättern. Lapathum

thum acutum crispum. Tab. lib. 2. fol. 147. krause spitze Mengolwurtz/ Tab. Passim bey Königsberg.

CCCLXXXI. Lapathum unctuosum C. B. Pin. 115. Stoltzer Heinrich/ Guttheinrich/ Brunf. deutsch fol. 75. Bonus Henricus. Matth. Bauh. in Matth. fol. 449. Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 250. Tab. lib. 2. fol. 134. Tota bona sive bonus Henricus, Lob. ic. 256. Tota bona, Dod. Lat. fol. 651. Rumicis tertium genus, Fuchs. fol. 463. Tota bona, spinaciæ facie, Adv. Lob. fol. 97. Tota bona Dodonæi. 1. Thal. p. 128. Guter Henrich oder Schmerbel/ Tab. Schmerbel Seb. in Trag. Gut oder Stoltz Henrich vulgò. In pagis passim.

CCCLXXXII. Lappa major purpurea. Joh. Lœs. Lappa major, Arcium Dioscoridis, C. B. Pin. 198. Lappa major, Trag. Kyb. in Trag. p. 837. Brunf. Lat. tom. 3. fol. 54. Cæs. lib. 3. c. 50. p. 536. Bardana, sive Lappa major, Dod. Lateinisch fol. 38. Personata, Lappa major, Bardana, Lob. ic. p. 588. Adv. Lob. fol. 253. Personatia, Lappa major, Bardana. Matth. deutsch 506. Personata, Lon. deutsch fol. 97. Personatia Fuchs. fol. 72. Arctium, Personata, Lappa major, Thal. p. 13. Arcion, Cord. in Diosc. fol. 198. Große Klett mit Purpurfarben Bluhmen/ Grosse Kletten/ Matth. Fuchs. Roß-Kletten / Kyber in Trag. Lon. Brunf. Butzen-Kletten/ und grosse Kletten/ Cord. in Diosc.

Caulibus est rubentibus nonnihil, foliis ex atro-virentibus. Radice ac semine urinas pellit, renes infarctu liberat, arenulas calculosq; excutit. Phthisicos quoque & hæmoptoicos juvat radix. Ejus medullacea pars, antequam caulescit, edulis est, ac verno tempore delicatissima inter acetaria habetur.

Lappa major in laqveari domûs suspensa credulo vulgo tonitrua avertit. Rustici siccatâ, linteamine sive obducto involutâ & in-

incensâ lappâ, festivitatis nuptialis tempore, saliarem in modum, ubi horsum vorsum cursitant, tædarum locô utuntur. In arenosis passim bey Königsb. Soleatæ mulieres, quæ ab utero sæpe præfocantur, folia Bardanæ tibialibus suis immittunt, eademque pedibus conculcant, remedium adversùs hystericam passionem inculpatum experturæ. Vertici capitis admota folia malum accelerant: Lappæ majoris radices porrigunt hippiatri equis vermiculantibus. Observabile quid est, Augustæ Vindelicorum aliquando in corde equi, celerrimè extincti, vermem fuisse repertum dodrantalem, fili bombycini crassitudine, albicantem, & in gyros variè se torquentem.

CCCLXXXIII. Lappa major candida Joh. Lœs. Große Klette mit weißen Blumen. Hæc caulibus & foliis est viridibus, floribus candidis, cætera priori similis.

Ejus semine communiter utuntur mulieres, ab utero præfocatæ, loco seminis cumini. Am Wege nach dem Dorff Laffsken.

CCCLXXXIV. Lappa minor, Xanthium Dioscoridis, C.B. Pin. 198. Xanthium, Matth. Bauh. in Matth. fol. 834. Fuchs. fol. 579. Cord. in Diosc. fol. 72. Cord. hist. fol. 159. Dod. Lat. 39. Gesn. hort. fol. 287. Cæs. lib. 8. c. 3. p. 319. Lon. deutsch 98. Lappa minor, Trag. Kyber. in Trag. fol. 839. Tab. lib. 2. fol. 448. klein Kletten/ Brunf. deutsch. fol. 233. Hieron. Bock. fol. 317. Xanthium, sive strumaria Lob. ic. p. 588. Adv. Lob. fol. 254. Xanthion seu Lappa minor, Thal. 133. kleine Klette. Tab. Lon. kleine Kletten/ Bettlerläuse/ Matth. Bubenläuse/ Igelsläuß/ und Igels-Kletten vulgò. Radix & semen strumas ac tumores discu-

tiunt. Fructus flavedinem inducit crinibus. In simetis nach der neuen Brücken zu.

CCCLXXXV. Lathyrus latifolius C. B. Pin. 344. Clymenum, Matth. Bauhin. in Matth. fol. 690. Lathyrus sylv. major, seu purpureus, Thal. 74. Lathyrus sylv. latifolius. Cam. hort. 84. Clymenum Matthioli, Clus. Pann. p. 742. Cicercula Sylvestris Tab. lib. 2. fol. 202. Lathyris latiore foliô. Lob. ic. p. 68. o. Lathyris Narbonensis latiore foliô, Adv. Lob. 398. Observ. 517. Ervilium, Cæs. lib. 6. c. 6. p. 233. wilde Küchern Tab. In der Hollen-Grund passim.

CCCLXXXVI. *Lathyrus angustifolius radice tuberosâ. Joh. Læs. Wilde schmalblättrige Küchern. Beym Altstätschen Gericht.

CCCLXXXVII. Lathyrus sylv. luteus foliis viciæ. C. B. Pin. 344. Vicia Tab. lib. 2. fol. 207. An Aracus flore luteo, Adv. Lob. fol. 398. Lathyrus sylvestris floribus luteis, Thal. 74. Glandibus terrestribus congener flore luteo, Clus. Pann. 744. Legumen terræ glandibus simile, Dod. Lateinisch. fol. 550. Geel Wicken Tab. In rubetis & dumetis passim.

CCCLXXXVIII. Laureola folio deciduo flore purpureo. Officinis laureola fœmina, C. B. Pin. 462. Chamælæa, sive Mezereon, Trag. Seb. in Trag. deutsch. fol. 751. Laurus pusilla, Lob. ic. p. 367. Daphnodes flore purpureô, Tab. lib. 3. fol. 776. Daphnodes Fuchs. fol. 227. Piper montanum, Gesn. hort. fol. 272. Thymelæa, Cord. in Dioſc. fol. 75. Chamelæa Germanica Dod. Lateinisch 364. Cam. hort. p. 39. Chamelæa Germanica seu nostras, Thal. 35. Chamædaphne, sive pusilla laurus, Adv. Lob. fol. 155.

Kel-

No. 37 ad pag. 138.

Lathyrus angustifolius radice tuberosâ.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0235-9
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0236-4
DFG

Kellershalß Tab. Seidelbast oder Läusekraut Seb. in Trag. Zeiland/ Fuchs. Scheißlorbeeren Matth. Wolffsbast aliis. Autore Traog graviter spirat totâ substantiâ, demptô flore, qui jucundi est odoris. Folia, flores, cortex, & grana gustata, fauces & guttur acriùs vellicant.

Fructus hujus Laureolæ Coccognidium est officinarum, quod à Belgis redimunt nostrates. Rusticos & Polyphæmos fortiter & cum dysphoriâ purgat granorum quindecim dosi. Hinter Morungen im Walde. It. Zu Neuhausen am Thier-Garten. In umbrosis.

CCCLXXXIX. Lenticula palustris vulgaris C. B. Pin. 362. Lens palustris Matth. deutsch. fol. 783. Lob. ic. p. 249. o. Cord. in Diosc. f. 68. Lenticula aquatica, Thal. p. 73. Lenticula aquæ, Brunf. tom. 3. fol. 118. Lens lacustris Dod. Lateinisch fol. 578. Lenticula palustris, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 547. Tab. lib. 2. fol. 206. Cæs. lib. 16. c. 35. p. 612. Lenticula, Adv. Lob. fol. 129. Waßerlinsen/ Tab. Matth. Meerlinsen/ Brunf. Seb. in Trag. Waßermoß quibusdam. Enten-Flott Nostratibus. Aquis stagnantibus passim innatat. Im Graben beym Philosophischen Gang.

CCCXC. Lenticula aquatica trisulca C. B. Pin. 362. Hederula palustris, Tab. lib. 2. fol. 570. Hederula aquatica Lob. ic. p. 36. o. Waßer-Ephew. Tab. Dreyspitziger Waßer-Eppich quibusdam. In fossis nach dem Bretter-Kruge zu copiosè.

CCCXCI. Lenticula palustris bifolia fructu tetragonô C. B. Pin. 362. Callitriche Plinii, Colum. min. cogn. part. 1. p. 316. klein kriechend Linsen-Kraut mit viereckichter Frucht. Pusilla est planta, fundo rivorum tenuissimis fibris

inhærens ac repens. Im Wiesen-Graben unten auffm Boden gegen Jerusalem über.

CCCXCII. *Lenticula palustris angustifolia folio in apice dissecto. Joh. Læs. Schmalblättericht Linsen-Kraut/ deßen Blätter in der Spitze zerschnitten.

Fibris terræ insistens, coliculos exire patitur virides, ramosos reptatu horsum vorsum euntes, binis ex intervallo foliolis angustis, longis, in summitate obtusis, ac tenerrimè semel incisis, quæ in caulium fastigio congressu suô stellulam quasi quandam effigiant, instructos. Foliola inter visuntur sæpe nova quædam capitella albida, rotunda, pediculis suis fulta. In der Hollen-Grund. It. beym Bleich-Garten in lacunis.

CCCXCIII. Lichen petræus latifolius sive hepatica fontana. C. B. Pin. 362. Lichen, Matth. Bauhin. in Matth. fol. 732. Dod. Lat. fol. 473. Thal. p. 73. Fuchs. fol. 476. Cæs. lib. 16. c. 19. f. 601. Lichen herba, Cord. in Diosc. fol. 65. Leber-Kraut/ Brunf. deutsch f. 177. Epatica Lon. deutsch. f. 247. Hepatica prima Tab. lib. 2. fol. 488. Lichen, hepatica, Lob. ic. p. 246. o. Jecoraria, seu hepatica fontana, Trag. Seb. in Trag. deutsch/ 416. Leberkraut das I. Tab. Stein-Leberkraut/ Matth. Fuchs. Lon. Brunnen-Leberkraut/ Seb. in Trag. Steinflechten/ Moßflechten und Leberkraut/ Cord. in Diosc. bey Schwanis in palustribus. It. in der Hollen-Grund ad fossarum margines.

CCCXCIV. Lilium floribus reflexis alterum, lanugine hirsutum. C. B. Pin. 78. Lilium montanum, sive sylvestre primum majus. Clus. hist. lib. 2. fol. 134. Lilium Saracenicum, Tab. lib. 2. fol. 328. Hemerocallis flore rubello, Lob. ic. p. 168. Lilium purpureum mas, Gesn. hort.

fol.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0239-4
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0240-5
DFG

fol. 264. Bleichrothe punctirte wilde Lilien mit umbgebogenen Blumen. Berg-Lilien. Hemerocallis herbariorum. Rauhe umbgebogene Berg Lilien. Heydnisch-Lilien/ oder Heydnische Blumen. Tab. Goldwurtz/ vulgò. In der Osterodschen Heyde passim. It. bey Rastenburg/ und im Walde bey Neuhoff/ nicht weit von Lagarben.

CCCXCV. Lilium convallium album. C. B. Pin. p. 304. Lilium Convallium, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 456. Tab. lib. 2. fol. 428. Dod. Lat. fol. 205. Gesn. hort. fol. 246. Matth. deutsch fol. 345. Clus. hist. lib. 2. fol. 190. Cæs. lib. 5. c. 34. p. 224. Antholog. mag. fol. 90. Ephemerum non lethale, Fuchs. fol. 240. Lilium convallium vulgare, Cam. hort. p 89. Lilium convallium, vel vernum Theophrasti, Lob. ic. p. 172. Lilium convallis, & sylvestre lilium, Brunf. Lateinisch tom. I. fol. 211. Cacalia, Lon. deutsch fol. 217. Mayen-Blümlein / Tab. Brunf. Fuchs. Meyen-Blümlein oder Zaucken/ Matth. Meyentryß / Gesn. hort. Copiosè hinterm Krantz-Kruge. It. bey Königsb. in umbrosis sylvis passim. Baccas habet post deciduos flores rubellas. Sub elevatione Poli 46. 47. efficacissimum est. Sole in 1. ♋ constituto. Semen colligatur, Sole 15. ♌ incolente: cerebrum confortat, & memoriam acuit juxta quosdam, ac præfertur ipsis floribus.

CCCXCVI. Lilium convallium minus. C. B. Pin. 304. Morphyllon. Unifolium recentiorum, Lob. ic. p. 303. Monophyllon, unifolium Thal. p. 77. Einblatt / Brunf. deutsch f. 235. Unifolium, Tab. lib. 2. fol. 428. Dod. Lateinisch 205. Cam. hort. 183. Eystett. Cotyledon sylvestre, & unifolium Trag. Seb. in Trag. deutsch 386. Bifolium primum, Lon. deutsch fol. 269. Monophyllon Matth. Bauh. in Matth. fol. 709. Einblatt/ Tab. Lon. Bey Lauten-Mühl in umbrosis passim.

Radix drachmæ unius pondere, cum aceto sumptà mox in initio, pesti medetur.

CCCXCVII. Linaria vulgaris lutea flore majore. C. B. Pin. p. 212. Linaria vulgaris, Trag. Seb. in Trag. deutsch 284. Eystett. Cam. hort. p. 90. Linaria vulgò. Gesn. hort. f. 265. Cæs. lib. 8. c. 51. p. 350. Scheiß-kraut/ Leinkraut Brunf. deutsch f. 78. Linaria prima, Lon. deutsch fol. 190. Dod. Lat. fol. 284. Osyris Matth. Bauh. in Matth. fol. 837. Cord. in Diosc. fol. 72. Fuchs. fol. 545. Osyris Linaria sive Urinaria, Lob. ic. p. 406. Osyris major, Tab. lib. 2. fol. 497. Scheiß- Lein- und Harn-Kraut / Lon. Groß Harn-kraut Tab. wilder Flachß/ unser Frauen Flachs/ Kröten-Flachs/ und Nabel-Kraut vulgò Frauen-Flachs / Bor.

Amara est, ac jecoris obstructiones expedit, Gal. 8. simpl. Dodonæo aperiendi, lotiumque ciendi vi prædita. Ictericis & calculosis utilis, Tab. Hæmorrhoidum dolores ad miraculum compescit, Horst. lib. 4. Observ. 42. In locis siccis & apricis bey Königsb. passim.

CCCXCVIII. *Linaria maritima floribus odoratis. Joh. Læs. Meer-Harnkraut mit wolriechenden Blumen. "Foliis provenit Osyridis Matth. sed crassioribus, & magis "succulentis, gustu amaris. In capsis semen nigrum idq; copi-"osum & elatum continentibus, effigie renem quoque refe-"rens. Flosculis luteis Cheiri odorem spirantibus, minoribus "tamen, quàm in vulgari linariâ. Radice nititur longiusculâ, "albicante, fibris instructâ suis. Bey Sarkau an den See-Bergen.

CCCXCIX. Lithospermum majus erectum. C. B. Pin. 258. Erhabene große Meer-Hirsen. Lithospermum, Fuchs. fol. 489. Adv. Lob. 192. Cord. in Diosc. fol. 60.

Cord.

No. 39 ad p. 142.

Linaria maritima
floribus odoratis.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0243-3
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0244-9
DFG

Cord. Hist. fol. 94. Lon. deutsch fol. 250. Lithospermum arvense, Tab. lib. 2. fol. 521. Lithospermum commune, Gesn. hort: fol. 265. Lithospermon minus, Matth. Bauh. in Matth. fol. 657. Lob. ic. 457. Dod. Lat. fol. 83. Lithospermon vulgare minus Cam. hort. p. 91. Saxifragia tertia, Brunf. Lat. Tom. 2. fol. 188. Lithospermum sativum Fuchs. ic. p. 274. Milium solis sativum. Trag. Seb. in Trag. deutsch 426. lithospermum legitimum Clus. hist. lib. 5. fol. 163. Anchusæ tertiæ similis altera Cæs. lib. 11. c. 8. p. 435. Minium soler Mauritanis, quoniam in montibus Soler freqvens nascitur. Ineptè ergò milium solis vulgò appellatur, Gesn. hort. 265. Lithospermum alterum fruticosum, Thal. p. 74. Meerhirsen/ oder Steinsaamen/ Lon. kleine Meer-Hirse/ Tab. Beym Neuhäusischen Schloß, in arenosis, copiosè.

CD. Lithospermum arvense radice rubrâ, C. B. Pin. 258. Acker-Meerhirse mit rothen Wurtzeln. Anchusa arvensis minor facie milii solis, Tab. lib. 2. fol. 520. Lithospermum sylv. Trag. Seb. in Trag. deutsch 427. Anchusa degener facie Milii solis, semine Buglossi Loc. ic. p. 459. Lithospermum tertium Dod. Lateinisch fol. 83. Anchusa tertia lithospermo similis, Cæs. lib. 11. c. 8. p. 435. Anchusa arvensis alba, Thal. p. 9. Rothe Ochsen-Zung Tab. Wild Meerhirsen Seb. in Trag. Am Kneiphöfischen Wall passim. Ex anchusæ radice fucus quoque confici potest, quem παιδέρασα dixêre Veteres. Is rubro colore genas tingit, qualis in pueris advertitur & placet. Fuci hujus cùm Alexis in Fabulâ, quam Isostasium inscripsit, mentionem olim fecerit, ac meretricium apparatum, comptumque artificiosum, lepidè descripserit, lubentia fuit, totam rem lectu jucundissimam, obiter huc apponere;

Pra-

Præcipuum studium (meretricum intellige) ad quæstum est, & eos,
Qui propiùs se admovent spoliandos: supervacua cætera:
Omnibus struunt insidias: ubi verò ditatæ sunt,
Novitias meretrices assumunt, tyrocinium artis facturas:
Ipsas statim informant, ut nec ingenium
Nec vultus ac facies semper eadem permaneat.
Brevi si corpore quædam est, suber crepidis
Infarcitur: si grandior, soleâ tenui calceus suppingitur:
Et capite in humerum dejecto prodit:
Hoc de proceritate nonnihil adimit: si cui gracilior coxa est,
Assutâ subtùs veste induit, ut pulchris esse natibus
Exclament, qui viderint: venter
Si tumidior est, fasciis ritè obstringitur
A tergo si pectoris gibbus prominet,
Virgulis statim ac tabellis anteriora versùs
Ut contis in ventrem repellunt:
Ruffa quæ supercilia sunt, pinguntur fuligine:
Quæ nigrò colore est, cerussâ oblinitur:
Quæ nimis candida est, PÆDEROTA *huic affricant.*
Quod in corpore pulchrum est, nudum id ostenditur.
Quibus elegantes sunt naturâ dentes, ridere coguntur invitæ.

CDI. Loto affinis vulneraria pratensis, C. B. Pin. 332. Anthyllis leguminosa Belgarum, Lob. ic. p. 87. o. Anthyllis leguminosa, Clus. Pann. p. 744. Clus. hist. lib. 6. fol. 232. Anthyllis lenti similis Dod. Lat. fol. 552. Lagopodium flore luteo, Tab. lib. 2. fol. 223. Anthyllis leguminosa, Lobelii, Cam. hort. P. 17. Vulneraria rustica, Gesn. hort. fol. 287. Arthetica Saxonum, Thal. p. 10. geeler Haasen-Klee Tab. Wund-Kraut Gesn. hort. Berg-Kraut accolis lacûs Curlandici. Sangvinem discutit grumosum, ac in vulneribus

bus, ulceribusque sanandis extollitur à Rusticis. Zwischen Kuntzen und Sarckau an den See-Bergen procerior & succosior provenit. It. Bey Lauten-Mühl in incultis, ubi exilior, & macrior.

CDII. Lotus sive Melilotus pentaphyllos minor glabra. C. B. Pin. 332. Kleine unrauge fünffblättrige gelbe Schoten-Klee. Trifolium siliquosum minus. Tab. lib. 2. fol. 219. Lotus pentaphyllos, Gesn. hort. fol. 265. Melilotus Germanica, Fuchs. fol. 527. Lon. deutsch 136. Trifolium corniculatum primum, Dod. Lat. 573. Lagopus primus & Meliloti exigui species altera, vel septima & nobilis. Trag. Seb. in Trag. deutsch f. 472. Meliloti tertium genus. Fuchs. ic. 298. Melilotus coronata: Adv. Lob. f. 386. Melilotum vulgò, Cæs. lib. 6. c. 22. p. 244. Kleiner Schoten-Klee/ Tab. Lon. Unser Frauen Schühlein. Fuchs. Schöne Goldgeele gedrungene Klee Blume/ Seb. in Trag. Horn-Klee und Honig-Klee/ vulgò.

In pratis proveniens foliis est majoribus, & siliquis tenuioribus: in montanis foliis minoribus, & siliquis crassioribus, adstringentis & digerentis est facultatis. Fuchs. Hinter dem Altstätschen Wall. It. Bey Lauten-Mühl passim.

CDIII. Lunaria Græca nostras. Joh. Lœs. Preusche Pfennig-Blum. Tricubitalis ferè est planta, radice ac siliquis à Lunariâ Græcâ seu Bolbonâ Lob. p. 322. in iconibus differens. Foliis nascitur crenatis, velut illa Lobelii, flosculis ex cæruleo albicantibus, quos deciduos seqvuntur siliqvæ longiores, ex tribus laminis constructæ, semen latiusculum formam renis exprimens, continentes. Radice nititur oblongâ, & sibratâ nonnihil, bulbulis prorsus destituta. Lunaria hæc Violæ lunari 2. Tab. lib. 2. fol. 31. assimilis

quidem est siliquis, foliis verò dissimillima, Hinter Latten-Walde im Gebirge.

CDIV. Lunaria racemosa, Lob. ic. p. 807. Traubichte Mohn-Raute. Lunaria racemosa, Ceterach foliis, racemulis Ophioglossi, Adv. Lob. fol. 360. Lunaria racemosa minor vel vulgaris, C. B. Pin. 354. Lunaria botryitis polyphyllos, Thal. p. 74. Lunaria botryitis. Cam. hort. p. 91. Eystett. Ruta lunaria, Ruta jecoraria, Tab. ic. p. 137. Lunaria minor, Matth. Bauh. in Matth. fol. 647. Lon. deutsch fol. 253. Gesn. hort. fol. 266. Fuchs. 482. Lunaria minor seu racemosa, Cæs. lib. 16. c. 18. p. 600. Epimedium Dioscoridis, Colum. in Phytobas p. 80. Lunaria botrytis minor, Clus. hist. lib. 5. fol. 118. Lunaria Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 719. Dod. Lateinisch. fol. 139. Mohnraut und Leberraut/ Tab. Klein Mo nraut. Fuchs. Traut Babbichen sieh mich an/ vetulæ quædam. Am Lautschen Teich in collibus herbosis nach Bladau zu. Sistit alba menstrua.

CDV. Lupulus mas, C. B. Pin. p. 298. Lupulus Brunf. Lat. Tom. 3. f. 113. Matth. Bauh. in Matth. f. 839. Dod. Lat. fol. 409. Clus. hist. lib. 1. fol. 126. Tab. lib. 2. fol. 583. Lupus salictarius spontaneus sive lupulus & vitis septentrionalium, Lob. ic. p. 629. Lupulus sativus & sylvestris Trag. Seb. in Trag. deutsch/ 641. Lupus salictarius, Fuchs. f. 164. Gesn: hort. fol. 266. Cæs. lib. 4. c. 17. p. 157. NB. Lupulus, qui fructum fert, non floret, qui verò floret, sine fructu est Cæs. cit. loc. Lupulus salictarius spontanea, Adv. Lob. fol. 276. fruchtbahrer Hopffen. Tab. Matth. Fuchs. Zahm und wild Hopffen/ Seb. in Trag. Amaror & odoris gravitas, vim aromaticam floribus decernunt. Menses ac lotium cient, infarctus jecoris ac lienis expediunt, humores crassos extenuant, abstergunt & discutiunt. Turiones seu asparagi lupuli, vetulis.

tulis Hopffen-Kühn/ acetaria inter sunt, alvum mollientia & sangvinem mundantia. In sylvis passim.

CDVI. Lupulus fœmina, C. B. Pin. p. 298. unfruchtbahrer Hopffen Cam. hort. p. 93. Foliis ad radicem tantùm serratis, non incisis provenit, editque flosculos subpallidos, in pollinem luteum abeuntes, nullô post se fructu relictô. Inter sepes & fruteta passim.

CDVII. Luteola herba salicis foliô, C. B. Pin. p. 100. Luteola Adv. Lob. ic. p. 353. Pseudostruthium, Matth. Bauhin. in Matth. fol. 442. Eystett. Antirrhinon Trag. Kyb. in Trag. p. 362. Struthium Gesn. hort. fol. 283. Catanance, Lon. deutsch fol. 191. Catanance prima, Tab. lib. 1. f. 395. Antirrhinon, Tragi Thal. p. 9. Lutum herba, Dod. Lat. fol. 80. Guadarella vulgò, Cæs. lib. 9. c. 35. p. 388. Weiden-blättriges Streich-Kraut / Tab. Orant oder Stärck-Kraut/ Lon. Kyb. in Trag. Ackerpfriemen quibusdam. Am Altstätschen Wall nach dem Baum zu.

CDVIII. Lychnis sylvestris alba simplex. C. B. Pin. 204. Ocymastrum, sive Ocimoides, Bauh. in Matth. f. 706. Matth. deutsch 422. Cam. in Matth. 344. Tab. lib. 2. fol. 14. Rosæ Marianæ similis tertia. Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 101. Strutio similis, Walcken-Kraut/ Lon. deutsch 109. Oicimoides major, Cæs. lib. 6. c. 47. p. 256. Ocimoides album. Gesn. hort. f. 269. Lychnis sylvestris alba Cam. hort. p. 93. weißer Wiederschoß Tab. wilde Basilien/ Matth. Cam. in Matth. Marien-Rößlein quibusdam. Foliis est hirsutis; floribus in summis ramulis candidis, quibus cytini seu conceptacula seminum succedunt, velut in hyoscyamo. Semen λεπτομερὲς siccantis est indolis, demorsis à serpentibus utile. Inter segetes passim.

CDIX. Lychnis ſylv. floribus purpureo-rubentibus Dod. Lat. p. 171. Lychnis ſylv. rubra Cam. hort. 93. Ocymaſtrum rubrum, Tab. lib. 2. fol. 15. Lychnis ſylv. rubello flore. An Heſperis Theophraſti. Lob ic. p. 335. Obſerv. Lob. 181. Lychnis ſylv. aquatica purpurea ſimplex. C. B. Pin. 204. Roſæ Marianæ ſimilis quarta Trag. Seb. in Trag. deutſch fol. 101. Melandryum Plinii genuinum Cluſ. hiſt. libr. 3. fol. 294. Lychnis ſylv. Eyſtett. Ocymoides rubrum Thal. p. 81. Ocymoides purpureum vel roſeum, Geſn. hort. fol. 269. Roth Wiederſtoß / Tab. Roth Margenrößlein und wilde Chriſtus-Auglein vulgò. Juxta pratorum & fluviorum margines paſſim.

CDX. Lychnis ſegetum major. C. B. Pin. 204. Nigellaſtrum Dod. Lat. fol. 173. Pſeudomelanthium, Mat. fol. 33. Lob. ic. p. 38. Adv. Lob. f. 12. Lon. deutſch 114. Nigella Brunf. Lateiniſch tom. 1. fol. 242. Lolium. Fuchſ. p. 127. Pſeudomelanthium, ἄνθεμον φυλλῶδες Theophraſti, Thal. 86. Githago Roſæ Marianæ ſexta ſpecies, Trag. Seb. in Trag. deutſch. 101. Lychnis arvenſis. Tab. lib. 2. fol. 10. Pſeudomelanthium flore rubeſcente, Eyſtett. Lychnis alia inter triticum, Cæſ. lib. 6. c. 43. p. 253. Raden Tab. Lon. Raden oder Korn-Aeglein Matth. Ratten-Blum, Brunf. Ratten. Fuchſ. Groß Raden Seb. in Trag. Inter ſegetes paſſim.

Radix Pſeudomelanthii, die corporis Chriſti, ſole meridianum punctum occupante, effoſſa, manibus ſervata, ut incaleſcat, quamvis hæmorrhagiam ſiſtere à quibusdam dicitur.

CDXI. Lychnis ſylv. quæ Beenalbum vulgò. C. B. Pin. 205. Papaver ſpumeum, ſive Ocymaſtrum alterum, Lob. Ic. p. 340. Papaver ſpumeum, Cam. hort. 117. Beenalbum Geſn. hort. Beenalbum ſive Polemonium, Dod. Lateiniſch

fol.

fol. 172. Polygonaton & Rosa Mariana qvinta, Trag. Seb. in Trag, deutsch 103. Herba articularis, Tab. ic. p. 298. Lychnis sylv. Lon. deutsch fol. 171. Polemonium primum Dodonæi. Thal. p. 92. Melandryum Plinii quorundam, Clus. hist. lib. 3. fol. 293. Polemonia, Cæs. lib. 6. c. 50. p. 258. Gliedweich und wild Margen-Rößlein Lon. Lydreich Seb. in Trag. Splyspettel und Glied-Kraut Tab. Semen & effigie, & sapore assimile est semini papaveris nigri. In sabulosis passim.

CDXII. Lychnis sylv. viscosa rubra angustifolia. C. B. Pin. pag. 205. Klebriche Purpurrothe Marien-Rößlein mit schmalen Blättern. Lychnis sylv. purpurea, Tab. lib. 2. fol. 11. Lychnis sylvestris prima flore rubrô, Clus. Pann. pag. 328. & 329. Lychnis Sylvestris quarta Clus. hist. lib. 3. fol. 289. Lychnis viscosa sylvestris flore incarnatô, Eystett. ἰξόκαυλος ruber Thal. p. 59. Wild Purpurroth Marien-Rößlein Tab. Vulnerariam esse plantam, viscum ejus attestatur. In monte Apollinis bey Qvednau.

CDXIII Lychnis viscosa flore muscosô C. B. Pin. pag. 206. Muscipula sive Armoraria altera Lob. ic. p. 453. Muscipula sive Viscaria altera flore muscoso. Adv. Lob. 190. Otites Lychnidis sylvestris genus, Tab. ic. pag. 820. Viscago Cæs. Lib. 6. cap. 49. pag. 257. Viscago major Cam. hort. 178. Sesamoides magnum Salmanticum, Clus. hist. lib. 3. fol. 295. κραυρόφιλον, Thal. pag. 68. Ohr-Löffelein-Kraut Tab. Varietas est in hâc plantâ. Flores nunc sunt minusculi, copiosi & congesti, nunc calyculis exiguis, curtis & albicantibus inhærentes: nunc majores ac distracti, calyculis longioribus subpurpureis, conclusi, quos vanescentes seqvuntur seminum capsæ majusculæ, in caulibus & foliis

hirsuties quædam advertitur. In der Brandenburgischen und Fischäusischen Heyde/ secus vias passim.

CDXIV. *Lychnis sylvestris viscosa foliis Otitidis. Joh. Lœs. Klebrige weiß Marien-Rößlein mit Ohr-Löffel-Kraut-Blätter. Radix lignosa ferè est, cortice subalbidô tecta, quæ cauliculum modò unum, modò plures effert cubitales, & minores, rotundos, hirsutos, geniculatos, viscatos, nunc subvirentes, nunc rubescentes, quorum geniculis singulis duo ex adversùm folia innata viridia in acumen tendentia ac hispida, ramulis plerumque binis, ad genicula exclusis, subservientia: floribus in fastigiô caulis ac surculis mense Julio est candidis ac dilabidis brevi spatiô, foliolis decem constantibus, circa summum leviter incisis, tractu ætatis mox incurvis ac reflexis, quorum stamina tria vel plura ex albo purpurea post: Semen in capsis flavescentibus subnigricans est, papaveris semini proximum, sed minus: folia summâ tellure copiosa alit. Radix hirsuta, oblonga, in extremitate subrotunda, pediculis prolixis nitentia, otitidis facie. Zu Quednau auffm Berge. Item bey Lauten-Mühl.

CDXV. Lysimachia lutea major: quæ Dioscoridis C. B. Pin. 245. Lysimachia lutea. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 146. Fuchs. fol. 492. Tab. lib 2. fol. 524. Adv. Lob. fol. 185. Cæs. lib. 6. cap. 50. p. 261. Eystett. Lysimachia lutea sive Salicaria Lob. ic. pag. 342. Lysimachia lutea communis Clus. hist. lib. 4. fol. 50. Lysimachium luteum Gesn. hort. fol. 266. Thal. pag. 71. Lysimachia prima, Matth. Bauh. in Matth. fol. 675. Lon. deutsch fol. 164. Lysimachia vera, Cord. in Diosc. fol. 61. Großer geeler Weiderich Tab. Fuchs. Matth. Lon. In der Hollengrund/ juxta rivos passim. Lysimachia lutea sub Elevatione poli 45. 46. 47. 48. optima.

Ra-

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0253-8
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0254-4
DFG

Radix & folia adſtringunt, & omnis generis fluxûs compeſcunt.

Herba ac flores lutei colligendi, Sole 15. ♌ occupante. In lixiviô decocti flores flavedinem inducunt crinibus.

CDXVI. Lyſimachia bifolia flore globosô luteô C. B. Pin. 245. Zweyblättriger Weiderich mit einer gelben runden Blüth. Lyſimachium aquatile. Dod. Niederländiſch fol. 958. Lyſimachia lutea altera Cluſ. hiſt. lib. 4. fol. 50. Waßer-Weyderich Dod. Niederländiſch. Bey Schwanis im Gebrüch. It. In der Hollen-Grund ad foſſas.

CDXVII. Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta magnô flore C. B. Pin. 245. Rauger Schoten-tragender Weidrich mit großer Blüthe. Lyſimachia purpurea, Fuchſ. fol. 491. Lyſimachiæ purpureæ primum genus Fuchſ. ic. pag. 278. Lyſimachia ſiliquoſa prima Tab. lib. 2. fol. 524. Antoniana major hirſuta Geſn. hort. fol. 247. Lyſimachia ſeu Salicaria altera Trag. Kyber. in Trag. p. 182. Onagra campeſtris hirſuta, Cæſ. lib. 6. Cap. 70. & 71. pag. 268. Lyſimachia ſecunda & tertia flore purpureô vel rubrô, Lon. deutſch 164. Lyſimachii majoris purpurei prima ſpecies, Thal. pag. 70. Weiderich-Rößlein Tab. Roth Weiderich Fuchſ. Braun und roth Weiderich Lon. Plantam hanc in pago Langkheim ad oram rivuli alluentis reperi: ejus caulis rotundus, hirſutus ac concavus quatuor ſurgebat in ulnas.

CDXVIII. Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta, parvô flore C. B. Pin. 245. Großer rauger Schoten-tragender Weiderich mit kleiner Blüth. Lyſimachia ſiliquoſa ſecunda Tab. lib. 2. fol. 525. Weiderich Röſelein Tab.

CDXIX. Lyſimachia ſiliquoſa glabra major C. B. Pin. pag. 245. Großer unrauger Schoten-tragender Weiderich

derich. Lysimachia siliquosa, filius ante Patrem Lob. ic. p. 343. Lysimachia siliquosa major, Clus. hist. lib. 4. fol. 51. Lysimachia siliquosa flore albô Tab. ic. pag. 853. Pseudo-lysimachium purpureum primum Dod. Lateinisch fol. 85. Lysimachii majoris purpurei secunda species Thal. pag. 70. Onagræ alterum genus Cæs. pag. 265. Weißer Weiderich Tab. Pota dysenterias, sangvinis rejectiones, & muliebre profluvium sanat. Gal. 7. simpl. In locis udis.

CDXX. Lysimachia siliquosa glabra minor C. B. Pin. pag. 245. Kleiner unrauger Schoten tragender Weiderich. Lysimachia minor & tertia Tab. lib. 2. fol. 524. Lysimachiæ siliquosæ varietas Adv. Lob. fol. 145. Lysimachii medium genus, Thal. p. 70. Klein Weiderich. Tab. In der Hollen-Grund in uliginosis.

CDXXI. Lysimachia siliquosa glabra minor flore albô. Joh. Lœsel. Klein unrauger Schoten tragender Weiderich mit weißer Bluhm. Bey Gerdauen am Mühl-Teich in umbrosis.

CDXXII. Lysimachia Chamænerion dicta latifolia C. B. Pin. pag. 245. Lysimachia vulgò altera, Cam. Hort. p. 93. Antoniana, s. S. Antonii herba, foliis lævibus. Gesn. Hort. ap. pag. 290. Chamænerion & Epilobion, Eystett. Sanct Antonii Kraut. Foliis duntaxat lævibus passim apud nos provenit, quæ Gesnero rarior inventu. In der Hollen-Grund. Item dießeit Neuendorff am Graben.

CDXXIII. Lysimachia spicata purpurea fortè Plinii C. B. Pin. 246. Lysimachia purpurea fortè Pliniana Lob. ic. pag. 342, Lysimachia purpurea Tab. lib. 2. fol. 524. Lysimachia flore purpureô Cam. Hort. pag. 93. Cæs. Lib. 6. cap. 55. pag. 261. Lysimachia altera Matth. Bauh. in

Matth.

Matth. fol. 675. Eystett. Lysimachia purpurea sub Elevatione Poli 45. 46. 47. 48. optima. Pseudo-Lysimachium purpureum alterum. Dod. Lateinisch fol. 86. Solidaginis Saracenicæ alia species, Trag. Kyber. in Trag. p. 487. Lysimachium purpureum Gesn. hort. fol. 266. Lysimachia purpurea communis major, Clus. Hist. lib. 4. fol. 51. Brauner spitziger Weiderich Tab.

Radix collecta, Sole ultimum ♋ gradum accedente, ac collo appensa certissimum Epilepsiæ remedium. Flores colligendi, Sole ultimum ♋ gradum inhabitante. Utiles sunt in sputo ac mictu sangvinis, mensiumque nimiô fluxu, pulvisculô eorum exhibitô. Faciem emaculat aqua florum destillata. Semen colligatur Sole 2. ♌ occupante, herba verò tota 8. ♌ Sole adeunte, Lysimachia purpurea, ipsô Jacobi die, vesperâ ingruente effossa, torrefacta, in sacculum conjecta, & novendium collo appensa, post in profluentem missa, putrilaginem gingivarum scorbuticam corrigere creditur. In incultis est juxta rivos passim.

CDXXIV. Lysimachia spicata cærulea. C. B. Pin. 246. Lysimachia Cærulea hortensis Lob. ic. pag. 344. Lysimachia cærulea hortensis, Veronica recta quorundam Adv. Lob. fol. 145. Veronica recta cærulea Eystett. Pseudo-Lysimachium cæruleum Dod. Lateinisch fol. 86. Lysimachii tertium genus, Gesn. hort. fol. 266. Lysimachia cæruleô flore Clus. Hist. lib. 4. fol. 52. Spitziger blauer Weiderich. In ascensu montis bey der Neuhäusischen Mühl. It. bey Wießdehlen in pratensibus.

CDXXV. Lysimachia cærulea galericulata, vel Gratiola cærulea C. B. Pin. 246. Blauer gehelmter Weiderich. Lysimachia flore cæruleô. Cam. hort. pag. 93. Ter-

tianaria Tab. lib. 2. fol. 93. Lysimachia galericulata Lob. ic. pag. 344. Herba Judaica altera, Dod. Niederländisch. f. 127. Gratia Dei Cæs. lib. 6. cap. 65. pag. 265. Lysimachia galericata, Lobelii. Clus. Hist. Lib. 4. fol. 53. Sideritis cærulea, Thal. pag. 104. Fieber-Kraut. Tab. Ad fluviorum ripas passim.

CDXXVI. *Lysimachia hirsuta purpurea, flore galericulatô. Joh. Lœs. Rauger gehelmter Weiderich mit Purpurfarben Bluhmen. Sæpe bicubitalis altitudine in locis humectis, sæpe multò minor in aridioribus, caulibus est quadrangulis, striatis, hispidis, geniculatis, concavis, ἐπὶ τὸ πλεῖστον brachiatis, quorum geniculis bina serviunt folia oblonga, viridia, hirsuta, tactu holoserica, in ambitu crenata, nova thyrsulorum germina haud rarò amplexu suô foventia. Caulium summitas flosculorum gaudet concursu duobus ad quodvis geniculum foliis suffultorum, verticillatim thyrsum ambientium, capsis in summô incisis insistentium, *galericulatorum, hiantium, maculosâ purpurâ* tenuissimis intus staminibus, quorum intermedium in cacumine bifurcum. Flosculis deciduis, in quâlibet capsâ quatuor advertes semina rotunda. Radix nodosa albicans & concava, villis circa nodos instruitur plusculis. Ad rivorum margines, sæpe & inter segetes.

CDXXVII. Malva sylvestris folio sinuato C. B. Pin. 314. Große wilde Pappel. Malva sylvestris major Tab. lib. 2 fol. 442. Thal. pag. 76. Malva agrestis major Gesn. hort. fol. 266. Malvæ vulgaris altera species. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 292. Malvæ sylvestris procerior vulgaris Lob. ic. pag. 650. Malva vulgaris major, Lon. deutsch fol. 191. Cam. Hort. pag. 95. Malva sylvestris elatior, Fuchs.

fol.

No. 41 ad p. 156.

Lysimachia hirsuta purpurea flore galericulato.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0259-6
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0260-7
DFG

fol. 509. Malva ſylveſtris vulgaris, Cord. in Dioſc. fol. 44. Malva ſylveſtris procerior Dod. Lateiniſch 653. Malva ſylveſtris recta. Cord. hiſt. fol. 114. Tab. Haſen-Pappeln; Graß-Pappeln Lon. Roß-Pappel. Fuchſ. Folia ſæpè ita ſinuata ſunt in noſtrate, ut in acutiem tendant eorum partes. Cauliculi hirſuti ſunt, ac flores violacei. Hinter Fiſchhauſen/ viâ, quâ itur nach Lochſtädt. Item am alten Schloß zu Gerdawen.

CDXXVIII. Malva ſylveſtris rotundô folio. C. B. Pin. 314. Rund-blättrige kleine Wald-Pappeln. Malva ſylveſtris pumila Fuchſ. fol. 508. Thal. pag. 76. Dod. Lateiniſch fol. 653. Malva vulgatiſſima. Trag. Seb. in Trag. deutſch fol. 292. Malva minor Lon. deutſch fol. 191. Malva vulgaris minor. Cam. hort. pag. 45. Malva ſylveſtris minor Tab. lib. 2. fol. 442. Gänß-Pappeln. Brunf. deutſch f. 228. Malva Matth. Bauh. in Matth. fol. 359. Malva ſylveſtris recens pumila Lob. ic. pag. 651. Malva ſylveſtris. Adv. Lob. fol. 292. Malva agreſtis minor, Geſn. hort. fol. 266. Malva ſylveſtris ſupina, Cord. hiſt. fol. 149. Gänß-Pappeln Tab. Fuchſ. Gemeine Käß-Pappel. Sebitz. in Trag. Kleine Pappeln Lon. Haſen-Pappeln Noſtratibus. Phanias libro de plantis ait, in malvâ ſeminis formam placentam vocari, quia ſit ei ſimilis. Vetulis & pueris apud nos Katzen-Käßchen dicitur. Circa hortos, pagos, & rudera paſſim.

CDXXIX. Malus ſylveſtris minor, Tab. ic. p. 1009. Mala ſylveſtria, quæ & alba & rubra. C. B. Pin. pag. 433. Mala ſylveſtria rubentia Tab. ic. pag. 1008. Malus ſylveſtris major alba. Tab. ic. pag. 1008. Klein Holtz-Apffel. Holtz-Strömling; Weiße große Holtz-Aepffel Tab. Höltzken

Borussis. Ex his præparatur potus, quem Hölzken Schemper nominant. In sylvis & pagis passim. Pomis olim pugnatum, retulit Chares Mytyleneus, Alexandrum, cum mala pulcherrima in agris circa Babyloniam reperisset, iis scaphas complevisse, ac illorum jactu è navibus, ut pugnarent, imperâsse, unde prælium illud dictum fuit μηλομαχία. Obiter jocum hùc adscribam. Dum circa arborem hanc cum Amicô versor, austera fustibus mala decutiens, ex illo, otii causâ, qværo: cur *Malum* homini os claudat, *Mala* verò aperiant? Causam cùm daret prorsùs alienam, dixi literam M hoc præstare, quæ omnes inter literas os claudit, reliquis id aperientibus. Rem ut exactiùs caperet, Epigramma hoc in voculam SCIP à me olim fusum ipsi recito:

Literula M *claudit, reliquarum tota caterva*
Os aperit; res est pensiculata diu.
SCIP *dictum factum claudit rursum ora puellæ,*
Et vult lege suà mente tegenda tegi,
SCIP *cur collectum claudit, cur pandit amicæ*
Os, ubi literulas ordine SCIP *recitat?*
SCIP, *quod rivalis docuit, recludere non fas,*
SCIP *schola quod docuit, tutò aperire potest.*

Adhæc qvæsivi ex eôdem, qvì fiat, quod litera M nunquam finiat voces Grajas:

Literulas inter Latias quæ claudere sveta
Voces, cur Grajas claudere non potis est?

Causæ locô attulit illud Ausonii:

Vocibus in Grajis nunquam ultima conspicior M.

CDXXX. Marrubium album vulgare C. B. Pin. pag. 230. Marrubium Fuchs. fol 590. Dod. Lateinisch f. 87.

Cord.

Cord. in Dioſc. fol. 58. Cæſ. lib. 11. cap. 24. pag. 447. Marrubium vulgare Cluſ. hiſt. lib. 4. fol. 34. Eyſtett. Marrubium album Lob. ic. pag. 517. Tab. lib. 2. fol. 239. Geſn. hort. fol. 267. Marrubium candidum, Trag. Kyber. in Trag. pag. 8. Marrubium ſive Praſſium, Matth. deutſch fol. 346. Andorn-Weiblein Brunf. deutſch fol. 83. Marrubium album odorum Adv. Lob. fol. 222. Weißer gemeiner Andorn Tab. Fuchs. Matth. Gottes-Vergeß quibusdam. In pagô Kraptepellen / ubi ſuccini hamiotæ, copioſiſſimè viſitur. Item in Gerdauen / und bey der alten Pfund-Bude in incultis. Sub Elevatione poli, 45. 46. 47. 48. 49. Radix perutilis, Sole in 1. ♉ conſtitutô effoſſa. Folia colligenda Sole 16. ♈ occupante; flores Sole 1. ♋ ingreſſô.

CDXXXI. Marrubium nigrum fœtidum, Ballote Dioſcoridis C. B. Pin. 230. Ballote ſive marrubium nigrum Lob. ic. pag. 518. Dod. lat. fol. 90. Marrubium nigrum Geſn. hort. fol. 267. Lon. deutſch fol. 140. Marrubiaſtrum Tab. lib. 2. fol. 240. Ballote, Matth. Bauh. in Matth. fol. 601. Cord. in Dioſc. fol. 57. Cæſ. lib. 11. cap. 22. pag. 445. Marrubium majus Trag. Kyb. in Trag. p. 8. Schwartzer ſtinckender Andorn Tab. Fuchſ. Matth. Lon. Groß und ſchwartz Andorn Kyber. in Trag. Am Kneiphöfiſchen Wall. Item bey Lauten-Mühl in ruderibus paſſim.

CDXXXII. Marrubium Cardiaca dictum, fortè primum Theophraſti C. B. Pin. 230. Cardiaca Matth. Cam. in Matth. fol. 397. Lob. ic. pag. 516. Adv. Lob. fol. 221. Tab. lib. 2. fol. 248. Dod. Lateiniſch fol. 94. Cæſ. lib. 11. cap. 23. pag. 445. Fuchſ. fol. 395. Andorn-Männlein Brunf. deutſch fol. 82. Meliſſa ſylveſtris, Trag. Kyber. in Trag. pag. 12. Hertz-Geſpann Tab. Hertz-Geſperr und Hertz-Kraut / Kyber. in Trag. Floſculis albis provenit in

arce zu Lieb-Mühl. Amara est, calidæ ac siccæ indolis. In Epilepsiâ & cordis affectibus singularis creditur esse virtutis. Sepibus & rivulis uliginosis passim se associat. Qværitur, cur plantæ siccatione plerumque citiùs nigrescant parte pronâ quàm aversâ, uti in hâc videre est? ▽ hujus plantæ destillata viridis (ni fallor) est coloris. Uti ▽ Pulsatillæ & Spiritus Pimpinellæ cærulea, an ob cupream vesicam? non satis stannô obductam? sicque per accidens. An per se? In vitrô destillationem nunquam tentavi. Sic contra Chymicorum assertum, Tincturæ vegetabilium transcenderent alembicum.

CDXXXIII. Marrubium palustre glabrum C. B. Pin. 230. unrauger Waßer Andorn. Marrubium palustre Lon. deutsch fol. 140. Marrubium aqvaticum Trag. Kyber. in Trag. pag. 9. Thal. pag. 76. Marrubium aquatile Dod. Lateinisch fol. 595. Marrubium aquaticum vulgi. Sideritis secunda Matthioli Lob. ic. 524. Marrubium aquaticum vulgi *Adv. Lob. fol. 211. Sideritis prima Heraclia Matth. Bauh.* in Matth. fol. 711. *Sideritis prima* Cam. hort. pag. 160. Verbenæ alterum genus Cæs. lib. 11. cap. 33. pag. 451. Lancea Christi, Gesn. Hort. fol. 263. Waßer- oder weicher Andorn Lon. Gliedt-Kraut das 1. Matth. Bruch- oder Waßer-Andorn quibusdam, juxta rivos & uliginosa passim.

CDXXXIV. Melampyrum purpurascente comâ. C. B. Pin. 234. Triticum vaccinum Dod. Lateinisch fol. 541. Braunechte Wald-Hirse oder Kuh-Weitzen. Hinter der Liep in locis udis.

CDXXXV. Melampyrum luteum latifolium C. B. Pin. pag. 234. Breit-blättrige gelbe Wald-Hirse oder Kuhweitzen. Milium sylvaticum primum & secundum Tab. l. 1.

fol.

fol. 682. solô coloris flore differunt hoc & præcedens. Melampyrum primum Tal. pag. 79. Parietaria sylvestris secunda, Clus. hist. lib. 4. fol. 44. Clus. Pann. pag. 603. Parietaria sylvestris Eystett. Cratæogonon Adv. Lob. ic. pag. 36. Wald-Hirschen Tab. Kuh-Weitzen quibusdam. Nacht und Tag vetulis. Ad margines sylvarum passim.

CDXXXVI. Melilotus officinarum Germaniæ, C. B. Pin. pag. 331. Melilotus germanica Lob. ic. pag. 430. Cam. hort. pag. 99. Melilotus germanica flore luteô. Eystett. Melilotus vulgaris major Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 471. Lotus urbana Matth. Bauh. in Matth. fol. 809. Lotus sylvestris Tab. ic. pag. 508. Cæs. lib. 6. cap. 17. pag. 241. Melilotus vera, Gesn. Hort. fol. 267. Loti sive trifolii species, Cord. in Diosc. fol. 70. Saxifraga lutea, Fuchs. fol. 749. Trifolium odoratum, sive Melilotus, Dod. Lat. fol. 567. Trifolium odoratum Imum Dodonæi Thal. pag. 125. Wilder Stein-Klee. Sieben-Gezeit Tab. Gemeiner oder großer Stein-Klee Matth. Geeler Stein-Klee vulgò. Dießeits Friedland propè viam, in tantà copiâ Melilotus tùm luteô tùm albidô flore crescit, ut vel hamaxa seu currus herbâ onerari possit. Odorata herba est, ὁ μελίλωτος εἰς πλεῖω χρόνον ἔνοσμος διαμένει, inqvit Theophrastus. Hinc fragrantiâ odoris coronis texendis olim serviebat.

CDXXXVII. Mentha cataria vulgaris & major. C. B. Pin. 228. Nepeta vulgaris. Trag. Seb. in Trag. deutsch 12. Menta felina, Cattaria Tab. ic. pag. 348. Eystett. Cattaria sive mentha Catti, Lob. ic. pag. 511. Adv. Lob. fol. 519. Nepeta fruticosa Cord. in Diosc. fol. 52. Nepeta Germanica, Cam. hort. pag. 106. Herba gattaria, Matth. Bauh. in Matth. fol. 530. Cattaria herba, Dod. Lateinisch. fol. 99.

Ca-

Calaminthæ primum genus. Fuchſ. fol. 434. Calamintha tertia ſeu Nepeta. Tal. pag. 34. Calaminthæ ſpecies quibusdam, Geſn. hort. fol. 251. Calamintha montana Lon. deutſch fol. 142. Gattaria vulgò, Calaminthæ tertium genus Dioſcoridis, Cæſ. lib. 11. c. 63. pag. 472. Katzen-Müntz/ Katzennapt Tab. Nept / Zahm Katzen-Kraut. Sebitz. in Trag. Vorgemüntz und Stein-Müntz Lon. Marien-Neßel Noſtratibus. In pago Laſſsien ad hortorum ſepes.

CDXXXVIII. Menthaſtrum vel mentha ſylveſtris altera, Trag. Sebitz. in Trag. deutſch fol. 15. Menthaſtrum Matth. deutſch fol. 291. Dod. Lateiniſch f. 96. Fuchſ. fol. 292. Cluſ. Hiſt. lib. 4. fol. 32. Lob. ic. pag. 509. Cord. Hiſt. fol. 157. Mentha ſylveſtris longiore foliô. C. B. Pin. pag. 227. Langblättrige wilde Roß-Müntz. Mentha ſylveſtris Geſn. hort. fol. 267. Lon. deutſch fol. 143. Roß-Müntz. Brunf. deutſch fol. 254. Menthaſtrum ſylveſtre, Eyſtett. Mentha ſylveſtris altera, Cæſ. lib. 11. cap. 64. pag. 473. Wilde Müntz/ oder Roß-Müntz Matth. Katzen-Balſam Sebitz. in Trag. Wild Balſam/ oder wilde Müntz Lon. Bicubitalis eſt planta, nonnunquam & longiùs excreſcit. Magnam vim obtinet calafaciendi ac reſolvendi. Zu Langkheim am Graben. Item bey Schönbruch und Creutzburg am Mühlen Flüß. Item zu Glommen am Graben.

CDXXXIX. Mercurialis ſpicata ſive fœmina, Dioſcoridis & Plinii. C. B. Pin. 121. Mercurialis fœmina Dod. Lateiniſch fol. 658. Matth. deutſch 541. Fuchſ. fol. 473. Cam. in Matth. 434. Tab. lib. 2. fol. 254. Lob. Obſerv. fol. 131. Adv. Lob. fol. 100. Phyllon Thelygonon Theophraſti, Cord. in Dioſc. fol. 59. Mercurialis vulgaris & prima, Trag. Sebitz. in Trag. deutſch 151. Bingel-Kraut

Weib-

Weiblein Tab. Matth. Fuchs. Bengel-Kraut Sebitz. in Trag. Küh-Wurtz / Mercurius-Kraut / Küh-Kraut und Scheiß-Kraut vulgò. Incidit, emollit, abstergit, digerit, bilem & aquosos humores educit. Locis muliebribus subdita menses & secundas ejicit. Pota & genitalibus admota, mulierem fœmellis generandis aptam reddit. Diosc. Mas è foliorum sinu in curtis petiolis coleos duos gestat, semini Aparines formâ & asperitate consimiles. Fœmina spicas alit, racemosis flosculis onustas, absque fructu vel semine vanescentes. Ad hortorum sepes.

CDXL. Mercurialis montana spicata. C. B. Pin. pag. 122. Mercurialis sylvestris fœmina, Cord. Hist. fol. 111. Thal. pag. 77. Cynocrambe fœmina. Matth. Bauh. in Mat. fol. 891. Cynocrambe sive Mercurialis fœmina sylvestris, Cam. hort. pag. 101. Wild Bingel-Kraut-Weiblein Mat. Im Sarkauschen Gebirge/ in opacis copiosissimè. Item bey Truntz copiosè. Ejus cauliculi exsiccati tractu temporis cæsium acquirunt colorem.

CDXLI. Mespilus apii foliô sylvestris spinosa sive oxyacantha C. B. Pin. 454. Cynosbatos Theophrasti Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 771. Lon. deutsch fol. 60. Oxyacantha Tab. lib. 3. fol. 741. Lob. ic. pag. 200. o. Cæs. lib. 3. cap. 13. pag. 99. Cam. Hort. pag. 113. Oxyacantha, acuta spina, Matth. Cam. in Matth. fol. 46. Oxyacantha Matthioli Thal. pag. 81. Sorbus aculeata Cord. hist. fol. 176. Spina Appendix Plinii, Clus. hist. lib. 1. fol. 121. Oxyacantha Dioscoridis Cord. in Diosc. fol. 19. Oxyacantha Dioscoridis & Plinii spina appendix, Gesn. Hort. fol. 270. Saurach Tab. Hagedorn Matth. Sebitz. in Trag. Lon. Mählbaum Nostratibus. Baccæ συπλικὴν, nuclei λίθω

θαυματουργικὴν obtinent virtutem. Inter fruticeta in der Hollen-Grund passim.

CDXLII. Millefolium vulgare album C. B. Pin. pag. 140. Weiße gemeine Schaaff-Garbe. Millefolium vulgare Trag. Kyber. in Trag. pag. 477. Millefolium vulgò, Gesn. hort. fol. 268. Millefolium terrestre vulgare. Stratiotes Millefolium Dioscoridis Lob. ic. pag. 747. Militaris sive Millefolium flore albô Adv. Lob. f. 333. Millefolium flore albô Eystett. Cam. Hort. pag. 101. Millefolium album Brunf. Lateinisch fol. 171. Stratiotes millefolia, Fuchs. fol. 727. Millefolium terrestre majus, Cord. Hist. fol. 139. Tab. lib. 1. fol. 462. Millefolia stratiotes Cod. in Diosc. fol. 70. Achillæa & Millefolium Lon. deutsch fol. 267. Millefolium Thal. pag. 77. Millefolium sive Achillæa Dod. Lateinisch fol. 100. Groß-Garben-Kraut Tab. Feld-Garben/ Groß-Garben/ Groß Schaaffribb Lon. Schaaff-rip oder Gerwel Kyber. in Trag. Weiße Garb Brunf. In arenosis passim. Item am Wege nach dem Dorff Laffsken copiosè.

CDXLIII. Millefolium purpureum. Tab. lib. 1. fol. 463. Millefolium purpurei floris Dod. Lateinisch fol. 100. Millefolium vulgare purpureum minus C. B. Pin. pag. 140. Millefolium terrestre purpureis floribus Lob. ic. pag. 747. Militaris sive Millefolium flore purpureô Adv. Lob. fol. 333. Millefolium minus Matth. Bauh. in Matth. fol. 799. Millefolium vulgare flore diluti ruboris, Trag. Kyber. in Trag. 477. Millefolium rubrô colore, Clus. hist. lib. 3. pag. 331. Purpur-rothe Schaaff-Garbe Tab. Am Kneiphöffschen Wall nach dem Brandenburgschen Thor zu.

CDXLIV. Millefolium aquaticum lenticulatum C. B. Pin. pag. 141. Fœniculum aquaticum galericulatum, Tab.

Tab. lib. 1. fol. 230. Millefolium aquaticum flore luteô galericulato Lob. ic. pag. 791 Waßerhelm-Kraut/ und Waßer-Fenchel Tab. Waßer-Garb mit geelen Blühmlein. Beym Krantz-Krug/ item in fossis nach dem Bretter-Kruge zu. Siccat & vulnera solidat.

CDXLV. Millefolium aquaticum flosculis ad foliorum nodos C. B. Pin. 141. Myriophyllon aquaticum minus. Clus. hist. lib. 6. fol. 252. Clus. Pann. pag. 711. Knotigte Waßer-Garbe mit kleinen weißen Blühmlein. Thyrsulis est rotundis numerosis nodis interceptis, radicationem capillaceis fibris impetrantibus. Singulis folia assistunt tenuissimè incisa, radicem versùs longiora, in cacumine breviora, quæ in caulium summitate ad quodvis geniculum flosculos gerunt candidos, octonis foliolis difficulter se explicantibus, instructos, tractu temporis in tubercula degenerantes. πολύκαρπος conspicitur Juliô mense. In fossis bey der Hollen-Grund.

CDXLVI. Millefolium aquaticum filamentis foliaceis. Joh. Lœs. Myriophyllum, Maratriphyllum palustre alterum. Lob. ic. pag. 790. Peucedanum aqvaticum Tab. lib. 1. fol. 230. Millefolium aquaticum foliis fœniculi ranunculi flore & capitulô C. B. Pin. 131. Myriophylli species coliculis fluitantibus. Thal. pag. 77. Fademblättrigte Waßer-Garb/ Waßer-Fenchel/ der 4. Tab. Foliis est squalidis, strictis, oblongiusculis, teneris, filamentorum instar, coliculis in summo ex intervallo flosculis jam deciduis, fructus innascitur oblongus, subrotundus, tetrorchis sæpè, cujus cavo velut in cochleâ incurvum & flavescens corpusculum continetur. In der Sarkauschen Bäcke.

CDXLVII. Millefolium aquaticum pennatum, spica-

tum, quod 4. in Prodr. C. B. pag. 73. Matth. Bauh. in Matth 813. Feder-Waßer-Garb. Hinter dem Altstädtischen Wall nach der Hollen-Grund zu in fossis.

CDXLVIII. Millefolium aquaticum, seu viola aquatica caule nudô, C. B. Pin. pag. 141. Waßer-Garb oder Waßer-Violen mit nackten Stengeln: fœniculum aquaticum secundum. Tab. Lib. 1. fol. 230. Myriophyllum alterum equisetifolium fluviatile Lob. Obs. fol. 460. Adv. Lob. fol. 354. Myriophyllum alterum Matth. Bauh. in Matth. f. 812. Viola aquatilis, Dod. Lat. fol. 584. Stratiotes fluviatilis Gesn. hort. fol. 283. der dritte Waßer-Fenchel Tab. die ander Fenchel-Garb. Matth. In lacunis passim.

CDXLIX. Mollugo montana angustifolia, vel Gallium album latifolium C. B. Pin. 334. Mollugo vulgatior Herbariorum, Galion album quorundam Lob. ic. p. 802. Galion candidô flore. Cord. in Dioſc. fol. 69. Cæs. lib. 8. c. 11. pag. 325. Gallion tertium, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 391, *Gallion album*, *Thal.* pag. 54. *Mollugo* prima Tab. lib. 1. fol. 538. Dod. Lateinisch fol. 354. Gallium flore albô, Cam. hort. pag. 63. Groß-Stern Meger-Kraut. Tab. Breit-blättriges weißes Meger-Kraut und Wallstroh. Seb. in Trag. In arenosis bey Königsberg passim. An Mollugo montana sive secunda Dod. Lat. fol. 354. quæ in monte bey Qvedenau reperitur?

CDL. Muscus terrestris vulgaris Lob. ic. pag. 242. o. Muscus palustris. Dod. Lateinisch fol. 472. Muscus vulgatissimus C. B. Pin. pag. 360. Muscus hortensis Trag. Kyber. in Trag. pag. 946. Gemein Erd-Moß. Im Gebrüch bey Lauten-Mühl copiosè. Flore utplurimum purpureô ibi repertus.

CDLI.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0271-8
DFG

Nō. 42 ad p. 167.

Muscus pennatus major
Cauliculis ramosis, in Summitate Velut spicatus.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0272-4
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0273-0
DFG

Nō. 43 ad p. 167.

Muscus pennatus minor Cauli-
culis ramosis, in Summitate
Velut spicatus.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0274-6
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0275-1
DFG

No. 44. ad. p. 267.

Muscus filicinus minor repens.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0276-7
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0277-3
DFG

Nō. 45. ad pag. 167.

Muscus bifolius procumbens foliis Subrotundis.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0278-9
DFG

CDLI. Muſcus pennatus: in prodr. C. B. pag. 151. Wald-Feder-Moß. In petroſis ac ſylvis freqvens eſt.

CDLII. Muſcus pennatus tectis vetuſtis inſidens Joh. Lœſ. Feder-Moß/ ſo auff den alten Dächern ſitzt. Viticulis ſuis brevibus ac ramoſis latè ſerpit hic muſcus, foliisque minutis pennam æmulantibus exornatur. Color ejus ex luteo vireſcit. Adnaſcitur etiam haud rarenter muris in ſenio conſtitutis.

CDLIII. *Muſcus pennatus major cauliculis ramoſis in ſummitate velut ſpicatus, Joh. Lœſel. Geſpitzter großer Feder-Moß mit äſtigen Stengelchen. Im Löbenichtſchen Walde.

CDLIV. *Muſcus pennatus minor cauliculis ramoſis in ſummitate velut ſpicatus. Joh. Lœſel. Geſpitzter kleiner Feder-Moß mit äſtigen Stengelchen. Cauliculi ejus textiles quaſi ſunt minutiis ac contortis foliolis copiosè ornati. Ramoſi adhæc cauliculi, parvulas quaſi ſpicas in ſummitate habentes. Viridis eſt muſcus, ſed quâ terram ſpectat ferrugineus. Im Löbnichtſchen Wald.

CDLV. *Muſcus filicinus minor repens. Joh. Lœſ. Klein kriechender Waldfahren-Moß. Viticulis eſt exiguis, ramuloſis, per terram ſerpentibus, in ſummitate velut ſpicatis, foliolis viridiuſculis, tenerrimè diſſectis. Radicationem fibris tenellulis refert acceptam. Bey Lauten-Mühl im Walde.

CDLVI. *Muſcus bifolius procumbens foliis ſubrotundis Joh. Lœſ. Zweyblättriger liegender Moß mit breiten rundlechten Blättern. Tenellula radix viticulas promit humi procumbentes, foliolis binis ſubrotundis, viridiuſculis, arctè ſe inſeqventibus, inſtructas ad latera pullulum

lulum sæpe seu ramusculum extrudentes. Im Löbnichtschen Walde.

CDLVII. *Muscus ramosus erectus oblongifolius Joh. Lœsel. Moß mit breiten länglichten Blättern. Ex radiculâ villosâ, nigricante cauliculus exit foliosus, in summitate ramosus, foliolis oblongis, latiusculis, virentibus numerosis, alternè incedentibus vestitus. Tenerior adhuc ramulis destituitur. Bey Selnicken oder Sunnicken.

CDLVIII. *Muscus erectus foliis in orbem sparsis Stern-Moß. Thyrsulis nascitur uncialibus sæpè & majoribus, quorum summo foliola insident amœnulè in orbem disposita, virentia & acuminata. Bey Selnicken.

CDLIX. Muscus uvida amans foliis subrotundis expansis. Joh. Lœsel. Wasser-Moß mit runden ausgebreiteten Blättern. Cauliculis crescit nigricantibus, quibus foliola adhærent subrotunda, viridia, aliquantulum crispa, alternatim sibi succedentia. Radiculæ tomentô quasi quôdam subnigricante obducuntur. Im Gebrüch beym Sarkauschen Kruge.

CDLX. *Muscus cupressiformis ramosus. Joh. Lœs. Aestiger Cypreßen-Moß. Cupressus quasi est, incanus, ramulosus, ramusculis intus cretulæ in modum candidis, queis indiscreta granulorum congeries assistit. Validissimè siccat, attritu digitorum in pollinem cinereum actus. Beym Löbenichtschen Walde.

CDLXI. *Muscus membraneus pilosus Joh. Lœsel. Dünner haarichter Baum-Moß. Assulatim adhæret corticibus arborum, musci pulmonarii instar, foris totus hirsutus & incanus, subtus membraneus & albidus. Im Löbnichtschen Walde.

CDLXII.

No: 46. p: 168.

Muscus ramosus erectus oblongifolius. No 47.

Muscus erectus foliis in orbem sparsis.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0281-4
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0282-0
DFG

Nō. 48. ad pag. 168.

Muscus cupressiformis ramosus.

Muscus membraneus pilosus. Nō. 49.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0283-5
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0284-1
DFG

CDLXII. Muſcus erectus ramoſus ſaturè viridis C. B. Pin. pag. 360. Selago tertia, Thal. pag. 116. Mürſemau Noſtratibus. Thyrſulis eſt ad radicem arctim conjunctis, ſuperiùs verò latiùs à ſe invicem disjunctis, in ſummo plerumque divaricatis, foliolis ſaturatè viridibus, quæ inter granula quædam aſſervantur. Iülos petiolis inſiſtentes ſuis, quales muſcus clavatus profert, edit nullos. Ruptis, ſugillatis, & præcipitatis auxiliô eſt. Purgat fortiter, tineas necat, menſes citat, & fœtus expellit, hinc ægrè diſtrahitur in officinis. Equorum uſitatiſſimum eſt medicamen. In der Fiſchhäuſiſchen Heyde.

CDLXIII. Muſcus terreſtris clavatus C. B. Pin. pag. 360. Muſcus clavatus Lob. ic. pag. 242. o. Muſcus terreſtris Trag. Kyber. in Trag. pag. 555. Matth. deutſch fol. 16. Muſcus terreſtris, ſive Licopodium Dod. Lateiniſch fol. 472. Lycopodium Tab. lib. 2. fol. 487. Selaginis ſpecies altera, Thal. pag. 116. Chamæpeuce Cord. hiſt. fol. 111. Muſci genus, quod pro ſpicâ Celticâ vendebatur Cæſ. lib. 16. cap. 21. pag. 602. Beer-Lapp Kyber. in Trag. Matth. Katzen-Leiterlein. Tab. Gürtel-Kraut/ Seil-Kraut/ Haar-Schaar und Teuffels-Klauen Dod. Löwen-Fuß / Neunheil und Neungleich quibusdam.

Clavi hujus plantæ pulverem reddunt elegantiſſimum, Plaun Ruſſis dictum, quem diſtrahunt veſicæ bubulæ incluſum. Clavos Auguſtô menſe maturatos copiosè colligunt, in furno ſiccatos, tundunt ac pulviſculum excutiunt, quem in vulneribus & ulceribus ſiccandis commendatiſſimum habent, ac intertrigine infantum etiam nihil albo præferunt. Adhæc Ruſſi pulviſculô hôc ignes ſuos celebrant Chaldaicos,

cos, flammas eo excitantes aspectu ludicras. Pixidulæ lamineæ, ulnæ dimidiatæ longitudine ac Pyramidis formâ, Plaun istud ingerunt, orificio admotâ seu face seu candelâ, pòst pixidulum deorsùm impetu quôdam trahendo commovent, ut pulvisculus lychnum tangat, & in flammas vertatur. Id ubi multoties iteratur, flammis subinde novis excitatis jucundum redditur adstantibus spectaculum. Sunt & qui tubulum Tabaci Plaun hôc complent admistô aliô pulvere, & inter scyphos convivis flammas offerunt cum stridore insperatas. Mirum est, pulverem hunc non accendi igne, nisi insufflletur. Olearius in descript. Itineris Persici pag. 331. In locis umbrosis inter ericeta passim. Item in der Fischhäusischen Heyde.

CDLXIV. Muscus clavatus foliis cupressi C.B. Pin. 361. Savina sylvestris Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 441. Savina sylvestris Tragi, Gesn. hort. fol. 278. Sabina sylvestris Lon. deutsch fol. 213. Chamæcyparissus Tab. Lib. 3. fol. 649. Savina Tragi sylvestris seu silaginis Plinianæ prima species, Thal. p. 115. Wald-Cypreß Tab. Wald-Sadenbaum Sebitz. in Trag. Lon. Gertlein / Gertel / Gertwurtz / und Schoßwurtz quibusdam. Wilder Sadebaum Nostratibus. Calefacit & siccat. Contra oculorum vitia suffitu prodest. Hinter der großen Glaß-Hütt im Scapen / in ericetis.

CDLXV. Muscus Coralloides muralis Joh. Lœsel. Maur-Moß. Cinerei est coloris, ac muris adeò firmiter adhærescit, ut baculô decussus aliquid lateritiæ substantiæ radicis locô secum auferat. Non inutile credo in hæmor-

rhagiâ

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0287-9
DFG

Muscus arboreus pyxioides pilosus. No. 50. p. 170

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0288-4
DFG

rhagiâ, & fortè Usneæ Cranii præferendum. In pago Margenau an der Kirch.

CDLXVI. Muscus Pyxioides terrestris C. B. Pin. pag. 361. Büchsenformiger Erd-Moß. Muscus terrestris pyxidatos alabastriculos imitatus. Lob. ic. pag. 267. o. In der Fischhäusischen Heyde/ in Ericetis passim.

CDLXVII. Muscus pyxioides saxatilis, in Prodr. descriptus C. B. pag. 152. Büchsenförmiger Stein-Moß/ Saxis passim adnascitur.

CDLXVIII. Muscus terrestris Coralloides erectus incanus, C. B. in Prodr. pag. 152. Gerader grauer Corallen-Moß/ bey dem Löbnichtschen Walde.

CDLXIX. Muscus terrestris Coralloides erectus, cornibus ruffescentibus C. B. in prodr. pag. 152. Gerader Corallen-Moß/ mit röthlichen Hörnern. In locis aridioribus inter ericeta nach dem Löbenichtschen Walde zu.

CDLXX. *Muscus arboreus pyxioides pilosus Joh. Lœs. Härigter Büchsenformiger Baum-Moß. Incanus est totus, ramusculis instructus plurimis, pilosis, ac velut in cornua dissectis, qui vel ad latera, vel in fastigio passim tubulos gestant, sed depiles, quales in pyxioide terrestri. In Qvercubus bey Selnicken und im Löbnichtschen Walde.

CDLXXI. Muscus capillaceus cinerei coloris è ramis ilicis dependens, Clus. Hist. In Indice apud Clus. non est. Muscus capillaceus longissimus C. B. Pin. pag. 361. sehr langer Aschfarber Baum-Moß. In sylvis passim, item in der Fischäusischen Heyde.

CDLXXII. Muscus arboreus, Trag. Kyber. in Trag. pag. 946. Matth. Bauh. in Matth. *fol.* 65. Thal. pag. 77. Dod. Lateinisch *fol.* 471. Muscus arboreus. Usnea officinarum

rum C. B. Pin. pag. 361. Muſcus Cord. in Dioſc. *fol.* 7. Muſcus arborum Tab. Lib. 2. *fol.* 482. Lon. deutſch *fol.* 87. Muſcus quernus Lob. ic. p. 242. Baum-Moß. Tab. Mooß oder Baum-Mooß Lon. Eichen Moß quibusdam. Pineus & abietinus, isque candidus melior cenſetur quernô. In ſylvis paſſim obvius.

CDLXXIII. Muſcus pulmonarius, ſive pulmonaria Officinarum Lob. ic. pag. 248. o. Pulmonaria, Trag. Kyber. in Trag. pag. 524. Tab. Lib. 2. *fol.* 259. Fuchſ. *fol.* 637. Dod. Lateiniſch *fol.* 474. Lon. deutſch *fol.* 247. Pulmonaria tertia, Cluſ. Pann. pag. 675. Pulmonaria ſecunda, Bauh. in Matth. *fol.* 733. Pulmonaria vulgaris Thal. pag. 89. Pulmonaria Lichenis quoddam genus, Cæſ. Lib. 16. c. 20. pag. 602. Lungen-Kraut. Tab. Matth. Lon. Fuchſ. Eichen-Lung Ruſticis. Paſſim in ſylvis.

CDLXXIV. Muſcus pulmonarius corpuſculis fuſcis papillatus. Lungen-Moß mit dunckeln Wartzeln. Im Löbenichtſchen Walde.

CDLXXV. *Muſcus marinus λιθοπώγων dictus Johan. Lœſ. Meer-Moß oder Steinbart. Ex numeroſiſſimis villis, modò latiuſculis, modò tenuiſſimis barbæ inſtar à lapide pendentibus, eidemque firmiſſimè annatis, conſtituitur, qui ſiccati criſpuli fiunt filamentis contractis. Color jam ſubviridis eſt, jam purpureus, jam albicans. Barbati hi lapides in littore maris freqventes. Bey Germau an der See.

CDLXXVI. Muſcus marinus capillaceus, Joh. Lœſ. Langer See-Moß. In littore maris.

CDLXXVII. *Muſcus aquaticus Ceratoides, Johan. Lœſ. Gehörnter Waßer-Moß. Septem octóve uncia-

Nō. 51. ad pag. 172

Musaus marinus λιθοπώρων dictus.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0291-3
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0292-9
DFG

Muscus aqvaticus Ceratoides. No. 52. p. 172

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0293-5
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0294-1
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0295-6
DFG



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0296-2
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0297-8
DFG

No. 54. ad p. 373.

Muscus aqvaticus bombycinus retiformis.



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0298-4
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0299-2
DFG

No. 55. pag. 173.

Muscus aqvaticus bombycinus tenuissimis filamentis.



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0300-8
DFG

ciarum sæpe est, sæpiùs minor, totus ex atrô virens, nonnunquam & incanus, thyrsis rotundis, spongiosis, ramulosis, in extremitate trifidis, quadrifidis, cornua quasi quædam effigie exprimentibus. Lignis putridis adnascitur sub aquis, & putidulus seu graveolens existit, vel diutulè servatus vel etiam siccatus. Im Mühlen-Flüß zu Schwanis. Item zu Kahlhoff im Teich bey der Kupffer-Mühlen.

CDLXXVIII. *Muscus aquaticus denticulatus, Joh. Lœsel. Zähnigter Waßer-Moß. Ramosus est, sub aquis fluitans, saxis nonnunquam & lignis firmiter annatus, foliis exiguis, numerosis, subviridibus, ex oblongô in acumen abeuntibus, quæ trinâ constitutâ serie cauliculos ita ambiunt, ut quasi trisulci appareant. Im Fluß Zahin bey Glaubitten. Item Zu Bladau im kleinen Bächichen nach Neuhausen zu.

CDLXXIX. *Muscus aquaticus bombycinus retiformis Joh. Lœs. Subtiler Netz-förmiger Waßer-Moß. In fossis nach dem Bretter-Kruge zu.

CDLXXX. *Muscus aquaticus bombycinus tenuissimis filamentis Joh. Lœs. Waßer-Moß von gantz zarten Fädemchen. In fossis nach dem Bretter-Kruge.

CDLXXXI. Muscus aquaticus tenuissimis foliis, cauliculis adhærentibus Joh. Lœs. Waßer-Mooß mit gantz kleinen subtilen Blätterchen. Bey Robitten in paludibus. Muscus hic in locis udis natus & exsiccatus tectis inservit, suppositus lateribus Bieber-Schwäntz vocatis. Soll beßere und dichtere Dächer geben / als wenn die Ziegel mit dem besten Kalck verschmieret würden.

CDLXXXII. Muscus aquaticus subterraneus Johan. Lœs. Langer Waßer-Moß/ so tieff unter der Erden gestan-

den. In prædiô Wandlacken anno 1648. puteum dùm fodiunt, vena offenditur ampla, exsultim ludentem copiosè exspuens aquam. Cujus profunditatem contô ligneô, orgyias d as longô ubi explorare desudant, contus abyssô delusus, non solùm impete vastô ab aquâ derepentè redditur, sed & unà muscus quidam incognitus, cubitô longior egeritur, quem putearii & infruniti adstantium animi negligentiùs habuêre, terrâ eum statim obruentes.

CDLXXXIII. Myagrum siliquâ longâ. C. B. Pin. pag. 109. Lein-Dotter mit langen Schoten. Cameline, Myagrum alterum Thlaspi effigie Lob. ic. pag. 225. Myagrum secundum Lobelii Tab. Lib. 2. *fol.* 538. der ander Leindotter Tab. Cauliculis est rotundis, striatis, asperis, sæpius virentibus, quandoque rufescentibus, quorum fastigiis quadrangulæ siliquæ nanis flosculis luteis succedentes, ac pedicellis suis fultæ insistunt. Folia oblonga & exiliter sinuata, aspera sunt. Radix contortula ac filamentis instructa albicat. Passim bey Königsberg.

CDLXXXIV. Myagrum sativum C. B. Pin. pag. 109. Myagrum primum Tab. Lib. 2. f. 358. Pseudomyagrum Bauh. Matth. fol. 815. Linaria quinta Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 283. Myagrum adv. Lob. f. 115. Sesamum Lon. deutsch f. 189. Camelina sive Myagrion Dod. Lateinisch f. 532. Camelina Dodonæi seu Myagron Thal. p. 28. Dorella, Cæs. Lib. 8. cap. 79. pag. 367. Leindotter oder Flachß-Dotter Lon. Flachs-Kraut quibusdam. Lino passim se admiscet. Utrum hoc Sesamum in Linum degeneret, notandum.

CDLXXXV. *Myagrum monospermon hirsutum siliquis rotundis. Joh. Lœs. Myagri duæ species. Cam. in

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0303-6
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0304-1
DFG

in Matth. deutsch f. 454. Rauger Leindotter mit runden Schöttlein. Bicubitali quandoque est caule, viridi, proximè radicem digitum minimum crasso, concavô, hirsutô, striato ac ramosô. Foliis Thlaspi hirsutie asperis, acuminatis, in exortu lobis duobus caulem amplexantibus: flosculis in ramorum fastigiis nanis, luteis foliolis quatuor instructis, quos deciduos excipiunt plusculæ capsæ virescentes, duriusculæ, ex lato rotundatæ: petiolis longis innitentes, filamento in apice exili, quæ diffractæ in singulis theculis unicum asservant semen. Radix ei albicans lignosa, paucis fibris. Floret mense Julio, imò & Octobri illud floruisse memini. Hinter dem Kneiphöfischen Wall im Stadt-Graben.

CDLXXXVI. Myrrhis sylvestris seminibus lævibus C.B. Pin. pag. 160. Cicutaria Gesn. Hort. f. 253. Lon. deutsch f. 266. Myrrhis Fuchs. f. 525. Myrrhis sylvestris Cam. Hort. pag. 104. Busch-Mören mit glatten Saamen. Busch-Mören oder Kälber-Korn Lon. Wilde Körfel Fuchs. Kälberkropff Nostratibus. Radix menses & secundas ejicit, pulmonum ulcera abstergit ac solidat. Bey Königsberg copiosè.

CDLXXXVII. Myrrhis sylvestris seminibus asperis C. B. Wilder Körfel mit scharffen Saamen. Myrrhis sylvestris nova Æquicolorum. Colum: min. cogn. stirp. & rar. pag. 113. part. I. Büsch-Möhren mit raugen Saamen. Passim am Königsbergschen Wall.

CDLXXXVIII. Myrrhis sylvestris inodora Joh. Loes. Wilder Körbel/ so keinen Geruch hat. Im Gepusch bey Bladau.

CDLXXXIX. Nasturtium aquaticum Dod. Lateinisch

f. 592. Lon. deutsch f. 144. Nasturtium aquaticum & secundum, Trag. Kyber. in Trag. pag. 82. Nasturtium aquaticum supinum C. B. Pin. pag. 104. Sion Cratevæ Erucæfolium Lob. ic. pag. 209. Sisymbrium aquaticum Bauhin. in Matth. f. 379. Cæs. Lib. 8. cap. 68. pag. 362. Sisymbrium aquaticum primum Tab. Lib. 2. f. 167. Sisymbrium Cardamine, Fuchs. fol. 723. Sisymbrium alterum Cord. in Diosc. f. 45. Sisymbrium alterum Dioscoridis. Gesn. hort. fol. 281. die Iste Brunn-Kreß. Tab. Kyb. in Trag. Fuchs. Brunn-Kreß oder Waßer-Kreß Lon. Ad marginem des Penartischen und Löbenichtschen Waldes in fossis, item hinter Selnicken am Land-Graben zwischen Lentzen und Dörkeiten. Folia nonnihil quandoque laciniata sunt. Folia colligenda Sole in ♉ versante, flores in 1. ♌.

CDXC. Nasturtium pratense vel tertium. Trag. Kyber. in Trag. pag. 83. Nasturtium pratense magnô flore C. B. Pin. pag 104. Nasturtium aquaticum simplici flore Eystett. *Sisymbrium aquaticum secundum* Tab. Lib. 2. f. 168. Iberis Fuchs. ic. pag. 185. Cardamine altera simplici flore, Clus. hist. Lib. 5. f. 128. Cardamine altera sive Sisymbrium Cardamine secundum Lob. ic. pag. 210. Nasturtium agreste Fuchs. fol. 325. Lon. deutsch f. 195. Sisymbrio aquatico non absimilis. Cæs. Lib. 8. cap. 68. pag. 362. Gauch-Blum Brunf. deutsch f. 131. flosculi Dod. Lateinisch f. 592. Iberis sive Dardamantice Nasturtii foliô, Thal. pag. 60. Lepidium minus Cord. in Diosc. f. 48. Gauch-Blum Lon. Fuchs. Die andere Brunn-Kreß. Tab. Wiesen-Kreß mit großer Blüth. In riguis passim bey Königsberg.

CDXCI. Nasturtium sylvestre tenuissimè divisum C. B. pin. pag. 105. Wilde Kreß oder Sophien-Kraut mit

gantz

gantz kleinen zertheileten Blättern. Sophia Chirurgorum Lob. ic. pag. 738. Sophia Dod. Lateinisch f. 133. Nasturtium sylvestre Gesn. hort. f. 268. Thalictrum, Herba Sophia latifolia, Tab. ic. pag. 6. Seriphium Germanicum, Trag. Kyber. in Trag. pag. 338. Seriphium absynthium Fuchs. fol. 2. Seriphium Lon. deutsch f. 184. Thalictrum Dodonæi, seu Sophiæ, & Nasturtium μυριόφυλλον Thal. p. 121. Accipitrina Cæs. Lib. 8. cap. 66. pag. 361. Wellsaamen Lon. Kyber. in Trag. Sophien-Kraut-Männlein Tab. Semen ejus officinis est semen sangvinariæ. In incultis bey Königsberg passim.

CDXCII. Nummularia major lutea C. B. Pin. pag. 309. Nummularia Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 637. Matth. Bauh. in Matth. fol. 716. Dod. Lateinisch fol. 600. Eystett. Cam. hort pag. 107. Numularia Lon. deutsch fol. 239. Cæs. Lib. 6. cap. 56. pag. 261. Centummorbia, Fuchs. f. 401. Nummularia sive Centmorbia, Lob. Adv. ic. p. 474. Numularia Tab. Lib. 2. fol. 547. Egel-Kraut Fuchs. Groß und klein Egel-Kraut Tab. Egel-Kraut/ Pfennig-Kraut/ und klein Natter-Zung Lon. Schlangen-Kraut quibusdam. Waßer-Polley vetulis. In locis humidis circa fluentia passim.

CDXCIII. Nymphæa lutea major C. B. Pin. p. 139. Große gelbe See-Kannen. Clus. Hist. Lib. 4. f. 77. Nymphæa lutea Trag. Sebitz. in Trag. deutsch f. 552. Dod. Lateinisch fol. 585. Lon. deutsch fol. 213. Matth. deutsch fol. 372. Lob. ic. pag. 594. Tab. Lib. 2. f. 413. Fuchs. fol. 536. Eystett. Nenuphar luteum, Brunf. Lateinisch tom. I. fol. 38. Nymphæa citrina. Cord. Hist. fol. 99. Nymphæa altera Cord. in Diosc. f. 59. Nymphæa altera flore ex toto luteo

Cæs.

Cæs. lib. 15. cap. 7. pag. 568. Geele See-Blum Tab. Seb. in Trag. Fuchs. Matth. Geele See-Bluhmen / Kellerwurtz / Keulwurtz / Waßer Mohn / Haarwurtz und Herculis-Wurtz. Lon. Haarstrang und Waßer-Lilien quibusdam. Geele Mummeln Nostratibus, item geele See-Kannen. In aquis stagnantibus passim. Folia Nymphææ infensas sibi habent erucas, hinc rarò folium invenitur non erosum aliquâ sui parte. Erucæ illæ albicant, & inter duo foliorum frustula, quæ erodendô abstulerunt, nave quasi constructâ, delitescentes super aquis vehuntur.

CDCXIV. Nymphæa lutea minor parvô flore C. B. Pin. pag. 194. An Nymphæa parva alia Cam. in Matth. fol. 306. Nymphæa lutea minor Septentrionalium. Lob. ic. pag. 595. Kleine gelbe Seekannen in fossis nach dem Bretter-Krug zu.

CDXCV. Nymphæa alba major. C. B. Pin. p. 193. Nymphæa alba Matth. deutsch fol. 372. Dod. Lateinisch f. 585. *Tab. lib. 2. fol. 412. Cord. hist. fol. 59. Thal. fol. 80.* Lob. ic. pag. 595. Lon. deutsch fol. 212. Nymphæa candida Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 552. Fuchs. fol. 535. Nymphæa alba, Lotus Ægyptia Alpini. Clus. hist. lib. 4. fol. 77. Nymphæa major alba, Eystett. Nenuphar album, Brunf. tom. 1. fol. 38. Weiße See-Bluhm Matth. Lon. Tab. Fuchs. Weiße See-Kannen / und weiße Mummeln Nostratibus. Refrigerant flores & humectant. Radix vinô nigrô decocta potu immoderatum mensium fluxum efficaci ac certo remedio sistit. Porcis ægrotantibus offertur à Nostratibus. In fossis & piscinis passim.

CDXCVI. Nymphæa alba minima. C. B. Pin. pag. 193. Morsus ranæ Dod. Lateinisch fol. 583. Lob. ic. pag. 596.

Nym-

Nymphæa alba minor, Tab. Lib. 2. fol. 412. Kleine weiße See-Blum Tab. Frosch-Biß. In fossis nach dem Bretter-Kruge zu.

CDXCVII. Ocimum vulgatius C. B. Pin. pag. 226. Ocimum sive Basilicum medium vulgatius Lob. ic. pag. 503. Ocimum medium vulgatius Adv. Lob. fol. 215. Ocimum medium Matth. deutsch f. 197. Eystett. Cam. in Matth. f. 164. Ocimum magnum, Tab. ic. pag. 343. Basilica minor & Baccharis Germanica. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 23. Ocimum mediocre, Fuchs. fol. 548, Ocimum tertium & medium Cæs. Lib. 11. cap. 59. pag. 469. Mittel-Basilien Matth. Fuchs. Klein Basilgen Sebitz. in Trag. Groß Basilien Thab. Hinter dem Wall bey der Haberbergischen Kirche. Item bey Lauten-Mühl inter segetes.

CDXCVIII. Onobrychis floribus viciæ dilutè cæruleis C. B. Pin. pag. 351. Onobrychis secunda, Clus. hist. lib. 6. fol. 239. Clus. Pann. pag. 753. Onobrychis Clusii secunda, Tab. Lib. 2. fol. 214. Hanen-Kopff mit lichtblauen Wicken-Blühmlein. Ad littus maris bey S. Albrecht. Item zwischen dem Sand- und Dümpel-Kruge. In arenosis.

CDCXIX. Ophioglosson, Matth. Bauh. in Matth. fol. 447. Trag. Kyber. in Trag. pag. 323. Dod. Lateinisch fol. 139. Thal. pag. 81. Cam. hort. pag. 110. Eystett. Ophioglossum Lon. deutsch f. 132. Tab. Lib. 2. f. 519. Fuchs fol. 577. Lancea Christi & Ophioglossum Gesn. hort. fol. 263. & 269. Ophioglossum vulgatum C. B. Pin. f. 354. Lingva serpentina, Cæs. Lib. 16. cap. 17. pag. 600. Ophioglosson, sive Enophyllum. Lob. ic. pag. 808. Lingula vulneraria Cord. Hist. fol. 153. Natter-Zünglein Kyber. in Trag.

Tab. Lon. Fuchs. Im Dollkeimischen Roß-Garten in muscosis, mense Juniô. Variat lingulâ, quæ communiter simplex, quandoque duplex vel triplex. Mansu subdulcis est herba & glutinosa nonnihil. Radix cum amarore subacris, exsiccat cum exiguo calore, tumores discutit, recentia & maligna vulnera glutinat, Phtisicos, hæmoptoicos ac herniosos egregiè juvat, pota vel admota. Chirurgi plantam oleo macerant, quò diutiùs insolato post felicissimè utuntur. Ab apibus læsum succus illitu curat. In loca hortorum umbrosa translata durat.

D. Ophris bifolia C. B. Pin. pag. 87. Ophris Bauh. in Matth. f. 846. Fuchs. f. 566. Tab. Lib. 2. f. 396. Cæs. lib. 10. cap. 48. pag. 430. Bifolium Adv. Lob. ic. pag. 302. Cam. hort. pag. 28. Lon. deutsch f. 269. Alisma Gesn. hort. fol. 245. Bifolium & Satyrion decimum. Trag. Kyber. in Trag. p. 784. Pseudoorchis. Bifolium Dod. Lateinisch fol. 242. Perfoliata mascula Brunf. Lateinisch Tom. I. fol. 182. Zwey-Blatt Tab. *Matth. Fuchs. Lon.* Durchwachs-Männlein Brunf. In uliginosis ac tenebrosis beym Krantz-Kruge. Item beym Penartischen Walde.

DI. *Ophris μονόφυλλος bulbosa. Joh. Lœs. Einblatt mit zwieblechter Wurtzel. Radix bulbosa & fibrosa, cui παραφυὰς interdum bulbulus alius cauliculum simplicem & rotundum exire patitur, spithamæ longitudine, sæpè & productiorem, folium latum & oblongum præstò habentem, cacumen versùs numerosis instructum capsis, tenui pediculô fultis, quibus flosculi paulò antè insederant. Bey Roßitten im Gebrüch.

DII. *Ophris δύφιλλος bulbosa, Joh. Lœs. Bifolium bulbosum Dod. Lateinisch f. 242. Ophris bifolia bulbosa

C. B.

Ophris μονόφυλλος bulbosa.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0311-0
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0312-6
DFG

Nō 58 pag. 180.

Ophris δύφυλλος bulbosa.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0313-1
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0314-7
DFG

C. B. Pin. pag. 87. Zwey-Blatt mit zwieblechter Wurtzel. Radix bulbosa uvam veluti quandam adſtitem habet uvæ criſpæ ferè aſſimilem, ſtipulam exilem ſursùm efferentem. Exilior eſt priore, utraque ophris defloruerat, ubi eas acceperam. Ad rupta & vulnera glutinanda efficax. Hinter Fiſchhauſen auff der Wieſen nach Lochſtät zu.

DIII. Orchis alba bifolia minor calcare oblongô C. B. Pin. pag. 83. teſticulus vulpinus primus, cujus flores culices exprimunt Lob. ic. pag. 178. Teſticulus vulpinus latifolius Tab. lib. 2. fol. 349. Orchis bifolius Cam. hort. pag. 111. Orchis flore albô minor Eyſtett. Teſticulus bifolius Cord. Hiſt. fol. 150. Orchis Serapias primus Dod. Lateiniſch fol. 237. Fuchs-Hödlein oder Fliegen-Bluhmen Tab. Standthart vetulis. In locis herboſis beym Penartſchen Walde.

DIV. Orchis palmata paluſtris tertia C. B. Pin. pag. 86. Palma Chriſti paluſtris ſecunda, Tab. lib. 2. fol. 357. Cynoſorchis paluſtris lævi folio & anguſto, ſeu Leptophylla omnium viliſſima C. Gemmæ Lob. ic. pag. 193. Waßerhandleins-Wurtz Tab. mit glatten ſchmalen Blättern. In riguis bey dem Penartiſchen Walde.

DV. Orchis palmata pratenſis maculata C. B. Pin. pag. 85. Palma Chriſti maculata Tab. ic. Eyſtett. Satyrium fœmina foliis maculatis Thal. pag. 113. Orchis fœmina altera Trag. Sebitz. in Trag. deutſch fol. 616. Palma Chriſti. Serapias fœmina pratenſis Lob. ic. pag. 188. Satyrion fœmina. Swert. florileg. part. I. fol. 63. Satyrion Baſilicon Græcorum, officinarum Chriſti palma Ruell. fol. 564. Orchis Serapias Lobelii Cam. hort. pag. 111. Satyrion Baſilicon fœmina Lon. deutſch fol. 234. Dod. Lateiniſch fol. 240.

Palma Christi, Cord. hist. fol. 130. Cæs. lib. 10. cap. 47. pag. 430. Händleins-Wurtz/ Creutz-Bluhm Tab. Creutz-Blum-Weiblein Kyber. in Trag. Lon. Gesprengte Händleins-Wurtzel Nonnullis. In riguis beym Penartschen Walde copiosè.

DVI. *Orchis palmata flore galericulatô dilutè viridi. Joh. Lœs. Händlein-Wurtz mit gehelmter lichtgrüner Blüth. Coliculum effert novem unciarum in longitudine, striatum, pallidè virentem ac lævem, cui folia assistunt plantaginis nervosæ facie, quorum ima terræ appronata majora ac rotundiora, cætera thyrso in progressu servientia, minora & acutiora. Flosculis in fastigio est galericulatis, labro prominulo, scrophulariæ aquaticæ quoquo modo æmulis, infimâ parte rubentibus, supernâ pallidè virentibus, ac foliolis suffultis. Radix variat, quæ modò palmata est, modò egregiè digitata. Convenit ferè cum Orchide palmatâ, flore viridi, C. B. in Prodr. pag. 30. descriptâ. Floret mense Junio. Im Grünhöfischen im Dollkeimischen Roß-Garten.

DVII. Orchis palmata palmis inversis flore albô, Joh. Lœs. umbgekehrte Händlein-Wurtz mit weißer Blüthe. Caulis hujus orchidis undecim uncias longus est geniculatus, foris candidus ac splendens, concavus intus, cujus geniculis foliorum locô valva quædam apponitur, ad fuscum nonnihil devergens colorem. Fastigio thyrsi mense Julio flosculi insident galericulati, candidi, effigie muscas ferè referentes, quibus quinque alia subflava ac semiunciam longa assistunt folia. Tota florum compages petiolô nititur exili, cui ad geniculum caulis unicum substernitur foliolum oblongum & acuminatum. Radix fusca est ac palmata, ex

fru-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0317-4
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0318-0
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0319-9
DFG

No. 60. ad pag. 183.

Orchis muscæ corpus referens maculosa.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0320-0
DFG

frustulis quatuor constituta, quæ in summo bifida, trifida ac quadrifida, palmas erectas ferè facie præsentantia. Hinter Krafftzen im Walde. Mense Juliô.

DVIII. Orchis muscam referens major. C. B. Pin. pag. 83. Testiculus muscarius quartus Tab. Lib. 2. f. 346. Orchis Myodes altera, foliô læviore & flore grandiusculô Lob. ic. pag. 182. Braunrothe glatte Fliegen-Ständel-Wurtz mit großer Blüth; Die vierdte Steudel-Wurtz Tab. Beym Krantz-Kruge und Qvednau. Radicibus utuntur officinæ in conficiendo electuario.

DIX. *Orchis muscæ corpus referens maculosa. Joh. Lœs. Fleckicht Fliegen-Stendel-Wurtz. Radix geminô bulbô, quorum alter turgidus & albus, nucis moschatæ magnitudine, cauli modò affirmatur tenellis duobus filamentis, & capsulâ quasi quâdam, in summo bulbi enatâ, exortis; modò absque medio thyrso nectitur: alter flaccidus totus, rugosus & succo inanitus, thyrso tenaciter jungitur, villis longiusculis dependentibus instructus. Caulis erat viridis, semicubitum proceritate superans, rotundus, cavus, striatus, fastigium versùs contortus, cui flores initiô purpurascentes, temporis lapsu albescentes, è volvis oblongis, viridibus & contortis, cauli indiscriminatim & copiosè adsistentibus, queis singulis foliolum subservit viride, exeunt. Labellum florum inferius in quatuor elegantissimè divisum est partes, pronâ facie albicans, maculisque purpureis insignitum, aversâ candidum, lobum exilem purpurascentem, sæpiùs album, & nonnihil inflexum imâ parte alens. Superiùs flos seu galea qvina alit folia, quorum tria suprema majora, duo sub se alia minora abscondunt, convexâ parte purpurei, simâ pallidi coloris, in meditullio corpusculum sublateum

sæpe pallidum, muscæ capitulum referens, concludentia. Cæterùm grandiora proximè terram folia nervosa sunt, ex quibus unum vel alterum in medio caulis constituta eundem fotu suo velut in vaginâ conclusum servant ac tuentur. Grandior radicis bulbus viscidi succi, gustu subdulcis est initiô, mox acredine quantillâ lingvam vellicat, adstrictionem qualem qualem post se relinquens. Floret mense Majo, & Juniô incipiente. Bey Lauten-Mühl.

DX. *Orchis coleô unicô, seu Monorchis flosculis pallidè viridibus Joh. Lœs. Einhödlein-Wurtz mit lichtgrüner Blüth. Plantula est septem unciarum & pauciorum sæpe altitudine, thyrsulô exili striatô, foliis propè terram binis, coliculum amplexantibus, queis in processu thyrsi foliolum succedit acuminatum: flosculis in summitate est pallidè virentibus, thecularum effigie, in ambitu foliosis. Radix coleô unicô ac transparente ferè, filamentis quibusdam crassiusculis superbit. Floret mense Junio. Im Grünhöffischen und Dollkeimischen Roß-Garten.

DXI. Orchis abortiva fusca C. B. Pin. pag. 86. dunckle mißgebürtige Knaben-Wurtz. Nidus avis ex speciebus Satyrii abortivi. Orchis abortiva Lob. ic. 194. Eystett. Satyrium abortivum species Hypocysti Lob. ic. pag. 271. o. Satyrium novum Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 620. An Orobanche prima Tab. Lib. 2. fol. 358. Orchis sylvestris Lon. deutsch fol. 233. Orchis abortiva Lobelii. Clus. hist. lib. 2. fol. 270. Neottia Dod. Lateinisch fol. 553. das neunde Margendrehen. Sebitz. in Trag. Wild Knabenwurtz Lon. Im Buch-Walde zwischen Schwanis und Perschke/ in umbrosis.

DXII. Origanum vulgare Trag. Sebitz. in Trag. deutsch

No 61. pag 184.

Orchis Coleo unico. Seu
Monorchis flosculis pallide
Viridibus.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0323-7
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0324-3
DFG

deutsch fol. 29. Matth. deutsch fol. 284. Lon. deutsch fol. 148. Eystett. Oryganum Sylvestre. Cunila bubula Plinii C. B. Pin. pag. 223. Agrioriganum sive Onitis major Lob. ic. pag. 492. Origanum sylvestre Dod. Lateinisch fol. 285. Cord. in Diosc. f. 52. Cam. hort. pag. 112. Origanum sylvestre seu vulgare Fuchs. f. 552. Tab. ic. pag. 346. Origanum Brunf. Lateinisch tom. 3. fol. 159. Origanum Italicum, Cæs. Lib. 11. cap. 52. pag. 463. Gemein Dosten oder Wollgemuth Tab. Wollgemuth Brunf. Fuchs. Berg-Müntz und brauner Feld-Dost quibusdam. Calefacit & siccat tertio excessu, incidit, extenuat, Gal. 6. simpl. Folio ex umbellâ infarctus omnes expedit tussientes, spleneticos & ictericos juvat, mensesque ducit: Oedemata, aliosque laxos tumores fotu illituque discutit. Prurigines, scabies balneo expurgat. Cerevisiæ additum eam ab acore præservat. Inter coryleta bey Bladau. Sub Elevatione Poli 45. 46. 47. 48. 49. Flores colligendi Sole 15. ♌ occupante: Semen, Sole 8. ♎ obsidente.

Origanum olim columbis vulneraria erat planta. Antigonus Carystius, hist. mirab. c. 42. ἡ φάτνα δὲ ὅταν πληγῇ τὴν ὀρίγανον ἔσαξεν εἰς τὸ ἕλκος, καὶ γίνεσθαι τοῦτον τὸν τρόπον ὑγιής. Palumbes percussa origanum vulneri indit, hôcque modo sanatur. Ubi notandum Antigonum fœminino genere origanum ponere. Eodem genere protulit sive Cantharus sive Plato: *Ex Arcadiâ hic Origanum attulit acerrimam.* Sunt, qui masculino genere Origanum dixerunt. Alexandrides: *Asparagum condidit ac lentiscum, & origanum, qui admixtus Coriandro, salsamentis gratiam addit & ornamentum.* Ion. *Ejus manu abditus est statim origanus.* Neutro & Epicharmus & Ameipsias Origanum efferunt genere.

DXIII.

DXIII. Origanum sylvestre album C. B. Pin. pag. 223. Origanum album. Tab. lib. 2. fol. 58. Origanum sylvestre flore albô Cam. hort. pag. 112. Weißer Feld-Dost. Vulgari respondet demptô flore. Passim.

DXIV. Ornithogalum luteum C. B. Pin. pag. 71. Cord. in Diosc. fol. 46. Lob. ic. pag. 165. Tab. Lib. 2. f. 321. Sweert. Florileg. part. 1. fol. 57. Bulbus agrestis Trag. Kyber. in Trag. pag. 737. Bulbus sylvestris Tragi, Cam. hort. pag. 31. Bulbus esculentus Lon. deutsch, fol. 226. Bulbus sylvestris alius bifolius. Gesn. Hort. fol. 251. Sisyrinchion, Cord. hist. fol. 122. Acker-Zwiebel/Feld-Zwiebel und Wild-Zwiebel. Kyber. in Trag. Geele Feld-Zwiebel Tab. Feld- oder Acker-Zwiebel. Lon. Klein Erd-Nüß, Cord. in Diosc. Ziegen-Lauch Nostratibus. Mense Aprili copiosè inter dumeta in der Hollen-Grund.

DXV. Orobanche major, garyophillum olens C. B. Pin. pag. 87. *Hypogenista*, Rapum genistæ à similitudine Lob. ic. pag. 268. o. Orobanche, Matth. deutsch fol. 198. Cord. in Diosc. fol. 46. Lon. deutsch fol. 276. Eystett. Cæs. pag. 342. Thal. pag. 80. Orobanche vera Gesn. hort. fol. 270. Leonina herba & Legumen Leoninum Ruell. fol. 390. & fol. 326. circa finem. Orobanche prima Clus. hist. lib. 2. pag. 270. Orobanche secunda Tab. lib. 2. f. 358. Limodoron sive Orobanche Dod. Lateinisch f. 552. Sommer-Wurtz/Lon. Tab. Wollriechende Sommer-Wurtz/Erwenwürger Matth. Orobanche hæc semper alterius plantæ radici adnascitur, eidemque alimoniam subtrahit, unde & Limodoron Theophrasto nominatur. Hinter Lopänen in incultis nach der See zu.

DXVI.

DXVI. Orobanche μονόκλωνος flosculis pediculis insidentibus, radice acuminatâ J. L. Spitzwurtzige Sommer-Wurtz deßen Blüth auff kleinen Stangen. An Orobanche hypopytis C. B. qua 3. in Prodr: p. 31. quæ sub piceis abietibus & pinastris provenit. In der Fischhäusichen Heyde passim.

DXVII. Orobanche radice dentata major. C. B. Pin. p. 88. Dentaria major Bauh. in Matth. f. 685. Dentaria major Matth. Lob. ic. pag. 270. o. Cam. hort. pag. 54. Eystett. Dentaria Matthioli Tab. Lib. 2. fol. 88. Anblatum Cord. hist. fol. 89. Dod. Lateinisch fol. 553. Anblatum Cordi seu dentaria major Thal. pag. 7. Dentaria major, seu ἄφυλλος I. Clus. hist. lib. 5. fol. 120. Squamatia Lon. deutsch fol. 303. Große Schuppen-Wurtz Tab. Anblatt/ Freysam-Kraut/ Blumen-Kraut/ S. Georgen-Wurtz und Klein-Kahl-Zahn-Kraut vulgò. Sau-Brodt Rusticis. Bey Neuhausen am Thier-Garten/ ubi effossa radix odorem spargit Iridis florentinæ. Item bey Truntz copiosè. Floret mense Aprili in der Hollen-Grund.

DXVIII. Orobus sylvaticus purpureus vernus C. B. Pin. pag. 351. Braunrothe frühzeitige Wald-Küchern. Orobus Pannonicus primus Clus. hist. lib. 6. fol. 230. Clus. pann. pag. 736. Orobus Sylvestris vernus Thal. Orobus pannonicus Eystett. Arachus latifolius alter Dod. Niederländisch fol. 868. Orobus sylvaticus vernus Cam. Hercyn. Stirp. ic. 6. Thal. pag. 80. Astragalus, Colum. in Phytobas. pag. 60. In der Sarckau. Item bey Bladau im Roß-Garten.

DXIX. Orobus sylvaticus viciæ foliis C. B. Pin. pag. 382. Würffel-saamigte Wald-Küchern mit Wicken-Blättern. Orobus Pannonicus secundus, Clus. hist. Lib. fol. 230. Astragaloides Dod. Lateinisch fol. 551. Astragoloides altera herbariorum Lob. ic. pag. 78. o. Würffel-Saamen

quibusdam. Bey Lauten-Mühl am Teich. Planta recens inspicienda est & conferenda cum illâ, quæ provenit in der Hollen Grund. Conf. Clus. Pann. sub tit. Orobus Pann. purpur. 2. pag. 737.

DXX. Ostrya ulmo similis fructu in umbilicis foliaceis C. B. Pin. pag. 427 Ornus Trag. Kyber. in Trag. fol. 1109. Lon. deutsch fol. 49. Betulus Lob. ic. pag. 190. Carpinus Bauh. in Matth. fol. 135. Tab. Lib. 3. fol. 682. Dod. Lateinisch fol. 841. Lob. Observ. fol. 607. ὄστρυ Theophrasti Clus. hist. lib. 1. fol. 55. Ostrya Cordi, ornus Tragi. Thal. pag. 83. Fagus sepium, Gesn. hort. fol. 258. Haubüchen oder Hagen-Büchen Kyber. in Trag. Haubüchen oder Buchäschern Lon. Spindel-Baum Tab. Hayn-Buch Nostratibus: Totæ sylvæ passim.

DXXI. Papaver erraticum majus: ῥοιάς Dioscoridi Theophr. Plinio C. B. Pin. 171. Papaver erraticum, Bauh. in Matth. fol. 745. Dod. Lateinisch fol. 447. Tab. Lib. 2. fol. 276. Cord. in Diosc. fol. 66. Gesn. hort. fol. 270. Cæs. lib. 15. Cap. 10. pag. 571. Lon. deutsch fol. 112. Papaver erraticum rubrum Eystett. Papaver Rhœas, sive caducô flore puniceô papaver, Lob. ic. pag. 275. Papaver rubrum Brunf. Lateinisch Tom. 3. fol. 52. Papaver erraticum primum Fuchs. fol. 515. Klapper-Rosen Tab. Klapper- oder Korn-Rosen Matth. Feldmagsahmen/Hirnschaal und Grindt-Mage n vulgò. Wilder Mohn Nostratibus. Am Kneiphöfischen Wall. Item inter segetes passim.

DXXII. Pastinaca sylvestris tenuifolia Dod. Lateinisch fol. 679. Pastinaca tenuifolia sylvestris Dioscoridis vel Daucus officinarum C. B. Pin. 151. Daucus vulgaris Clus. hist. lib. 6. fol. 198. Pastinaca sylvestris Matth. Bauh.

in

in Matth. fol. 549. Staphylinus ſylveſtris, Trag. Sebitz. in Trag. deutſch fol. 348. Paſtinaca erratica Fuchſ. fol. 684. Cord. in Dioſc. fol. 54. Tab. lib. 1. fol. 239. Daucum uſitatius officinarum Wilde dünnblättrichte Möhren. Paſtinaca ſylveſtris genuina Dioſc. Lob. ic. pag. 722. Wild Paſtenach Tab. Matth. Wilde Rüben Sebitz. in Trag. Wilde Paſtaney Fuchſ. Wilde Möhren/ Vogels-Neſt und Eſels-Möhren vulgò. Calfacit & ſiccat ordine tertiô Tab. præſertim ſemen, quod radice calidius. Urinam pellit, calculos exterit & mulierculis ab utero ſuffocatis auxiliô eſt. Hinter der Schackiſchen Kirchen/ prædium versùs Melchioris á Rappen. Item in monte Apollinis bey Qvednau. Item bey Geſau am Wege. Item bey Wolffshöffen.

DXXIII. Paſtinaca ſylveſtris tenuifolia altera. Joh. Lœſ. Wilde Paſtenach die andere. Hæc foliis eſt diverſiſſimis à priore. Geſtat namque folia majora & latiora nec ita inciſa, quemadmodùm in Dauco videre eſt. 2. Varietas eſt in umbellâ, quæ ſubtùs foliis latis & acuminatis fulcitur, cùm Dauci umbella foliis Nigellæ in modum inciſis ſuſtentetur. 3. Thyrſuli umbellæ in hâc diſtractæ nonnihil, in Daucô conjunctiores, & ad nidamentum aptiores. Semen guſtandum & radix ubi recens; fortè & in his diſcrimen à Dauco. In monte Apollinis hinter Qvednau. Item bey Selnicken inter Coryleta.

DXXIV. Paſtinaca ſylveſtris Trag. Seb. in Trag. deutſch f. 346. Breitblättriger wilder Paſtenack Geſn. hort. fol. 271. Cam. hort. p. 118. Paſtinaca ſylveſtris Cord. Thal. p. 84. Paſtinaca Brunf. Lateiniſch Tom. 3. f. 172. Elaphoboſcum Bauh. Matth. f. 568. Elaphoboſcum Erraticum. Branca Leonina Tab. ic. pag. 77. Siſer ſylveſtre Fuchſ. fol. 753. Baucia, Paſtinaca

ſylveſtris Arabum, an Elaphoboſcum? Adv. Lob. fol. 317. Paſtinaca ſylveſtris latifolia Dod. Lateiniſch fol. 681. C. B. Pin. pag. 155. Wild Hirtz-Paſtenach/ wild Morellen Tab. Beſtenau Brunf. Wild-Möhren Fuchſ. Potentior eſt hortenſi, urinas & menſes provocat cùm herbâ tùm maximè ſemine & radice, Gal. 8. ſimpl. c. de Staphil. Semen officinis uſitatum venenis adverſatur, & in calceos mingentes ſtrenuè in Venerem agit. Im Roß-Garten bey der Altſtätiſchen Ziegelſcheune. Item zu Jeruſalem am Berge.

DXXV. Pedicularis pratenſis lutea, vel criſta galli C. B. Pin. pag. 163. Pedicularia lutea Tab. Lib. 2. fol. 470. Criſta galli Herbariorum Lob. ic. pag. 529. Criſta Galli, ſeu Alectorolophos lutea Thal. pag. 33. Criſta galli, Dod. Lateiniſch fol. 556. Criſta ſimplici caule Cæſ. Lib. 8. cap. 37. pag. 341. Pedicularis pratenſis ſecunda Trag. Sebitz. in Trag. deutſch fol. 201. Criſta gallinacea Cluſ. Hiſt. Lib. 5. fol. 211. Geel Läuſe-Kraut Sebitz. in Trag. Geel Rödel Tab. Hanen-Kamm quibusdam. Klapper Noſtratibus. Semen ejus ſecali miſtum atrum reddit panem. In pratis præſertim editioribus, item inter ſegetes copiosè.

DXXVI. Pedicularis pratenſis purpurea C. B. Pin. pag. 163. Pedicularis Lob. ic. pag. 748. Tab. Lib. 2. fol. 470. Pedicularis altera Lon. deutſch fol. 182. Pedicularis campeſtris prior, Trag. Sebitz. in Trag. deutſch fol. 201. Fiſtularia Dod. Lateiniſch fol. 556. Alectorolophus tertius, Cſuſ. Pann. pag. 709. Alectorolophi tertii alterum genus, Cluſ. hiſt. lib. 6. fol. 211. Alectorolophus Dodonæi prima, ſeu Fiſtularia, Thal. pag. 7. Läuſe-Kraut mit Purpurfarben Bluhmen. Rödel-Kraut Tab. Braun Läuſe-Kraut/ oder Rödel Lon. Braun Wieſen-Läuſe-Kraut Sebitz. in

Trag.

Trag. Fistulas ac sinuosa ulcera sanat: menses & sangvinem undecunque fluentem sistit, vino austero decocta; In pratis riguis passim.

DXXVII. Pedicularis pratensis candida. Joh. Lœs. Leuse-Kraut mit weißen Bluhmen. Purpureæ facie prorsus est assimilis dempto flore niveo. Esitata jumentis phthiriasin accersit. In pratis beym Bretter-Kruge.

DXXVIII. Persicaria urens, seu Hydropiper, C. B. Pin. pag. 102. Persicaria prima, sive Hydropiper, Tab. ic. pag. 857. Persicariæ primum genus, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 71. Hydropiper, Fuchs. fol. 845. Cord. in Diosc. fol. 47. Cæs. lib. 4. cap. 35. pag. 168. Hydropiper, sive Persicaria, Bauh. in Matth. fol. Hydropeperi Dod. Lateinisch fol. 607. Hydropiperi. Persicaria Hydropiper, Lob. ic. pag. 351. Persicaria mordax, seu Hydropiper, Thal. p. 85. Pulicaria mascula, Brunf. Lateinisch tom. 2. f. 14. Persicaria mas, Lon. deutsch fol. 198. Scharff Flöhe-Kraut/ Flöh-Kraut/ Waßer-Pfeffer Tab. Matth. Flöh-Kraut Mäñlein Brunf. Groß Pfersing-Kraut/ oder Pfersing-Kraut Männlein/ Lon. Waßer-Pfeffer/ Schmertzen/ Cord. in Diosc. Mücken-Kraut quibusdam. In locis palustribus & ad rivulorum margines passim.

DXXIX. Persicaria mitis maculosa & non maculosa, C. B. Pin. pag. 102. Persicaria altera, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 71. Tab. lib. 2. fol. 528. Persicaria mitis maculosa, Lob. ic. pag. 315. Persicaria Fuchs. fol. 630. Dod. Lateinisch fol. 608. Pulicaria fœmina, Lon. deutsch fol. 197. Gelind Flöh-Kraut. Das ander Flöh-Kraut Tab. Sebitz. in Trag. Matth. Flöh-Kraut Weiblein/ Brunf. Pfersing-Kraut-Weiblein/ Lon. Folia quandoque sunt maculata, quandoque non. Persicaria hæc lateres inter ignitos tosta,

& imposita, dolores sistit arthriticos certo experimento. Sunt, qui ulceribus inveteratis solidam & citam curationem Persicariâ hâc promittunt. Eam Lunâ decrescente partibus ulceratis alligant, & spatio XXIV. horarum elapsô, recentem apponunt, applicatione in dies continuatâ, usque dum Luna juvenescere seu iterùm crescere incipit. Remotam ab ulcere sterquilinio committunt, putredine consumendam. Consumpta ulcus curatum ostendit. Persicaria in frigidam conjecta, foris maxillæ affirmata, ut incalescat prorsùs, mox fimo commissa, ut tota putrescat, dentium dolores mitigat. De Persicariâ vide plura in Marci Marci Philosoph. Veterum restitutâ pag. m.495. **Auff dem Thaw nach dem Bretter-Kruge zu.** Sub elevatione poli 46. 47. 48. 49. Jumentis radix porrigitur, à viscerum ægritudine tumidis. Folia legenda Sole 15. ♍ ingresso: flores. Sole 8. ♌ occupante: semen Sole ♌ deserente.

DXXX. Persicaria minor, C. B. Pin. pag. 102. Persicaria pumila, Tab. lib. 2. fol. 528. Persicaria pusilla repens, Lob. ic. pag. 316. **Klein Flöh-Kraut** Tab. In fossis **hinter dem Friedländschen Thor nach dem Penartischen Walde zu.**

DXXXI. Petasites major & vulgaris C. B. Pin. pag. 167. **Große gemeine Pestilentz-Wurtz.** Petasites, Trag. Kyber. in Trag. pag. 415. Dod. **Lateinisch** fol. 597. Cord. hist. fol. 123. Fuchs. fol. 644. Gesn. hort. fol. 271. Lob. ic. pag. 591. Adv. Lob. fol. 254. Observ. Lob. fol. 321. Lon. **deutsch** fol. 254. Tab. lib. 2. fol. 421. Cæs. lib. 12. cap. 20. p. 489. Petasites florens & sine flore Clus. Hist. lib. 5. fol. 116. Petasites flore punicante Thal. pag. 91. Tussilago major, Bauh. in Matth. fol. 615. Petasites mas, Cam. hort. pag. 122. **Pestilentz-Wurtz** Tab. Kyber. in Trag. Matth. Fuchs.

Lon.

Lon. Neunkrafft Nostratibus. Vulgus radices offert vaccis die pro festo Joh. Baptistæ, quô præcavere student, ne lac vaccis detrahatur. Flos punicans est & odoratus. Bey der Neuhäusischen Mühl.

DXXXII. Petasites minor C. B. Pin. pag. 197. Kleine Pestilentz-Wurtz. Petasites albo flore Cam. hort. pag. 122. Clus. hist. lib. 5. fol. 116. Petasites flore candido, Thal. pag. 91. Petasites fœmina & Leucanthemos, Cam. hort. pag. 122. Am frischen Hase copiosè. Flos ex candido subflavus est, & inodorus ferè. Radix resinam fundit copiosam, in peste salutaris existens. Cum Zedoariâ & Angelicâ præstans est remedium in uteri strangulatu. Cam. in hort. pag. 122.

DXXXIII. Phalangium non ramosum Dod. Lateinisch fol. 106. Tab. lib. 1. fol. 685. Phalangium non ramosum. Liliago Cordi, Lob. ic. pag. 48. Phalangium parvo flore non ramosum C. B. Pin. pag. 29. Liliago, Asphodelus Germanica, Phalangium, Cord. hist. fol. 150. Phalangium cauliculis simplicibus Cæs. lib. 10. cap. 27. pag. 416. Ohnästiges Erd-Spinnen-Kraut/ Tab. Groß-Lilgen vulgò. Hinter Brandenburg/ inter ericeta & aspera. Folia, flores ac semina scorpionum & phalangiorum ictibus succurrunt, ac tormina passos juvant. Diosc.

DXXXIV. Pilosella major erecta, C. B. Pin. pag. 262. Pilosella major altera Tab. lib. 1. fol. 626. Groß gerades Mäuß-Oehrlein / In der Hollen-Grund. Item bey Lauten-Mühl iner fruticeta.

DXXXV. Pilosella major repens hirsuta, C. B. Pin. pag. 262. Pilosella, Matth. deutsch fol. 405. Pilosella prima Tab. lib. 1. fol. 625. Pilosella, auricula muris, Adv. Lob. fol.

200.

200. Pilosella, & Holostium Lacunæ, Lob. ic. pag. 479. Auricula muris, Brunf. Lateinisch tom. 3. fol. 119. Auricula muris minor, Trag. Kyber. in Trag. pag. 278. Lon. deutsch fol. 126. Pilosella major, Fuchs. fol. 605. Dod. Lateinisch fol. 67. Pilosella media, Thal. pag. 83. Kriechendes rauhes Mäus-Oehrlein. Mäus-Oehrlein Tab. Klein Maus-Ohr/ Nagel-Kraut Lon. Mäuß-Oehrlein Brunf. Amarore & acredine quantillâ hepatis, lienis & mesenterii infarctus expedit, crassa tenuat, resolvit, educitque bilem: in utero, hydrope ac tabe salutaris. Matthiolo siccat, refrigerat, vehementer adstringit, solidat, glutinat, tenuat, & abstergit: in sputo sangvinis, dysenteriâ, diærrhæâ, ac puerorum herniis perutilis, vi suâ vulnerariâ. Chalybs candens succo ejus sæpiusculè extinctus, tantam contrahit duritiem, ut lapides ferrumque atterat. Vi etiam est præsentissimâ ad calculum, Lob. Passim in incultis.

DXXXVI. Pilosella major repens minus hirsuta, C. B. Pin. pag. 262. Auricula muris minor secunda, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 221. Lactucella sylvestris repens, Cam. hort. pag. 82. Pilosella vulgò. Cæs. lib. 13. cap. 18. pag. 514. Das ander Mäus-Ohr / Sebitz. in Trag. In collibus hinter dem Altstätischen Walle nach der Hollen-Grund zu.

DXXXVII. Pimpinella saxifraga major umbellâ candidâ, C. B. Pin. pag. 159. Pimpinella Brunf. Lateinisch tom. 3. fol. 28. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch f. 370. Gesn. hort. fol. 272. Pimpinella major Fuchs. fol. 608. Pimpinella major Fuchsii, Lob. ic. pag. 720. Pimpinella saxifraga Bauh. in Matth. f. 729. Pimpinella saxifraga major, Cam. hort. pag. 125. Tragoselinum majus. Pimpinella major,

major, Tab. ic. p. 88. Saxifraga magna, Dod. Lateinisch f. 315. Bipinella Saxifraga major, Adv. Lob. f. 321. Pimpinella nostras communis major, Thal. p. 87. Saxifraga vulgaris major, Clus. Pann. p. 697. Groß Bibinel/ Fuchs. Tab. Sebitz. in Trag. Bibenel Matth. Brunf. Groß Bocks-Peterlein vulgò. In umbellâ hujus Pimpinellæ saxifragæ, semina inter visuntur quandoque orbiculares, capsæ virides, pediculis inhærentes, quæ diffractæ eruculam ostentant coccinei coloris. Radicibus quandoq; adnascuntur cocca rubra, quibus tinctores utuntur ad colorem carmesinum rebus inducendum. Inter coryleta bey Bladau passim. Radix pimpinellæ colligatur Sole ♌ deferente: folia, Sole in ♌ commorante: semen, Sole in 1. ♐ existente.

DXXXVIII. Pimpinella saxifraga minor, C. B. Pin. pag. 160. Cam. hort. pag. 125. Pimpinella nostras communis minor, Thal. pag. 87. Pimpinella minor, Fuchs. fol. 609. Tragoselinum petræum, Tab. lib. 1. fol. 316. Bipinella, Saxifraga hircina, Adv. Lob. f. 321. Bipinella, Saxifraga minor Lob. ic. p. 719. Saxifraga parva, Dod. Lateinisch fol. 315. Pimpinellæ tertia species, Trag. Seb. in Trag. deutsch f. 370. Daucus Selinoides, Cord. hist. fol. 154. Saxifraga hircina minor, Gesn. hort. fol. 279. Tragium, Column. in Phytobas pag. 76. Saxifraga, Pimpinella Germanica minor. Clus. hist. lib. 6. fol. 197. Saxifraga, sive Pimpinella Germanica minor, Clus. pann. pag. 697. Saxifraga altera Cæs. lib. 7. cap. 57. Stein-Bibernell/ Tab. Klein Bibenel/ Fuchs. Die dritte Bibernell/ Sebitz. in Trag. Stein-Peterlein/ Mauer-Peterlein und Krauß-Bibernell vulgò. Vicem petroselini Macedonici sustinere potest, si illud deficiat.

DXXXIX. Pimpinella sangvisorba major, C. B. Pin. pag. 160. Sangvisorba major, Fuchs. fol. 788. Cam. hort.

125. Tab. lib. 1. fol. 391. Cord. hist. fol. 143. Sangvisorba altera major, sive Pimpinella, Lob. ic. pag. 719. Adv. Lob. f. 320. Pimpinella Italica major sangvisorba Clus. hist. lib. 6. f. 197. Thal. pag. 87. Pimpinella, sive sangvisorba major, Bauh. Matth. fol. 729. Pimpinellæ Italicæ secundum genus, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 373. Sideritis secunda Dioscoridis. Colum. min. cogn. stirp. & rar. part. 1. pag. 125. Groß Sperben-Kraut/ Große Welsche Bibernell / Tab. Herr-Gotts-Bärtlein/ Welsche Bibenel Matth. Sebitz. in Trag. Groß Kölbles-Kraut/ Fuchs. Groß Blutt-Kraut/ Groß Blutt-Tröpfflein/ und Wurm-Wurtz vulgò. Braun Leber-Blum Nostratibus. Refrigerat radix, siccat & adstringit. Fluores alvi, & sangvinem undecunque fluentem efficacissimè sistit, ac intestinorum exulcerationes sanat. Flos siccatus & ex vinô rubrô sumptus, dysentericos juvat. In pratis aridioribus & graminosis locis.

DXL. Pinus sylvestris, C. B. Pin. pag. 491. Matth. deutsch f. 24. *Pinus sylvestris sive Pinaster, Dod.* Lateinisch f. 860. Pinus sylvestris montana, Tab. lib. 3. fol. 638. Pinaster, Brunf. Lateinisch/ tom. 3. f. 238. Lob. ic. pag. 226. o. Gesn. hort. f. 272. Thal. pag. 90. Pinus sponte proveniens. Cord. in Dioſc. f. 15. Wilder Fichten-Baum Matth. Wilder Berg-Zirbel-Baum Tab. Hartz-Baum / Kien-Holtz. Kiefer-Holtz vulgò. Fichten Nostratibus. Gabatæ. Totæ Sylvæ passim. Pinus eas inter arbores refertur, quæ cariem vetustatemque haut sentiunt. Cupressus ac pinus, inqvit Vitruvius lib. 2. c. 9. in vetustatem sine vitiis conservantur: quod is liquor, qui inest penitùs in corporibus earum, habet amarum saporem; qui propter acritudinem non pati-

patitur penetrare cariem, neque eas bestiolas, quæ sunt nocentes. Ideoque quæ ex his generibus opera constituuntur, permanent ad æternam diuturnitatem. Pinus in Isthmicis ludis primum priùs erat coronamentum, post apium. Notandum, pinea tigna, abiegna, querna, & consimilia, ædificiis struendis destinata, ubi exasciantur, facilè hiscere, ac rimas agere; contra per meditullium serrâ dissecta tale quid haud pati. Sic asseres serratos ac siccatos meditullium versùs curvari advertes, ob fibras ex peripheriâ ad centrum concurrentes, non contrà. Ferunt, & fissos asseres non ita incurvari, ac qui serrâ sunt desecti.

DXLI. Pisum marinum. Joh. Lœs. Wilde Seeschoten. Radix flavescens, & longiùs sub arenâ incedens, sarmenta excludit angulosa, striata, foliis uncialibus, binis semper ex intervallo sarmenta ambientibus, è quorum meditullio exoritur ala, novem aut decem foliorum contrario & alterno situ nascentium, cujus extremitas in capreolos tandem exit. Flores aut siliquas cujus indolis producat, mihi hactenus observare non licuit. Auff den See-Bergen nacher Kuntzen zu.

DXLII. Plantago latifolia sinuata, C. B. Pin. pag. 189. Plantago major, Matth. Bauh. in Matth. fol. 375. Fuchs. f. 38. Dod. Lateinisch. f. 107. Gesn. hort. fol. 273. Cam. hort. f. 273. Cam. hort. pag. 128. Tab. lib. 2. f. 402. Arnoglossa, Plantago latifolia lævis, Lob. ic. pag. 303. Adv. Lob. fol. 127. Plantago rubea Brunf. Lateinisch tom. 1. f. 25. Plantago latifolia Cord. in Diosc. fol 44. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch f. 180. Lon. deutsch f. 172. Plantago πολύνευρος major sive rubea Thal. pag. 86. Plantago & centinervia Cæs. lib. 8. cap. 16. pag. 327. Großer Wegrich. Tab. Rother

ther Wegrich Sebitz. in Trag. Lon. Brunf. Breit Wegerich Fuchſ. Weg-Blätter Noſtratibus. Adſtringit, abſtergit ac digerit: jecoris obſtructiones ſolvit, renum ac veſicæ ulcera ſanat, dyſentericos, ſangvinis eruptiones & alvi profluvia ſiſtit, tùm foliô, tùm ſemine. Folia vel integra ulceribus inducta ſaniem extergunt: ſuccus ulcerum malignitatem corrigit, expurgataque ad cicatricem ducit. Secùs vias copiosè.

DXLIII. Plantago anguſtifolia major, C. B. Pin. pag. 189. Plantago quinqvenervia, ſive Lanceola Lob. ic. pag. 305. Adv. Lob. fol. 128. Plantago πενταάνευρος major, Thal. pag. 86. Plantago lanceolata, Tab. lib. 2. f. 406. Trag. Sebitz. in Trag. deutſch fol. 180. Plantago minor Brunf. Lateiniſch Tom. 1. f. 24. Fuchſ. f. 39. Lon. deutſch. f. 174. Dod. Lateiniſch f. 107. Geſn. hort. fol. 273. Lanceola, Cæſ. lib. 8. cap. 17. pag. 328. Spitzer Wegrich Sebitz. in Trag. Tab. Fuchſ. Brunf. Spitz- oder klein Wegrich / Lon. Roßripp quibusdam. In pratis præſertim editioribus paſſim, ſpicâ reperta bey Lauten-Mühl geminâ. Sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. 49. Radix colligenda Sole in ♊ verſante: flores, Sole in ♋: Semen, Sole in ♎ conſtituto.

DXLIV. Plantago anguſtifolia minor C. B. Pin. pag. 189. Tab. lib. 2. fol. 402. Plantago πενταάνευρος minor, Thal. pag. 86. Lanceola minor, Cæſ. lib. 8. cap. 17. pag. 328. Kleiner ſpitziger Wegrich / Tab. Hinter dem Kuciphöfiſchen Walle in ſabuletis. Majore viribus imbecillior eſt.

DXLV. Plantago latifolia glabra minor, C. B. Pin. pag. 189. Plantago latifolia minor, Tab. lib. 2. fol. 402. Kleiner breiter Wegrich.

DXLVI. Plantago latifolia incana, C. B. Pin. pag. 189. Plantago major incana, Lob. ic. pag. 304. Cluſ. hiſt. lib. 5. f. 109.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0338-2 DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0339-0
DFG



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0340-1
DFG

f. 109. Plantago major, Matth. deutsch f. 169. Cam. hort. pag. 128. Brunf. Lateinisch tom. 1. f. 23. Lon. deutsch f. 172. Plantago media, Dod. Lateinisch fol. 107. Gesn. hort. f. 273. Plantago media Dodonæi, Thal. pag. 86. Plantago latifolia, vel media & secunda, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch f. 180. Plantago minor Dioscoridis, Tab. Schaafs-Zunge/ Tab. Breiter Wegrich/ Brunf. Lon. Sebitz. in Trag. Bey Bircken-Feld in incultis copiosè. Item bey Lauten-Mühl secùs viam.

DXLVII. Plantago aquatica latifolia, C. B. Pin. pag. 191. Plantago aquatica Brunf. Lateinisch tom. 1. fol. 27. Matth. deutsch f. 170. Tab. lib. 2. f. 405. Fuchs. f. 42. Dod. Lateinisch f. 606. Gesn. hort. fol. 273. Thal. pag. 86. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 181. Cæs. lib. 14. cap. 15. pag. 552. Lon. deutsch f. 174. Plantago aquatica, foliis Betæ aut Plantaginis, flore Gallii albi, Lob. ic. pag. 300. Breitblättriger Waßer-Wegrich Tab. Matth. Fuchs. Waßer-Wegrich/ oder Frosch-Löffel-Kraut/ Lon. Frosch-Wegerich quibusdam. In paludibus passim.

DXLVIII. *Plantago aquatica λεπτομακρόφυλλος. Joh. Lœselii. Radix est capillacea, albula partim, partim rufula, caules nonnunquam tricubitales, erectos, rotundos, ex intervallo brachiatos, in altum mittens, quorum cacuminibus flosculi innascuntur albi, & vanescentibus his exigua capitula, minutum semen asservantia. Folia promit radix numerosa, digitum transversum lata, bicubitalia, & longiùs excurrentia. Waßer Wegrich mit schmalen langen Blättern. Im Pregel passim bey der Hospithal-Wiese.

DXLIX. Polygala vulgaris, C. B. Pin. pag. 215. Polygala Lon. deutsch. f. 217. Poligala vulgaris minor, Clus. hist.

lib. 3. f. 325. Polygalon Trag. Kyber. in Trag. p. 571. Polygala recentiorum, Adv. Lob. f. 179. Polygala recentiorum rubeis & albis floribus, Lob. ic. p. 416. 417. Polygalon flore rubro purpurascente: & flore cæruleo, Eystett. Polygala Tragi, Thal. pag. 88. Cam. hort. Polygala cærulea, purpurea, alba, Tab. lib. 2. fol. 501. Flos Ambarvalis, Dod. Lateinisch fol. 253. Blau/ braun und weiß Creutz-Blümlein / Tab. Ramsel/ Creutz-Blum/ Lon. Kyber. in Trag. Milch-Blum quibusdam. Zwischen Lauten-Mühl und Bladau in locis herbosis.

DL. Polygonatum latifolium vulgare, C. B. Pin. pag. 303. Polygonatum Bauh. Matth. fol. 678. Lob. ic. pag. 637. Cord. hist. fol. 113. Cord. in Diosc. fol. 61. Polygonatum vulgare, Cam. hort. pag. 129. Pplygonatum vulgatius, Eystett. Polygonatum majus, Lon. deutsch/ fol. 206. Polygonum majus, Adv. Lob. f. 283. Polygonatum majus, seu vulgare, aut latifolium, Thal. pag. 85. Polygonatum latifolium, Fuchs. fol. 585. Dod. Lateinisch f. 346. Tab. lib. 2. fol. 755. *Sigillum Salomonis, Brunf.* Lateinisch tom. 3. f. 92. Gesn. hort. fol. 281. Sigillum Salomonis latifolium, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 316. Frassinella, Cæs. lib. 5. c. 32. pag. 224. Breitblättrige gemeine Weiß-Wurtz/ Weiß-Wurtz / Matth. Fuchs. Brunf. Weiß-Wurtz-Männlein/ Tab. Große Weiß-Wurtz/ Lon. Weiß-Wurtz/ Gelenck-Wurtz/ Cord. hist. Polygonatum latifolium baccis nigris. Inter tetanothra, quæ Plinio sunt medicamenta cutem erugantia, habetur Cataplasma antipodagricum quorundam. R. rad. Sigill. Salom. Libr. I. Smegm. Venet. libram I. Croc. drachm. 3. Coq. in mensurâ vini adusti, ad cataplasmatis consist. In der Hollen-Grund/ und Penartischen Walde in umbrosis.

DLI.

DLI. Polygonatum angustifolium non ramosum, C. B. Pin. pag. 303. Unästige/ schmalblättrige Weiß-Wurtz. Polygonatum angustifolium, Fuchs. fol. 586. Eystett. Clus. Pann. pag. 263. Polygonatum angustifolium primum, Tab. lib. 2. fol. 431. Polygonatum quintum, sive angustifolium primum, Clus. hist. lib. 2. fol. 277. Polygonatum alterum, Dod. Lateinisch f. 345. Polygonatum tenuifolium, Cord. hist. f. 113. Polygonatum erectum, Gesn. hort. f. 273. Sigillum Salomonis angustifolium, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 316. Polygonatum minus Lob. ic. pag. 805. Lon. deutsch f. 206. Polygonatum minus, rubris foliis, ambitu stellato, Adv. Lob. f. 358. Polygonatum tenuifolium majus, Thal. pag. 85. Polygonato similis in Alpibus, Cæs. lib. 5. c. 33. pag. 224. Weiß-Wurtz-Weiblein/ Tab. Schmale Weiß-Wurtz/ Fuchs. Kleine Weiß-Wurtz/ Lon. Sebitz. in Trag. Flosculis provenit albidis. Bey Birckenfeld hinter der Ziegel-Scheune.

DLII. Polygonon latifolium, C.B. Pin. pag 281. Centumnodia, Brunf. Lateinisch/ tom. 3. fol. 128. Polygonummas, Matth. Bauh. in Matth. fol. 676. Dod. Lateinisch fol. 113. Fuchs. fol. 614. Thal. pag. 87. Cæs. lib. 4. cap. 36. p. 168. & 169. Polygonum mas vulgare, Sangvinaria, Centumnodia, Lob. ic. pag. 419. Adv. Lob. f. 179. Polygonon masculum, Trag. Kyber. in Trag. pag. 391. Polygonum vulgare, Cam. hort. pag. 130. Polygonus mas, Gesn. hort. f. 273. Polygonum majus Tab. lib. 2. fol. 502. Polygonum majus seu mas, Lon. deutsch f. 204. Groß-Weg-Graß Tab. Große Wege-Tritt/ Matth. Weg-Graß / Brunf. Fuchs. Wege-Tritt/ oder Weg-Graß. Lon. Demm-Graß / und Blutt-Kraut quibusdam. Jungfer-Tritt Nostratibus. Secus vias ac semitas copiosè.

DLIII.

DLIII. Polygonum oblongo angusto folio, C. B. Pin. pag. 281. Polygonum tertium, Tab. lib. 2. fol. 503. Weg-Tritt mit langen schmallen Blättern. Blutt-Kraut. Refrigerat gradu secundo, siccat & adstringit. Sangvinariæ nomen ab effectu obtinuit, quippe eo sive integro, sive tuso, stillanti parti inducto, sangvis coit, & in grumos concrescit. Collectionibus fervidis & ignibus sacris auxiliatur. Bey Juden-Kirch secùs viam. Colligenda herba Sole ♌ ingresso.

DLIV. Polygonum minus, seu Millegrana major, C. B. Pin. pag. 281. Polygonum minus Matth. deutsch. fol. 677. Herniaria, Gesn. hort. f. 261. Cam. hort. pag. 74. Thal. pag. 56. Tab. lib. 2. fol. 507. Empetron, Trag. Kyber. in Trag. pag. 527. Lon. deutsch fol. 249. Herba Turca, sive Herniaria, Lob. ic. pag. 421. Herba Turca, Herniaria multigrana serpilli facie, Adv. Lob. fol. 180. Millegrana, Cord. hist. fol. 98. Harn-Kraut Tab. Brunf. Kleiner Weg-Tritt/ Matth. Harn-Kraut/ Stein-Kraut/ Lon. Bruch-Kraut/ oder Groß Tausend-Korn vulgò. Jungfer-Graß Fœmellis. Dürr-Kraut Rusticis. In incultis bey Brandenburg. Item hinter dem Kneiphöfischen Wall/ in petrosis.

DLV. Polygonum minimum, seu Millegrana minima, C. B. Pin. 282. Millegrana minima, Lob. ic. p. 424. Herniaria altera, Thal. pag. 57. Das allerkleineste Tausend-Korn. Plantula est exilis polycaulos, ramulosa, folia disposita habens Alsines instar multicaulis, sed minuscula. Thyrsulorum bifurcationes fermè singulas binis foliolis comitatas, rotundiusculum excipit capitellum, seu granulum; Cacumina verò numerosiora hujusmodi occupant granula.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0345-0
DFG

No. 63. ad pag. 203.

Polygonum foliis gramineis
Spergulæ Capitulis.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0346-6
DFG

nula. Radix longiuſcula, & ſæpè contortula. Im Dorff Sarckau.

DLVI. Polygonum minus polycarpum, Tab. lib. 2. f. 530. Hund-Würgel. Polygonum minus, ſeu fœmina, Lon. deutſch fol. 205. Saxifraga Anglica, fortè Alſines minimum genus, Cynanche, Dalechampii Lob. ic. pag. 428. Saxifraga Anglica Adv. Lob. fol. 183. Polygonon Germanis Knawel/ Trag. Kyber. in Trag. pag. 393. Polygonum anguſtiſſimo & acuto, vel gramineo folio minus repens, C. B. pin. 281. Knäwel/ Dod. Lateiniſch fol. 115. Klein fruchtbahrer Weg-Tritt/ Tab. In incultis; item inter ſegetes paſſim. In Poloniâ polygonum quoque reperitur cocciferum, Kosmaczek dictum, cujus radiculis cocca elegantiſſimo rubore commendata innaſcuntur. Provenit idem polygonum propè Roſtochium in locis arenoſis, cujus cocca pueri die Profeſto Johannis Baptiſtæ colligunt, vocantque Johannis-Wurmlein. Collegit ipse eadem Lœſelius Roſtochii vivens, & advertit paulò pòſt muſcas è coccis exeuntes, & avolantes. Succo Sericum tingi poſſet, quæ tinctura ὁλόβηρος i. e. tota vera ſalutanda haud eſt, utpote quæ Imperatoribus olim debebatur l. auratas. C. de veſtibus holoberis.

DLVII. *Polygonum foliis gramineis Spergulæ capitibus. Joh. Lœſ. Weg-Tritt mit kleinen Köpfichen/ und gar zarten Blättern. Radice nititur longiuſculâ, ſubflavâ, & villosâ nonnihil, quæ cauliculos edit exiles, numeroſos, ἐπικλινεστέρους, in terram circum circa procumbentes, nodoſos, in ſummitate ramoſos. Singulis geniculis folia præſunt tenuia & anguſta, magnitudine ſuâ variantia, modò plura, modò pauciora, paleaceis & niveis quibusdam mem-

branulis fulta: flosculis est in summo cauliculorum dilutè purpureis, quos vanescentes parva, ac quinis foliolis conclusa subseqvuntur vascula, rotunda, & in acumen vergentia, Spergulæ capitulis similia, in quibus minusculum seminium. Hinter Juden-Kirch am Wege nach Selnicken zu. Item secùs viam, quâ itur nach Neuhausen.

DLVIII. *Polygonum foliis gramineis alterum. Joh. Lœs. Anderer Weg-Tritt mit gar zarten Blättern. Thyrsulis est exiguis, rotundis, geniculatis, quincuncialibus sæpè: Initiò perbrevibus aliquot ad quævis genicula foliis, concursu suô veluti fructum aliquem referentibus, quæ ætatis tractû elongantur, & graminea fiunt: flosculos habet niveos, & his deciduis vascula nana, acuminata, exile semen servantia. Radicula paucis fibris donata est. Am Bollwerck beym Zoll-Hauß.

DLIX. Polypodium, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 430. Fuchs. fol. 588. Cord. in Diosc. fol. 76. Cord. hist. fol. 171. Gesn. hort. fol. 273. Tab. lib. 2. fol. 478. Cæs. lib. 16. cap. 6. pag. 593. Cam. hort. pag. 130. Lon. deutsch/ fol. 251. Filicula, seu Polypodium, Bauh. Matth. fol. 87. Polypodium vulgare, C. B. Pin. pag. 359. Engelsüß / Brunf. deutsch/ fol. 307. Polypodium, Filicula, Herba Radioli Apuleji Lob. ic. pag. 814. Polypodium majus Dod. Lateinisch/ fol. 464 Engelsüß/ Tab. Fuchs. Lon. Sebitz. in Trag. Süßfarn/ Süß-Wurtzel / Baumfarn / Tropffen-Wurtz vulgò. In petris muscosis zu Neuhausen. Im See-Gebirg zwischen Sarckau und Lattenwalde copiosè. Nonnunquam vetustis arboribus innascitur, bey Wießdehlen im Walde.

DLX. Populus nigra, C. B. Pin. pag. 429. Matth. deutsch/ fol. 41. Dod. Lateinisch/ fol. 836. Lob. ic. p. 194. o.

Cord.

Nō. 64. ad pag. 204

Polygonum foliis gramineis alterum.



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0349-6
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0350-7
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0351-2
DFG

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0352-8
DFG

Cord. in Dioſc. fol. 18. Tab. lib. 3. fol. 687. Cæſ. lib. 3. cap. 45. pag. 120. Populus alba, Lon. deutſch fol. 42. Trag. Kyber. in Trag. pag. 1080. Schwartzer Pappel-Baum/ Tab. Matth. Bollen/ Pappel-Baum Lon. Schwartz Albeer-Baum/ Sar-Baum quibusdam. In pagis paſſim.

DLXI. Populus tremula, C. B. Pin. pag. 429. Populus Lybica, Matth. deutſch fol. 41. Lob. ic. pag. 194. o. Tab. lib. 3. f. 687. Dod. Lateiniſch fol. 836. populus nigra, Trag. Sebitz. in Trag. deutſch fol. 859. Lon. deutſch f. 43. Populo nigræ ſimilis in Alpibus, Cæſ. lib. 3. cap. 45. pag. 120. Populi tertia ſpecies, Cord. in Dioſc. fol. 17. Aſpen/ oder Poppel-Weiden/ Lon. Lybiſcher Pappel-Baum/ Tab. Aſpen und Bellen-Baum Trag. Eſpen Noſtratibus. Cortex nigræ & albæ populi particulatim cæsus, & ſulcis ſtercoratis mandatus, omni anni tempore edules fungos profert, Dioſc. In ſylvis copiosè.

DLXII. Potamogeton rotundifolium, C. B. Pin. pag. 193. Potamogeton, Trag. Kyber. in Trag. pag. 688. Matth. deutſch/ fol. 496. Lon. deutſch fol. 211. Tab. lib. 2. fol. 411. Fuchſ. fol. 651. Cæſ. lib. 8. cap. 22. pag. 332. Potamogetoni ſimilis rotundiore folio, Cord. in Dioſc. fol. 69. Potamogeton λειόφυλλον, Thal. pag. 85. Rund-blättriges Saam-Kraut Tab. Matth. Lon. Fuchſ. In aqvis ſtagnantibus paſſim.

DLXIII. *Potamogeton rotundifolium alterum Joh. Lœſel. Ander rundblättriges Saam-Kraut. Folium unum æquo ferè intervallo ab altero diſtat, ubi verò novus exſurgit ramulus, bina concurrunt folia, exortum ejus quaſi firmantia. Am Pregel.

DLXIV. Potamogeton Salicis folio C. B. Pin. p. 193. Schmal-blätterig Saam-Kraut. Potamogeiton, Dod.

Lateinisch fol. 582. Potamogeton angustifolium, Tab. lib. 2. fol. 411. Phyllitis lacustris, Cord. hist. fol. 150. Potamogeton sive Fontalis, & spicata, Adv. Lob. f. 129. Potamogeton ἱτεόφυλλον, Thal. pag. 86. Spitzig Saam-Kraut Tab. In aquis stagnantibus bey Königsberg passim.

DLXV. Potamogeton foliis latis splendentibus. Saam-Kraut mit weichen breiten gläntzenden Blättern. C. B. Pin. p. 193. Potamogeiton altera, Dod. Lateinisch fol. 582. Potamogeton μαλακόφυλλον, Thal. p. 86. Am Frisching.

DLXVI. Potamogeton foliis crispis, sive Lactuca ranarum, C. B. Pin. 193. Saam-Kraut mit krausen Blättern. Fontilapathum pusillum, Lob. ic. pag. 286. Adv. Lob. fol. 117. Potamogeton ἁλόφυλλον, seu crispum, aut fimbriatum, Thal. pag. 86. Tribulus aquaticus minor, Clus. hist. lib. 6. fol. 252. Clus. Pann. pag. 714. Alga secunda, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 545. Das ander Saam-Kraut. Sebitz. in Trag. Kleiner Brunn- oder Frosch-Lattich quibusdam. In lacunis hinter dem Altstädtischen Walle nach der Hollen-Grund zu. Foliis provenit crispis, quæ majora ac longiora sunt, quàm in Fontilapatho pusillo, Lob. Crispitudo tamen foliorum minor est.

DLXVII. *Potamogeton gramineum latifolium. Johan. Lœs. Klein großächtiges breites Saam-Kraut. Im Graben beym Bretter-Kruge.

DLXVIII. *Potamogeton gramineum tenuifolium, Joh. Lœs. Klein großächtiges schmales Saam-Kraut. Plantula est ramosa, ac foliis crescit gramineis, longiusculis, atrovirentibus: in summitate caulis spica seu capitulum visitur exile, flosculis minutis exornatũ. Im Graben beym Bretter-Kruge.

DLXIX. Potentilla, Brunf. Lateinisch tom. 3. fol. 45.

Bauh.



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0355-6
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0356-1
DFG



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0357-7
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0358-3
DFG

Bauh. Matth. f. 718. Lon. deutsch f. 268. Cæs. lib. 14. cap. 23. pag. 557. Fuchs. fol. 619. Thal. pag. 91. Argentina Dod. Niederländisch fol. 948. Argentilla, Potentilla, Lob. ic. pag. 693. Anserina, Tab. lib. 1. fol. 425. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 382. Argemone altera, Gesn. Hort. f. 248. Genserich Tab. Matth. Lon. Fuchs. Grensich/ Grensing/ und Genserich/ Sebitz. in Trag. Gäns-Kraut/ Grinsig/ Grunsing und Silber-Kraut vulgò. Plantula est in jus euntibus à Sagis commendatissima. Hanc stato tempore lectam rabula superstitiosus calceis immittit, ne causâ cadat. Verùm præstant διανομαὶ, nummorum aut sportularum elargitio. In Glossario: διανομὴ χρυσίου, διανομὴ ἀργύρου, sportulæ. Restituenda hæc vox Plinio & Trajano epistolis 117. 118. ubi diamones scriptum pro dianomes: Sportulas explicat ipse Trajanus. De his donariis, à rabulâ elargitis, verè Cyprianus: Qvantis hic sordibus emit, ut fulgeat? Circa vias & semitas passim. Sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. 49. graduum nata, vulgò efficax. Radix effodienda, Sole primum arietis gradum obsidente: folia colligenda, Sole 15. Arietis inhabitante: flores, Sole in 1. ♌ constituto.

DLXX. Potentilla repens hirsutie incanâ, Johan. Læs. Kriechender Gänserich mit raugen grauen Blättern. Bey Neuendorff am Wege.

DLXXI. Potentilla erecta major hirsutie incana. Großer gerader Gränsing mit raugen grauen Blättern. Spithamas duas longitudine planta, tota hirsutie incana, superat. Foliis profundè incisis, pronâ parte viridé pallentibus, supinâ albicantibus. Am Wege nacher Neuendorff.

DLXXII. Prunus sylvestris, C. B. Pin. pag. 444.

Brunf. Lateinisch tom. 3. fol. 186. Matth. deutsch fol. 103. Dod. Lateinisch fol. 753. Fuchs. fol. 404. Lon. deutsch fol. 68. Cord. in Diosc. fol. 25. Gesn. hort. fol. 274. Lob. ic. pag. 176. o. Tab. lib. 3. fol. 700. Cæs. lib. 2. cap. 15. pag. 48. Prunus sylvestris vulgaris, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 796. Wilder Schlehen-Baum/ Tab. Schlehen-Dorn Matth. Lon. Schlehen/ Brunf. Fuchs. Sebitz. in Trag. Refrigerat, siccat, & adstringit, maximè fructus. Ejus succus Acacia est officinarum, sed non vera. Aqua ex floribus cum vino destillata, in laterum doloribus, & cordis compressionibus magni est usûs, Trag. Vinum pendulum octidui spatio restituunt pruna immatura adhùc, contusa & immissa. Exsiccata & contusa efficaciter idem agunt, Trag. & Tab. Folia & radices faucium ulcera sanant, & fluxiones avertunt gargarisatu. In der Hollen-Grundt copiosè. Item hinter Brandenburg nach dem Lentzken-Berg zu.

DLXXIII. Prunella, Fuchs. f. 621. Tab. lib. 2. f. 256. Cæs. lib. 11. cap. 37. pag. 453. Brunella major folio non dissecto, C. B. Pin. pag. 260. Brunella, Brunf. Lateinisch/ tom. 3. fol. 26. Dod. Lateinisch fol. 136. Symphytum petræum, Consolida minor, Matth. Lob. ic. pag. 474. Symphytum petræum, Cord. in Diosc. fol. 62. Consolida minor, Matth. Bauh. in Matth. fol. 684. Consolida minima, sive Prunella flore purpureo vulgaris, Cam. hort. 45. Prunella aut potiùs Brunella Officinarum, Eystett. Prunella vulgaris, vel sexta, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 245. Braunellen/ Tab. Brunf. Fuchs. Sebitz. in Trag. Gottheil und S. Antonii Kraut vulgò. Vulneribus medetur, grumos sangvinis dissolvit, & pulmoni exulcerato aliisque saucis partibus auxilio est. In asperis passim. Bey Raths-Hoff/ zu Stein-

Stein-Bäck &c. Brevissimâ spicâ reperta est in der Osterrodischen Heide.

DLXXIV. Prunella flore albo. Joh. Lœs. Brunel mit weißer Blüth. Bey Fischhausen hinter der Ziegel-Scheune. Item bey Hoppenbruch in Districtu Balgensi.

DLXXV. Pulsatilla vulgaris, Lob. ic. pag. 281. Pulsatilla recentiorum, Cæs. lib. 14. cap. 11. pag. 550. Pulsatilla communis, Cam. hort. pag. 134. Pulsatilla folio crassiore & majore flore, C. B. Pin. pag. 177. Pulsatilla, Bauh. Matth. fol. 462. Dod. Lateinisch fol. 433. Gesn. hort. fol. 274. Pulatilla prima, Tab. lib. 1. fol. 97. Pulsatilla vulgaris dilutiore flore, Clus. hist. lib. 2. fol. 246. Clus. Pann. pag. 385. Küchenschell/ Brunf. deutsch fol. 143. Herba Venti, Trag. Kyb. in Trag. p. 413. Lon. deutsch fol. 113. Anemones species, Thal. pag 15. Küchen-Schellen/ Tab. Lon. Matth. Kyber. in Trag. Kühe-schell / Hackel-Kraut / Schlotten-Bluhm vulgò. Aqua Pulsatillæ verno tempore extracta, experimento certo, febrifuga est, unciarum trium pondere sumpta. Vomitum movet acri sapore. Cœruleo colore destillata prodit. Vide suprà marrubium cardiaca dictum. Bey Brandenburg und Frauenburg in siccioribus copiosè. Item in der Wormditschen Heyde.

DLXXVI. Pulsatilla folio Anemones secundæ sive subrotundo: quæ 5. in Prodr. C. B. pag. 94. Bey Lauten-Mühl in collibus arenosis. Hinter der kleinen Schleuß jenseit des Thamnes auff dem Berge copiosissimè. Aprili & Majo floret.

DLXXVII. Pyrola rotundifolia major, C. B. Pin. p. 191. Groß rundblättriges Winter-Grün. Pyrola, Brunf. Lateinisch/ tom. 3. fol. 8. Matth. deutsch fol. 411. Eystett. Tab. lib. 2. fol. 432. Dod. Lateinisch fol. 138. Pirola, Gesn. hort.

fol.

fol. 272. Pyrola à Pyri folio, Lob. ic. pag. 294. Adv. Lob. fol. 122. Pyrola major, seu Beta sylvestris Thal. pag. 84. Pyrola & Limonium sylvestre, Lon. deutsch fol. 219. Pyrola vulgatior, Clus. hist. lib. 5. fol. 116. Antholog. magn. fol. 104. Pirola alia in campestribus, Cæs. lib. 8. cap. 32. p. 338. Limonium, Fuchs. fol. 467. Limonium sylvestre, Trag. Kyber. in Trag. Winter-Grün/ Tab. Matth. Kyber. in Trag. Fuchs. Brunf. Wald-Mangolt/ Wald-Kohl/ Holtz-Mangolt vulgò, wilde Bete Nostratibus. In opacis & muscosis bey Schwanis und Neuhausen.

DLXXVIII. Pyrola rotundifolia minor. C. B. Pin. pag. 191. Klein rundblätterig Winter-Grün. Pyrola quarta minima Clus. hist. lib 5. fol. 118. Clus. Pann. pag. 509. Pyrola minima, Eystett. Anthol. mag. fol. 104. Inter ericeta bey Kuntzen und Bladau.

DLXXIX. *Pyrola acutifolia polyanthos radice geniculatâ. Joh. Læs. Spitz-blättericht Winter-Grün mit vielen weißen Blümlein. Radix alba ac nodosa cauliculo subservit viridi, rotundo, hirsuto, geniculato, pedem alto, sæpè productiori, cui proximè terram folia adstant octo, frequentiùs pauciora, virentia, ex oblongo mucronata: singulis porrò geniculis, cacumen versùs, foliolum exile & acutum, caulem velut in vaginulâ servans, jungitur: tandem subseqvuntur numerosi flosculi, â calyculis suis foliolo tenuissimo fultis, prodeuntes & albicantes. In der Fischhäusischen Heide. Item hinter Latten-Walde.

DLXXX. Pyrola folio mucronato serrato, C. B. Pin. pag. 191. Winter-Grün mit gespitzten und zerkerbten Blättern. Pyrola minor Thal. pag. 85. Pyrola secunda tenerior, Clus. hist. lib. 5. fol. 117. Clus. Pann. pag. 505. Pyrola

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0362-4 DFG

Nō. 68. ad. pag 210

Pyrola acutifolia polyanthos radice geniculatâ.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0363-0
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0364-5
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0365-1
DFG

No. 69. ad pag. 211.

Quercus florida.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0366-7
DFG

rola Pannonica secunda, Cam. hort. 134. In der Fischhäusischen Heyde.

DLXXXI. Pyrola fruteſcens arbuti folio, C. B. Pin. pag. 191. Staudechtiges Wintergrün mit zerkerbten langlechten Blättern. Pyrola tertia vel fruticans, Cluſ. Pann. pag. 505. Cluſ. hiſt. lib. 5. fol. 117. In der Fischhäusischen Heyde.

DLXXXII. Pyrola alſines flore Europæa, C. B. Pin. pag. 191. Wintergrün mit Hünerdarms Blüt, Alſinanthemon, Thal. pag. 15. Alſine alpina, Schwenck. lib. 1. ſtirp. pag. 17. Im Penartischen und Löbnichtschen Walde.

DLXXXIII. Pyrus ſylveſtris C. B. Pin. pag. 439. Wilder Birn-Baum. Pyra ſylveſtria, Tab. lib. 3. fol. 720. Pyra ſylveſtria majora, Tab. lib. 3. f. 720. Holtz-Birn/ groſſe Holtz-Birn/ Tab. Kruſchken Boruſſis. Junonis vetuſtiſſimum ſimulachrum è pyro ſylveſtri fabricatum memoratur Pauſaniæ lib. 2. Vide quoque Euſebium de Præparat. Evangelica c. 8.

DLXXXIV. Qvercus, Trag. Kyb. in Trag. pag. 1102. Matth. deutſch fol. 69. Lon. deutſch/ fol. 48. Tab. lib. 3. fol. 669. Fuchſ. fol. 229. Quercus cum longo pediculo, C. B. Pin. pag. 420. Qvercus vulgaris, Lob. ic. pag. 154. o. Quercus vulgaris, Hemeris, Cord. in Dioſc. fol. 21. Qvercus Pannonica latifolia, rectiùs Cerrus, Cam. hort. pag. 135. Eich-Baum/ Tab. Matth. Lon. Fuchſ. Eichen vulgò. * Floſculos habet elegantiſſimos, longiùs ab arbore pendentes. Ramulis aſſiſtunt nonnunquam rotundluſcula corpora, ſqvamea primùm, mox villoſa, Bedegvaris ferè effigie. Galla ſeu fructus qvercûs, quæ κηκὶς Dioſcoridi, inſecta aliquando intus alit. Ex Gallis majoribus diffractis, nunc peſtilitatem, nunc bellum, nunc annonæ caritatem, præſagus colligit vul-

gus, & quidem hôc modô: araneum si contineat Galla, pestem & malignas febres: muscam si alat, bella; eruculam si concludat, famem incolis portendit. Sunt alii, prognosticum augurale ita constituentes: Auctumnô effractâ gallâ, araneus annum inauspicatum: musca tolerabilem: acarus frugiferum spondet. Cassa verò si sit galla, & nihil horum contineat, funera indicit. Præcoces & uberrimæ circa Festum Michaëlis gallæ, hyemem signant temporiùs adventuram & nivosam. Adstringit cortice, folio, glande & gallâ. Juvat sangvinem tussientes, egerentes, foriolos, & genituræ profluvio laborantes. Emplastrum ex quercu Lœselii ita paratur: R. corticum teneriorum quercûs, radicum quercûs, turionum quercûs, florum quercûs, rasuræ ligni qverni ana libr. semis. olei veteris libr. III. coquantur, ac in infusione commorentur aliquot dies, post colaturæ adde lithargyrii aurei triti ac creti libr. 1½. coquantur aliqvandiu, & inter coquendum affundantur succi foliorum quercûs, aquæ foliorum quercûs ana libr. 1½ tandem ubi bullæ volantes in auras assurgunt, & consistentia debita adest, per incerniculum insperge pulveris foliorum quercûs, florum qvercûs ana Unc. 3. corticum quercûs Unc. 2. visci querc. cum foliis, gallarum, cupularum, glandium, granorum chermes ana Unc. 1½. agitentur omnia quercinâ radiculâ, fiatque l. a. emplastrum sine cerâ. Usus: validè adstringit, siccat, repellit, intercipit, discutit, & glutinat. Herniosos ergò, vomitores, foriolos, sangvinem sputantes, vel per alvum, aliaque loca egerentes, juvat, & abortationes prægnantium præcavet. Sacros ignes, & consimiles ferventias, mulcet, tumores discutit, & arthriticos sistit dolores. Ulcera adhæc ichoribus fatigata solidat, & ossa fracta ferruminat. In Borussiâ propè Welaviam in

pago

pago Oppett reperta est olim quercus, cujus perimeter viginti septem ferebatur in ulnas. Annosa & cava jam quercus equitem equo ephippiato insidentem, ac intùs tumultuantem, ultrò admisit, quod tentaverat etiam divus Albertus, primus Borussiæ Dux, ejusque Filius Albertus Fridericus. Tale quidpiam legimus etiam de Platano, auctore Plinio Lib. XII. c. 1. quæ in Lyciâ nata, ac cavata, specum intus habuit in circuitu octuaginta & unius pedum. In hâc specû Lucinius Mutianus ter COS. cum octodecim aliis viris, saliarem in morem epulatus est. Perdurat autem annos sæpè trecentos & multò plures ipsa quercus. Seculum crescendo, seculum vigorem servando, ac denique seculum marcescendo insumere creditur vulgò. In Vaticano ilex vetustior erat urbe Româ, teste Pliniô Lib. XVI. c. 44. ubi simul tradit, Romæ in areâ Lucinæ lotum fuisse arborem CCCCL. tunc circiter annorum. Sunt, qui de quercu numen faciunt, de Numine φ φ. ut loquitur Buchananus in Franciscano. Hinc Sacra olim erat quercus idololatris Borussis ob Gorcho, esculentorum & potulentorum Deastrum, quem sedem in quercu, ubi locorum nunc est oppidum Heiligenbeil/ seu Hieropolis, habuisse ferunt. Huic Gorcho perpetuus servabatur ignis, & omnis generis primitiæ offerebantur, v. gr. frumenti, farinæ, mellis, lactis, captorum piscium, aliorumque eduliorum, oblatæque Mulcibero igni tradebantur. Quercum hanc pòst unà cum idolo Anshelmus primus Ermlandiæ Episcopus correptâ bipenni excidit, & in cineres redegit. Alia quercus latissima & trifida habebat Rickojothi in medio Natangensis tractus, in qua triplex colebatur idolum, Potollo, Perkunos, & Potrympo. Potollo sacrificii loco immolabantur capita extinctorum hominum ac pecorum. Deaster hic sæpissimè domos infestabat ditiorum maximè, ubi è vivis quôdam sub-

latô pauciores essent in victimis offerendis. Tùm enim noctû homines adortus, crebriùs illis facessebat negotium. Solemnibus diebus huic in honorem sebum in ollis cremabatur. Perkunos alter erat Deaster, cui fovebatur ignis ex lignis quercinis, iisque aridis accensis, perpetuò flagrans, sacrificiis cremandis destinatus: eô exstinctô sacrificulus incurrebat discrimen vitæ. Potrympo tertius erat Deaster, cui à sacrificulo angvis lacte enutritus ac frumento coopertus consecrabatur. Ejus in honorem infantes necabantur, thus ac cera cremabantur. Qvercus hæc idolis instructa, foliorum virorem nunquam amisisse, sed perpetuò, etiam brumali tempore, eundem servâsse perhibetur. Huic arbori decus & Autoritatem Ancus Marcius, Rex Romanus, addidit, qui usu æris nondum repertô, primas leges Romanas, & priscos qualescunque ritus, in quercinas tabulas incidit. Proverbium est apud Græcos & Nostrates, loqui à quercu, & ad quercum. Sensus est, omni positô metû, cum omni securitate verba facere. Qvercus enim cùm sit arbor Jovis, ad hanc quisquis confugiebat, in tuto credebatur usque, & sub tutelâ Numinis. In congressu venereo coles ne masculescat fascino rem ita disturbant: Qvernus ramulus, sursùm rectà pullulans, solem versùs acuitur, ac resecatur: post acumine suo terræ defigitur, quam lotio paulò ante perpluit fascinandus. Defixus ita ramulus, ac proculcatus, impotentiam creat, donec eruatur. Fascinum hoc solvunt scopæ betulinæ inversæ, lotio in summitatem diffusam immisso. Quò largior glandium proventus, eò frumentorum est parcior. Ante fruges cognitas Arcadibus, & in universum gentibus priscis, glandes fuêre frumenti locô: Sicut pyra Argæis & Tirynthiis. Virgilius I. Georgic.

Con-

Concussaq; famem in sylvis solabere quercû. Sed deinde

Quernaq; glans victa est utiliore cibô. Ovid. lib. 1. Fast.

Hinc post esum sequebantur ructus. Juvenal. Satyr. 6. v. 10.

- - - - *Glandem ructante marito.*

Iberi in Symposiis glandes in secundis mensis apponebant. Cuivis olim glandem suam, in alienum fundum procidentem, tollere licuit in alieno. Ita cautum est, lege XII. tabularum, auctore Pliniô lib. XVI. c. 5. Idque attestatur Jurisconsultus in l. unica ff. de glande legendâ. Sed & tu interim vide I. Julianus §. 2. ff. ad exhib. Extemporaneum atramentum scriptorium si expetas, succô ex gallis expressô pulvisculum vitrioli ammisce, addito, ne situm contrahat, pauxillo salis vel gummi Arabici. Quercus inter duas laurus plantata olim erat Romæ ante Palatium Imperatorium, tacitè innuens, Heroicâ virtute ac fortitudine Principum niti Rempublicam. Quercus namque signum est conservati Civis: Laurus verò victoriæ ac triumphi. Hinc Cæsares bello victores in Capitolium ducebantur lauro redimiti, milites verò, qui pro Civium salute fortissimè omnium steterant, quernâ cingebantur coronâ, unde & hæc corona, ex quernâ fronde scilicet, civica olim dicebatur, cui & aurea cessit. Hujus coronæ proprium erat, ut illâ donatis perpetuò eam gestare liceret. Tradebatur militibus ab Imperatore vel Duce exercitûs. Graminea verò seu obsidionalis corona, ex illo fiebat gramine, ubi cives obsidione liberabantur, & dabatur servatori ab universo exercitu. Hæc æstimatione immensâ cæteris coronis longè præcellere credita est. De quercu adhùc notabile id est: Saxum aliquod ingentis molis, obstaculo existens, ubi in frusta redigere animo habes, fac struem circumcirca segminum quercino-

cinorum, quâ accensâ candeſcat ſaxum, pòſt ferreí mallei impetuosô, ac fervidè iteratô concuſſu, ſaxum aliquoties terre, in fruſta mox diſſiliendum, & loco amovendum. Hoc artificiô diffractum novi ſaxum, duodecim molares lapides portionibus ſuppeditans ſuis. Ne mirare, verum eſt, molitores ſeu moletrinæ ſi conſulueris artifices, vel potiùs experientiam ipſam.

DLXXXV. Qvercus marina, Lob. ic. pag. 255. o. Tab. lib. 3. fol. 670. Cluſ. Hiſp. pag. 25. Cluſ. hiſt. lib. 1. fol. 21. Fucus maritimus, vel Quercus maritima veſiculas habens, C. B. Pin. pag. 365. Meer- oder See-Eich/ Tab. See-Eich mit Blaſen. Chamarum teſtis & lapidibus ferrumine quaſi quôdam affirmatur, radice deſtitutâ. Folia ejus atrô ſunt virore, recenter è mari expulſa: ſiccata nigreſcunt, & glutinis inſtar ſplendent. Succi eſt ferruginei & ſtiptici. Im Germauſchen und hinter Kuntzen. Copioſiùs in littoris gleſſaria ejecta, ſuccini parum promittit legentibus. *Fuci verò marini quò plus egeritur, eò uberior gleſſi ſeges.*

DLXXXVI. Quinqvefolium majus repens, C. B. Pin. pag. 325. Qvinquefolium vulgare quartum, Tab. lib. 1. fol. 436. Qvinqvefolium majus luteum, Fuchſ. fol. 624. Qvinquefolium, Matth. Bauh. In Matth. fol. 719. Cord. in Dioſc. fol. 64. Cæſ. lib. 14. cap. 19. pag. 554. Qvinquefolium, ſive Pentaphyllum vulgare, Lob. obſerv. fol. 393. Qvinquefolium majus, Dod. Lateiniſch/ fol. 116. Pentaphyllum, Geſn. hort. fol. 271. Pentaphyllum repens, Cam. hort. p. 119. Pentaphyllon primum & ſecundum, Lon. deutſch/ fol. 242. Pentaphyllon minus Brunf. Lateiniſch/ tom. 2. fol. 34. Pentaphyllon vulgare, Trag. Kyber. in Trag. pag. 505.

Pen-

Pentaphyllum majus, Thal. pag. 88. Gemein Fünff-Finger-Kraut/ Tab. Groß Fünff-Finger-Kraut / Fuchs. Fünff-Blatt/ Fünff-Finger-Kraut/ Matth. Klein Fünff-Finger-Kraut/ Brunf. Groß gemein kriechend Fünff-Finger-Kraut. Radice est oblongâ, foris nigricante, intùs subrubente: Cauliculis rotundis virentibus, quaquà versùm humi reptantibus fragariæ instar, & latè se diffundentibus: foliis qvinis, viridibus, oblongis, serratis, pediculis longiusculis: floribus Anserinæ luteis, itidem longis petiolis instructis. Reliqua inter quinquefolia efficacissimum, & officinis usuale. Radices, folia & flores vehementer sed citra morsum ac manifestum calorem adstringunt, & siccant tertio recessu, venenis ac pesti resistunt, & sangvinem undecunque fluentem cohibent. Radix decocta, ac triginta dies pota epilepsiæ medetur. Auff dem Tragheimischen Kirchhoffe. Item Bey der Schwanischen Mühl. Quinquefolium optimum sub elevatione poli graduum 45. 46. 47. 48. 49. natum, ac effossum Sole primum Arietis gradum inhabitante.

DLXXXVII. Qvinquefolium minus repens luteum, C. B. Pin. pag. 325. Klein kriechend Fünff Finger-Kraut. Qvinquefolii minimum genus, vel primum, Trag. Kyber. in Trag. 505. Pentaphyllum minus luteum, Adv. Lob. fol. 307. In locis arenosis passim bey S. Albrecht.

DLXXXVIII. Qvinquefolium minus repens lanuginosum luteum, C. B. Pin. pag. 325. Pentaphyllum sive Qvinquefolium minus, Tab. ic. pag. 123. Qvinquefolii quarti flavo flore prima species, Clus. hist. lib. Qvinquefolii quarti secunda species, Clus. Pann. pag. 429. Klein kriechend Fünff-Finger-Kraut unten mit Aschfarben Blättern. Gemein klein Fünff-Finger-Kraut/ Tab. Foliis est suprà viridibus,

infrà

infrà cinereis, flosculis croceis. Radix & folia cum adstrictione siccant. In saxosis passim bey Königsberg.

DLXXXIX. Qvinquefolium erectum luteum dorso foliorum incano. Joh. Lœs. Stehend Fünff-Finger-Kraut/ deßen Blätter auff einer Seiten gantz weiß. Radice est longiusculâ, ex atro rufescente, & fibrosâ: cauliculis erectis cubitalibus, rufulis, lanugine candidâ, fastigium versùs pubescentibus, & in ramulos abeuntibus: Foliis inferioribus longissimo albicante & hirsuto pediculo innitentibus, qui in reliquis brevior. Dividuntur autem folia in quinque lacinias, ex angusto ampliatas, per ambitum profundiùs incisas, superiore parte virescentes, dorso incanas. Flores habet croceos, quinquefolios, staminulis aureis, quos insequitur minutissimum semen, Bey der Kneiphöfischen Wind-Mühl in arenosis.

DXC. *Qvinquefolium hirsutum luteum paucioribus laciniis. Joh. Lœs. Gelb raug Fünff-Finger-Kraut mit wenigern Blättern. Radix foris ex pullo ruffa, intùs albicans & lignosa, longis fibris, cauliculos edit cubitales, sæpè & majores, rotundos, virides, hirsutos, multifariam brachiatos ac humi procumbentes, quibus folia adnascuntur oblonga, in tres tantùm lacinias divisa, longis suffulta pediculis, pronâ parte virentia, dorso pallido, hirsutie villosâ, per oras incisa, duobus aliis ad exortum pediculorum foliolis instructa, ex quibus novi subinde se emergunt thyrsuli. Cacumina horum luteis exornantur flosculis, foliolis sustentatis suis, quibus succedit capitulum exile, frago haud absimile, in minutissima & facilè diffluentia semina transiens. Am Altstätischen Wall nicht weit vom Baum.

DXCI. Qvinquefolium palustre rubrum, C. B. Pin.

pag.

Qvinqvefolium hirsutum luteum paucioribus lacinijs.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0375-7
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0376-3
DFG

pag. 178. Lob. ic. pag. 674. Tab. lib. 1. fol. 132. Gelbe Wald-Violen. Ranunculus phragmites flore luteo, Gesn. hort. fol. 246. Ranunculi sylvestris alterum genus, Trag. Kyber. in Trag. p. 97. Ranunculi quarta species lutea, Fuchs. fol. 162 Anemone sexta, Dod. Lat. fol. 435. Ranunculus nonus, Lon. deutsch fol. 199. Ranunculi tertia species, Cord. hist. fol. 120. Ranunculus nemorosus flore luteo, Adv. Lob. fol. 300. Eystett. Anemone montana colore luteo, Cæs. lib. 14. c. 10. pag. 549. Ein unbekant Wald-Kraut. Brunf. deutsch fol. 111. Herba sylvestris ignoti nominis, Brunf. Lateinisch/ tom. 2. fol. 80. Geel Aprillen-Blumen. Geel Wald-Hänlein. Tab. Lon. Fuchs. Geele Hasel-Blumen quibusdam. Vis ei exulcerans. Bey Lauten-Mühl in fruticetis.

DXCIII. Ranunculus nemorosus albus, Tab. lib. 1. fol. 132. Ranunculus nemorosus, Lob. ic. pag. 673. Ranunculus candidus, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 74. Ranunculi quarta species lactea, Fuchs. fol. 161. Ranunculi quarta species, Cord. hist. fol. 120. Ranunculus sylvarum, Clus. hist. lib. 2. fol. 247. Anemone quinta, Dod. Lateinisch fol. 435. Anemone sylvestris vulgaris flore niveo, Clus. Pann. pag. 385. Ranunculus octavus, Lon. deutsch/ f. 199. Ranunculus phragmites flore albô, Adv. Lob. fol. 300. Anemone montana colore candido, Cæs. lib. 14. cap. 10. pag. 549. Ranunculi tertii, tertium & quartum genus, Thal. pag. 96. & 97. Anemone nemorosa flore majore, C. B. Pin. pag. 176. Weiß Aprillen-Blumen/ Sebitz. in Trag. Weiß Wald-Händlein/ Tab. Fuchs. Lon. Augen-Wurtz/ und weiß Mertzen-Blum quibusdam. Weiße Violen Borussis. πυρωτικὸς est, lingvam acredine vellicans. Succus verrucas aufert illitu. Ternos ejus flores, intuitu primo, verno

tempore notatos ac totidem Hepaticæ nobilis, superstitiosa plebs ingerit adversus febrim, quam metuit. In sylvis & frutetis passim. Vere primo.

DXCIV. Ranunculus nemorosus Muscatellina dictus, C. B. Pin. pag. 178. Aristolochiæ rotundæ concavæ similis herbula, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 608. Moschatella, Cord. hist. fol. 172. Moschatella Cordi, Thal. pag. 78. Moscatella, Cam. hort. pag. 103. Fumaria bulbosa seu tuberosa minima, Tab. ic. p. 39. Ranunculus minimus Septentrionalium herbido musco flore & Muscatella Cordi, Lob. ic. p. 674. Biesem-Hanen-Fuß. Kleineste Hollwurtz/ Biesem Kraut/ Tab. Acris est & moschum olet. In der Hollen-Grund passim.

DXCV. * Ranunculus nemorosus hirsutus foliis Caryophyllatæ. Joh. Læs. Rauher Wald-Hanen-Fuß mit Benedicten-Wurtz-Blättern. Radix è filamentis longiusculis constituta caulem emittit hirsutū in summitate ramosum, cui alternatim assistūt folia, profundis & minùs profundis incisuris, hirsuta, thyrsulis longis insistentia, quorum inferiora in lætiore solo nonnunquam tàm grandia, ut digitis expansis peripheria vix exhauriri possit. Sæpius tertiam partem ejus granditatis haut sunt, & subsequentia folia longè minora. Cauliculos ubi promit caulis in exortu, terna iis committit folia, mox cacuminibus eorum flosculos indulget aureos, foliolis quinque constantes, semine post in capitulis congesto. Floret Mense Majo. Bey Selnicken in fruticetis. Item im Penartischen Walde/ und in der Hollen-Grund.

DXCVI. Ranunculus pratensis erectus acris, C. B. Pin. pag. 178. Ranunculus luteus, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 73. Ranunculus pratensis surrectis cauliculis,

Lob.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0379-3
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0380-4
DFG

Lob. ic. p. 665. Ranunculus sylvestris & secundus, Tab. lib. 1. fol., 131. Ranunculus hortensis secundus, Dod. Lateinisch / fol. 426. Ranunculus polyanthemus maculatus, Thal. pag. 98. Auffgericht stehend scharffer Wiesen-Hanen-Fuß / wilder Hanen-Fuß. Tab. Gelb Hanen-Fuß. Sebitz. in Trag. Acker-Hanen-Fuß quibusdam. Folia Persicariæ instar nonnunquam maculantur, & tùm vehementiùs urunt. In pratis passim.

DXCVII. Ranunculus pratensis repens hirsutus, C. B. Pin. p. 179. Ranunculus pratensis etiamq; hortensis, reptante cauliculo, Lob. ic. p. 664. Ranunculus hortensis primus, Dod. Lateinisch / fol. 425. Ranunculus vinealis, Batrachium vineale, Tab. ic. pag. 54. Kriechender Wiesen-Hanen-Fuß / Weingart-Hanen-Fuß / Weihen-Fuß / Tab. In hortis proveniens latioribus est foliis, in pratis minoribus. Calidus & exurens est. In arvis passim.

DXCVIII. Ranunculus pratensis radice verticilli modo rotunda, C. B. Pin. pag. 197. Crus galli, Brunf. Lateinisch / tom. 1. fol. 145. Ranunculus bulbosus, Lob. ic. p. 667. Thal. pag. 96. Ranunculus radice bulbosâ, Cam. hort. pag. 136. Ranunculus tuberosus, vulgò Rapum D. Antonii, Dod. Lateinisch / fol. 431. Ranunculus exiguus & primus, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch / fol. 73. Ranunculi tertia species, Fuchs. fol. 160. Ranunculus minor, flammula, seu Ranunculi nona species, Cord. hist. fol. 121. Ranunculus minor, Tab. lib. 1. fol. 131. Ranunculus quintus, Bauh. Matth. fol. 459. Lon. deutsch fol. 199. Ranunculus flammula dictus, Gesn. hort. fol. 275. Ranunculus lanuginosus primus, Cæs. lib. 14. c. 2. p. 544. Vulgò Rapum Divi Antonii, Dod. Lateinisch / fol. 431. Brenn-Kraut / Hanen-

Fuß mit runder Wurtzel. Kleiner Hanen-Fuß/ Tab. Brunf. Fuchs. Der kleine und schalckhafftige Hanen-Fuß/ Sebitz. in Trag. Drüß-Wurtz/ Tauben-Fuß/ Lon. Hanen-Fuß oder Gleiß-Blumen die fünffte/ Matth. Rüben- Hanen-Fuß vulgò. Gehößlete Gleiß-Blümlein/ Helvet. Gesn. hort. In locis saxosis minor est, in hortis altior, in pratis medioximus. Radix quotannis nova exoritur, veteri deorsùm missâ. Pesti correptorum juxta Tragum eadem cum sale tusa femori aut brachio utiliter affirmatur, virus evocandi causâ: Locum quippe celerrimè exulcerat, vesicâ inductâ. Bey Königsberg passim. Nach der Lauten-Mühl zu.

DXCIX. Ranunculus arvensis echinatus, C. B. Pin. pag. 179. Ranunculus arvorum Lob. ic. pag. 665. Ranunculus arvensis angustifolius sive decimus quartus, Tab. lib. 1. fol. 134. Ranunculus arvensis, Gesn. hort. fol. 275. Ranunculus sylvestris tertius, Dod. Lateinisch fol. 427. Ranunculi hortensis simplicis prima species, Fuchs. fol. 157. Ranunculus sativus, Fuchs. ic. pag. 86. Ranunculus arvensis sive quinta species, Cord. hist. fol. 120. Acker-Hanen-Fuß mit stachlichten Köpffen. Acker-Hanen-Fuß/ Tab. ungefüllter Garten-Hanen-Fuß/ Fuchs. Flosculis provenit luteis, quibus semen succedit spinis horrens. Am Weisseltamme/ ubi trajectus pontone Dantisco Elbingam versùs.

DC. Ranunculus palustris Apii folio levis, C. B. Pin. pag. 180. Glatter Eppichblättriger Waßer-Hanen-Fuß. Apium aquaticum, Trag. Kyber. in Trag. pag. 93. Ranunculus palustris rotundiore folio, Lob. ic. pag. 669. Apiastrum primum, Cord. in Diosc. fol. 57. Ranunculus palustris Cord. hist. fol. 119. Thal. pag. 99. Ranunculus palustris folio Apii, Cam. hort. pag. 136. Ranunculus palustris sive tertius, Tab. lib. 1. fol. 131. Ranunculus primus, Bauh. Matth.

Matth. fol. 457. Ranunculi primum genus, Gesn. hort. fol. 275. Ranunculus tertius, Lon. deutsch fol. 198. Waßer-Hanen-Fuß / Tab. Lon. Wasser-Epff / Brunf. Lon. Frösch-Pfeffer/ Feig-Blattern-Eppich/ vulgò. In locis uliginosis passim.

DCI. Ranunculus palustris Apii folio lanuginosus, C. B. Pin. pag. 180. Ranunculi secunda species, vel Sardous Ranunculus Cord. hist. fol. 119. Ranunculus secundus, Bauh. Matth. fol. 458. Rauher Eppich-blätterichter Hanen-Fuß. Hanen-Fuß oder Gleiß-Blum die andere/ Matth. Lanuginosus est, & plusculis foliorum incisuris. In incultis & arenosis passim bey Königsberg.

DCII. Ranunculus aquaticus folio rotundo & capillaceo, C. B. Pin. pag. 180. Wasser-Hanen-Fuß theils mit runden/ theils mit haarächtigen Blättern. Ranunculus aquaticus Hepaticæ facie, Lob. ic. pag. 750. Ranunculus fluviatilis, Tab. lib. 1. fol. 144. Ranunculus aquatilis, Dod. Lateinisch/ fol. 587. Wasser-Hänlein/ Tab. Fluß-Hänlein/ Fluß-Hanen-Fuß/ Waßer-Leber-Kraut/ Fluß-Leber-Kraut und Wasser-Leber-Blümlein vulgò. In lacunis auff der Altstädtischen Klapper-Wiesen.

DCIII. Ranunculus longifolius palustris major, C. B. Pin. pag. 180. Ranunculus lanceatus major, Tab. lib. 1. fol. 135. Ranunculus πολύφυλλος, Thal. p. 100. Groß lang Waßer-Hanen-Fuß / Tab. Großer Speer-Hanen-Fuß vulgò. Circa radicem, quæ ex filamentis constituitur, cauliculi concavi ac geniculati notantur iique repentes, à Tabern. omissi, quorum singulis geniculis additæ sunt fibræ, radicationi destinatæ. Filamentis illis tenaciter affirmari conspicies corpuscula quædam oblonga ac nigricantia, ex quibus

tractu temporis prodeunt muſcæ ſubvirides, ac velut auratæ, alas ſub velamentis geſtantes, quæ circa finem menſis Auguſti avolant, nidulis ſuis poſt ſe relictis. Accidit hoc in Muſeo meo, ubi, poſtquam ranunculum quatuordecim ferè dies ſervâſſem, ac corpuſculum unum, jam nonnihil lacerum, aperuiſſem, exiit muſca lento greſſu, qvæ apricitate diei excitata paulò pòſt avolabat, me ſpectante. Provenit in der Hollen-Grund. Item hinter Fiſchhauſen in pratis uliginoſis.

DCIV. Ranunculus paluſtris ſerratus, C. B. Pin. p. 180. Ranunculus aquatilis anguſtifolius ſerratus, Lob. ic. pag. 670. Flammula Ranunculus folio ſerrato, Dod. Lateiniſch/ fol. 432. Ranunculus lanceatus ſerratus, ſive decimus nonus, Tab. lib. 1. fol. 135. Langer Waßer-Hanen-Fuß Tab. Gekerfft Speer-Kraut/ und gekerffet langer Waſſer-Hanen-Fuß vulgò. In humidis & riguis paſſim. Radix denti eroſo inſerta, excidium ei parat. In affectu febrili ruſtici hôc utuntur Ranunculô. Ranunculi hujus folia manuum carpis, ubi arteriæ ſubſultim ludunt, paroxyſmo ingruente, affirmata, die naturali elapſo remota, ac flammis cremata, quartanam febrim expugnant, vicibus tribus ante paroxyſmum re inſtitutâ. Flammulam ranunculum ab ullo unquam ore aſſumptum fuiſſe, nuſpiam invenio apud Botanicos. Verùm ex vulgo ſunt, qui eundem in ſcorbuto præſentiſſimum eſſe præſidium clamitant, ac multos eo reſtitutos dictitant. Capiunt autem ſucci libram unam, commiſcent vini Francici libras duas, maceraturi tempus benè longum miſcellam. Pòſt dimidium cochlear porrigunt ſcorbuticum malum vel metuentibus, vel nutrientibus. Acredinem medicamenti in ventriculo ſi ſentiunt aſſumentes, indicium eſt, ſatis fuiſſe aſſumptum, ſin minus, cochlear totum ingerendum præbent. Ra-

nun-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0384-7 DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0385-3
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0386-8
DFG

nunculi folia colligenda, Sole in ♌ hærente: flores Sole 15. ♌ inhabitante.

DCV. Ranunculus montanus Aconiti folio flore globoso, C.B. Pin. p. 182. Hanen-Fuß mit Wolffwurtz-Blättern/ und Kugelrunden Blumen. Ranunculus alpinus luteus, sive undecimus, Tab. lib. 1. fol. 133. Trollius flos, Gesn. in monte fracto. Trollius flos ampliore flore & aureo. Clus. Pann. pag. 372. Ranunculus sextus, Bauh. Matth. fol. 459. Anemone montana quædam, Gesn. hort. fol. 247. Ranunculus flore globoso, Dod. Lateinisch. fol. 430. Eystett. Ranunculus montanus alpinus glomeratus, Lob. ic. pag. 675. Ranunculus globosus sive montanus, Cam. hort. pag. 137. Alphanen-Fuß. Tab. Troll-Blum/ Glocken-Blum quibusdam. Ad pratorum margines beym Penartischen Walde.

DCVI. *Ranunculus aconitifolius folio rotundo ad radicem præstolante. Joh. Lœs. Hanen-Fuß mit Wolfswurtzhafftigen Blättern/ da ein rundes Blat an der Wurtzel sitzt. Radix ex filamentis albidis exstructa, caulem edit cubitalem, rotundum, viridem, fastigium versùs brachiatum & geniculatum: imo geniculo folium undecim laciniis circumserratis & virentibus superbiens, reliquis geniculis folia paucioribus divisuris assident, qveis subservit aliud degener folium, orbiculatum & crenatum, petiolum longum à radice mutuans: flosculis est croceis in caulium summo hæsitantibus. In Districtû Elbingensi, & quidem in cavâ valle, juxta tramitem Pfaffen-Steig/ quâ itur à pago Lentzen ad pagum Dörbeck. Item bey Lauten-Mühl. Mense Majo.

DCVII. Raphanus sylvestris, Fuchs. fol. 660. Thlaspi alterum, Diosc. lib. 2. c. 186. ῥαφανὶς ἀγρία, Diosc. lib.

lib 2. c. 138. Raphanus major, Trag. Seb. in Trag. deutsch f. 584. Gesn. hort. fol 275. Raphanus vulgaris seu rusticanus, Bauh. Matth. f. 350. Thlaspi majus, Cord. in Diosc. f. 46. Lon. deutsch fol. 196. Thlaspi magnum. Cæs. lib. 8. cap. 78. pag. 367. Raphanus rusticanus, C. B. Pin. pag. 96. Raphanus rusticanus crassâ radice, Lapathii folio, Lob. ic. pag. 320. Raphanus rusticus, Cam. hort. pag. 138. Raphanis magna, Radicula magna, aut rusticana, Dod. Lateinisch/ 677. Raphanus marinus Tab. lib. 2. fol. 124. Raphanus agrestis sive Armoracia, Brunf. Lateinisch/ tom. 3. fol. 197. Meerrettich/ Tab. Fuchs. Sebitz. in Trag. Lon. Kreen/ Matth. Merrich oder Bauren Senff quibusdam. Calidus tertio, siccus secundo; tùm radice, tùm semine, crassa incidit, obstructa aperit, renes expurgat, urinas mensesque ciet, calculos comminuit, & scorbuticos juvat. Folia decocta & cum oleo in cataplasma aptata, jecoris ac lienis durities molliunt, & urinæ stillicidio auxiliantur, Dod. In prato beym Mühlen-Fluß zu Schwanis. Semen nullum fert, Autore Gesnero in Hort. fol. 196. Raphanus pœna olim erat adulterorum. In Attide qui alterius vitiâsset uxorem, raphano per obscœna afficiebatur, ut eâ ignominiâ notatus, à contagio alienæ uxoris abstineret. Apud Cumæos contrà adultera asino imposita traducebatur, dicebaturque ὀνοβάπς, teste Plutarcho in Qvæstionibus Græcis. Pœna autem raphano illata ῥαφανίδοσις, h. e. raphani in podicem impulsio, dicebatur Atheniensibus, unde ῥαφανιδωτοὶ, qui tali pœnâ excruciabantur: quemadmodùm θριξαπάλαι, quibus vibrissæ è naribus, & pili è pudendis, ob adulterium, evellebantur. Insignem verò dolorem ex raphanidosi patiebantur mœchi, majorem ex mugili, omnium sævissimum ex scorpio pisc. Juvenalis:

- - - quosdam Mœchos & mugilis intrat.

Hora-

Horatius aliud quid adultero, alienas permolere uxores dedito, accidisse memorat, lib. I. Satyr. 2.

Hunc perminxerunt calones, quin etiam illud
Accidit, ut cuidam testes caudamque salacem
Demeteret ferrum. jure omnes: Galba negabat.

Notandam hîc esse censeo (ut extra oleas ferar sit venia,) vim vulgaris raphani ἑλκυστικὴν, quâ orbes stanneos vel ligneos cum adstantium stupore attollit hoc modo: Capitulum raphani cum herbidâ caulium substantiâ assulosè abscissum, sali communi immittatur, mox creberrimo circumactu in meditullio orbis facto, ut sal liquescat, orbi fortiter imprimatur, quo pressu & agitatu capitulum orbi ita affirmatur, ut in altum eundem sustollat, servetque diu. Reliqvum quicquid est raphani cum radice, ægriùs idem præstat, quod sæpiùs sum expertus. Causam rei alibi evolvemus.

DCVIII. Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias divisis, C. B. Pin. pag. 97. Radicula sylvestris, Dod. Lateinisch/ fol. 677. Raphanus sylvestris officinarum aquaticus, Lob. ic. pag. 319. Raphanus aquaticus Tab. lib. 2. fol. 123. Sisymbrium sylvestre, Cæs. lib. 8. cap. 69. pag. 362. Waßerrettich mit tieff zerschnittenen Blättern/ Waßer-Rettich/ Tab. Wilder Rettich vulgò. Foliis est nunc brevioribus & angustioribus, quorum ambitus quandoque est serratus, quandoque profundè incisus: nanis flosculis luteis, ramusculos caulium exornantibus, & in minutas siliquas desinentibus: radice gustû acri & mordace. In lacunis bey der neuen Brück.

DCIX. Raphanus aquaticus alter, C. B. Pin. pag. 97. cujus icon in Prod. pag. 38. Rapistrum aquaticum, Tab. lib. 2. fol. 118. Waßer-Hederich/ Tab. Radix copiosissimis fila-

mentis caules promit, inferiùs magnis & latis instructos foliis, quæ cacumina versùs sensim angustantur, acuminantur & inciduntur. Caulium summitates flosculis candidis, stellatis exornantur. Im Dantzker Werder milliare dimidium ab urbe circa fossam.

DCX. Rapistrum flore luteô, C. B. Pin. pag. 95. Rapistrum, Brunf. Lateinisch/ tom. 3. fol. 159. Dod. Lateinisch fol. 675. Gesn. hort. fol. 275. Sinapis agrestis alterum genus Trag. Kyber. in Trag. pag. 100. Lampsana, Bauh. Matth. fol. 356. Lon. deutsch/ fol. 225. Lampsana flore melino, Tab. lib. 2. fol. 118. Rapistrum arvorum, Lob. ic. 198. Raphani altera species in arvis proveniens, Cord. in Diosc. fol. 44. Radix sylvestris, Cæs. lib. 8. cap. 55. pag. 353. & 354. Hederich/ Brunf. Nostrates vetulæ olera decocturæ his plerumque ammiscent folia tenella rapistri lutei, commendata sapore toties. Hederich/ oder Heiden-Rettich/ Lon. Acker-Kohl mit bleichgelben Blumen/ Tab. Rüdig Nostratibus. In arvis passim. Foliis est nunc incisis, & sinuatis, nunc integris.

DCXI. Rapunculus spicatus, C. B. Pin. pag. 92. Grosse Rapuntzel mit einer Fuchs-Schwantz-Aehr. Rapunculum sylvestre, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 576. Lon. deutsch fol. 224. Rapunculus quintus, sive nemorosus primus, Tab. lib. 2. fol. 120. Rapunculum alopecuron, Dod. Lateinisch fol. 165. Rapunculus sylvestris spicatus albens, Thal. pag. 94. Phyteuma foliis rapunculi, Cæs. lib. 9. cap. 30. pag. 386. Rapuntium majus Alopecuri comoso flore, Lob. ic. pag. 329. Adv. Lob. fol. 140. Rapunculus flore spicato albo, Cam. hort. pag. 138. Rapunculus alopecuroides longiore spicâ Clus. hist. lib. 5. fol. 173. Wald-Rapuntzel/

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0390-3 DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0391-8
DFG

Nō. 73. ad pag. 229.

Rapunculus scabiosæ capitulo candido.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0392-4
DFG

tzel/ Tab. Sebitz. in Trag. Lon. In umbrosis bey Bladau. Item im Penartischen Walde.

DCXII. Rapunculus scabiosæ capitulo cœruleo, C. B. Pin pag. 92. Rapuntzel mit blauen scabiosen-Köpfflein. Scabiosa minor, Dod. Lateinisch/ fol. 122. Scabiosa sylvestris minor cœrulea, Eystett. Rapuntium montanum capitatum Leptophyllon, Column. min. cogn. stirp. & rar. part. 1. pag. 227. Scabiosa media, Lob. ic. p. 536. Scabiosa media serrato angustifolio flore globulariæ, Adv. Lob. fol. 232. Schaaf-Grind-Kraut / Apostemen-Kraut mit hochblauer Bluhm. Folia modò lævia sunt, modò hirsuta. Icones apud Lob. & Dod. etiam crenas foliis assignant, quas observare in nostrate hactenus non licuit. In incultis præsertim siccioribus passim.

DCXIII. *Rapunculus scabiosæ capitulo candido. Joh. Lœs. Schaaf-Grind-Kraut / Apostemen-Kraut mit weißer Bluhm. Foliis est angustis, tenuibus, lino æmulis, leviter crispatis, ac hirsutis, quæ circa radicem numerosissima. Thyrsulis protensis, rotundis, viridibus, quorum intermedius mediâ suâ parte nudus. Summitati eorum flosculus insidet, albus, conglomeratus, figurâ conglobatâ, qui paulatim pressior dilatatur. Radix villosa albicat. Beym Löbnichtschen Walde in incultis.

DCXIV. Rapunculus persicifolius magno flore. C. B. Pin. pag. 93. Pfirschen-blätterig Rapuntzel mit grossen blauen Glocken-Blumen. Campanula persicifolia nostras, Lob. ic. pag. 327. Campanula persicæ folio, Clus. hist. lib. 5. fol. 171. Phyteuma, Bauh. Matth. fol. 827. Phyteuma Matthioli, Cam. hort. pag. 125. Campanula angustifolia, Tab. lib. 2. fol. 33. Campanula media, Dod. Lateinisch/ fol. 166. Rapunculus campanulatus Nerii folius primus,

mus, Thal. pag. 95. Campanula alba & cœrulea, Eystett. Klein Glöcklein/ Tab. Blaue Glocken quibusdam. Flore conspicitur modò cœruleo, modò albo, hinter Latten-Walde im See-Gebirge; item bey Kumäynen in umbrosis.

DCXV. Rhamnus catharticus, C. B. Pin. pag. 478. Purgierende Stechdorn oder Creutz-Beer. Spina cervina vulgò dicta Italis, Gesn. hort. fol. 281. Spina alba Lon. deutsch fol. 59. Spina infectoria, Bauh. Matth. fol. 144. Lob. ic. pag. 181. o. Spina infectoria pumila prima, Clus. hist. lib. 1. fol. 111. NB. vid. Bauh. loc. cit. sub No. IX. Rhamni alia species, Trag. Kyber. in Trag. pag. 979. Cervispina, Cord. hist. fol. 175. Rhamnus solutivus, Dod. Lateinisch/ fol. 756. Spina cervalis vulgò, Cæs. lib. 3. cap. 17. pag. 101. Creutz-Beer/ Lon. Wegdorn-Beer/ Kyber. in Trag. Creutz-Holtz Nostratibus; Folia refrigerant & siccant. Baccæ gustù amaræ & nonnihil adstringentes, calidæ & siccæ sunt ordine secundo, humores serosos, biliosos ac pituiteos purgant, *pollinis drachmâ 1. sumptâ.* Syrupus ex succo baccarum, qui domesticus nominatur in arthritide cachexiâ, hydrope, & paralysi commendabilis est. Baccæ virides ac immaturæ croceum præbent colorem: nigræ verò ac maturæ cum modico aluminis in mortario pistilli circumactu tritæ, saturatè viridem, quem Safft-grün nominant. Suppeditant & puniceum colorem, circa festum Martini ab arbore lectæ. In der Hollen-Grund; Item bey Lauten-Mühl inter fruticeta.

DCXVI. Rhamnus salicis folio angusto, fructu flavescente, C. B. Pin. 477. Schmaler Weiden-blättriger Stechdorn. Rhamnus secundus, Matth. deutsch fol. 48. Dod. Lateinisch fol. 755. Lon. deutsch fol. 76. Clus. hist.

lib.

lib. 1. fol. 110. Clus. Hisp. pag. 67. Rhamnus primus Dioscoridis creditus, Lob. ic. pag. 180. o. Oleaster Germanicus, Cord. hist. fol. 186. Rhamnus quorundam, Cam. hort. pag. 139. Stechdorn der ander. Matth. Lon. Rothe Schlehen Borussis. Ad littus maris passim. Bey Dirschkeim. Item bey der Balga am Hafe. Rhamni alterum genus Cæs.

DCXVII. Ros solis folio rotundo, C. B. Pin. pag. 357. Rund-blättriger Sonnen-Thau. Ros solis, Dod. Lateinisch/ fol. 474. Cam. hort. pag. 142. Lon. deutsch fol. 304. Rorella minor prima, Tab. lib. 2. fol. 490. Rorella sive ros solis, Eystett. Rorida sive Ros solis major. Lob. ic. pag. 811. Salsirora, seu sponsa solis, Thal. pag. 116. Sonnen-Thau/ Lon. Kleiner Sonnen-Thau der erste / Tab. Sindau und Sonnen-Löffel quibusdam. Hinter dem Krantz-Kruge diesseits den Sand-Bergen nach der Sarckau zu copiosissimè. Item bey Schwanis in muscosis. Item bey Schreittlacken im Gebrüch. Planta hæc ipsâ meridie guttata est, guttulis se rorans, unde nomen herbæ. Mirabilius est, in Insula Ferro, ex Canariis unâ, omnis pluviæ, rivorum ac fluminum experte, arborem dari cottidie foliis suis aquam stillantem lympidam, ac gustu svavem, ad quam hauriendam homines ac cœteræ animantes ex totâ cursim currunt Insulâ sitis pellendæ causâ. Foliis crescit nucis juglandis, fructus fert quercûs. In Itinerariis passim.

DCXVIII. Rosa sylvestris vulgaris flore odorato incarnato. C. B. Pin. 483. Wilde Fleisch-farbe riechende Hahnbotten oder Feld-Rosen. Cynosbatus Dioscoridis, Lon. deutsch. fol. 61. Rosa sylvestris, Bauh. Matth. fol. 166. Tab. lib. 3. fol. 788. Gesn. hort. fol. 276: Dod. Lateinisch/

fol. 186. Rosa sylvestris odorata incarnato flore. Eystett. Rosæ sylvestris primum genus, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 773. Rosa canina odorata, & sylvestris Rosa, Lob. ic. pag. 210. o. Cynosbatos, sive Cynorrhodos procerior, Cord. in Diosc. fol. 19. Rosa canina, Cam. hort. pag. 146. Rosa sylvestris altior, Cæs. lib. 3. cap. 10. pag. 97. Cynorrhodos seu Rosa canina, Thal. pag. 35. Heck-Rosen/ Tab. Sebitz. in Trag. Hanbutten oder Han-Rosen/ Lon. Feld-Rosen/ Frauen-Rose/ Marien-Dorn/ Korn-Rose/ Haber-Rose/ Hunds-Rosen/ Büttel-Rosen/ Heyd-Rose vulgò. In der Hollen-Grund inter fruticeta passim. Item bey Sünicken alibique. Spongiola aliquando adnascitur. Vid. Dod. loc. cit.

DCXIX. Rubus vulgaris, sive Rubus fructu nigro, C. B. Pin. pag. 479. Schwartze Brom-Beeren. Rubus, Brunf. Lateinisch/ tom. 2. fol. 186. Matth. deutsch fol. 427. Lob. ic. pag. 211. o. Lon. deutsch/ fol. 57. Fuchs. fol. 152. Dod. Lateinisch fol. 741. Rubus primus, Cæs. lib. 3. c. 11. pag. 28. Rubus arvensis, Tab. lib. 2. fol. 587. Rubus grandis & secundus, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 660. Rubus Batis, Adv. Lob. fol. 446. Rubus vulgaris, Gesn. hort. fol. 277. Thal. pag. 102. Brombeeren/ Brunf. Fuchs. Lon. Tab. Brombeer/ Bremen/ Matth. Bey der Altstätischen Ziegelscheune. Item bey Fischhausen im Rosen-Busch copiosè, qui locus veriùs rubetum dici posset. Rubus hic virgultis grandioribus retrorsùm reflexis ad terram inclinat, reptatu propagationem acqvirens, foliis est hirtis aculeatis, ac vegetis, deciduis tùm demùm, ubi novella pullulant folia. Fructus niger est, sapore dulcis, cum acore grato. Refrigerat & siccat Aut. Diosc. Galeno turiones

aqueæ

aqueæ ſunt ſubſtantiæ cum modicâ adſtrictione. Fructus maturus temperatus eſt dulcedine ſuâ, & nonnihil adſtringens: immaturus acerbus, vehementiùs ſiccans& adſtringens. Folia decocta foriolos juvant, dyſentericos ac mulieres nimio menſtruorum fluxu diſcruciatas. Salmonius apud Athenæum rubi fructum appellat Batium. Rubus βάτος eſt, inde vox βάτον. Rudimentum fructus rubi, vel mori, olim ſpica vocabatur, quia ſpicæ ſimile. Sophocles:

Primum quidem cernes candidam quæ floret ſpicam,
Deinde teres atq; puniceum morum.

Succo mororum acidorum olim mulieres faciem fucabant, ac inde ὑπωπιασμέναι vocabantur. Pugnis eo nomine à maritis exceptæ, veriùs ὑπωπιασμέναι dici poſſent, à livore oculos & faciem ſugillante.

DCXX. Rubus repens fructu cœſio. C. B. Pin. pag 479. Rubus minor, Dod. Lateiniſch fol. 742. Rubus humilis Belgicus, Cluſ. Pann. pag. 115. Cluſ. hiſt. lib. 1. fol. 118. Rubus humilis & primus, Trag. Sebitz. in Trag. deutſch f. 660. Rubi alterum genus, Cæſ. lib. 3. cap. 11. pag. 98. Rubus reptans, Adv. Lob. fol. 446. Rubus hic cæſio fructu virgultis ſuis ſpinoſis terræ ſe inſinuat, ac novis radiculis impetratis ſui generationem uberiùs promovet, agros ſæpè totos occupando. Fructus cœruleus ſapore eſt dulci. Blaue Kratzel Beeren Noſtratibus. In arvis paſſim.

DCXXI. Rubus idæus ſpinoſus, C. B. Pin. pag. 479. Rothe Hind-Beeren. Rubus idæus, Trag. Sebitz. in Trag. deutſch/ fol. 660. Matth. deutſch f. 428. Lob. ic. pag. 212. o. Geſn. hort. fol. 277. Thal. p. 102. Dod. Lateiniſch fol. 743. Rubus idæus Dioſcoridis, Lon. deutſch/ fol. 78. Rubus idæus vulgaris Cluſ. hiſt. lib. 1. fol. 117. Rubus idæus exilibus ſpi-

ſpinis, Cord. in Dioſc. fol. 63. Rubus rertius montibus proprius, Cæſ. lib. 3. cap. 11. pag. 98. Hindt-Beeren. Matth. Himbeern. Sebitz. in Trag. Lon. In der Hollen-Grund. Item auff dem Lentzken-Berge.

DCXXII. Rubus ſaxatilis alpinus, Cluſ. hiſt. lib. 1. fol. 118. Kleine Stein-Beeren/ Cluſ. Pann. pag. 115. Chamærubus ſaxatilis, C. B. Pin. pag. 479. Rubus parvus ſaxatilis alpinus Cam. hort. pag. 149. Rubus alpinus humilis, Geſn. hort fol. 277. Rubus minimus, Thal. pag. 102. Stein-Beer/ Thal. Brunitſchken/ Accolis maris Balthici. Auff der Curländiſchen Nährung in den See-Gebirgen paſſim, hinter Latten-Walde. Item bey Bladau in umbroſis. Antiſcorbutica planta eſt.

DCXXIII.* Sagitta aquatica foliis variis. Joh. Lœſ. Radice eſt albidis, rotundis & articuloſis filamentis, foliis bicubitalibus effigie ſuâ evariantibus: quorum nonnulla craſſiuſcula & triangula ferè, intùs ſpongioſa, & in ſummitate ſagittifera ſunt: alia latiuſcula, nervoſa & minùs craſſa, ſubacuminantur: alia vel haſtulæ in modum effigiantur, vel ſagittalis formæ aliquantillum adſciſcunt. Caulis eſt rotundus, lævis, junceâ intùs ſubſtantiâ, qui in ramulis floſculos gerit albicantes, tribus foliolis, ſtaminibus ex luteo purpuraſcentibus. His ſuccedit fructus capitoſus, uti in vulgari. Groß Pfeil-Kraut mit mancherley Blättern. Im Pregel paſſim.

DCXXIV. Sagitta aquatica minor latifolia, C. B. Pin. pag. 194. Sagitta, ſeu ſagittalis, Cord. hiſt. fol. 86. Sagitta minor, Bauh. Matth. fol. 797. Dod. Lateiniſch fol. 588. Tab. lib. 2. fol. 415. Adv. Lob. fol. 127. Sagittaria minor, Lob. ic. pag. 302. Klein breitblätterig Pfeil-Kraut/ Tab. Matth.

Kleine



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0399-8
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0400-4
DFG

Kleine Otter-Zung quibusdam. In undis stagnantibus passim. Beym Philosophischen Gang.

DCXXV. Sagitta aquatica minor angustifolia, C. B. Pin. 149. Sagitta minor angustifolia, Tab. lib. 2. fol. 416. Klein schmalblätterig spitzig Pfeil-Kraut/ Tab. Fœmellis sterilitatem detestantibus salutaris. Am Pregel hinter dem Bretter-Kruge.

DCXXVI. Salix prima, vel procera, Dod. Lateinisch fol. 842. Salix perticalis, Cord. in Dioſc. fol. 21. Salicis quartum genus, Lon. deutsch fol. 42. Salix Dioscoridis, Lob. ic. pag. 136. Salix vulgaris alba arborescens, C. B. Pin. pag. 473. Große Salweyblättrichte Kampweide. Foliis est oblongis in acutiem tendentibus, superiore parte virentibus ac glabris, aversâ molli & albâ, lanugine obsitis, in ambitu exiguè, ac desultoriâ quasi operâ incisis. Ramusculorum cortex albidus & lanosus utplurimùm est. Perticæ ac pali ex hâc sæpiusculè fiunt. Folia, flores & cortices salicum refrigerant citra morsum, siccant & adstringunt, cruentum vulnus glutinant, ac inflammationi resistunt. Flores cum lanugine naribus inserti, vel in pollinem acti, & calamo sursùm efflati, hæmorrhagiæ medentur. Aqua nucamentorum adversùs ἀναστόμωσιν, διαίρεσιν καὶ ῥῆξιν vasorum, efficax est. Corticum cinis aceto mistus, verrucas & clavos aufert. Folia recentia somnum accersunt, lotionibus addita. In pagis passim. Bey Bladau. Salix rusticis, sagis ac veneficis, virgulas promit, quas Francones Alp-Rutten nominant. Alpen Dæmones esse credunt, in pascuis & uliginosis locis oberrantes, cum quibus fœdera feriunt, ut nocentiores sint pecudum, vel etiam hominum generi. Ægritudinem armentis vel hominibus Dæmonum horum ope illatam, Germani Elben vocant.

Unde locutiones: Das Vieh oder der Mensch hat die Elben. It: Es sind dahin und dahin so viel Elben ins Leib gezaubert. Sciscitanti quid Elben sint, respondent, vermes esse minutos, rubellis capitulis, manus ac pedes frequentissimè occupantes, qui non nisi magicis remediis enecantur. Aliàs licèt cultello exscindantur, de integro tamen dictis in locis generantur. Simile quid veneficæ apud nos agunt Dæmonibus subterraneis, quos Unter Erdtschen appellant. Ut autem scias, quid sint illæ virgulæ, Alprutten dictæ, rem ita habe: Salices, rubris maximè corticibus vestitæ, pullulos quandoque geminos è simplici excludunt gemmâ, firmissimè invicem connatos, ac cortice communi tectos, effigie digitorum duorum, glutine junctorum. Usus: Germen dictum rustici ante Solis exortum ab arbore resecant, eoque plagosum pecus, malo hoc discruciatum, sæpiùs flagellant, plagis integrum triduum, ante ortum & occasum Solis, morbido pecori impositis. Sunt, qui obsessos & fascinatos hoc remedio in integrum restitutum iri dictitant. *Hippiatri equos* (die den rittenden Wurm haben) hoc præsidio fuisse adjutos, seriò attestantur.

DCXXVII. Salix caprea rotundifolia, Tab. lib. 3. fol. 745. Salix lato folio, Gesn. hort. f. 278. Salix latifolia rotunda C. B. Pin. p. 474. Salix latifolia, Cam. hort. p. 151. Salix Platiphyllos. Adv. Lob. p. 423. Salix platiphyllos alia, Thal. p. 112. Runde breite Seyl-Weiden/ Tab. Salweyden/ Gesn. hort. Folia crenis destituta supernè virent, infernè canescunt, florem edit luteolum, odoratum, apibus gratum, cui longum succedit nucamentum, cum semine in pappos abiens. Im Domnauschen Walde & aliis saltibus nemorosis.

DCXXVIII. Salix vulgaris rubens, C. B. Pin. p. 473. Salicis primum genus, Lon. deutsch fol. 41. Salicis tertium genus,

genus, Fuchs. fol. 336. Salix Sabina, seu Amerina, Thal. p. 112. Salix minor, viminalis & Gallica, Dod. Lateinisch f. 843. Band-Weiden und rothe Weiden/ Lon. Gold-Weide. Cortex insigniter ex fusco splendet. Folia gerit viridia & serrata. Lentitiæ est sequacis, calathis, cistellis ac canistris aptissima. Bey Lauten-Mühl.

DCXXIX. Salix caprea latifolia, Tab. lib. 3. fol. 745. Salix folio ex rotunditate acuminato, C. B. Pin. 474. Breitblättrige gespitzte Seil-Weide. In sylvis hinc & inde. Scythæ ex salignis virgis, humi constratis, futura prædicebant, Auctore Herodoto lib. 4. Herniæ remedium: Succosior salix Lunâ decrescente, cultro deorsum impresso, incidatur aliquousque, mox assula excidatur, loco affecto affirmetur, & aliquantisper gestetur, donec sordidula gestamine existat: tandem in locum gentilitium delata, ligno prius avulso recreata, ac debitè, ut concrescat, deligata, ægrum herniosum firmat ac restituit.

Podagræ auxilium: Lunâ extra pisces constitutâ, & quidem postridiè, quàm ultimam adiit quadram, saligna stirps, terræ desacranda, miscellæ lotii & sangvinis ægrotantis (locus affectus dicto superiùs tempore scarificetur, & lotio, spatio bidui reddito, ammisceatur) aliquandiu maceranda committatur: mox tertio ante novilunium die fossula efformetur, stirpi inserendæ apta, in quam & priorem miscellam & salicem transferas: mense abhinc elapso, tertio ante novilunium die, locum circa affectum, de integro scarificetur æger, sangvis lotio confundatur: idem labor, quatuor hebdomadarum spatio exacto, iteretur, sic feliciſſimè averruncaturus es crucium podagræ malum.

DCXXX. Salix sylvestris latifolia, Tab. lib. 3. fol 744.

Salix, Bauh. Matth. fol. 175. Breite Seil-Weide / Tab. Spitzblättrichte Kamp-Weide. Foliis est crenatis, oblongis, acuminatis, suprà viridibus, infrà modò exalbidis, modò virentibus, quorum exortibus alæ duæ adpositæ sunt. Corbibus pabulatoriis, messoriis, fiscellis ac nassis parandis expetita. Virgultum tenerum hanc in rem Majo & Julio mensibus demitur. Majo resectum das May-Holtz / Julio verò S. Jacobs Holtz artificibus nominatur. In riguis in der Hollen-Grund.

DCXXXI. Salix sylvestris angustifolia, Tab. lib. 3. fol. 744. Salicis alterum genus. Fuchs. fol. 335. Lon. deutsch fol. 41. Salix sativa lutea folio crenato. C. B. Pin. pag. 473. Salix tertia, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 855. Cæs. lib. 3. cap. 46. pag. 125. Salix vitellina, Cord. in Diosc. fol. 21. Schmal Seil-Weiden/ Tab. Geele Weyden/ Bach-Weyden/ Lon. Gelbe Weiden und Dotter-Weiden/ Cord. in Diosc. Gelbe Haar-Weiden quibusdam. Folia habet crenata, supernè ex virore splendentia, infernè candicantia, quæ nunc majora, nunc minora. In der Hollen-Grund.

DCXXXII. Salix fragilis latifolia. Joh. Lœs. Bruch-Weide mit breiten Blättern. Salix fragilis, C. B. Pin. p. 474. Salicis tertium genus & salix alba. Lon. deutsch fol. 42. Salix secunda candido cortice, Trag. Seb. in Trag. deutsch f. 855. Bruch-Weide und weisse Weide/ Lon. Albicant folia, hirsutie molli, crenis in ambitu vix conspicuis. Foliis quandoque innascuntur vesiculæ oblongæ, eruculis gravidæ. Virgulta ejus levi manu franguntur. Auffm Tham nach der neuen Brücken.

DCXXXIII. Salix fragilis tenuifolia. Joh. Lœsel. Bruch-Weide mit schmalen langen Blättern. Zur Kobbel-Bude in Truchsen Walde am Ufer des Frischings.

DCXXXIV

DCXXXIV. Salix rubra obtuſo latiore folio. Rothe Sprock-Weide mit breiten ſtumffen Blättern. Caules habet teretes, ac rubentes: folia latiora, obtuſa, crenata, pronâ parte atrovirentia, ſupinâ cinerea, alis duabus in exortu ſtipata. Ad corbes inutilis. In riguis in der Hollen-Grund.

DCXXXV. Salix oblongo Salviæ folio. Joh. Lœſ. Kleine Salweyblättrichte Kamp-Weide. Cauliculis eſt ramoſis, incanis: foliis oblongis, Salviæ æmulis, in ambitu crenatis, ſupernè atrovirentibus, infernè candidis & lanuginoſis, quorum exortibus alæ duæ appoſitæ. Corbulis deſervit texendis. Paſſim.

DCXXXVI. Salix humilis anguſtiore oblongo folio. Joh. Lœſ. Haar-Weide mit ſchmallen länglichten Blättern. Cauliculis eſt numeroſis, nunc rubentibus, nunc viridibus: foliis oblongis & anguſtis, nonnihil crenatis, ſuprà viridibus, infrà exalbidis, quibus veſiculæ ſubrubentes baphico cocco aſſimiles, ſæpè innaſcuntur. In der Sarckau. It. Bey der Kobbel-Bude am Friſching.

DCXXXVII. Salix pumila anguſtifolia prima, Cluſ. hiſt. lib. 1. fol. 86. Salix pumila anguſtifolia altera. Cluſ. hiſt. Pann. pag. 103. Salix pumila brevi anguſtoque folio incano. C. B. Pin. 474. Kleine ſchmalblättrichte kurtze Haar-Weide. Dorſo caneſcunt folia, pronâ parte virent, ac veſiculas ſæpe habent. Lentitiæ eſt inſignis. Im Gebrüch bey Lauten-Mühl. Salix olim ruſticis coronamenta dabat. Scopo huic ſerviebat maximè ſalix Amerina, quæ ad nexus aliàs & vitilia fuit idonea. Megiſthes, vir humanus & affabilis, totos decem menſes Amerinâ ſalice redimitus erat. Esù corticum ſalicis, alni, & conſimilium arborum, mirè delectatur

Castor, qui, cùm sit animal horrendô morsû, arbores retas olim dictas, juxta flumina dentibus suis croceis ceu ferro cædit, hominesque ad retanda flumina cogit. De his antiqvum exstat edictum, quod servavit nobis Gellius Lib. XI. cap. 17. Qui flumina retanda publicè redempta habent, si quis eorum ad me adductus fuerit, qui dicatur, quod cùm ex lege locationis facere oportuerit, non fecisse. Ubi ex Gavio dicit retas esse arbores, quæ aut ex ripis fluminum eminent, aut in alveis eorum exstant, appellatasque esse, quod prætereuntes naves impediant, & quasi irretiant: Ideoque retanda flumina locari solita esse, id est, purgandum, ne quid moræ, aut periculi navibus, in ea virgulta incidentibus, fieret. Hæc obiter.

DCXXXVIII. Sambucus, Brunf. Lateinisch/ tom. 3. fol. 181. Bauh. Matth. fol. 873. Dod. Lateinisch / fol. 845. Fuchs. fol. 64. Lon. deutsch/ fol. 64. Lob. ic. pag. 161. o. Gesn. hort. fol. 278. Tab. lib. 3. fol. 731. Sambuci primum genus, Cord. in Diosc. fol. 75. Cæs. lib. 3. cap. 4. pag. 91. *Sambucus fructû in umbella nigrô, C. B. Pin. pag. 456.* Sambucus vulgaris, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 782. Thal. pag. 111. Sambucus campestris, sive vulgaris, Cam. hort. pag. 152. Holunder/ Matth. Lon. Sebitz. in Trag. Holder-Baum/ Tab. Holder/ Brunf. Fuchs. Alhorn Nostratibus. Siccantis est naturæ, aquas ducit, sudores movet, venenis resistit, calculos atterit, ac menstrua citat, Galeno 6. simpl. acte tùm arboreâ, tùm herbaceâ, siccat, glutinat, & modicè digerit. Cortex interior Sambuci, nigro exteriore dempto, cultello sursùm apices versùs ramusculorum rasus, & condylomatibus inflammatis impositus, dolores etiam gravissimos ani sedat. Rasura calfacta abjiciatur, & nova sæpiùs imponatur. Experimentum fuit illustris cujusdam Matronæ, quæ à partu

crucio

crucio hoc malo infestata ocissimè hôc remediô fuerat restituta. Sarmatis arbor Sambucus domicilium credebatur *Putschæti*, tutelaris quondam Numinis lucorum & sacrarum arborum. Huic rustici pane, cerevisiâ, cibisque variis, sub arbore hac superstitiosè locatis, olim litare consveverant à *Putschæto* unà contendentes, quò placatum efficeret *Marcoppolum*, Deum Magnatum & Nobilium, ne posthac graviore servitute à Dominis premerentur suis. *Barstuccas* etiam, seu subterraneos, quos Germani Erd-Männlein vocant, Putschæti auxilio ad se solicitabant, quippe ob Dæmones hos συνοίκους se fortunatiores futuros persvasissimum habebant. His, vesperâ ingruente, mensam in horreo mappâ sternere solebant, caseos, panes, butyrum & cerevisiam addentes, nec dubitabant de fortunarum accessione, si manè viderint cibum illic absumptum. Si verò intactus remanserit in mensâ, animô vehementer angebantur. Venerabantur etiam Deos quosdam visibiles, (obiter ut hoc dicam,) qui Græcis Κόβαλοι, Russis Colky, Germanis Kobold dicebantur. Hos omni ciborum genere alebant, eò, quòd furtiva afferrent frumenta aliunde ex horreis petita. Dæmones hi domicilium occupaturi sæpe nocturno tempore lignorum segmina in domo congerebant, & mulctras lacte plenas stercoribus spurcabant. Segmina illa, si Paterfamilias indisjecta servaverit, & lac stercore frustulentum cum familiâ comederit, Dæmones statim, ut gratissimi hic hospites futuri, & apparuêre & permansêre. Vermes notandi, quos sub Sambuco sepeliunt Sagæ. Bimulus sambuci cortex, sursùm versùs abrasus, lacte decoctus, ac potus, vomitu purgat: aliò versùm verò seu deorsùm rasus, per alvum, seu gutturem inferiorem (cum Plauto loquar,) dejicit noxia. Remedium odontalgiæ transplan-

plantans certum eſt in ſambuco: Sambucum teneram, occidentem versùs, cultro deorsùm impreſſo, ſanciet aliquis, vultû in orientem miſſo, ac corticem cum ſubjecto ligno aliquousque avellat: paulò pòſt aſſulâ, ex meditullio arboris excisâ, dentes ita fodiat, quò cruentetur: cruentatam ac madidam adhuc cruore, in priſtinum ac natalem locum deferat, ac avulſam priùs arboris partem mox ſuperinducat, partibus ſauciis filo cannabino crudo, ſtudiosè in orbem collecto, benè firmatis. Vulnerata hôc modô, deligata, ac ſpontali coalitû reſtituta arbor, qverqveræ ὀδονταλγίας certa exiſtit ſalus. Eandem & ſalix pollicetur vim, debitè dicto ſuperius modo tractata. Fruſtula baculi ſambuci, Sole ♌ ingreſſo, ab arbore reſecta, filo in orbem collecta, ac in pari numero collo ſuſpensa, epilepſiam fugant. Dememinisſe interim haud oportet, ligneola Solis die eſſe comparanda, tàm diu geſtanda, donec filo rupto ſponte decidua fiant, demum in profluentem eſſe mittenda. Suppeditat ſambucus remedia baccis, acinis baccarum, floribus, turionibus, foliis, cortice mediano flavo, radice, medullâ, & ſpongiolis ſeu auriculis Judæ. 1. Bilem, pituitam, & inprimis ſerum expurgat. 2. menſes evocat, juvatque mulieres ab utero præfocatas. 3. urinam ducit, ſudorem provocat, & calculum expellit. 4. malignitati reſiſtit. 5. dolores quarumcunque partium compeſcit, cutim rarefaciendo, ac vapores digerendo. Medulla ſambuci globulos ſuppeditat Chirurgis, quos ſæpiuſculè fontanellis immittunt. Medulla hæc Græcis μήτρα nominatur. De voce μήτρα qværit Ulpianus Tyrius apud Athenæum, μήτρα πῦ κεῖται, ubi legitur pro eduli cibo? Mos erat Ulpiano, inter epulas nihil cibi guſtare, priusquam dixiſſet τὸ πῦ κεῖται, hoc ubi exſtat? Hinc & κειτύκειτ elegantiſſimè

tissimè appellatus est. Notat autem μήτρα vulvam suillam, olim in deliciis habitam, uterum, & medullam arborum. Sambucus glirario infensissima est odore, quippe ramuli sambucei succosi ac odorati, circumcirca scolymum in terram defixi, eum tuentur à gliribus, anhelo gutture scolymum aliàs depascentibus. Idem ebulus præstat, quem horreis immittunt rustici ad fugandos mures.

DCXXXIX. Sambucus humilis, sive Ebulus, C. B. Pin. pag. 456, Ebulus, Brunf. Lateinisch/ tom. 3. fol. 65. Matth. deutsch fol. 562. Fuchs. fol. 65. Tab. lib. 2. fol. 451. Dod. Lateinisch/ fol. 381. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 628. Lob. ic. pag. 164. o. Cæs. lib. 5. cap. 13. pag. 209. Sambuci alterum genus, sive Ebulus, Lon. deutsch fol. 64. Ebulus, sive parva Sambucus, Cord. in Diosc. fol. 75. Attich/ Matth. Tab. Brunf. Fuchs. Attich/ oder niedriger Holder/ Lon. Hydropicorum aquas ἄνω καὶ κάτω ducit. Fer. 5. m. m. Im Dorff Lopäinen an der See. Item zu Abschwangen ad hortorum sepes. In pago Lügeinen im Lochstädtschen copiosè. Ebuli radix, Augusto decrescente Lunâ effossa, in ulceribus sordidis, ac vermiculationibus infantum, extollitur, etiam collo appensa. Cæterùm oleum corticum radicis ebuli efficacissimum in lumbricis excludendis: circa Jacobi diem, Lunâ in decrementis constitutâ; cortices radicum ebuli, non ablutarum, contundantur, contusô corticum minutali oleum affundatur, in Sole paulò pòst apricaturo. Olei hujus cochlear unum vel alterum ingeratur, & abdomen linteo stringatur.

DCXL. Sambucus aquatica flore simplici, C. B. Pin. pag. 456. Waßer-Hollunder mit schlechter Blüth. Sambucus aquatica, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 786. Tab.

lib. 3. fol. 732. Bauh. in Matth. fol. 874. Lob. ic. pag. 201. o. Thal. pag. 111. Sambucus paluſtris, Dod. Niederländiſch/ fol. 1323. Cæſ. lib. 3. cap. 4. pag. 91. & 92. Lycoſtaphylon fœmina, Cord. hiſt. fol. 174. Schwelcken. Sebitz. in Trag. Schwelcken-Baum/ Tab. Arbor Noſtratibus dicitur Kaninchen-Baum; Fructus verò Kaninchen. Baccas fert rubicundas, vomitum excitant devoratæ. Succo vis eſt abſterſoria, hinc ex eodem Syrupus conficitur, è baccis cuniculorum, malè officinis dictus, in affectibus faucium ſalutaris. Loca amat rigua. Beym Penartiſchen Walde. Item. in der Hollen-Grund.

DCXLI. Sanicula officinarum, C. B. Pin. pag. 319. Heil-Kraut. Sanicula, Trag. Sebitz. in Trag. deutſch/ fol. 405. Dod. Lateiniſch/ fol. 140. Eyſtett. Lon. deutſch/ fol. 244. Tab. lib. 1. fol. 302. Cam. hort. pag. 152. Thal. pag. 111. Cæſ. lib. 14. cap. 22. pag. 556. Sanicula & Diapenſia, Brunf. Lateiniſch/ tom. 1. fol. 80. & 81. Lob. ic. pag. 663. Diapenſia, Bauh. Matth. fol. 720. Sanicula mas, Fuchſ. fol. 671. Sanickel/ Matth. Tab. Lon. Brunf. Sanickel-Männlein/ Fuchſ. Schernäckel Vetulis. Bey Birckenfeld in umbroſis copiosè. Item bey Bladau am Berge.

DCXLII. Saponaria major lævis, C. B. Pin. p. 206. Groß glatt Seiffen-Kraut. Saponaria, Trag. Kyb. in Trag. p. 900. Dod. Lat. f. 179. Eyſtett. Tab. lib. 2. f. 409. Lob. ic. p. 214. Saponaria prima, Cæſ. lib. 6. c. 48. p. 256. Saponaria vulgaris, Cam. hort. p. 153. Struthium, Fuchſ. f. 780. Thal. p. 117. Struthium primum, Lon. deutſch/ fol. 109. Seyffen-Kraut Tab. Lon. Fuchſ. Speichel-Wurtz oder Seiffen-Kraut/ Kyber. in Trag. Amara eſt, acris, abſtergens & aperiens. In lue Gallicâ, quæ optima etiam remedia eluſerat, efficaciſſima exſti-

exſtitit. Inventorem habuit Zapatam, Empiricum Hiſpanum. Herba adhuc ſuccida, manibus comminuta, eas ſmegmatis inſtar mundat. In cœmeterio pagi Neuhauſen. Item dießeits dem hohen Kruge in arenoſis copiosè. Flores in umbellâ modò albi, modò rubicundi, modò copioſiores, modò pauciores.

DCXLIII. Satureja hortenſis, ſive Cunila ſativa, Plinii C. B. Pin. pag. 218. Satureja Trag. Kyber. in Trag. p. 45. Dod. Lateiniſch f. 289. Lon. deutſch fol. 150. Tab. lib. 2. fol. 74. Cam. hort. pag. 153. Hyſſopus agreſtis, Brunf. Lateiniſch/ tom 3. fol. 164. Satureja hortenſis, Lob. ic. pag. 426. Adv. Lob. fol. 182. Satureja hortenſis, & Thymbra vera, Geſn. hort. fol. 279. & 284. Satureja ſativa, Fuchſ. fol. 304. Satureja domeſtica, Eyſtett. Satureja, ſive Thymbra ſativa, Cord. in Dioſc. fol. 53. Cord. hiſt. fol. 145. Wilder Hyſop/ Kirch-Hyſop. Brunf. Satureja oder Garten-Hyſop/ Kyber. in Trag. Sedeney/ oder Saturay/ Lon. Gemeine Saturay/ Tab. Joſeplen/ oder Saturon/ Fuchſ. Kalbs-Iſop/ Zwiebel-Yſop/ Hüner-Füll/ Sergen-Kraut. Pfeffer-Kraut Noſtratibus. Calfacit, ſiccat tenaces humores acredine ſuâ incidit, menſes citat, ac thoracis vitiis medetur ab infarctu craſſo. An der Lauten-Mühl auff der Mauer.

DCXLIV. Saxifraga rotundifolia alba, C. B. Pin pag. 309. Rundblättriger weißer Steinbrech. Saxifraga alba, Trag. Kyber. in Trag. pag. 525. Dod. Lateiniſch/ fol. 316. Geſn. hort. fol. 279. Cam. hort. pag. 154. Thal. pag. 106. Tab. lib. 2. fol. 510. Saxifraga alba, Saxifraga minor, Fuchſ. ic. pag. 427. Saxifragia quarta, Bauh. Matth. fol. 694. Saxifraga alba, Lon. deutſch/ fol. 248. Saxifraga alba Chelidonides, Lob. ic. pag. 612. Saxifragia Brunf. Lateiniſch tom. 1.

fol. 185. Saxifraga major, ſeu alba, Fuchſ. fol. 747. Saxifraga alba tuberosâ radice, Cluſ. hiſt. lib. 3. fol. 308. Thelygono affinis herba, Cæſ. lib. 8. cap. 31. pag. 338. Weißer Steinbrech/ Tab. Kyb. in Trag. Hoher Steinbrech/ Fuchſ. Auff dem Naßen-Garten in montoſis.

DCXLV. Saxifraga rotundifolia aurea, C. B. Pin. pag. 309. Chryſoſplenion, vel Saxifraga aurea, Tab. lib. 2. fol. 512. Saxifraga aurea, Dod. Lateiniſch/ fol. 316. Geſn. hort. fol. 279. Saxifraga aurea Lichenis facie & natalitiis, Lob. ic. p. 612. Saxifraga aurea Dodonæi, Cam. hort. pag. 154. Thal. pag. 106. Hepatica paluſtris, Eyſtett. Gülden Miltz-Kraut/ Tab. Gülden Steinbrech. Infarctum jecoris ac lienis expedit, & à vaccis comeſta butyro flavedinem confert. Viribus eſt Hepaticæ vel Lichenis. Ad rivulos, ſcaturigines, & loca uliginoſa paſſim menſe Aprili.

DCXLVI. Scabioſa major ſqvamatis capitulis C. B. Pin. pag. 269. Scabioſa major, Matth. deutſch fol. 405. Scabioß/ Brunf. deutſch fol. 92. Scabioſa major flore purpureo, ſive prima, Tab. lib. 1. fol. 546. Scabioſa major Matthioli, Cam. hort. pag. 154. Cyanus ſylveſtris major arvenſis, Thal. pag. 29. Groß braun Scabioßen/ Tab. Calefacit, ſiccat, incidit, abſtergit & expurgat. Secus vias & ſalebroſa paſſim.

DCXLVII. Scabioſa major ſquamatis capitulis, floſculis candidiſſimis, Groß weiß Scabioſen. Foliis provenit profundiſſimè inciſis, effigiem ſcabioſæ majoris, Matth. ferè exprimentibus. Caules gerit teretes, ſtriatos ac ſubvirides: floſculos in ſquamoſis capitulis niveos, quorum ſi evulſeris unum, in quatuor filamenta eundem ſupernè diremptum conſpicies. Capitula ex compactili ſqvamarum ſerie

con-

constant abeuntque squamæ in acutiem, parvulis utrinque aculeis, iisque nigricantibus armatæ. Radice nititur lignosâ, tereti, ac filamentis exornatâ, quæ insipida penè: foris subnigra est, intus candida. In pago Sarkau hinter dem forderſten Kruge. Item bey Holland secus viam Elbingam versùs.

DCXLVIII. Scabiosa pratensis hirsuta, quæ officinarum C. B. Pin. pag. 269. Scabiosa altera campestris, sive Segetum & Satorum, Lob. ic. pag. 537. Scabiosa major flore ex cœruleo purpureô, Tab. lib. 1. fol. 546. Scabiosæ primum genus, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 194. Scabiosa vulgaris, Eystett. Scabiosa, Lon. deutsch fol. 179. Fuchs. 716. Scabiosa dissectifolia major, Thal. pag. 108. Groß Scabiosen/ Tab. Apostem-Kraut/ Fuchs. Pastemen-Kraut/ oder Scabiosen/ Lon. Groß Purpur-blaue Scabiosen/ vulgò. Hâc nostrates officinæ non utuntur, sed alterâ illâ, quæ C. B. Scabiosa major squamatis capitulis, dicitur. In arvis & pratis nonnihil riguis passim.

DCXLIX. Scabiosa multifido folio, flore flavescente, C. B. Pin. pag. 270. Scabiosa ὠχρολευκῷ flore sive septima, Clus. hist. lib. 4. fol. 3. Scabiosa tertia, Clus. Pann. pag. 538. Scabiosa Pannonica flore albo. Eystett. Scabiosa tenuifolia candida seu major, Thal. pag. 109. Scabiosa major floribus luteis. Cam. hort. pag. 154. Gelblicht Scabiosen mit sehr zerschnittenen Blättern. Auffm Berge gegen dem Naßen-Garten über. Item bey Lauten Mühl und Sarckau passim. Gelblichte Scabiosen mit viel zerschnittenen Blättern.

DCL. Scordium, C. B. Pin. pag. 247. Trag. Kyber. in

Trag. pag. 885. Dod. Lateinisch fol. 126. Matth. deutsch/ fol. 340. Tab. lib. 2. fol. 437. Cam. hort. pag. 156. Eystett. Lon. deutsch fol. 231. Scordium, sive Trixago palustris, Adv. Lob. ic. pag. 497. Scordium verum, Gesn. hort. fol. 279. Wasserbathenig/ Lacken-Knoblauch/ Matth. Tab. Lachen-Knoblauch/ Kyber. in Trag. Lon. Waßer-Knoblauch quibusdam. Variat magnitudine: hinc majus & minus. Bicubitale fermè proceritate suâ semel observavi. Acri, amarâ, excalfactoriâ & facultate alliatâ, omnium viscerum, inprimis pectoris & pulmonum, crassos ac viscosos humores extenuat, virulentos detergit & expurgat: tineas necat, menses & urinas ducit, fotu potuve partum accelerat: Vetera ulcera purgat, siccat & cicatrice obducit: Venenis adversatur, ac putredini mirum quantum obsistit. Chirurgi gangrænam formidantes ex lixivio parant fomentum, in quo Scordium decoctum. Post fomentationem cataplasma sæpiusculè imponunt, ex farina lupinorum, pulvere Scordii, oxymelite simplici, & modico lixivio. Auff der Wiese am Fluß zu Bladau.

DCLI. Scorzonera foliis nervosis, C. B. Pin. p. 275. Scorsonera altera Lob. ic. pag. 551. Scorzonera Germanica angustifolia, Tab. lib. 2. fol. 299. Klein deutsch Scorsonera, Tab. Schlangenmordt und Natter-Milch quibusdam. Beym Penartschen Waldt. In monte Apollinis hinter Quednau. Item bey Gerdauen in pratis nach dem alten Hofe und Drusen zu. Floret mense Majo.

DCLII. *Scrophularia aqvatica major caule fimbriato. Groß Wasser-Braunwurtz. Fœmellis Creutz-Nessel. Radix quadrangula, fimbriata, nodosa, cubitalis, semiunciam crassa, atrovirens, concava, fibris longissimis copiosissimis

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0415-8
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0416-4
DFG

ſiſſimis candidis & villoſis inſtructa, caulem congeneris naturæ ſpargit anguloſum, tricubitalem, fimbriatum, geniculatum, cavum, viridem, ad genicula brachiatum. Adſtant autem ſingulis nodis ex adversùm bini cauliculi, qui circa nodos ſubinde alios excludunt ramos, & hi rursùm teneriores, omnes quadratos & fimbriatos. Folia ex viridi nigricant, & ſerrata ſunt: flores in caulium ſummo purpuraſcunt, & tandem in acuminata vaſcula, ſemen minutulum continentia, abeuntes. Guſtu adſtringens & ſubamara eſt, ac minùs fœtet. Vulneribus ulceribusque medetur ſordidis. Bey der Hollen-Grund in foſſis. Vetulæ in tineis ſeu lumbricis latis excludendis eam mirè extollunt. Carrichterus phagedænam ſeu ulcus depaſcens ſuſtuliſſe gloriatur his: Erat Hagenoæ æger, Gabriel Heckher nomine, cui lupus (ita vocat affectum) ſpatio XXVII. annorum ſiniſtrum oculum, naſum dimidium, os, ac conterminas oris & maxillæ partes depaſcendo abſtulerat, huic (1.) ſcrophulariæ radices cottidiè potui addidit ordinario. (2.) omnibus eduliis pulverem radicis foliorumque lappæ minoris admiſcuit, totamque herbam elixis incoqui juſſit. (3.) pulvere cardui benedicti ac foliorum ſenæ, additis corrigentibus, ægrum aliquoties purgavit, (4.) loca exulcerata & ſordida aquæ ſcophulariæ, cardui benedicti, ac menthæ aquaticæ anaticâ miſcellâ manè & veſperi abluit. (5.) oleum corticum betulæ, geminas inter ollas exuſtum, ac tantundem aquæ cardui benedicti, cum melle decoctæ, ac deſpumatæ, linteis excepit, iisdemq; hiulca & comeſa opplevit loca. (6.) pulverem herbæ Antonianæ (Feder-Kraut dictam plantam exaudit,) ulceribus ultimò inſperſit, ſanationem θεόθεν qualem qualem aſſecutus. Scrophulariæ radicis tubera aliquot imparia, Lunâ de-

cre-

crescente effossa, filo collecta, ac statim collo suspensa, nodos inveteratos, strumas, & omnis generis tumores discutiunt, præsertim si manè & vesperi semidrachma pulveris ingeratur, & radix potui immittatur.

DCLIII. Scrophularia nodosa fœtida, C. B. Pin. pag. 235. Scrophularia, Bauh. Matth. fol. 791. Dod. Lateinisch/ fol. 50. Ocimastrum alterum, Trag. Kyber. in Trag. pag. 184. Scrophularia major, Brunf. Lateinisch tom. 1. f. 215. Lob. ic. p. 533. Lon. deutsch f. 164. Tab. lib. 2. f. 244. Cam. hort. p. 157. Scrofularia major Cæs. lib. 8. c. 49. p. 349. Scrofularia major prima, & Clymenum mas, Gesn. hort. fol. 280. & 254. Galeopsis, Fuchs. fol. 194. Braunwurtz/ Tab. Fuchs. Lon. Kyb. in Trag. Sauwurtz / Brunf. Feigwartzen-Kraut vulgò. Amara est, siccat, tenuat, abstergit, digerit, ac partium tenuitate carcinomata, strumas, parotidas, panos, & consimiles durities disjicit, ac nomis medetur. Succus ex toto expressus & cum cerâ & olivo mistus, singularis est in auferendâ scabie, Trag. In cœco hæmorrhoidum dolore nihil efficacius Scrophulariâ, sive ipsa plantæ substantia sicca aut viridis, sive decoctum ejus assumatur. Henr. ab Heer. in Observ. Med. obs. 20. Semen lumbricos enecat Drachm. 1. pondere sumptum, Trag. & Tab. In der Hollen Grund passim. Radix scrophulariæ colligenda, Sole 1. ♋ inhabitante. Bubonibus pestilentibus imposita radix contusa certo experimento venenum evocat. Caules legantur, Sole ultimum gradum ♉: folia verò 1. ♉. inhabitante.

DCLIV. Securidaca dumetorum minor pallidè cærulea, C. B. Pin. pag. 349. Securidacæ secundæ altera species, Clus. hist. lib. 6. fol. 237. Clus. Pann. pag. 749. Siliquæ fusci coloris putatoriam falcem formâ exprimunt, & unicum

semen

ſemen ejusdem figuræ continent. Flos ex purpureo albeſcens eſt in noſtrate. Bey Holland in incultis copioſiſſimè.

DCLV. Sedum majus vulgare, C. B. pin. pag. 283. Sedum majus, Fuchſ. fol. 32. Cord. in Dioſc. fol. 68. Tab. lib. 2. fol. 512. Sempervivum majus, Bauh. Matth. fol. 785. Sempervivum primum, Lon. deutſch fol. 92. Sedum vulgare, Eyſtett.. Sedum, Trag. Sebitz. in Trag, deutſch. fol. 298. Sempervivum majus alterum, ſive Jovis barba, Dod. Lateiniſch/ fol. 127. Aizoon, ſive Sempervivum majus, Cam. hort. pag. 7. Sedum ſeu ſempervivum vulgare majus, Geſn. hort. fol. 280. Cotyledon altera prima. Sedum vulgare Clus. hiſt. lib. 5. fol. 63. Sempervivum majus ſive Sedum majus crenatum Myrthifolium, Lob. ic. pag. 373. Groſſe Haußwurtz/ Fuchſ. Matth. Lon. Haußwurtz/ Tab. Groß Haußwurtz/ Groß Donner-Kraut/ Groß Immer-Grün/ Hauß-Lauch/ Cord. in Dioſc. Mauer-Pfeffer/ vulgò. Refrigerat, humectat & leniter adſtringit. Zu Mühlhauſen; Item zu Holland im Oberlande in muris antiquis.

DCLVI. Sempervivum minus vermiculatum acre, C. B. Pin. pag. 283. Sempervivum minimum, Lob. ic. pag. 379. Bauh. in Matth. fol. 785. Portulaca tertia, Brunf. Lateiniſch, tom. 3. fol. 102. Illecebra ſive ſempervivum tertium, Dod. Lateiniſch fol. 129. Sedum minus tertium & vermicularis, Trag. Sebitz. in Trag. deutſch f. 301. Sedum minimum, Tab. lib. 2. fol. 514. Sedum minus, ſeu minimum cauſticum, Eyſtett. Sedum tertium Dioſcoridis, Geſn. hort. fol. 280. Sedi tertium genus, Fuchſ. fol. 36. Sedum minimum, Illecebra, Sedi tertium genus non ſemper virens, Adv. Lob. fol. 162. Sempervivum tertium minimum alterum, Cæſ. lib. 15. cap. 22. pag. 578. Sempervivum ſecundum

Lon. deutsch fol. 92. Sedum minus octavum causticum, Clus. hist. lib. 4. fol. 61. Kleineste Katzen-Träublein/ Tab. Kleine Haußwurtz/ Lon. Katzentraubel/ Fuchs. Sebitz. in Trag. Bladloß mulierculis. In arenosis passim, sæpè etiam in subgrundiis & parietibus. Sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. 49. Radix effodiatur Sole 1. ♊ occupante: cauliculi, Sole 15. ♋ habitante: folia, Sole 1. ♈ visitante: flores, Sole 1. ♊ assecuto.

DCLVII. Sempervivum minus vermiculatum acre, cauliculis repentibus. J.L. Radice nititur exili ac fibratâ, modò rubentis, modò albicantis coloris, quæ sub terrâ progrediens nova excludit germina. Cauliculi ejus reptantes, folia præter exigua, teretia & succulenta, fibras obtinent copiosas, quibus terræ leviter affirmantur. Inter reptandum novos constituunt pullulos seu ramulos. Flosculos habet luteolos, pediculis suis insistentes. Hinter Sarckau am See-Gebirge.

DCLVIII Senecio minor vulgaris, C. B. Pin. pag. 131. Senecio vulgaris & prima, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 226 Senecio, Matth. deutsch fol. 494. Cord. in Diosc. fol. 69. Fuchs. fol. 286. Gesn. hort. fol. 280. Lon. deutsch/ fol. 128. Verbena fœmina, Brunf. Lat. Tom. I. 120. Senecio seu Erygeron Lob. ic. pag. 225. Senecio prima, Tab. lib. 1. fol. 572. Creutzwurtz/ Matth. Tab. Seb. in Trag. Lon. Fuchs. Eysen-Kraut/ Creutz-Kraut/ Eysen Kraut-Weiblein/ Brunf. Grind-Kraut/ Creutz-Kraut/ Baldgreise quibusdam. Passim obvia, præsertim in ruderibus circa macerias. Herba tusa, & inflammatis mammis imposita, experimentum est. Oculo ab apis ictû læso, ac in tuber assurgenti, mirè profuisse senecionem, memini in quodam subjectô.

Ser-

DCLIX. Serpillum vulgare majus. C. B. Pin. p. 220. Serpillum album primum & ſecundum, Tab. lib. 2. f. 77. & 78. Serpillum majus flore purpureo, Cam. hort. pag. 159. Weiſſer Qvendel / Tab. Künlein / Hüner-Kohl quibusdam. Feld-Kümmel Noſtratibus. Flore eſt albo, eſt & purpureo. In montoſis paſſim. Serpilli radix legenda, Sole 15. ♌ inhabitante: cauliculi Sole in ♈ exiſtente: flores Sole in ♋.

DCLX. Serpillum vulgare minus, C. B. Pin. pag. 220. Serpyllum, Trag. Sebitz. in Trag. deutſch fol. 31. Fuchſ. fol. 251. Lon. deutſch fol. 149 Geſn. hort. fol. 280. Cæſ. l. 11. cap. 54. pag. 465. Adv. Lob. fol. 180. Serpyllum ſylveſtre, ſive alterum, Bauh. Matth. fol. 533. Serpillum ſylveſtre Cord. in Dioſc. fol. 53. Serpillum minus flore albo & purpureo, Tab. lib. 2. fol. 78. Kleiner Qvendel mit weißen und braunen Blumen / Tab. Qvendel / Fuchſ. Lon. In aſperis & ſecùs vias ſæpiſſimè reperitur.

DCLXI. Serpillum minimum repens flore candido Gantz kleiner kriechender Qvendel mit weißer Blüth. Hinter dem Spittel-Hofe am Wege nach der Fiſchhäuſiſchen Heyde zu.

DCLXII. Serratula, Bauh. Matth. fol. 672. Lob. ic. pag. 534. Dod. Lateiniſch. fol. 42. Cam. hort. pag. 158. Serratula Matthioli, Cluſ. hiſt. Centauroidis, aut Centaurii majoris ſylveſtris Germanici prima ſpecies, Thal. pag. 26. Serratula tinctoris, Eyſtett. Serratula tinctoria prima, Tab. ic. pag. 156. Cerretta, ſive Serretta prima, Cæſ. lib. 13. cap. 53. pag. 539. Ferberſcharten / Matth. Scharten-Kraut das erſte / Tab. Beym Penartiſchen Walde.

DCLXIII. Seſeli Æthiopicum, Matth. deutſch / fol. 309. b. Lon. deutſch / fol. 259. Seſeli Æthiopicum & Libanotis alba,

Gesn. hort. f. 264. & 281. Seseli Æthiopicum Matthioli, Clus. hist. lib. 6. fol. 194. Clus. Pann. pag. 693. Seseli Æthiopicum herba, Dod. Lateinisch fol. 312. Dauci alterum genus, Fuchs. fol. 232. Libanotis Theophrasti, Lob. ic. pag. 704. Libanotis Theophrasti alba, sive secunda, Tab. lib. 1. fol. 387. Libanotis latifolia altera sive vulgatior, C. B. Pin. pag. 157. Libanotis Theophrasti altera. Thal. pag. 71. Weiße Hirsch-Wurtz/ Tab. Fuchs. Æthiopischer Sesel. Matth. Radix crasso est cortice, sapore initiò dulci, deinde amaricante, supremo capite hirsuta: Foliorum alæ qvina maximam partem habent folia, per ambitum serrata, supernè atrovirentia, infernè subcinerei quodammodo coloris. Flosculos habet caulis in umbellis candidos, qui in oblongum, nigricans & angulosum abeunt semen, Cuminum aut Sileris montani semen odore & sapore referens. Calfacit, siccat & abstergit. Radix alexipharmaca est, hinc jumentis, ovibus, porcis, pestilitate, vel aliô morbô correptis præsenti auxilio est. Folia pecoribus & nutriculis data, lac uberiùs pollicentur. Semen calculos atterit, & lotium citat. Ulcera consolidat radix cum melle rosato admota, Tab. In der Osterodischen Heyde hinter dem Schilling/ lacus est duorum milliarium.

DCLXIV. Sideritis vulgaris hirsuta erecta, C. B. Pin. pag. 233. Sideritis prima, Fuchs. fol. 769. Cord. in Diosc. fol. 63. Thal. pag. 103. Gesn. hort. fol. 281. Clus. hist. lib. 4. fol. 39. Sideritis Heraclea, sive prima, Tab. lib. 1. fol. 457. Sideritis, sive ferruminatrix, Adv. Lob. fol. 223. Sideritis quarta, Lon. deutsch fol. 115. Auffstehend Glied-Kraut mit rauchen gekärbeten Blättern. Glied-Kraut/ Fuchs. Glied-Kraut/ Zeiß-Kraut/ Lon. Flores summum caulem verticillatim ambientes in spicam desinunt, galeati aliquantulum,

tulum, albidi, hiatum, ſive rictum ſangvineis notis conſperſum habentes. Crenas habent folia, quas in ſuâ abeſſe tradit Lonic. Abſtergentis, adſtringentis, & frigidæ eſt virtutis. Vulnera ſangvinem fundentia firmat, & conglutinat, Cam. Lon. Bey Holland in incultis.

DCLXV. Sideritis arvenſis latifolia glabra, C. B. Pin. pag. 233. Sideritis ſecunda, Bauh. Matth. fol. 711. Alyſſum majus, Tab. lib. 2. fol. 243. Sideritis Herculea altera Cæſ. lib. 11. c. 35. fol. 451. & 452. Sideritis primæ arvenſis ſpecies altera, Thal. pag. 105. Sideritis arvenſis flore pallido, Cam. hort. pag. 161. Wilde Meliß Fæmellis. Floſculis provenit albis. In ſabuloſis hinter dem Kneiphöfiſchen Walle.

DCLXVI. Sideritis arvenſis anguſtifolia rubra, C. B. Pin. pag. 233. Alyſſum Galeni flore purpureo, Tab. lib. 2. fol. 242. Sideritis arvenſis flore rubro, Cam. hort. fol. 161. Sideritidi primæ congener ſecunda, Thal. pag. 104. Bey Lauten-Mühl ad agrorum margines. Item bey S. Albrecht in ſabuletis.

DCLXVII. Sion, ſive Apium paluſtre foliis oblongis, C. B. Pin. pag. 154. Sium verum, Bauh. Matth. fol. 377. Sion odoratum, Trag. Kyber. in Trag. pag. 465. Apium paluſtre, Fuchſ. fol. 270. Lon. deutſch fol. 264. Sium Cord. in Dioſc. fol. 44. Geſn. hort. fol. 281. Dod. Lateiniſch fol. 589. Eleoſelinum, Apium paluſtre, Fuchſ. icon. pag. 136. Sium primum minus, Tab. lib. 1. fol. 248. Sium ſive Laver Dioſcoridis oluſatri folio, ſive Paſtinaca aquatica, Lob. ic. pag. 208. Waßer-Epff/ Waßermerck/ oder Bauren-Epff/ Lon. Brunnen-Peterlein/ Kyber. in Trag. Waſſer-Peterlein das erſte/ Tab. Waßer-Eppich/ Fuchſ. Froſch-

Eppich quibusdam. Calfacit & ſiccat, digerit, infarctus renum expedit, calculos frangit, urinas menſesque citat. Odoratum eſt, ac guſtu amarum. Radix hujus Sii folia ſæpè tria facie diverſiſſimâ excludit, quorum unum oblongum & in ambitu crenatum, Sio naturale, alterum profundiùs inciſum & crenatum, tertium profundiſſimè ac tenerrimè diſſectum, Phellandrii ferè modo. Voco illud * Sion, ſive Apium paluſtre foliis variis. Im Land-Graben hinter Sellnicken menſe Majo.

DCLXVIII. Solanifolia Circæa dicta major, C. B. Pin. pag. 168. Circæa Lutetiana, Lob. ic. pag. 266. Lappa ſylveſtris Trag. Kyber. in Trag. pag. 843. Circæa, Eyſtett. Helxine ſylveſtris ſive fluviatilis, Thal. p. 56. Herba D. Stephani, Tab. Icon. pag: 730. Ocimaſtrum verrucarium, Geſn. hort. fol. 269. S. Steffens-Kraut/ Tab. Bey Schwanis in uliginoſis. Item in der Gauſit hinter Kuntzen.

DCLXIX. Solanum Officinarum C. B. Pin. pag. 166. Solanum Brunf. Lateiniſch tom. 2. pag. 29. Lon. deutſch fol. 107. Solatrum vulgare, Trag. Kyber. in Trag. fol. 303. Solatrum minus, Cæſ. lib. 5. cap. 18. pag. 212. Solanum quod edendo eſt, Cord. in Dioſc. fol. 67. Solanum nigrum Cord. hiſt. fol. 158. Solanum hortenſe, Matth. deutſch fol. 462. Dod. Lateiniſch fol. 454. Geſn. hort. fol. 281. Fuchſ. fol. 686. Cam. hort. pag. 162. Solanum ſativum, Tab. lib. 2. fol. 281. Solanum hortenſe, Circææ aut Phaſeoli folio, Lob. ic. fol. 262. Nachtſchatten/ Tab. Matth. Fuchſ. Kyber. in Trag. Nachtſchatt/ oder Säu-Kraut/ Lon. Ad ſepes hortorum paſſim.

DCLXX. Solanum ſcandens, ſeu Dulcamara, C. B. Pin.

Sion sive Apium palustre foliis variis.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0425-4
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0426-0
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0427-6
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0428-1
DFG

Pin. pag. 167. Dulcamara, Dod. Lateinisch fol. 402. Dulcis amara, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 644. Amara dulcis, Tab. lib. 2. fol. 580. Lon. deutsch fol. 237. Solanum γλυκύπικρον, Thal. pag. 106. Dulcis amara flore cœruleo vulgatior, Eystett. Vitis sylvestris, Bauh. Matth. fol. 881. Vitis sylvestris Matthioli, Cam. hort. pag. 128. Amara dulcis & solanum fruticosum Gesn. hort. fol. 246. & 282. Amara dulcis, Circæa, Lob. ic. pag. 269: Circæa Monspeliensium, Observ. Lob. fol. 136. Salicastrum Plinii, Cæs. lib. 5. cap. 10. pag. 207. Je länger je lieber Lon. Sebitz. in Trag. Hinsch-Kraut Tab. Alffranck Nostratibus. Juxta fluenta im alten Hammer.

DCLXXI. Solanum quadrifolium bacciferum, C.B. Pin. pag. 167. Herba paris, Matth. deutsch/ fol. 471. Dod. Lateinisch fol. 444. Cæs. lib. 15. cap. 13. pag. 573. Eystett. Herba Paris, Uva lupina, Solanum τετράφυλλον, Thal. p. 57. Aconitum salutiferum, Tab. lib. 2. fol. 391. Solanum tetraphyllum, sive Herba Paris, Lob. ic. pag. 267. Ἀστὴρ, sed non Atticus, Trag. Kyber. in Trag. pag. 308. Aconitum Pardalianches, Fuchs. fol. 87. Aconitum monococcum, Cord. in Dioſc. fol. 67. Cord. hist. fol. 152. Paris herba, Lon. deutsch fol. 180. Cam. hort. pag. 118. Solanum tetraphyllum, Gesn. hort. fol. 282. Einbeer/ Tab. Matth. Wolffs-Beer oder Stern-Kraut/ Kyber. in Trag. Dollwurtz/ Fuchs. Foliis quandoque quinque vel sex apud nos provenit. Bey Lauten-Mühl. Item im Penartischen Walde in umbrosis.

DCLXXII. *Sonchus asper laciniatus latifolius. Säw-Diestel mit breiten zerschnittenen Blättern. Planta est bicubitalis, & altiùs assurgens, è radice lignosâ, flavescente, fibris instructa suis, thyrsum promens striatum, concavum,

vum, lævem, ad latera, & in summitate ramulosum, floscu-
lis ornatum luteis, quibus vanescentibus succedit candidissi-
ma lanugo, semini minuto, anguloso & subnigro innitens.
Caulem alternatim ambiunt folia atrovirentia, supinè palli-
da, aspera, proximè terram, & in caule ampla, & insigniter
laciniata, in ramusculis laciniis ferè destituta, & oblonga.
Inter segetes. Bey den Huben.

DCLXXIII. *Sonchus asper laciniatus angustifolius.
Säu-Diestel mit schmallen zerschnittenen Blättern. Foliis
duntaxat a priore differt, quæ in hoc angustiora, viridia, a-
versâ parte exalbida, & elegantiùs incisa spectantur. Unter
dem Getreid nach Laffsken.

DCLXXIV. Sonchus asper, Tab. lib. 1. fol. 615. Lon.
deutsch fol. 124. Gesn. hort. fol. 282. Sonchus aspera, Bauh.
Matth. fol. 384. Fuchs. fol. 674. Sonchus aspera vulgi, flo-
re Hieracii, foliis Dentis leonis, aliàs Dipsaci & lactucæ, Lob.
ic. pag. 234. Sonchus asper minor, Cord. hist. fol. 157. Son-
chus, Cord. in Diosc. fol. 45. Sonchus lævis tenerior lati-
folia, Lob. observ. fol. 118. Sonchus asper laciniatus & non
laciniatus, C. B. Pin. pag. 124. Sau-Diestel/ Tab. Gänß-
Diestel/ Dudistel/ Lon. Säumelcken Hasen-Kohl/ Cord.
in Diosc. Solum sqvalidius Soncho huic folia concedit la-
ciniosa Dentis Leonis: lætius verò non laciniata, Dipsaci
aut lactucæ. Sapor ei amarus, aqveâ dulcedine temperatus:
Semen dulce odore papaveris. Refrigerat & modicè ad-
stringit. Diosc. Inter segetes.

DCLXXV. *Sonchus lævis lanceatus acutifolius.
Sonchen-Kraut mit spitzen absätzigten Blättern. Radix
numerosis & crassis fibris, foris subflavis, intùs candidis, gu-
stû amaris, caulem effert tricubitalem, & proceriùs sæpè sur-
gentem, rotundum, striatum, concavum, maximam partem
lævem

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0431-7
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0432-2
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0433-8
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0434-4
DFG

folia viridia, ſupinè pallidula, ſpithamæ longitudine, unciam lata, alternatim aſſiſtunt, proximè terram magis lanceata. His quæ ſuccedunt, & lanceata, & ſemilanceata, & integra ſunt, in acumen abeuntia. Caulis in ſummitate ramoſus nonnihil, floſculos edit luteos in candidos pappos ætatis tractu mutatos. Zu Brandenburg am Friſching. Item hinter Fiſchhauſen nach dem Haſe zu. Foliis in ambitu exigua eſt aſperitas.

DCLXXVI. Sonchus lævis minor paucioribus laciniis, C B. Pin. pag. 124. Sonchus lævis latifolius, ſive tertius, Tab. lib. 1. fol. 616. Haſen-Kohl/ Tab. Breiter Haſen-Kohl.

DCLXXVII. Sonchus lævis laciniatus latifolius, C. B. Pin. pag. 124. Sonchus lævis, Bauh. Matth. fol. 385. Dod. Lateiniſch fol. 643. Sonchus non aſpera, Fuchſ. fol. 675. Sonchus lævis vulgaris foliis lacinioſis Dentis leonis, Lob. ic. 235. Intybus ſylveſtris, ſeu erratica tertia, Trag. Sebitz. in Trag. deutſch fol. 215. Sonchus lenis ſeu lævis, Cord. hiſt. fol. 157. Sonchus lævis alter flore luteo. Tab. lib. 1. fol. 616. Haſen-Kohl/ Tab. Haaſen-Keel/ Fuchſ. Cum leni adſtrictione refrigerat. Inter ſegetes paſſim.

DCLXXVIII. Sonchus lævis laciniatus muralis parvis floribus. C. B. Pin. pag. 124. Sonchus lævis altera. Bauh. Matth. fol. 385. Sonchus alter folio profundis laciniis ſinuato hederaceo, Lob. ic. 236. Sonchus ſylvaticus quartus, Tab. lib. 1. fol. 618. Wild Sonchen-Kraut das Vierdte/ Tab. Im Penartiſchen Walde/ in umbroſis.

DCLXXIX. Soncho affinis Lampſana ſylvatica, C. B. Pin. pag. 125. Sonchus ſylvaticus ſecundus, Tab. lib. 1.

fol. 617. Wild Sonchen-Kraut das andere/ Tab. Im Penartischen Walde.

DCLXXX. Sorbus sylvestris foliis domesticæ similis, C. B. Pin. pag. 415. Sorbus sylvestris, Matth. deutsch/ fol. 101. Tab. lib. 2. fol. 721. Sorbi quintum genus aucuparium, Cord. in Diosc. fol. 25. Sorbus aucuparia, Clus. hist. lib. 1. fol. 9. Clus. Pann. pag. 8. Thal. pag. 107. Ornus, Dod. Lateinisch/ fol. 834. Ruell. fol. 212. Fraxinea arbor Großer Mäl-Baum/ Trag. Kyber. in Trag.. 1009. Sorbus sylvestris Alpina, Lob. ic. pag. 107. o. Wilde Speer-Birn/ Tab. Wilder Speerwer-Baum/ Matth. Qvitschel-Beer Cord. in Diosc. Qvitschen Prutenis. Fructus ejus Græcis ὄα vel ὄα adstringunt. Sorba sumus molles nimium durantia ventres, ait Mart. Rusticis apud nos usui sunt in calculo expellendo. Eorum septem & plura sæpè ingerunt cum euphoria. Novi quendam triduum ischuriâ laborantem, qui viginti sorbis absumptis, & lotium copiosè reddidit, & lapillos unà ejecit plusculos. In sylvis passim.

DCLXXXI. Sparganium ramosum, C. B. Pin. p. 15. Tab. ic. p. 246. Sparganium, Bauh. Matth. f. 702. Cord. in Diosc. fol. 63. Cæs. lib. 4. cap. 67. pag. 193. Eystett. Cam. hort. pag. 163. Sparganion, Trag. Kyber. in Trag. pag. 677. Gesn. catalog. pag. 118. Plantaria, sive Butomon. Dod. Lateinisch/ fol. 601. Plantanaria Dodonæi, Thal. pag. 91. Sparganium & Butomos Theophrasti, Lob. ic. pag. 80. Butomum, Ruell. fol. 442. Schwertel-Ried/ Igels-Knospen. Tab. ic. Groß-Ried/ Matth. Degen-Kraut/ Cord. in Diosc. Ein Kraut gleicht sich dem kleinen Schwertel / Gesn. Catalog. Desiccantis est facultatis, Gal. 8. simpl. Radix alexi-

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0437-1
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0438-7
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0439-5
DFG

Nō. 81. pag. 261.

Spergula perpusilla lanceatis foliolis.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0440-7
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0441-2
DFG

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0442-8
DFG

alexiteria est, ac tumores discutit. In fossis stagnantibus passim.

DCLXXXII. *Spergula bifolia lini capitulis. Joh. Lœs. Zweyblättrige Spergel mit kleinen Flachs-Köpflein. E radice simplici, subalbicante, & nonnihil fibratâ cauliculi exoriuntur modò una, modò plures, spithamæ longitudine, in summitate maximam partem ramosi, quorum geniculis bina foliola brevia assident. Flosculos fert albidos, in meditullio flavescentes, quibus succedunt vascula orbiculata, minutum semen, idq; flavum & in acutiem vergens, continentia. An caryophyllis hæc annumeranda? Bey Lautē-Mühl inter fruticeta.

DCLXXXIII. *Spergula perpusilla lanceatis foliolis. Joh. Lœs. Gantz kleine Spergel mit Lantzächtigen Blättern. Spergula hæc admodùm exilis radiculis est capillaceis, foliolis à radice tenuiter assurgentibus, quæ paulò pòst grandescunt ac lanceolæ in modum effigiantur; ita ut formam alicujus plantaginellæ angustifoliæ exprimant. Flosculi nivei exiguis nituntur pediculis, ab ipsâ radice exortis, nec altè assurgentibus, quos vanescentes capsulæ excipiunt, semini gestando deservientes. Bey Sarkau zwischen dem Haff und der See in planitie.

DCLXXXIV. *Spina alba tomentosa latifolia sylvestris, C. B. Pin. pag. 382. Spina alba tertia, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 675. Acanthium, Bauh. Matth. fol. 499. Dod. Lateinisch/ fol. 721. Adv. Lob. fol. 365. Spina alba sylvestris, Fuchs. fol. 57. Lon. deutsch/ fol. 102. Acanthium vulgare flore purpureo. Tab. lib. 2. fol. 360. Weg-Diestel mit Purpurfarben Blumen. Est & flore albô, hinc Tab. Fuchs. & Lon. Weiße Weg-Diestel nominatur. Folia densâ lanugine obducuntur, ex quâ collectâ & netâ, vestes bombycinis similes texi possunt, juxta Diosc. Calfacit

& ſiccat cum adſtrictione. Radix & folia decocta Opiſthotonis, & ſangvinem ſputantibus utilia. Bey der alten Pfund-Bude. Item zu Brandenburg am Schloß.

DCLXXXV. Spondylium vulgare hirſutum, C. B. Pin. pag. 157. Sphondylium, Bauh. Matth. fol. 577. Lon. deutſch. fol. 101. Cæſ. lib. 7. c. 54. pag. 312. Sphondylium ſeu Spondylium, Geſn. hort. fol. 282. Sphondylium I. Tab. lib. 1. fol. 348. Branca urſina, Brunf. tom. 3. fol. 149. Trag. Kyber. in Trag. fol. 344. Spondylium, Adv. Lob. fol. 313. Dod. Lateiniſch/ fol. 307. Acanthus Germanica, Fuchſ. fol. 53. Beeren-Klaw/Tab. Brunf. deutſche Beeren-Klaw Fuchſ. Lon. Matth. Beerentatz quibusdam. Bartſch Noſtratibus. Radix acrimoniam ferè radicis Angelicæ obtinet. In der Hollen-Grund copiosè. Ex herba hâc quondam in Italiâ ammiſtô oleô & melle paratus clyſter Polono, qui inversô usú clyſterem ebibit, veſicam cum cannâ capiti imponens. Advenit Medicns ſciſcitans clyſteris effectum, reſpondit Polonus, & benè clyſterem à ſe epotum, & alvum egregiè indè ſolutam. Videns Medicus in vertice capitis exſtantem cannam, ac caput ungvinosâ veſicâ cinctum, riſit ſiniſtrum medicaminis uſum, his jocularitèr additis: prodeſſe enema ita uſurpatum Polono, non Italo. Simile quid hic Regiomonti accidit, in Nauclero quodam Hollando, cui à Medico ſuppoſitorium & pillulæ ordinata. Quid fit? Invertit nauta medicaminum uſum, glandem devorans, catapotia ano inferiùs committens. Paulò pòſt inqvirenti Medico, quid effectus egerint præſcripta pharmaca, rettulit æger, dat lange Dingschen ſchmackt mooge/ de klenen Dingschen fullen herut.

DCLXXXVI. Succiſa hirſuta cærulea. Joh. Lœſ. Succiſa ſive morſus Diaboli, Matth. deutſch f. 243. Dod. Lateiniſch f. 124.

124. Succisa, Fuchs. fol. 715. Morsus Diaboli, Trag. Kyber. in Trag. pag. 246. Adv. Lob. fol. 235. Tab. lib. 1. fol. 559. Gesn. hort. fol. 268. Lon. deutsch fol. 180. Cam. hort. pag. 103. Succisa glabra, C. B. Pin. pag. 269. Teuffels Abbiß Matth. Tab. Fuchs. Abbiß / Lon. Anbiß-Kraut und Teuffels-Biß vulgò. Prorsùs glabram non repperi, sed semper hirsutie quâdam instructam, quæ in foliis proximè terram notabilior. Amara est, calida & sicca gradù secundô intensô Antiquis. Incidit, abstergit, discutit, consolidat, grumos sanguinis dissolvit, tineas alvi necat, & sugillata illitu emendat. In epilepsiâ, lue Gallicâ, peste & malignis febribus salutaris. Tumores tonsillarum fauciumq; contumaces omnium efficacissimè sanat decoctum radicis ore detentum, Dod. Minutal herbæ viridis ac radicis impositum, carbunculos sanat pestiferos, præsentaneo remedio, Matth. Tota equis porrigitur pabulo mista, visu imbecilli, aut verme discruciatis, Tab. In pratis passim. Radices quinque morsus Diaboli Lunâ decrescente effossæ, filo collectæ, collo suspensæ, ac quoad ejus facere poteris, gestatæ, oculorum dolores, cæcitatem minitantes, certô tollunt experimento. Diutulè amuletum hoc tolerandum, nam etiamsi initiò parùm prosit, tractu tamen temporis mirificam ejus vim haud dubiè cognosces. Sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. 49. efficax. Folia colligenda Sole 15. ♉ ingresso: Flores, Sole 1. ♊ obsidente.

DCLXXXVII. Succisa hirsuta candida, Joh. Lœs. Morsus Diaboli flore albo, Tab. lib. 1. fol. 559. Teuffels Abbiß mit weißen Blumen / Weißer Abbiß / Tab. Im Walde bey Selnicken.

DCLXXXVIII. Succisa hirsuta cærulea foliis incisis

& laciniatis. Joh. Lœſ. Teuffels Abbiß mit tieff zerſchnittenen Blättern. Bey Sellnicken.

DCLXXXIX. Symphytum conſolida major, C. B. Pin. pag. 259. Conſolida major, Trag. Kyber. in Trag. pag. 240. Thal. pag. 28. Cam. hort. pag. 45. Symphytum Alum, ſeu Alus, Lob. ic. pag. 583. Symphytum, Lon. deutſch fol. 178. Symphytum majus, Conſolida major, Matthiol. deutſch fol. 400. Symphytum alterum, Cord. in Dioſc. fol. 62. Symphytum majus flore purpureô & albô, Tab. lib. 2. fol. 261. Symphytum majus flore purpureo, rubrô & pallidô. Eyſtett. Conſolida vulgò, Cæſ. lib. 11. cap. 7. pag. 434. Wall-Wurtz/ Kyber. in Trag. Lon. Matth. Weiß und braun Wallwurtz/ Beinwelle/ Schmeer-Wurtz/ Schwartz-Wurtz/ Lotwurtz/ Cord. in Dioſc. Inter fluminum ripas paſſim. Radix conſolidæ majoris cum συμβάλλον μέρος conferat ungvento hopliatrico, cujus autor Anshelmus, Italus Parmenſis, qui pòſt ſanctus appellatus, operæ pretium eſſe duxi, ejus & confectionem, & verum addere uſum: R. radic. conſolid. maj. ſantal. rubri ana Unc. 2. lapid. hæmatit. Unc. 2. uſneæ cranii hominis ſtrangul. drachm. 3. pulv. lumbricor. terreſtr. Unc. ſemiſſ. axung. urſi maſculi, apri, porci ana libr. ſemiſ. Ex his in pollinem actis, & axungiis commiſſis, pauxillo vini interdato, fiat l. a. ungventum. Uſus: in cæſuris oblidens ferrum (eô deficiente, terſo ligneolo vulnus refricetur, cruentetur ac deligetur:) verpo inungat aliptes, à dorſo aciem versùs progrediens: in puncturis, à capulo mucronem versùs. Ungvinoſum poſt ferrum, linteo involvendum, ac cottidiè deligandum, nec ferventiis, nec frigoribus committendum, ne querqverum quid ægro attrahas. Interea temporis æger linteamine, aquâ limpidâ madido, deor-

deorsum vulnus diligenter abstergat, eluat, & victûs exactam habeat rationem. Vulnerati morituri τεκμήριον perhibent tale: Telo blanditer ad ignem incalescenti, pauxillum miscellæ santali rubri, ac hæmatitæ lapidis insperſum, maculas in ferro si excitat sangvineas, ægro exitium promittit. Aliàs vulnera non lethalia, seu cæsim seu punctim inflicta, sanantur, sauciante telo in pingvedinem anserum, vel lardum porcinum misso. Consolidæ majoris succosa radix contusa, linteo inducta, & partibus affirmata cruciatus podagricos certo tollit præsidio. Flores consolidæ majoris colligendi, Sole 15. ♌ obsidente: semen, Sole 1. ♎ inhabitante.

DCXC. Symphytum maculosum, sive Pulmonaria latifolia. C.B. Pin. 259. Pulmonaria Plinii, Gesn. hort. fol. 274. Pulmonaria altera, Bauh. Matth. fol. 733. Symphytum maculosum, Dod. Lateinisch fol. 135. Pulmonaria maculosa Lob. ic. pag. 586. Cam. hort. pag. 133. Eystett. Pulmonaria folio non maculoso, Clus. hist. lib. 5. fol. 169. Lungen-Kraut das ander/ Matth. Hirsch-Mangolt quibusdam. Im Penartischen Walde primo vere.

DCXCI. Tanacetum vulgare luteum. C.B. Pin. p. 132. Tanacetum. Matth. deutsch/ fol. 378. Dod. Lateinisch/ fol. 36. Gesn. hort. fol. 283. Cæs. lib. 12. cap. 8. pag. 479. Lon. deutsch/ fol. 187. Trag. Kyber. in Trag. pag. 158. Artemisia Dioscoridis, Tab. lib. 1. fol. 34. Tanacetum vulgare Eystett. Tanacetum citrinum, Thal. pag. 125. Tanacetum millefolii foliis, Lob. ic. pag. 749. Artemisia monoclonos, Fuchs. fol. 46. Reinfarn/ Matth. Tab. Lon. Fuchs. Kyber. in Trag. Wurm-Kraut vulgò. Calefacit, siccat, maturat, & abstergit. In ulceribus antiquis celebratur

bratur à Tab. Helminthagogon quoque est, hydroticum ac diureticum. In der Hollen-Grund. Item bey Schwanis secùs agrorum margines copiosè.

DCXCII. Tanacetum foliis crispis, C. B. Pin. p. 132. Tanacetum cristatum Anglicum. Lob. ic. 749. Krause gelbe Reinfahren/ bey Laptau.

DCXCIII. Taxus, Matth. deutsch/ fol. 474. Dod. Lateinisch fol. 859. Gesn. hort. fol. 283. Lon. deutsch/ fol. 39. Cam. hort. pag. 166. Thal. pag. 122. Cæs. lib. 3. cap. 54. p. 134. Taxus, Milos Theophrasti, Lob. ic. pag. 232. o. Eiben-Baum/ Matth. Lon. Bogen-Holtz quibusdam. In cœmeterio pagi Truntz provenerat olim, quam eradicatam in hortum transtulit quidam. Arbuscula hæc facilè crescit transplantata, duratque ultra seculum. Baccas ejus in Angliâ à pueris innoxiè esitari, refert Pena. Rustici taxi lignum lacte decoctum, ejusque scobem, utilissimè porrigunt canibus rabidis, quibus in juventute sæpiusculè vermiculi sub lingvâ nascuntur, quæ lyssæ vel littæ. Scobs ligni experimentô vulgi contra morsum canis rabidi ingeritur. Folia taxi Rorismarini loco in coronamenta sumuntur à fœmellis, quæ auro incrustant, vel argento, serta & servias apparantes. Im Scapen bey der großen Glaßhütt/ hinter Latten-Walde in umbrosis. Dießeits Wulffsdorff. Bey Laukischken. Item: Bey Sylen im Ragnitschen/ & alibi.

DCXCIV. Telephium vulgare. C. B. Pin. pag. 287. Telephium primum. Tab. lib. 2. fol. 515. Telephium & Anacampseros, Gesn. hort. fol. 274. & 283. Telephium, Cam. hort. pag. 167. Crassula major: Cæs. lib. 15. cap. 26. p. 579. Thal. pag. 33. Scrophularia media vel tertia, Brunf. Lateinisch/ tom. 1. fol. 215. Faba inversa, sive Crassula, Lob. ic.

pag.

pag. 389. Acetabulum alterum. Cord. in Dioſc. fol. 69. Telephium album, Fuchſ. fol. 800. Cotyledon alterum Dioſcoridis, Cymbalaria, Column. in Phytobaſ. min. cogn. ſtirp. & rar. Part. 1. pag. 307. Telephium vulgare, ſive ſecundum, Cluſ. hiſt. lib. 4. f. 66. Telephium alterum, ſive craſſula, Dod. Lateiniſch fol. 130. Wund-Kraut/ Tab. Knaben-Kraut / S. Johanns-Kraut/ Fotzwanck/ Gauchheil/ Fotzwein / Brunf. Wund-Kraut Weiblein/ Fuchſ. Fette Henne / Donner-Bonen / Cord. in Dioſc. Bruch-Wurtzel quibusdam. Wolffs-Bohnen Noſtratibus. Die pro feſto D. Johannis vulgus Telephium trabibus hypocauſti ſubmittit, ex marcidâ plantâ hujus vel illius obitum ſuperſtitiosè hariolans. In der Hollen-Grund. Item inter ſegetes paſſim.

DCXCV. Thalictrum majus ſiliquâ angulosâ aut ſtriatâ. C. B. Pin. pag. 336. Ruta pratenſis, Geſn. hort. fol. 286. Ruta pratenſis Herbariorum, Adv. Lob. fol. 391. Thalictrum nigrum, Cord. hiſt. fol. 97. Thalictrum nigrum Cordi, Thal. pag. 121. Thalictrum, Cord. in Dioſc. fol. 69. Thalictrum ſecundum, ſive Germanicum, latifolium, Cam. hort. pag. 167. Thalietrum magnum, Dod. Lateiniſch/ fol. 58. Ruta ſylveſtris prima, Cæſ. lib. 9. cap. 2. pag. 371. Heyl-Blatt/ Cord. in Dioſc. In monte Apollinis hinter Qvednau; Item bey Neuhauſen am Thier-Garten. Θαλίητρον vel (η in κ ex errore mutato) Θάλικτρον, modicè calefacit, citra morſum exſiccat, & vetera ulcera cicatrice obducit.

DCXCVI. Thalictrum pratenſe anguſtifolium, C. B. Pin. pag. 337. Ruta pratenſis major quinta, Tab. lib. 1. fol. 146. Thalictrum tertium anguſtifolium, Cam. hort. pag. 167. Groſze Wieſen-Raut die fünffte / Tab. Bey Lauten-Mühl. Item bey Holland am Fluß copiosè.

DCXCVII. Thalictrum pratense angustissimo folio, C. B. quod 1. in Prodr. pag. 146. In pratis beym Penartischen Walde passim.

DCXCVIII. Thlaspi arvense siliquis latis, C. B. Pin. pag. 105. Thlaspi secundum, Bauh. Matth. fol. 427. Thlaspi Dioscoridis Drabæ & Chamælinæ folio, Lob. ic. pag. 212. Adv. Lob. fol. 73. Thlaspi latius, Dod. Lateinisch/ fol. 712. Nasturtium quartum, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 65. Thlaspi majus Tab. ic. pag. 458. Bauren-Senff/ Tab. Klein Seckel- oder Täschel-Kraut. Inter segetes passim.

DCXCIX. Thlaspi fruticosum incanum, C. B. Pin. pag. 108. Thlaspi incanum Mechlinense, Lob. ic. pag. 216. Thlaspi Machliniense, Clus. Pann. pag. 470. Thlaspi incanum Machliniense, Clus. hist. lib. 5. fol. 132. In der Hollen-Grund copiosè.

DCC. Tilia fœmina folio majore, C. B. Pin. pag. 426. Tilia fœmina Brunf. Lateinisch/ tom. 3. fol. 238. Fuchs. fol. 862. Tab. lib. 3. fol. 692. Bauh. Matth. fol. 156. Gesn. hort. fol. 284. & 285. Cæs. lib. 2. cap. 10. pag. 41. & 42. Tilia fœmina, Theophrasti, Lob. ic. pag. 188. o. Tilia, Lon. deutsch/ fol. 50. Dod. Lateinisch/ fol. 838. Tilia sativa, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 879. Linden / Lon. Linden-Baum/ Tab. Fuchs. Linde Germanis, ob ligni lenitatem & mollitiem. E tiliæ ligno, cujus materies teredinem non sentit, Auctore Plinio lib. XVI. c. 14. sculpta fuisse simulachra, ex Tertulliano de Idololatriâ constat. Qui de tiliâ, inquit, Martem exsculpsit, quantò citiùs armarium compingit? Succo glutinoso abundat, hinc & longæva est, & in primâ ætate flexuosa. Cortex suppeditat materiam, Bast/ Borussis dictam, ex quâ funes & alia parantur. Cortex & folia siccant,

ſiccant, adſtringunt, glutinant, diſcutiunt, ac repellunt. Flores λεπτομερεῖς ac odorati, caleſaciunt & ſiccant. Cataplaſma ex foliis pedum tumores diſcutit, & ſingulare contra ſpaſmum flatulentum remedium eſt in gravidis. Scobs ligni tiliacei aurum extemplò & in ictu ferè oculi eliquat, ſequentibus miſta: R. nitri puriſſ. Unc. 2. ſulphur. ſcob. lign. tiliac. aa Unc. ſemiſ. M. F. pulv. ſubtiliſſ. Beneficio hujus pulveris, florenum Hungaricum in volâ manus priùs emunitâ, putaminis nucis juglandis interventu, dictum factum liquo, ſtrato ſuperſtrato inſtituto, & carbone accensô. Tilia arbor Boruſſis olim idololatrica erat, ad quam fanum exſtructum, quod unà cum Tilia ſummo in honore fuerat habitum: Ad hanc Tiliam, papalibus tenebris adhuc obrutus Divus Albertus, pedeſter ac diſcalceatus Regiomonto peregrinationem ſemel inſtituerat. Poſt converſus diruto fano, & excisâ arbore, Idololatras ad locum illum cultûs gratiâ devenientes, ſuſpendio affecit. Ornant ſæpè prædia (quæ Varroni à præſtando: rectiùs prædia quaſi proædia, loca ante ædes poſita) tilieto elegantiſſimo Nobiles. In ſylvis copiosè.

DCCI. Tithymalus helioſcopius, C. B. Pin. p. 291. Matth. deutſch/ fol. 528. Dod. Lateiniſch/ fol. 371. Fuchſ. fol. 811. Cord. in Dioſc. fol. 74. Geſn. hort. fol. 284. Lon. deutſch/ fol. 130. Cam. hort. pag. 169. & 170. Tab. lib. 2. fol. 292. Tithymalus helioſcopius Dodonæi, Thal. pag. 127. Tithymalus helioſcopius, ſive ſoliſequius Portulacifolius Lob. ic. pag. 356. Eſula, Brunf. Lateiniſch/ tom. 1. fol. 194. Eſula vulgaris, Trag. Kyber. in Trag. pag. 294. Gemeine Wolffs-Milch/ Kyber. in Trag. Sonnen-wendende Wolffs-Milch/ Matth. Lon. Tab. Fuchſ. Wolffs-Milch/ Brunf. Hunds-Milch/ quibusdam. In fimetis paſſim.

DCCII. Tormentilla ſylveſtris, C. B. Pin. pag. 326. Tormentilla, Matth. deutſch/ fol. 436. Brunf. Lateiniſch/ Tom. 1. fol. 85. Dod. Niederländiſch/ fol. 118. Trag. Kyber. in Trag. pag. 503. Tab. lib. 1. fol. 446. Cord. hiſt. fol. 94. Eyſtett. Lon. deutſch/ fol. 243. Tormentilla, vel Heptaphyllon, Lob. ic. p. 696. Heptaphyllum, Fuchſ. f. 260. Geſn. hort. f. 261. Tormentill/ Matth. Tab. Lon. Fuchſ. Tormentill/ Rothwurtz/ Bluttwurtz Brunf. Hertzwurtz/ Feigwurtz/ roht Guntzel/ roth Heylwurtz/ Schür-Wurtz/ Birckwurtz vulgò. Heydeckern Saxonibus. In umbroſis & muſcoſis paſſim obvia.

DCCIII. *Tragopogon luteum abortivum. Geeler breitſtengelichter Bocks-Bart. Radix ſubſtantiâ prorsùs candidâ, at flaveſcente tunicâ cincta, & villoſa, caulem emiſerat cubitalem, digitum ferè auricularem craſſum, ſed egregiè latum, latitudine ad radicem unciali, in progreſſu ſesquiunciali, cujus ſummo ſinuato, & in ſe reflexo, flos incumbebat grandior, luteus, uncias quatuor latus, foliis virentibus acutis ſtipatus, qui manè pandendo ſe extulit, & à meridie contrahendo ſe abdidit, in pappos tandem ſeneſcendo vaneſcens. Foliis erat numeroſis, oblongis, anguſtis, acuminatis, in caule paſſim indiſcriminatim exortis, & contortulis quandoque, anfractibus crenas quaſi quasdam præſentantibus. Aſſiſtebant adhæc lato illi cauli pulluli thyrſulorum teretes, novellos in faſtigio exituros ſimplices flores, velut in vulgari, promittentes. Floruit Mense Junio, beym Kneiphöfiſchen Walle.

DCCIV. Tragopogon pratenſe luteum majus, C. B. Pin. pag. 274. Tragopogon, ſive Barba hirci, Bauh. Matth. fol. 410. Tragopogon, Fuchſ. fol. 820. Lon. deutſch/ f. 127. Dod. Lateiniſch/ fol. 256. Tragopogon flore luteo, Eyſtett.

Bar.

Tragopogon luteum abortivum.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0453-0
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0454-5
DFG

Barbula hirci, Trag. Kyber. in Trag. pag. 280. Tragopogon luteus communis, Thal. pag. 121. Hirci barba, Cord. in Dioſc. fol. 46. Cord. hiſt. fol. 156. Tragopogon luteum, Lob. ic. p. 550. Tab. lib. 2. f. 297. Barba hirci flore luteo, Cam. hort. p. 27. Gelber Bocks-Bart/ Tab. Lon. Fuchſ. Kyber. in Trag. Bocks-Bart/ Gauch-Brodt/ Matth. Morgenſtern quibusdam. Am Kneiphöfiſchen Wall.

DCCV. Tribulus aquaticus, C. B. Pin. pag. 194. Matth. deutſch/ fol. 408. Dod. Niederländiſch/ 922. Trag. Kyber. in Trag. pag. 841. Lob. ic. pag. 596. Adv. Lob. fol. 258. Cord. in Dioſc. fol. 62. Lon. deutſch / fol. 98. Geſn. hort. fol. 285. Cæſ. lib. 4. cap. 27. pag. 162. Tribulus aquaticus major, Cluſ. Pann. pag. 713. Tribulus lacuſtris, Cord. hiſt. fol. 161. Waßer-Nuß/ Kyber. in Trag. Lon. Waßer-Nuß/ weiher Nuß / See-Nuß / Stachel-Nuß/ Spitz-Nuß/ Dod. Zu Uderwang im Mühlen-Teich; Item zu Domnau im Schloß-Teich. Olim Thraces ad Strymonem habitantes, foliis tribuli equos ſaginabant, ipſi nucleo vivebant, panem facientes prædulcem, & ventrem contrahentem. Effingebant tùm piſtores panem in varias formas. Martialis lib. 14. epigramm. 69. Priapi ſiliginei meminit:

Si vis eſſe ſatur, noſtrum potes eſſe Priapum;
Ipſa licèt rodas ingvina, purus eris.

DCCVI. Trifolium paluſtre, C. B. Pin. p. 327. Cord. hiſt. fol. 96. Dod. Lateiniſch/ fol. 580. Eyſtett. Trifolium fibrinum ſive tertium, Tab. lib. 2. fol. 221. Trifolium paluſtre, ſeu Trifolium Caſtoris, Thal. pag. 125. Limonium, Cord. in Dioſc. fol. 62. Limonium pratenſe, Trag. Kyber. in Trag. pag. 705. Trifolium paludoſum, Lob. ic. pag. 330.

Isopyron & Lotus palustris, Gesn. hort. fol. 263. & 265. Biber-Klee/ Tab. Wiesen-Mangolt/ Kyb. in Trag. In locis uliginosis & palustribus passim bey Königsberg.

DCCVII. Trifolium pratense purpureum, C.B. Pin. pag. 327. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 467. Fuchs. f. 817. Adv. Lob. fol. 380. Trifolium pratense, Matth. Bauhin. in Matth. fol. 609. Dod. Lateinisch/ fol. 565. Lob. ic. pag. 29. o. Tab. lib. 2. fol. 222. Trifolium pratense rubrum, Cam. hort. pag. 171. Trifolium pratense vulgare, flore rubro, Thal. pag. 123. Braun Wiesen-Klee/ Fuchs. Wiesen-Klee/ Tab. Matth. Braun Fleisch-Blume/ vulgò. Siccantis est indolis. Decoctum ejus in fluore muliebri laudatissimum. In pratis passim.

DCCVIII. Trifolium pratense album, C. B. Pin. pag. 327. Fuchs. fol. 818. Adv. Lob. fol. 380. Cam. hort. pag. 171. Trifolium majus primum Clus. hist. Trifolium acutum, Lon. deutsch/ fol. 135. Trifolium pratense alterum, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 467. Bauh. Matth. fol. 609. Trifolium pratense vulgare flore candido, Thal. pag. 123. Weiß Wiesen-Klee/ Fuchs. Spitz-Klee/ Matth. Lon. Refrigerat, siccat, & nonnihil adstringit. Albo muliebri profluvio mirificè confert, Fuchs. Clyster ex decocto hujus & purpurei adjecto melle, intestinorum rosiones & dolores sedat, viscidos lentosque adhærentes intestinis humores educit. Præstantius & conducibilius album creditur purpureo, in pabulatione jumentorum. In pratis editioribus passim.

DCCIX. Trifolium pratense luteum capitulo breviore, C. B. Pin. 328. Trifolium pratense luteum, Fuchs. f. 819. Trifolium luteum primum capitulo breviori, Thal. pag. 124. Trifolium arvense Tab. lib. 2. fol. 222. Feld-

Klee

Klee mit geelen kleinen Köpfichen/ Feld-Klee/ Tab. Geeler Wiesen-Klee/ Fuchs. Tenuium est partium & exsiccat. In pratis aridioribus, & secùs vias passim.

DCCX. Trifolium pratense luteum capitulo lupuli, vel agrarium, C. B. Pin. 328. Lotus campestris, & Melilotus 8. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ 472. Trifolium luteum alterum lupulinum, vulgò lupulus sylvaticus, Thal. pag. 124. Trifolium agrarium, Dod. Lateinisch/ fol. 576. Katzen-Klee oder Hasen-Pfötlein/ Sebitz. in Trag. Wilder Hopffen Fœmellis. Ad limites agrorum passim. Trifolium luteum minimum Lob. ic.

DCCXI. Trifolium montanum album, C. B. Pin. pag. 328. Trifolium majus albo flore, Clus. Pann. pag. 760. Trifolium majus primum, Clus. hist. lib. 6. fol. 245. Weiß spitziger Berg-Klee. Foliis est oblongis, angustis, duris, nervosis, incanis & in ambitû velut serratis. In monte Apollinis. Hinter Qvednau.

DCCXII. Trifolium montanum purpureum majus, C. B. Pin. pag. 328. Trifolium aliud montanum majus, Thal. pag. 123. Trifolii altera species & major, Gesn. hort. fol. 285. Trifolium majus secundum, Clus. hist. lib. 6. fol. 245. In montosis passim.

DCCXIII. Trifolium montanum spicâ longissimâ rubente, C. B. Pin. pag. 328. Lagopus altera folio pinnato, Lob. ic. pag. 40. o. Cytisus, Trag. Kyber. in Trag. pag. 601. Cytisus Columellæ, Lon. deutsch/ fol. 137. Trifolii majoris tertii altera species, Clus. hist. lib. 6. fol. 246. Lagopus major Eystett. Lagopus major alter Dod. Lateinisch/ fol. 578. Trifolium spicatum, Thal. pag. 124. Grosser Geiß-Klee/ Kyber. in Trag. Dignum horto trifolium.

Omni-

Omnium herbarum, quæ lactis copiam pariunt, tàm pecoribus quàm mulieribus, præstantissima est Cytisus. In der Osterrodischen Heyde copiosè.

DCCXIV. Trifolium arvense humile spicatum, sive Lagopus, C. B. Pin. pag. 328. Lagopus sive pes leporis, Bauh. Matth. fol. 699. Lagopus, Dod. Lateinisch/ fol. 577. Adv. Lob. Fuchs. 494. Lagopus. Pes leporis Obs. Lob. ic. pag. 39. o. Lagopodium Tab. Lib. 2. fol. 222. Lagopus & Lagopyron, Adv. Lob. fol. 383. Lagopus & totus campestris, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ 472. Leporinus pes. Herba, Cord. in Diosc. fol. 62. Lagopus major, Cæs. lib. 6. cap. 19. fol. 243. Lagopus minor, Cam. hort. pag. 83. Lagopus vulgaris, Thal. pag. 73. Katzen-Klee/ Tab. Fuchs. Hasen-Fuß/ Hasen-Klee vulgò. Katzen Schwantz Fœmellis. Siccando & adstringendo foriolis utilis. Passim inter segetes.

DCCXV. Trifolium sylvestre luteum siliqvâ cornutâ, vel Medica frutescens, C. B. Pin. pag. 330. Medica flavo flore, Clus. hist: lib. 6. fol. 243. Medica flore luteo, Clus. Pann. pag. 759. Lens major repens, Tab. lib. 2. f. 204. Meliloti majoris species tertia, Trag sebitz. in Trag. deutsch/ 471. Großkriechende Linsen/ Tab. Großer Stein-Klee/ der dritte. Sebitz. in Trag. Bey der Balga am Hafe copiosissimè. Item bey Lauten-Mühl.

DCCXVI. Trifolium acetosum vulgare, C. B. Pin. pag. 330. Oxytriphyllon, Trag. Kyber. in Trag. pag. 521. Trifolium acetosum, Brunf. Lateinisch/ tom. 3. fol. 50 Dod. Lateinisch/ fol. 578. Matth. deutsch/ fol. 352. Thal. pag. 123. Trifolium acetosum flore albo. Eystett. Alleluja, Lon. deutsch fol. 246. Oxys Fuchs. fol. 564. Cord. hist. fol. 172. Tab. lib.

lib. 2. fol. 224. Oxys Plinii, Gesn. hort. fol. 270. Oxys Pliniana, Panis cuculi, Alleluja officinarum, Trifolium acetosum, Lob. ic. pag. 32. o. Oxys flore lacteo, Cam. hort. pag. 114. Buchampffer/ Tab. Kyber. in Trag. Sauer-Klee Matth. Fuchs. Guck-Gauch-Klee/ Lon. Gauch-Ampffer/ Brunf. Buch-Klee/ Guck-Gauchlauch/ Gauch-Brodt/ Hasen-Klee/ Hasen-Ampffer vulgò. Kuckucks-Kohl Nostratibus. In umbrosis & sylvosis radicibus arborum passim adnascitur. Radix colligitatur Sole 1. ♈ inhabitante.

DCCXVII. Trifolium hepaticum flore simplici, C. B. Pin. pag. 330. Hepatica Brunf. Lateinisch/ tom. 1. fol. 190. Hepatica aurea, & herba Trinitatis, Gesn. hort. fol. 261. Hepatica aurea flore cœruleo, Tab. lib. 2. fol. 225. Hepatica aurea, Thal. pag. 56. Trifolium aureum, Dod. Lateinisch/ fol. 579. Lon. deutsch/ fol. 246. Trinitas, Bauh. Matth. fol. 610. Trinitas & Epimedium, Cord. hist. fol. 93. Nobilis hepatica, Trag. Kyber. in Trag. pag. 519. Hepaticum trifolium, Lob. ic. pag. 34. o. Trifolium hepaticum sive aureum flore cæruleo, Cam. hort. pag. 172. Hepatica trifolia cæruleo flore, Clus. hist. lib. 6. fol. 247. Blau gülden Leber-Kraut/ Tab. Edel Leber-Kraut/ Matth. Kyber. in Trag. Gülden-Klee/ Hirsch-Klee quibusdam. Blaue Viole Nostratibus. In umbrosis bey Schwanis; Item bey Domnau.

DCCXVIII. Tussilago vulgaris, C. B. Pin. pag. 197. Cam. hort. pag. 175. Tussilago, Bauh. Matth. fol. 614. Fuchs. fol. 140. Cord. in Diosc. fol. 58. Gesn. hort. fol. 258. Cæs. lib. 12. cap. 21. pag. 490. Lon. deutsch/ fol. 254. Tus-

ſilago, Farfara, Ungula Cabballina officinorum Adv. Lob. ic. pag. 589. Bechion ſive Farfara, Dod. Lateiniſch/ fol. 596. Ungula caballina, Brunf. Lateiniſch/ tom. 1. fol. 42. Trag. Kyber. in Trag. pag. 418. Bechion, Cord. hiſt. f. 93. Huff-Lattich/ Matth. Lon. Roßhüb/ Fuchſ. Brunf. Kyber. in Trag. Brandt-Lattich/ Eſels-Huff/ Brandletſchen vulgò. Secùs fontes ac foſſarum margines copiosè primo ſtatim vere viſitur. Tuſſilaginis vulgaris lanugo collecta, linteamine quodam cum paulo nitro concluſa, in lixivio decocta, ac in Sole ſiccata, igniariis fomitem omnium tenerrimum adminiſtrat. Verbaſci albi lanugo idem præſtat. Tuſſilaginatum vel Farfaratum, quô Tabaci locô utendum, ita fieri poteſt: R. vini tincti ſeu de Alecante, Cereviſiæ Dantiſc. Joppen-Bier ana libr. 2. Ebull. cum flor. Roſmar. Lavendul. pæoniæ, bugloſſ. borrag. Violar. à Mj Colaturæ adde ſucc. flor. betonic. roſar. Provincial. tiliæ, lilior. convall. ana Libr. 1. coquantur ſucci cum priori decocto, ac deſpumentur optimè: pòſt adde ſalis commun. Mj pulv. Cinamom. nuc. moſchat. macis ſem. aniſ. ana Unc. ſemis. ambr. griſ. veræ, ſpiritu vini diſſolutæ, Scrupul. ſemis. ebulliant iterum, & ut craſſamentum ſubſidat, ollam benè tectam aliquandiu ſerva. Mox liquidius transfuſum de integro ebullire permitte, & confeſtim folia tuſſilaginis, mediam creſcendo ætatem nacta, nervo craſſiori vel exciſo vel fracto, immitte, maceraturus ut molleſcant. Inſuccata ita folia panno involvantur laneo, linteô mox inductô, ac fimô equinô ſuperpoſitô, ut fervore contractô ſui digeſtionem & ulteriorem elaborationem conſequantur folia. Cottidiè autem eadem inſpicienda, nec eximenda, donec rufulum contraxerint colorem. Quô adversô (horridus foliorum, fotû diutiùs continuatô, evitetur

tur nigror, qui corruptionis manifestus index) segestre panneum aufer, ac filo crassiori transfossa collige folia, quæ in loco perflabili & umbrosiore siccata, convoluta tandem ac gyrata, funibus arctissimè constringantur, & in vasculo ligneo firmissimè impacta serventur. Fumus hujus tussilaginati, tubulo haustus, gratior erit & cerebro, & cordi, ejusq; ventilabro pulmoni.

DCCXIX. Typha palustris major, C.B. Pin. pag. 20. Typha Matth. deutsch/ *fol.* 447. Fuchs. *fol.* 823. Tab. lib. 1. *f.* 686. Lob. ic. pag. 81. Cord. in Dioſc. *f.* 58. Lon. deutsch/ *f.* 209. Typha palustris, Ruell. *f.* 560. Dod. Lateinisch/ *f.* 604. Cæs. lib. 4. cap. 68. pag. 194. Typha aquatica, Trag. Kyber. in Trag. pag. 681. Narren-Kolben/ Fuchs. Kyber. in Trag. Narren-Kolben/ See-Kolben Matth. Liesch- oder Moß-Kolben/ Tab. Kolben/ Lon. Ließ-Knospen/ Deitel-Kolben quibusdam. Ejus flos ambustis medetur. In aquis stagnantibus & uliginosis hinter der Altstätischen Ziegel-Scheune.

DCCXX. Valeriana sylvestris major, C. B. Pin. p. 164. Valeriana vulgaris, Trag. Kyber. in Trag. pag. 61. Valeriana & Phu majus commune, Gesn. hort. *f.* 272. & 285. Valeriana sylvestris, Dod. Lateinisch/ *f.* 349. Eystett. Lob. ic. pag. 715. Valeriana sylvestris major, Thal. pag. 129. Phu parvum, Bauh. Matth. fol. 38. Valeriana altera, Cæs. lib. 4. cap. 2. pag. 148. Phu vulgare, Tab. lib. 1. *f.* 562. Valeriana sylvestris prima, Clus. hist. lib. 4. *f.* 55. Phu Germanicum, Fuchs. *f.* 857. Gemein Baldrian/ Matth. Fuchs. Kyber. in Trag. Großer Baldrian/ Tab. Katzen-Wurtzel/ großer Dennmarck/ Augen-Wurtzel/ Wend-Wurtzel vulgò. Valeriana sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. Flores

legendi, Sole 1. ♍ occupante: ſemen, Sole 8. ♍ incolente. Semen egregiè purgat vino maceratum & aſſumptum. Radix, Sole 15. ♋ incolente, effoſſa, conciſa, ac vinô malvaticô tàm diu macerata, donec Sol ultimum gradum ♍ attingat, pòſt torculari ſubmiſſa & expreſſa, oleum reddit tuſſientibus ſalubre. Radix ante ortum Solis (Sole 15. ♋ ingreſſo) effoſſa, taffetto inſuta, ac collo, Sole in 1. ♎ verſante, appenſa, oculos confortat, aciemq; eorum tuetur.

DCCXXI. Valeriana Græca. Dod. Lateiniſch/ *f.* 352. Tab. lib. 1. *f.* 569. Valeriana cœrulea, C. B. Pin. pag. 164. Phu peregrinum, Geſn. hort. *f.* 272. Valeriana peregrina Cam. hort. pag. 176. Valeriana peregrina Belgarum & Herbariorum, Adv. Lob. *f.* 319. Valeriana Græca flore cœruleô, Eyſtett. Griechiſcher Baldrian/ Tab. Bey Juden-Kirch auff der Wieſe.

DCCXXII. Valeriana paluſtris minor, C. B. Pin. Valeriana exigua vel 4. Trag. Seb. in Trag. Valeriana ſylveſtris minor Adv. Lob. Phu minus, Tab. lib. 1. Kleiner Waßer-Baldrian. Ibidem.

DCCXXIII. Valeriana campeſtris inodora major, C. B. Pin. pag. 165. Album olus, Dod. Lateiniſch/ *f.* 647. Phu minimum alterum, Lob. ic. pag. 717. Lactuca agnina Tab. lib. 1. *f.* 570. Valerianæ campeſtris ſecunda ſpecies, Cam. hort. pag. 175. Bupleuron, Cæſ. lib. 4. cap. 14. pag. 156. Locuſta quibusdam Geſn. hort. fol. 265. Lammer-Lattich/ Tab. Inſipidô ferè eſt ſapore, refrigerat, & nonnihil humectat. Eſtur in acetariis hybernô tempore, quæ tùm lætiſſimè viret. Radix Valerianam redolet. In der Hollen-Grund.

DCCXXIV.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0463-5
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0464-1
DFG

DCCXXIV. Valeriana paluſtris foliis ſubrotundis parùm inciſis. Klein Waſſer-Baldrian mit rundlechten Blättern. E radice geniculatâ, ac copioſiſſimis filamentis præditâ, exſurgit caulis ſpithamam altus, cui propè terram ſubrotunda, pediculis longis, in progreſſu verò ad internodium caulis bina ex adversô ſita ſubſerviunt folia, quæ circa umbellam florum congeſtorum ac pallidè rubentium, parùm inciduntur ac dividuntur. In loco uliginoso propè pagum Lentzen/ in Diœceſi Elbingenſi, Majo Menſe.

DCCXXV. Verbaſculum pratenſe odoratum, C. B. Pin. pag. 241. Primula veris, Bauh. Matth. f. 801. Lonicerus deutſch/ f. 170. Primula veris ſive prima, Tab. lib. 2. fol. 34. Primula veris hortenſis, Thal. pag. 90. Herba Paralyſis, Brunf. Lateiniſch/ tom. 1. f. 96. Trag. Kyber. in Trag. pag. 201. Herba paralyſis altera, Cæſ. lib. 6. cap. 57. pag. 261. & 262. Primula pratenſis, Lob. ic. pag. 567. Primula pratenſis odora lutea, Adv. Lob. f. 243. Verbaſculum odoratum, Fuchſ. fol. 850. Arthritica ſimplici luteo flore, Cam. hort. pag. 22. Primula veris flavo flore elatior, Cluſ. hiſt. lib. 3. f. 301. Primula veris major, Dod. Lateiniſch/ f. 147. Primula veris flore luteo, Eyſtett. Alisma pratorum, Colum. in Phytobas. pag. 21. Schlüßel-Blumen/ Tab. Matth. Kyber. in Trag. Geel Schlüßel-Blumen/ Fuchſ. Himmel-Schlüßel/ Brunf. S. Peters Schlüßel/weiß Betonien/ Gicht-Kraut/ Handſchuch-Blumen quibusdam. Ad ſylvarum margines paſſim.

DCCXXVI. Verbaſcum mas latifolium luteum, C. B. Pin. pag. 239. Verbaſcum mas, Tab. lib. 2. f. 266. Verbaſcum mas, Thapſus barbatus. Adv. Lob. fol. 242. Verbaſcum

baſcum primum, Bauh. Matth. f. 800. Verbaſcum aut Phlomos vulgaris mas Dioſcoridis, Thapſus barbatus officinarum, Lob. ic. p. 561. Verbaſcum latius, Dod. Lat. f. 143. Verbaſcum candidum mas, Lon. deutſch/ f. 161. Varbaſcum latifolium mas, Eyſtett. Verbaſcum album mas, Thal. p. 129. Wull-Kraut-Mäñlein/ Tab. Wull-Kraut/ Königs-Kertze/ Matth. Weiß Wull-Kraut-Männlein/ Lon. Kertzen-Kraut / Brenn-Kraut/ Himmelbrandt/ Unholden-Kertz/ Feld-Kertz vulgò. Welcke Noſtratibus. Copiosè viſitur hæc planta circa oppidum Holland in aſcensû montium. Bey Rößel in ingenti copiâ. Herba colligenda Sole 15. ♌ occupante: flores Sole in ♌ conſtituto: Semen Sole in ultimo gradu ♋ radix Sole in 1. ♏. Oleum in podagrâ & contracturis perutile hôc modô paratur: Flores dictô tempore collecti, ac vitro concluſi, Soli exponantur, donec Sol 15. ♎ attingat. Podagræ remedium: Verbaſci manipulus unus & alter, cum tantulo cretæ decoquatur, decocto pedes foveantur & abluantur, poſt in ſcrobem ſordida miſcella conjiciatur, terrâ tegatur, putredine peritura, & curatura. Verbaſci albi, ſeu maris, flores tunſi, ſuccum fundunt fœmellis ſervientem, turpes dum vultus ruga ſenilis arat. Folia lateres inter ignitos cocta, ex calceatu claudicantes equos fotû egregiè juvant.

DCCXXVII. Verbaſcum nigrum flore ex luteo purpuraſcente, C. B. Pin. 240. Verbaſcum nigrum, Trag. Kyber. in Trag. p. 218. Tab. lib. 2. f. 267. Dod. Lateiniſch/ f. 144. Verbaſcum nigrum Dioſcoridis, Lob. ic. pag. 562. Verbaſcum nigrum latifolium, Thal. pag. 129. Verbaſcum tertium, Bauh. Matth. fol. 800. Blattaria Plinii, ſeu Verbaſcum nigrum, Eyſtett. Verbaſcum nigrum ſalvifolium purpureo flore, Adv. Lob. 241. Verbaſcum ſylveſtre, Fuchſ. fol. 849. Verba-

ſcum

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0467-8
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0468-4
DFG

ſcum ſylveſtre minus, Lon. deutſch/ fol. 169. Schwartz Wull-Kraut/ Tab. Wull-Kraut das dritte/ Matth. Wild Wull-Kraut/ Fuchſ. Wild Wull-Kraut das kleine / Lon. Schwartz Kertzen-Kraut vulgò. In der Hollen-Grund. Item in pagis paſſim.

DCCXXVIII. Verbaſcum nigrum flore candido, in meditullio purpuraſcente. J. L. Cum verbaſco nigro flore ex luteo purpuraſcente, C. B. in reliquis convenit. In pago Werlitten im Oſterrodiſchen.

DCCXXIX. Verbena communis cæruleo flore, C. B. Pin. pag. 269. Verbena, Geſn. hort. fol. 285. Lon. deutſch/ fol. 167. Verbena recta, Trag. Kyber. in Trag. pag. 210. Verbena communis & ſacra recta, Lob. ic. pag. 534. Verbenaca, Matth. Bauh. in Matth. fol. 742. Verbena recta, Dod. Lateiniſch/ fol. 150. Tab. lib. 1. f. 471. Verbenaca ſupina, ſive fœmina, Fuchſ. fol. 593. Verbenaca ſupina, Cord. in Dioſc. fol. 66. Verbena maſcula, Brunf. Lateiniſch/ tom. 1. fol. 119. Verbena fœmina, Cæſ. lib. II. cap. 32. pag. 450. Cam. hort. pag. 176. Verbena vulgaris, Cluſ. hiſt. lib. 4. fol. 45. Eiſen-Kraut-Männlein / Tab. Eiſen-Kraut/ oder Eiſenhart-Männlein/ Lon. Eiſen-Kraut/ oder Eiſenhart/ Matth. Eiſenrich/ Eiſern/ Iſen-Kraut/ Tauben-Kraut quibusdam. Verbena ſicca & calida eſt, guſtû amara, adſtringens ac glutinans, Tab. Dolorem capitis diſcutiendo mitigat, Gal. 2. de compoſ. med. Im alten Hammer. Item zu Kuntzen in pago copiosè. Verbena ſub elevatione poli 45. 46. 47. 48. 49. Folia colligenda Sole in ny exiſtente: flores Sole in ♌. Verbena ſagmen dicitur veteribus. Juſtinianus l. Sanctum. ff. de diviſione rerum & qualitate. Sanctum eſt, quod ab injuriâ hominum defen-

ſum

ſum atque munitum eſt. Sanctum autem dictum eſt à ſagminibus. Sunt autem ſagmina quædam herbæ, quas Legati Populi Romani ferre ſolent, ne quis eos violaret. Origo ex Græco σάγισμα pro ἅγισμα, unde ſagmen.

DCCXXX. Veronica mas ſupina & vulgatiſſima, C. B. Pin. pag. 246. Veronica mas, Fuchſ. fol. 166. Lon. deutſch/ fol. 96. Thal. fol. 131. Veronica, Tab. lib. 2. fol. 98, Teucrium, Trag. Kyber. in Trag. pag. 207. Veronica vulgò dicta, Geſn. hort. fol. 285. Veronica vulgaris ſupina, Cluſ. hiſt. lib. 3. fol. 347. Veronica vera & major, ſive Veronica major Septentrionalium & Veronica mas Fuchſii & Dodonæi: etiam Betonica Pauli, Lob. ic. pag. 471. Veronica major, Cam. hort. pag. 176. Veronica vera & major, Adv. Lob. fol. 197. Veronica mas ſerpens, Dod. Lateiniſch/ fol. 40. Auricula muris tertia, Cæſ. lib. 8. c. 27. pag. 335. Ehren-Preiß/ Tab. Kyber. in Trag. Ehren-Preiß-Männlein / Lon. Fuchſ. Grundheil quibusdam. *In locis apricis paſſim. In pago* Latten-Walde Veronicam hanc foliis obſervavi maximis. Veronica ſub elevatione poli 45. 46. 47. 48. Radix effodienda, Sole 15. ♋ occupante: cauliculi, Sole ultimum ♋ gradum inhabitante. Folia Sole 1. ♌ tenente: flores, Sole 15. ♌ obſidente: ſemen Sole ultimum gradum ♋ tenente. Veronica tuſſedine diſcruciatis commendatiſſima eſt planta. Hic ἀκροποδιτί tranſilire non poſſum illud, quod nempe quondam hic Regiomonti (in der krummen Grub) habitârit mulier, Anna piſtoris cujusdam uxor, quæ tuſſientes & quosvis ſputatores ex mirabili antipathiâ ferre non potuit. Minxit namque confeſtim, ac diras imprecata eſt, exaudiens ſcreatu vel tuſſi aliquem ſputa moventem Ruſticis ubi pro fru-

frumentis ſolvendis pecuniam numerabat, inter numerandum ſi quempiam ſputantem advertebat, in hæc mox prorupit verba: Sprütz deine Mutter die Hure/ & perrexit numerando 6. 7. 8. 9. Sprütz du Huren-Sohn/ 10. 11. 12. Sprütz deine Mutter die Hure/ 13. 14. 15. &c. Maritus ejus vel in cellam ſe abdidit tuſſiens, vel aliò ſe abduxit, ne audiretur malô preſſus. Metuit namque ſcelerata, quæ in quosvis tuſſientes promiſcuè effutierat, verba. Scaliger Exercit. CCCXLIV. §. 6. tradit, nobilem quendam Vaſconem, auditô phormingis ſono, iliicò urinam reddidiſſe.

DCCXXXI. Veronica ſpicata anguſtifolia, C. B. Pin. pag. 246. Veronica recta vulgaris major, Cluſ. hiſt. lib. 3. fol. 347. Veronica ſpicata cœrulea, Cam. hort. pag. 177. Veronica recta Herbariorum Lob. ic. pag. 473. Auricula muris quarta, Cæſ. lib. 8. c. 27. Veronica recta prima & ſecunda, Tab. lib. 2. fol. 99. Auffricht ſtehender Ehren-Preiß/ Tab. Schwalcken-Zagel Noſtratibus. In ericetis bey Brandenburg/ item bey Lauten-Mühl.

DCCXXXII. Veronica pratenſis ſerpillifolia, C. B. Pin. pag. 247. Teucrium alterum, Trag. Sebitz. in Trag. deutſch/ fol. 165. Veronica pratenſis, Dod. Lateiniſch/ f. 41. Veronica fœmina, Thal. pag. 131. Veronica minor ſerpilli folia, Lob. ic. pag. 472. Betonica Pauli quorundam, Cam. hort. pag. 28. Auricula muris prima in pratis humectis, Cæſ. lib. 8. c. 27. pag. 335. Bey Königsberg paſſim.

DCCXXXIII. Vicia ſepium folio rotundiore acuto, C. B. Pin. p. 345. Aphaca, Bauh. Matth. f. 416. Vicia, Dod. Latein. f. 531. Lob. ic. p. 750. Cluſ. hiſt. lib. 6. f. 235. Cæſ. lib. 6. c. 11. p. 236. Orobus ſylveſtris ſive Vicia major ſylveſtris, & ſecunda, Trag. Seb. in Trag. deutſch/ f. 495. Aphace, Fuchſ. f. 110.

Vicia ſylveſtris, Lon. deutſch/ fol. 285. Wilde Wicken/ Matth. Fuchſ. Groſze Wicken/ Seb. in Trag. In dumetis & frutetis paſſim.

DCCXXXIV. Vicia multiflora hirſuta cærulea. Vicia multiflora, C. B. Pin. pag. 345. Aracus, Tab. lib. 2. fol. 208. Galega altera, vel ſylveſtris, aut Germanica, Dod. Lateiniſch/ 548 Galega ſylveſtris Dodonæi, Thal. pag. 55. Vogels-Wicken/ Tab. In dumetis & ſecùs vias paſſim.

DCCXXXV. Vicia multiflora hirſuta purpurea, Joh. Lœſ. Rauge braune vielblütige Wicken. In der Hollen-Grund.

DCCXXXVI. Vicia multiflora glabra candida, Joh. Lœſ. Unrauge weiſze vielblütige Wicken. Im Morungiſchen Walde.

DCCXXXVII. Vicia ſemine rotundo nigro, C. B. Pin. pag. 345. Craccæ primum genus, Dod. Lateiniſch/ fol. 582. Aracus, Araca, & Cracca major: Vicia ſylveſtris Lob. ic. 75. o. Vicia minor, vel tertia, Trag. Sebitz. in Trag. deutſch/ 495. Braune Waldwicken mit runden ſchwartzen Saamen. Reperta beym Altſtädtiſchen Gericht in montoſis; menſe Aprili. Semen columbarum cibus, quô ineſcari poſſunt, gratiſſimus. Floſculis eſt purpureis.

DCCXXXVIII. Vicia ſegetum cum ſiliquis plurimis hirſutis, C. B. Pin. pag. 345. Craccæ alterum genus, Dod. Lateiniſch/ fol. 542. Cracca minor, Tab. lib. 2. fol. 208. Vicia minima, vel quarta, Trag. Seb. in Trag. deutſch/ fol. 496. Aracus ſive Cracca minima, Lob. ic. pag. 76. o. Kleine wilde Wicken/ Tab. Floſculis eſt tenellis, candidulis: ſiliquis nanis, curtis, hirſutis, binis, trinis, vel quaternis ſeminulis rotundis gravidis. Inter ſegetes paſſim.

DCCXXXIX.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0472-5 DFG

DCCXXXIX. Viola Martia purpurea flore ſimplici odoro, C. B. Pin. pag. 199. Viola purpurea, Matth. deutſch/ fol. 514. Adv. Lob. fol. 266. Cæſ. lib. 9. cap. 39. pag. 393. Viola Martia purpurea, Tab. lib. 2. fol. 16. Viola Martia odorata nigra ſeu purpurea, Trag. Sebitz. in Trag. deutſch/ fol 443. Viola Martia præcox purpurea, odora, ſimplici flore, Lob. ic. 608. Viola nigra, ſive purpurea Dod. Lateiniſch/ fol. 156. Viola nigra, Cord. in Dioſc. fol. 71. Geſn. hort. fol. 286. Viola, Lon. deutſch/ fol. 214. Blaue/ oder braune Violen/ Matth. blaue Violen/ Lond. Blaue oder braune Mertz-Violen/ Tab. In der Hollen-Grund ſpontè. Efficax ſub elevatione poli 45. 46. 47. 48. Radix effodienda Sole 1. ♉ ingrediente. Refrigerat, ac pulmonum exulcerationibus medetur. Flores efficaciſſimi Sole in ♉ abeunte.

DCCXL. Viola Martia inodora ſylveſtris, C. B. Pin. pag. 199. Viola canina, Tab. lib. 2. fol. 18. Lon. deutſch/ fol. 214. Viola ſylveſtris inodora, Dod. Lateiniſch/ fol. 156. Viola canina cærulea inodora ſylveſtris ſerotina, Lob. ic. pag. 609. Violæ nigræ ſylveſtrior ſpecies, Geſn. hort. fol. 286. Viola purpurea ſylveſtris ſive canina, Trag. Sebitz. in Trag. deutſch/ 443. Viola Martia canina, Eyſtett. Viola Martia ſylveſtris, Thal. pag. 130. Hunds-Violen/ Lon. Tab. Sebitz. in Trag. In der Hollen-Grund paſſim.

DCCXLI. Viola tricolor hortenſis repens, C. B. Pin. pag. 199. Herba ſanctæ Trinitatis, Brunf. Lateiniſch/ tom. 3. fol. 29. Herba Trinitatis, Fuchſ. fol. 803. Lon. deutſch/ fol. 215. Herba Trinitatis ſativa, Trag. Sebitz. in Trag. deutſch fol. 448. Viola tricolor, Dod. Lateiniſch/ fol. 158. Viola Trinitatis prima, Tab. lib. 2. fol. 24. Jacea, ſive flos Trinitatis, Bauh. Matth. fol. 832. Viola flammea, Cæſ. lib. 9.

cap. 40. pag. 393. Viola flammea, coloria, calida, Lob. ic. pag. 611. Freysam-Kraut/ Tab. Lon. Dreyfaltigkeit-Blum/ Brunf. Frembde Sorge Nostratibus. Cubitum & quadrantem alta in lœtiori Sole reperta à me zu Gerdauen. In incultis & desertis passim. Sub elevatione poli graduum 45. 46. 47. 48. Radix eruatur Sole 39. ♉ occupante: folia cum cauliculis, Sole 1. ♌ inhabitante: flores, Sole 30. ♊ tenente: semen, ultimum ♌ gradum Sole ingresso.

DCCXLII. Virga aurea solidago Sarracenica dicta Joh. Lœs. latifolia, serrata. Groß heydnisch Wund-Kraut mit breiten Blättern. Radix ex multis crassis, longiusculis & albidis fibris constituta, caulem porrigit tricubitalem, nonnunquam & productiorem, rotundum, ramosum, viridem & striatum, albicante medullitùs pulpâ, cui folia virentia, tres digitos transversos lata, ac spithamam ferè longa, lanugine destituta, & in circuitu egregiè serrata, subserviunt. Fastigia caulium honestantur copiosis flosculis luteis, ætatis tractu in pappos euntibus. Zur Kobbel-Bude am Frisching.

DCCXLIII. Virga aurea, Solidago Sarracenica dicta, angustifolia serrata, Joh. Lœs. C. B. Pin. pag. 268. Solidago Sarracenica, Dod. Lateinisch/ fol. 141. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ 388. Fuchs. fol. 728. Observ. Lob. fol. 159. Adv. Lob. fol. 125. Virga aurea, Gesn. hort. fol. 286. Consolida aurea, Tab. lib. 2. pag. 258. Consolida Sarracenica, Thal. pag. 27. Eystett. Groß heydnisch Wund-Kraut mit schmalen Blättern. Gülden Wund-Kraut / Tab. Heydnisch Wund-Kraut/ Fuchs. In longitudinem quatuor imò quinq; ulnarum excrescit sæpè, caulem pedi loco utendum suppeditans. Folia dorso lanuginosa ex atro virescunt ac splendent: Quæ cacumina versùs caulium tendunt, ex incisione crispata veluti sunt in ambitu. Zur Kobbel-Bude am Frisching.

DCCXLIV.

DCCXLIV. Virga aurea latifolia ſerrata, C. B. Pin. p. 268. Virga aurea ſerratis foliis Tab lib. 2. f. 546. Virga aurea altera ſerrato folio, Lob. ic. p. 299. Virga aurea margine crenato, Dod. Lat. 142. Gülden Wund-Kraut mit breiten Blättern. Gülden Wund-Kraut/ Tab. Calida & ſicca ordine ferè ſecundo. Abſtergit, glutinat, adſtringit, urinam provocat, & renum calculos atterit, ac expellit. Villanovanus de virtutibus hujus plantæ hæc memoriæ prodit: De virgâ aureâ vidi experimentum in quodam, qui habuit lapidem in veſicâ, & comedit dictam herbam cum ovis omni manè per novem dies, & fractus eſt lapis, & ipse oſtendit mihi manum plenam lapillis. Poſt addit: Omnia ulcera tàm antiqua quàm recentia citò conſolidat impoſita, & ani exitum ac dolorem hæmorrhoidum largè fluentium ſanat, in cibo vel potu ſumpta. In monte Apollinis hinter Qvednau. Floret Sole in ♌ exiſtente. Optima ſub elevatione poli 46. 47. 48. 49. Radix ejus Sole 1. ♌ ingreſſo collecta, ulcerationibus jecoris & pulmonum deſervit. Flores ultimum ♌ gradum Sole occupante colligantur.

DCCXLV. Viſcum, Trag. Kyber. in Trag. pag. 949. Fuchſ. fol. 329. Dod. Lateiniſch/ fol. 826. Matth. deutſch/ fol. 333. Cord. in Dioſc. fol. 57. Lon. deutſch/ fol. 87. Tab. lib. 3. fol. 671. Lob. ic. pag. 636. Viſcum baccis albis, C. B. Pin. pag. 423. Miſtel/ Matth. Kyber. in Trag. Fuchſ. Lon. Miſpel/ Tab. Emollit, digerit, extrahit, diſcutit, parotidas, tubercula, cæterasque collectiones ad maturationem perducit, Dioſc. Qverculanum & in corylo natum epilepticos juvat: In pyro ſylveſtri proveniens, cum foliis contuſum, & pingvedini caponum emplaſtri inſtar

mixtum, ac compositum, contracturas sanat. Sebitz. Cortices & baccæ immaturæ aviculis exitiosum.

DCCXLVI. *Viscum fraxini baccis ex albo luteis. Joh. Læs. Eschen-Mispel mit weißgelben Beerlein. Observavi viscum apud nos in abiete, salice, sorbo, tiliâ, quercû, corylô, betulâ, pyrô, pomô, & fraxinô. Quia verò illud è fraxino rariûs est, & ante vix ab ullô annotatum, adlibuit in præsenti id paucis depingere. Hyeme hoc ab arbore dejectum, ex frustis sex, alas veluti quasdam præsentantibus, constituebatur, pediculis nitentibus suis, quorum concursus coronam quasi quandam mentiebatur. Qvælibet ala compressa erat & striata, cubitum ferè alta, uncias duas lata, in fastigio curvata & hiulca. Baccæ, alis & pediculis assistentes, ex albo luteæ spectabantur. Hinter Labiau im Nemonin, quæ cædua est sylva, fraxinis & alnis maximam partem constans, in quâ minimùm quatuor mille lignearum struum (quas Achtel-Holtz Nostrates dicunt) singulis annis colliguntur, annuum reditum Regi nostro sedecim millibus Imperialium augens.

DCCXLVII. Vitis idæa foliis subrotundis exalbidis, C. B. Pin. pag. 470. Vitis idæa altera, Clus. hist. lib. 1. pag. 62. Clus. Pann. pag. 79. Vitis idæa Gesneri major, Cam. hort. pag. 182. Drunckel-Beeren Nostratibus. Hinter Karschau in muscosis. Pulpa baccarum albicat, acini flavescunt.

DCCXLVIII. Vitis idæa foliis oblongis crenatis fructu nigricante. C. B. Pin. 470. Vaccinia nigra, Dod. Lateinisch/ fol. 768. Adv. Lob. fol. 415. Myrtillus, Matth. deutsch/ fol. 82. Lon. deutsch/ fol. 58. Vitis idæa prima, Tab. lib. 3. fol. 580. Bagolæ primum genus, Cæs. lib. 5. cap. 14. pag. 210. Heidel-Beer/ Tab. Lon. Gemeine Heidel-

del-Beeren/ Matth. Blau-Beeren Noſtratibus. In ericetis & muſcoſis paſſim.

DCCXLIX. Vitis idæa foliis ſubrotundis non crenatis baccis rubris, C. B. Pin. 470. Vaccinia rubra, Dod. Lateiniſch/ fol. 770. Adv. Lob. fol. 415. Myrtillus exiguus, Trag. Kyber. in Trag. pag. 974. Vitis idea buxeis foliis. Cluſ. hiſt. lib. 1. fol. 61. Vitis idææ ſpecies altera acinis rubris, Geſn. hort. fol. 287. Foliis buxi locô utuntur mulieres hybernô tempore in ſertis exornandis, quæ ſæpiùs inaurant vel argento incruſtant. Bey Schwanis im Gebrüch/ item bey Lauten-Mühl.

DCCL. Vitis idea foliis oblongis non crenatis baccis rubris. Erica baccifera latifolia, Tab. lib. 3. fol. 810. Hæc in Pinace C. B. omiſſa. In der Sarckau.

DCCLI. Vitis idæa paluſtris, C. B. Pin. pag. 471. Vaccinia paluſtria, Dod. Lateiniſch/ fol. 770. Lob. ic. pag. 109. o. Oxycoccum, Cord. hiſt. fol. 140. Eyſtett. Oxycoccus Valerii Cordi, Cam. hort. pag. 113. Oxycoccum, Cordi, Thal. pag. 83. Vitis idæa tertia in paluſtribus, Cluſ. hiſt. lib. 1. fol. 61. Acinaria paluſtris, Geſn. hort. fol. 277. Helvetiis & Boruſſis. Moß-Beeren. Hinter Karſchau. Item bey Lauten-Mühl in muſcoſis & uliginoſis.

DCCLII. Vitis idæa Rorismarini folio, aversâ parte albido ac nervoso. Joh. Lœſ. Folia unâ parte vireſcunt, alterâ albeſcunt, ac nervô eleganti in duas veluti partes diſcriminantur. In der Sarckau/ item bey Schwanis im Gebrüch.

DCCLIII. Ulmus, πτελέα Dioſc. & Theophr. Joh. Lœſ. Röſtern. Folia, cortex & radix adſtringunt, abſtergunt, glutinant, & fracturas ſolidant. Foliis ſe recens vulnus ad σύμφυσιν duxiſ-

duxisse scribit Gal. 8. simpl. Ulmi lignum recens à rusticis sæpè sauciatur, ut nodos crescendo contrahat. Hoc paulò pòst clavæ & lychnuchi locô utuntur iter facientes. In sylvis passim. Præcox foliorum ulmi ac Persicæ decidium pestilitatem jumentis portendit. Ulmum arborem serviisse olim censeo horribili illi suppliciorum generi, quod disphendomena vocârunt. Illud ita sumebatur: Arbores proceræ curvabantur, criminoso in deflexis cacuminibus alligato, quibus repentè laxatis, lacerum corpus in diversa distrahebatur. Hôc supplicio afficiebatur Bessus, qui Darium interfecerat, perhibente Plutarchô in Alexandro. Membris ita suis plectebatur ab Aureliano Imperatore miles, qui cum hospitis uxore adulterium commiserat, Vopiscô teste.

DCCLIV. Ulmus aut ei similis, cum folliculis, quam aliqui pro Tiliâ mare offerunt, Dod. Lateinisch/ fol. 838. Tilia mas, Matth. Bauh. in Matth. fol. 155. Tab. lib. 3. f. 691. Lob. ic. pag. 188. o. Stein-Linden Tab. Wiecken Nostratibus. Foliis insident folliculi purpurei, oblongi, pisi magnidine, muscas continentes exiles, quæ apertis iisdem avolant. Insunt & nonnunquam vermiculi teretes, qui Cnipes dicuntur Theophrasto, 2. de hist. Plantar. c. 9. Ex folliculis ulmi, cum bestiolis innatis, additis aliis, sæpiusculè emplastrum paratur, probatissimo experimento ad puerorum hernias. Dixi Cnipes vocari ulmi vermes ex Theophrasto. Aliàs σνίψ vel κνίψ vermiculus est ligna erodens, quibus erosis subinde locum mutat. Hinc proverbium, ὁ κνίψ ἐν χώρᾳ, i. e. Cnips in regione, dicitur in vagabundum, qui sedem crebriùs mutat, & ex loco in locum migrat, velut Horatius, qui vitio huic se obnoxium fuisse fassus est. Trips

simili-

ſimiliter Græcis vermiculum denotat, lignis tàm exitioſum, quàm Ips cornibus & vitibus. Hinc illud vulgare: κακὰ μὲν θριπὲς, κακὰ δὲ ἰπὲς, i. e. mali thripes, mali ipes. Lignum arboris tenellum adhuc cultello ſæpiuſculè circa circum ſauciant ruſtici, ut nodos contrahat, quô reſectô pòſt clavæ Herculeæ locô utuntur. Ex delibrato cortice Lithvani calceos parant, quos Paräßken nominant. In ſylvis paſſim.

DCCLV. Urtica fatua ſylveſtris aculeata, Thal. p. 131. Cannabis ſpuria facie urticæ, Lob. ic. pag. 527. Planta hæc C. B. Pin. pag. 232. Urtica aculeata foliis non ſerratis vocatur, verùm folia ſerrata obtinet, quæ à pictore omiſſa, teſtante Plantinô in iconibus Antverpiæ editis. Tatbe wilde Neßel/ oder falſcher wilder Hanff. In arenoſis paſſim.

DCCLVI. Urtica urens maxima, C. B. Pin. pag. 232. Urtica major, Fuchſ. fol. 107. Tab. lib. 2. fol. 234. Lon. deutſch fol. 138. Thal. pag. 131. Urtica, Cord. in Dioſc. fol. 69. Urtica urens altera, Dod. Lateiniſch fol. 151. Urtica vulgaris urens prima, Trag. Kyber. in Trag. pag. 2. Urtica ſylveſtris major, Geſn. hort. fol. 287. Urtica ſylveſtris aſperior, ſive Urtica communis, ſive major, aut Urtica fœmina, Lob. ic. pag. 521. Große Neßel/ Tab. Groß brennend Neßel Lon. Heyter-Neßel Fuchſ. Donner-Neßel Noſtratibus. Ex hâc elegantiſſimum ac firmiſſimum conficitur linteum. Urticâ hâc involutum tabacum, biennium & diutiùs viribus integrum, ſervant nautæ. Vilius tabacum hoc ſegeſtri munitum, colorem acquirit Nicotianæ Braſilianæ. Circa Regiomontum paſſim. Copioſiſſimè creſcit

ſcit in alneto Zwiſchen dem Piltzchen-Krug und Wonihnkeim. Attici urticam vocant ἀναλήφην, herbam nimirum, cujus contactu cutis prurit. Miror hinc Antigonum, laſcivum Juvenem, pro ſceptro dextrâ manu pungentes urticas, & pro aureâ coronâ hederaceam geſtaſſe, & hôc habitu jus populis dixiſſe.

DCCLVII. Urtica urens minor, C. B. Pin. pag. 232. Urtica minor, Fuchſ. fol. 108. Cord. hiſt. fol. 109. Tab. lib. 2. fol. 335. Lon. deutſch fol. 138. Thal. pag. 131. Urtica urens minima, Dod. Lateiniſch/ fol. 152. Urtica minor acrior, Lob. ic. pag. 522. Urtica tertia, Trag. Kyber. in Trag. pag. 1. Bauh. Matth. fol. 790. Urtica minor, ſive Cania Plinii acrior, Adv. Lob. fol. 223. Heiter-Neßel/ Tab. Eyter-Neßel/ Lon. Brenn-Neßel Fuchſ. Circa loca habitabilia paſſim.

DCCLVIII. *Vſtilago tritici. J. L.* Weitzen-Brand. Hujus nulla fit mentio apud Bauh. copiosè tamen reperitur, ita, ut tritico, antequam piſtrillæ committitur, aqua ſit affundenda, pro removendâ uſtilagine, quæ paulò pòſt ſupernatat agitato tritico. Urtica fatua ſylveſtris aculeata Thal. Cannabis ſpuria facie urticæ Lob. ic. Urtica aculeata foliis non ſerratis C. B. Pin. Taube wilde ſtachliche Neßel.

DCCLIX. Vſtilago ſecalis, C. B. Pin. pag. 24. Vſtilago, Dod. Lateiniſch fol. 542. Lob. ic. pag. 35. Lon. deutſch fol. 287. Trag. Kyber. in Trag. pag. 66. Vſtilago ſecalina, Tab. lib. 1. fol. 683. Rubigo & Robigo Horatio & Virgilio. Korn-Brandt Tab. Brandt/ Lon. Kyber. in Trag.

Trag. Pulviſculum Vſtilaginis pictoribus elegantem colorem fuſcum ſuppeditare ſcribit. Tab. Fortè intelligit fuliginem hordei uſti, quâ Gemmarii utuntur in parandis tincturis, quæ Adamanti ſubduntur. Obiter hoc: Hortorum areas, greſſibus deſtinatas, quas ſabulo communiter opplemus, inſtante hyeme, ſtramine copiosô ſi oneraveris, ſuperingeſta hybernis frigoribus nix cavebit ſolidè, ne gramina eo in loco vernô tempore ſuccreſcant, quæ aliàs eradicanda, ut libera ſit eundi via.

DCCLX. Vſtilago hordei, C.B. Pin. pag. 24. Vſtilago hordeacea, Tab. lib. 1. fol. 684. Vſtilago polyſtichi, Lob. ic. pag. 36. Gerſten-Brandt Tab.

DCCLXI. Vſtilago avenæ, C.B. Pin. pag. 24. Lob. ic. p. 36. Vſtilago avenacea, Tab. lib. 1. f. 684. Haber-Brandt Tab. Ex avenaceo vel hordeaceo ſtramine atramentum, rebus in æs inciſis, & exſcribendis deſerviens: Stramen in minutal conciſum, ollæ capaci committitur, eiq; ollar additur, commiſſuris (ne quid exſpiret) benè clauſis: poſt in furnum, ubi vaſa figulina coqvuntur, congeritur totum, & uſtulatur aliquandiu: tandem horridè in fundo nigricans materies cum olivo in marmore Porphyretico teritur, ac uſui ſervatur. Præſtantius atramentum eam in rem conficitur ita: Fuligo, quæ in vaſculis ligneis concluſa paſſim apud nos diſtrahitur, ac Tönchen-Schwartz ſalutatur, in ollam figulinam, encauſto non pictam, immittitur, orificio exacte clausô. Mox quadrantem horæ, admotis circum circa prunis, exuritur fuligo, ut incandeſcat. Poſt calore ſponte refrigerato & extincto,

fuligini ammiſcetur vernix benè pura & cocta, ac miſcella in marmore tam diu agitatur, donec ſpiſſitudinem contrahat. Coctæ vernici aliquantillum aluminis Arabici ſi addideris, chriſma obtinebis ſplendidius. Sunt, qui ex ebore, ſuccino, vini tartaro ac fæcibus, longè elegantiſſimum parant atramentum, rebus ex ære deſcribendis utile.

FINIS.

INDEX

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0482-1 DFG

INDEX GERMANICUS.

NB. p. paginam, n. numerum indigitat.

A.

Waßer Aaron p. 62. n. 149.
Abbiß/ Anbiß / Teuffels Abbiß. p. 263. n. 686.
Ackerwurtz p. 6. n. 10
klein Holtz-Aepffel p. 157. n. 429.
weiße große Holtz-Aepffel/ Höltzchen ibid.
wilde Agley p. 18. n. 46.
Agrimonien p. 71. n. 176.
Ahorn/ vid. Leinbaum.
Alant-Kraut/ Alant-Wurtzel p. 123. n. 338.
schwartz Albeer-Baum p. 205 n. 560.
Alb-Kraut p. 70. n. 174.
Alffranck p. 257. n. 670.
Alhorn/ Ahorn p. 240. n. 638.
Allerman Harnisch p. 105. n. 277.
Alp-Rutten p. 235. n. 625.
Alphanen-Fuß. p. 225. n. 605.
waßer-Ampfer/ Roß-Ampfer Weyer-Ampfer p. 135. n. 377
klein Weyer-Ampfer ibid. n. 378.
Haasen-Ampfer / Butter-Ampfer p. 135. n. 379.
Buch-Ampfer p. 275. n. 716.
Anblatt p. 187. n. 517.
gemeiner weißer Andorn p. 159. n. 430.
Andorn-Weiblein ibid.
schwartzer stinckender Andorn ibid. n. 431.
Andorn-Männlein ibid. n. 432
unrauger Waßer-Andorn p. 160. n. 433.
Waßer oder rauher Andorn. ibid.
Bruch- oder Waßer-Andorn ibid.
Waßer-Angelick p. 15. n. 38.
wilde rauhe Angelick p. 16. n. 39.
S. Antonii Kraut p. 152. n. 422.
Apostemen-Kraut mit hochblauer Blum p. 229. n. 612.
mit weißer Bluth. ibid. n. 613.
Apostemen-Kraut p. 247. n. 648.
Geel Aprillen-Blumen p. 219. n. 592.
weiß Aprillen-Blumen ibid. n. 593.
Aspen p. 205. n. 561.
Attich oder niedriger Hollunder p. 243. n. 639.

Augen-Trost p. 72. n. 177.
blauer Augen-Trost p. 64. n. 153.
brauner Augen-Trost p. 72. n. 178.
Augenwurtz p. 219. n. 593.
Augen-Wurtzel vid. Baldrian.
Aurin vid. Laurin.

B.

Bachbungen klein mit länglichten Blättern p. 14. n. 33.
- - mit Polley-Blättern p. 14. n. 34.
- - mit kurtzen länglichten Blättern/ deßen Saam in doppelten Schildlein p. 15. n. 36.
Bären-Klau / Bären-Tatz/ vid. Bartsch.
Bären-Lapp. p. 169. n. 463.
Baldgreiß vid. Creutzwurtz.
Baldrian grosser p. 277 n. 720.
Grichischer Baldrian p. 278. n. 721
kleiner Wasser-Baldrian/ ibid n. 722.
Wild oder Katzen-Balsam p. 162. n. 438.
S. Barbara Kraut. vid. Rapuntzel.
Bartsch p. 262. n. 685.
Bartzen-Kraut p 49 n. 124.
klein/ groß und mittel Basilien p. 179. n. 497.
Seidel-Bast p. 139. n. 388.
Wolffs-Bast. ibid.
Bast p. 268. n. 700.
Beinwelle p. 264. n. 689.
Beißerling p. 83. n. 207.
Benedicten-Wurtz / Kraut/ p. 36. n. 96.
Waßer- und Wald-Benedicten-Wurtzel p. 37. n. 97.
Bengel-Kraut p. 163. n. 439.
Berg-Kraut p. 144. n. 401.
wilder Bertram p. 63. n. 150.
Wiesen-Bertram mit zerkerbten Blättern. ibid.
Besem-Kraut vid. Stabwurtz.
groß Besem-Kraut p. 130. n. 362.
weiß Betonien p. 279. n. 725.
Beyfuß p. 19. n. 47.
Bibenel p. 195. n. 537.
groß Bibenel/ Stein-Bibenel ibid.
grosse Welsche Bibenel/ p. 196. n. 539.
Bieber-Kraut. vid. Tausend Gulden-Kraut.
Bieber-Wurtz p. 78. n. 193.
Biesem-Kraut p 220. n. 594.
Bingel oder Bengel-Kraut-Weiblein p. 162. n. 439.
wild Bingel-Kraut Weiblein p. 136. n. 440.
weiß Bilsen-Kraut p. 127. n. 353.
groß weiche Binsen p. 130. n. 364.
blühende Waßer-Binsen p. 131. n. 365

glatte

glatte Waßer-Binsen p. 131. n. 366.
schlechtköpfichte kleine Cyper-Binsen p. 131. n. 367.
Binzen-Halm p. 118. n. 321.
gemeine Birck p. 25. n. 66.
Hangel-Birck p. 26. n. 67.
Birckling p. 82. n. 205.
wilder Birn-Baum p. 211. n. 583.
Bitterling p. 82. n. 203.
Bladloß p. 252. n. 686.
ein Blat mit Zwieblechter Wurtzel p. 180. n. 501.
zwey Blatt p. 180. n. 500
- - mit zwieblechter Wurtzel p. 181. n. 502
Fünff Blatt p. 217. n. 586.
Blaubeeren. p. 288. 289. n. 748
Blumen-Kraut p. 187. n. 517.
groß Blutt-Kraut p. 196. n. 539.
groß Blutt-Tröpflein p. 196. n. 539.
Blutt-Kraut p. 28. n. 71. p. 201. n. 552. 553.
Bocks-Beeren p. 122. n. 334.
Bocks-Kraut p. 133. n. 371
Bocks-Bart/ geeler breitstenglichter p. 270. n. 703. p. 271. n. 704.
Bogen-Holtz. vid. Eibenbaum.
Sau-Bohnen. vid. Bilsenkraut
Bollen p. 205. n. 560.
Brand p. 292. n. 758 &c.
Braunellen p. 208. n. 573.
groß Waßer-Braun-Wurtz. vid. Creutz-Neßel.
Braun-Wurtz p. 250. n. 653.
Brenn-Kraut p. 221. n. 598.
Brenn-Kraut vid. Welck.
Brombeeren p. 232. n. 619.
Bruchwurtz p. 71. n. 174. 176
Bruch-Kraut p. 202. n. 554.
Brunel mit weißer Blüth. p. 209. n. 573.
Brunitschken p. 234. n. 622.
Brust-Kraut p. 39. n. 99.
rothe Büche oder Buchbaum p. 72. n. 179.
Buch-Aeschen p. 188. n. 520.

C.

Calmus p. 6. n. 10
Camillen / Chamillen-Blum vid. Romey.
S. Christoffels-Kraut p. 4. n. 7
wilde Christus-Aeuglein p. 148. n. 409.
Corallen-Kraut vid. Spargen
wilde Corinthen. p. 122. n. 335.
Corneel-Baum p. 55. n. 139.
Creutz-Blum/ blau/ braun und weiß p. 182. n. 505. p. 200. n. 549.
Creutz-Holtz / Creutz-Beer/ p. 230. n. 615.
Creutzwurtz/ Creutz-Kraut p. 101. n. 267. p. 252. n. 658.
wald-Cypreß p. 170. n. 464.

D.

Dagget p. 27. n. 67.

Degen-

Degen-Kraut p. 260. n. 681.
großer Dennmarck vid. Baldrian.
krotten Dill Hunds-Dill vid. Hunds-Romey.
Kuh-Dill p. 45. n. 117.
Acker-Diestel/ Haber-Diestel p. 34. n. 90. breitblätterig Speer-Diestel p. 34. n. 91. vielstachlichte Acker-Diestel mit schmalen Blättern/ p. 34 n. 92. Weg-Diestel p. 216. n. 684. Dreum-Diestel/ drey-Diestel p. 50 n. 127. Fliegen-Diestel/ Mücken-Diestel p. 22. n. 55. groß Garten-Diestel/ braun Karten-Diestel p. 62. n. 148. Säu-Diestel mit breiten und schmalen zerschnittenen Blättern p. 257. 258. n. 672. 673. mit spitzigen und absätzigen Blättern/ ibid. n. 675. Vielstachlichte Wiesen-Diestel mit schmalen Blättern p. 35. n. 93.
Doll-Kraut. vid. Bilsen-Kraut.
Doll-Wurtz p. 257. n. 671.
Dorn/ Sommer-Dorn p. 61. n. 145. Marien-Dorn p. 232. n. 618. Weg-Dorn-Beer p. 230 n. 615. schmaler weidenblättriger Stech-Dorn p. 230. n. 616. Stech-Dorn der ander p. 231. n. 616 Purgierende Stech-Dorn oder Creutz-Beer p. 230. n. 615.
Dort. p. 121. n. 331.
Dosen-Kraut/ Alb-Kraut p. 70. n. 174.
Dost/ Wirbel-Dost p. 50. n. 126. Waßer-Dost p. 70. n. 174. weiß Waßer-Dost p. 71. n. 175. gemein Dost p 185. n. 512. brauner und weißer Feld-Dost p. 185. n. 512. p. 186. n. 513.
Dotter/ vid. Lein-Dotter.
Dotter-Bluhm/ vid. Kuh-Bluhm.
Drachen-Wurtz p. 6. n. 10. p. 62. n. 149.
Drespe p. 121. n. 331
Drunckel-Beeren p. 288. n. 747.
Drüß-Wurtz p. 222. n. 598.
Dreyfaltigkeit-Bluhm p. 286. n. 741.
Dürr-Wurtz/ scharffe/ blaue/ p. 52. n. 134. Waßer-Dürr-Wurtz mit zerschnittenen Blättern p. 53 n. 135. Dürr-Wurtz mit Kugel-runder Blüth. item kleine Dürr-Wurtz ibid. Waßer Dürr-Wurtz mit tieff und schlecht zerschnittenen Blättern p. 54. n. 127. 128.

Dürr-

Dürr-Kraut p. 202. n. 554.
Durchwachs/ gelb. p. 29. n. 73.
Durchwachs-Männlein/ p. 180. n. 500.

E

Eber-Wurtz p. 35. n. 94.
Egel-Kraut/ groß und klein p. 177. n. 492.
Ehren-Preiß p. 282. n. 730.
Eiben-Baum p. 266. n. 693.
Eiche/ Eich-Baum p. 211. n. 584.
Erd-Eiche/ Erd-Eichel p. 73. n. 187.
Meer oder See-Eiche mit Blasen p. 216. n. 585.
Eichen-Lung p. 172. n. 473.
Ein-Beer p. 257. n. 671.
Ein-Blatt p. 141. n. 396. mit Zwieblechter Wurtzel p. 180. n. 501.
Eisenhart/ Eisen-Kraut/ Eiserich p. 5. n. 8. p. 281. n. 719.
Eisen-Kraut p. 69. n. 171. vid. Creutz-Wurtz.
Elisabeth-Kraut p. 43. n. 113.
Endten-Flott p. 139. n. 389.
Elren-Baum p. 10. n. 19.
Engel-Blümlein/ weiß und braune p. 107. n. 280.
Engelsüß p. 204. n. 559.
Berg-Eppich/ Berg-Peterlein p. 18. n. 45.
Waßer-Eppich/ Waßer-Epff Waßer-Peterlein p. 223. n. 600. p. 255. n. 667.
dreyspitziger Waßer-Eppich p. 139. n. 390.
Frosch-Eppich p. 255. n 667.
Feig-Blätter-Eppich p. 223. n. 600.
Waßer-Epheu p. 139. u. 390.
kleiner Baum- und Wald-Epheu p. 122. n. 336. Erd-Epheu p. 123. n. 337.
Erdbeer-Kraut/ gemein und weit kriechend p. 75. n. 188. 189.
Erd-Gall. vid. Tausendgülden-Kraut.
Erd-Rauch p. 77. n. 192. mit runder hohler und dichter Wurtzel p. 78. n. 193. 194.
Erd-Schmeer. p 91. n. 235.
Erd-Spinnen-Kraut ohne Ast/ p. 193. n. 533.
Erwenwürger p. 186. n. 515.
Esch-Baum/ Eschern-Holtz/ Stein-Eschern p. 76. n. 190.
Esels-Huff/ vid. Huff-Lattich
Espen p. 205. n. 561.
Eyer-Blum p. 61. n. 145.

F.

Farb-Kraut/ gelb p. 101. n. 266.
Farn-Kraut p. 73. n. 182. großästiges ohngezähntes Farn-Kraut/ p. 74. n. 183. kleinästiges/ gezähntes Farn-Kraut ibid. n. 184. gezähntes

tes Waßer-Farn-Kraut ibid. p. 185. Baum-Farn/ p. 204. n. 559.
Faul-Baum/ Hüner-Augen/ p. 11. n. 20. p. 42. n. 111.
Feder-Nägelchen p. 40. n. 105.
Feigwartzen-Kraut p. 250. n. 653. vid. Geßel-Blum.
Feld-Kümmel/ groß/ klein und kriechender p. 253. n. 659. 660. 661.
Fenchel/ Waßer-Fenchel/ p. 165. 166. n. 443. 446. 448.
Ferber-Blumen p. 101. n. 266.
Fichten/ wilder Fichten-Baum p. 196. n. 540.
Fieber-Kraut/ vid. Tausend-Gülden-Kraut p. 165. n. 425
Filtz-Kraut/ p. 59. n. 141.
Fingerhutt/ geel/ p. 61. n. 147.
Fünff Finger-Kraut/ p. 217. n. 587.
Fisch-Molde. p. 28. n. 70.
Flachs-Seide/ Flachs-Dotter/ p. 59. n. 141. Matten-Flachs/ Wiesen-Flachs/ p. 114. n. 307. wilder Flachs/ unser Frauen Flachs/ Kröten-Flachs/ p. 142. n. 397. p. 112. n. 300.
Flederöhrchen/ p. 92. n 236.
Fliegen-Blumen p. 181. n. 503
Flocken-Blum/ groß/ schwartz/ mit schupfichten Köpffen/ p. 128. n. 355. mit weißer Blüth ibid. n. 336. mit zerschnittenen Blättern und schuppichten Köpffen p. 129. n. 357. breitblättrige Flocken-Blum mit haarichten Köpffen ibid. n. 358. weißblühende Flocken-Blum mit haarichten Köpffen. ibidem n. 359.
Flöh-Kraut/ p. 53. n. 136. scharff/ gelind/ klein Flöh-Kraut-Männlein ũd Weiblein/ p. 191. 192. n. 528. 530.
Fotz-Wein/ Fotzzwang/ vid. Wolffs-Bohnen.
unser Frauen Mantel vid. Sinnau.
unser Frauen Schühlein/ p. 145. n. 402.
unser Frauen Flachs p. 142. n. 397.
Frembde Sorge/ p. 286. n. 741.
Freysam-Kraut/ p. 187. n. 517. p. 286. n. 741.
Frosch-Biß. p. 179. n. 496.

G.

Galeise. p. 101. n. 266.
Gänse-Blum p. 31. n. 81. große Gänse-Blum/ p. 24. n. 61.
Gänserich/ kriechender Gänserich mit raugen grauen Blättern p. 207. n. 570. großer gerader Gränsing mit raugen grauen Blättern p. 207. n. 571.

Gän-

Gänse-Füß p. 23. n. 58.
Gäns-Kraut p. 207. n. 569
Gänsichen p. 86. n. 221.
Garb/ Waßer-Garb / oder Waßer-Violen mit nackten Stengeln p. 166. n. 448. groß Garben/ groß Garben-Kraut p. 164. n. 442. Feld-Garb/ weiße Garb. ibid. Waßer-Garb mit geelen Blümlein p. 165. n. 444. knotichte mit kleinen weißen Blümlein ibid. n. 445. Fademblättrige Garb ibid. n. 446. Feder-Waßer-Garb ibid. n. 447.
Gaßen-Wurtz. p. 135. n. 379.
Gauch-Blum p. 41. n. 108.
Gauch-Brodt vid. Bocksbart
Gauchheil p. 14. n. 32. vid. Wolffs-Bohnen.
Gauch-Haber p. 73. n. 180.
Geelöhrchen p. 81. n. 200. Holtz-Geelörchen p. 90. n. 233.
Geiß-Bart p. 23. n. 60.
Geiß-Fuß. p. 16. n. 40.
Genst/ Genster p. 101. n. 266.
Gelenck-Wurtz p. 200. n. 550.
Gentian (klein) p. 101. n. 267.
S. Georgen-Wurtz p. 187. n. 517.
Gertlein/ Gertel/ Gertwurtz/ p. 170. n. 464.
Gerwel p. 164. n. 442.
Gerstenthwalch vid. Gauch-Haber.
Gersten-Brand p. 293. n. 760.
Gessel-Blum p. 46. n. 119.
Gicht-Beeren p. 122. n. 334.
Gicht-Kraut p. 105. n. 276. vid. Himmels-Schlüßel.
Giersch/ Hund-Giersch p. 16. n. 39. 40.
Gil-Blum p. 101. n. 266.
Glattling p. 83. n. 206.
Glieder-Kraut p. 160. n. 433.
Glied-Kraut p. 149. n. 411. p. 254. n. 664.
Gliedweich p. 149. n. 411.
Glocken-Blum/ blau und weiß p. 33. n. 87. 88. p. 225. n. 605. Wind-Glocken/ Zaun-Glocken p. 51. n. 131. Wald-Glöcklein p. 61. n. 147. klein Glöcklein p. 230. n. 614. blaue Glocken ibid.
Gold-Blum mit Rheinfahr-Blätter p. 47. n. 120.
Goldwiesen-Blum/ vid. Kuh-Blum.
Goldwurtz p. 141. n. 394. vid. Schin-Kraut.
Gotts-Bärtlein p 196. n. 539
Gottes Gnad p. 105. n. 276.
Gottheil p. 208. n. 573.
Gottes-Vergeß p. 159. n. 430.
Grähnen-Holtz/ vid. Thanne.
Gränsing vid. Genserich.
Graß / 49. zigerley. Besiehe nach

nach der Ordnung von p. 107. biß 121. von n. 284. biß 332.
Gried/ Berg-Griedt p. 118. n. 321.
Grind-Kraut vid. Creutz-Wurtz. Schaff-Grind-Kraut p. 229. n. 612. 613.
Grind-Magen p. 188. n. 525
Grind-Wurtz/ deßen Blätter eine Elle lang p. 135. n. 377. klein Waßer-Grindwurtz p. 135. n. 378. Grindwurtz mit hohlen rundlechten Blättern p. 135. n. 379. Grindwurtz mit spitzen krausen Blättern p. 135. n. 380.
Grinsing p. 207. n. 569.
Grüßling p. 86. n. 220.
Grundheil vid. Ehrenpreiß.
Grunsig p. 207. n. 569.
Guckgucks-Blum p. 41. n. 108.
Güntzel; Gülden Güntzel p. 50. n. 128. blau Gülden-Güntzel ibid. roth Gülden-Güntzel ibid. n. 129. roth Güntzel vid. Tormentil.
Gundreb/ Gundelreb p. 123. n. 337.
Gürtel-Kraut p. 169. n. 463.

H.

Haar-Schaar und Teuffels-Klauen. p. 169. n. 463.
Haarstrang p. 178. n. 493.
Haarwurtz ibid, (Diestel.
Haber-Diestel vid. Acker-Haber-Graß p. 73. n. 180. Gauch-Haber / Mauß-Haber/ Taub-Haber p. 73. n. 180.
Haberbrandt p. 293. n. 761.
Habicht-Kraut (klein) mit Wegwarten-Blättern p. 124. n. 343. unrauhes Habicht-Kraut mit Wegwart-Blättern ibid. n. 344. wild-Habicht-Kraut p. 125. n. 345. rauhes Habicht-Kraut mit breiten Blättern und großer Blüth ibid. Berg-Habicht-Kraut mit breiten unzerschnittenen Blättern p. 125. 346. Astiges Berg-Habicht-Kraut mit rauhen Blättern p. 125. n. 347. klein Berg-Habicht-Kraut mit breiten unraugen Blättern p. 126. n. 348. Großstaudiges Habicht-Kraut mit schmalen Blättern p. 126. n. 349. Habicht-Kraut mit Pfaffen-Oehrleins Blättern p. 126. n. 350. Wegwarten-Habicht-Kraut ibid. Habicht-Kraut mit langlechten und am Rande stachlichten Blättern p. 126. 127. n. 351.
Händchen p. 49. n. 264.
Händel-Kraut/ Hüner-Rauten p. 13. n. 26. Waßer-händ-

händleins-Wurtz mit glatten schmalen Blättern p. 181. n. 504. Händleins-Wurtz p. 182. n. 505. gesprengte Händleins-Wurtzel ibid. mit gehelmter lichtgrüner Blüth n. 506. umbgekehrt mit weißer Blüth ibid. n. 507
Hänlein / Waßer-Hänlein / Fluß-Hänlein p. 223. n. 601. gelb und weiß Wald-Hänlein p. 219. n. 592. 593.
Hagedorn p. 163. n. 441.
Hahnen-Bein / p. 110. n. 289.
Hahnen-Fuß / Biesem-Hanen-Fuß p. 220. n. 594. rauger Wald-Hanen-Fuß mit Benedicten-Wurtz Blättern / p. 220. n. 595. scharffer / wilder / gelber Acker- und Wiesen-Hahnen-Fuß p. 221. n. 596. kriechender Wiesen-Hanenfuß / Weingart-Hahnen-Fuß ibid. n. 597. Rüben-Hahnen-Fuß / p 222. n. 598. ungefüllter Garten-Hahnen-Fuß. Acker Hahnen-Fuß mit stachlichten Köpffen p. 222. n. 599. Glatter Eppich-blättriger Waßer-Hahnenfuß / p. 222. n. 600. groß lang Waßer- oder Speer-Hahnen-Fuß p. 223. n. 603. langer Waßer-Hahnen-Fuß p. 224. n. 604. Hahnen-Fuß mit Wolffswurtzhafftigen Blättern / da ein rundes Blat an der Wurtzel sitzt p. 225. n. 605.
Hahn-Hödlein p. 70. n. 173
Hahnen-Kamm / p. 190. n. 525.
Hahnen-Kamp / p. 54. n. 157.
Hahnen-Kopff p. 179. n. 498.
Hackel-Kraut / p. 209. n. 575.
Hanbuttten oder Han-Rosen p. 232. n. 618. wilde fleischfarbe riechende Hanbutten oder Feld-Rosen / p. 131. n. 618.
Handschuh-Blumen vid. Himmels-Schlüßel
Hals-Kraut / gemein Neßelblättericht scharffes Hals-Kraut p. 32. n 84. Neßelblättericht Hals-Kraut mit weisser Blüth p. 33. n. 85. klein Hals-Kraut mit deicht aneinander gesetzten Blumen p. 33 n. 86. (n. 89.
Hanff / wilder Hanff p. 33.
Harn-Kraut p. 202. n. 554. Groß Harn-Kraut p. 142. n. 397. Meer-Harn-Kraut mit wolriechenden Blumen p. 192. n. 398.
Hartz-Baum p. 196. n. 540.
Hart Riegel p. 55. n. 39.
Hasel-Nuß / Hasel-Baum / Hasel-Strauch p. 55. n. 140.

Geele Haasel-Blumen / p. 219. n. 592.
Hasel-Wurtz p. 19. n. 49.
Hasen-Aug vid. Benedicten-Wurtz.
Hasen-Brodt / Hasen-Oehrlein p. 112. n. 300. p. 92. n. 240.
Hasen-Fuß p. 274. n. 714.
Hasen-Pfötlein p. 107. n. 280. p. 273. n. 710.
Hasen-Graß p. 112. n. 300.
Hasen-Kohl / vid. Kohl.
Hasen-Klee p. 273. n. 716
Häubüchen oder Haynbüchen p. 188. n. 520.
Haugenblum vid. Romey.
Hauhechel / braun / mit und ohne Stengel / p. 17. n. 41. 42.
Hauß-Lauch / Haußwurtz / groß und klein p. 251. 252. n. 655. 656.
Hederich p. 69. n. 171. Hederich oder Heiden-Rettich / p. 228. n. 610. Waßer-Hederich p. 227. n. 609.
Heer-Moß / vid. Moß.
Heidelbeer p. 288. n. 748.
Heiden p. 67. n. 163. schmalblättrige Heide mit schwartzen Beeren p. 67. n. 164.
Heinrich / stoltzer guter Heinrich / p. 136. n. 381.
Heid-Näglein / vid. Näglein.
Heidnisch Wund-Kraut / vid. Wund-Kraut.
Heil aller Schaden p. 102 n. 277.
Heil aller Welt vid. Benedicten-Wurtz.
Heilblat p. 267. n. 695.
Heil-Kraut / gülden Heil-Kraut p. 43. n. 113.
Helm-Kraut / Waßer-Helm-Kraut p. 165. n. 444.
Hendel-Kraut / vid. Händel-Kraut.
Herbstling p. 82. n. 204.
Hertz-Freude / vid. Meeßke.
Hertz-Gespan p. 159. n. 432. Hertzgesperr und Hertz-Kraut. ibid.
Heyd / vid. Heid.
Heydecker / vid. Tormentill.
Heydenschmuck p. 101. n. 266
Heydnische Blumen p. 141. n. 394.
Himels-Brand / vid. Welck.
Himmels-Schlüßel / p. 279. n. 725.
Hindbeeren p. 233. 234. n. 621
Hirnschaal / p. 188. n. 521.
Hirsch-Mülde / p. 23. n. 59.
Hirsch-Brunst / p. 95. n. 250.
Hirsch-Kraut / p. 78. n. 139. vid. Ulffrancken.
Hirsch-Wund-Kraut p. 70. n. 174.
Hirsch-Wurtz / p. 254. n. 663.
Hirse / Wald-Hirse / p. 161. n. 435. Meer-Hirse / erhabene

bene grosse Meer-Hirse/ p. 142. n. 399. kleine Meer-Hirse p. 143. Acker-Meer-Hirse p. 143. n. 403. wilde ibid. braunechte Wald-Hirse p. 160. n. 434. breitblättrige gelbe Wald-Hirse ibid.
Hirten-Tasch / Hirten-seckel/ vid. Täschel-Kraut.
Hödlein/ Fuchs-Hödlein / p. 181. n. 503. Einhödlein-Wurtz mit lichtgrüner Blüht / p. 184. n. 510.
Hochmuth und Muthwillen p. 40. n. 105.
Hollunder/ Holder / Holder-Baum/ p. 240. n. 638. Wasser - Hollunder mit schlechter Blüth p. 243. n. 640.
Hollwurtz/ kleineste Hollwurtz p. 220. n. 554. runde/ feste/ gemeine Hollwurtz p. 78. n. 193. 194.
Höltzken p. 157. n. 429.
Holtz-Aepffel ibid.
Holtz-Birn/ vid. Kruschken/ p. 211. n. 583.
Hopffen/ wilder Hopffen p. 273 n. 710. fruchtbahrer/ zahmer Hopffen p. 146. n 405. unfruchtbahrer Hopffen p. 147. n. 406. Hopfen-Kühn p. 147. n. 405.
Huff-Lattich vid. Lattich.
Hüner-Augen vid. Faulbaum. p. 11. n. 20.
Hüner-Biß/ vid. Meyer. Hüner - Biß mit Gundelreb Blättern p. 135. n. 376.
Hünerdarm mit Ehrenpreiß Blättern p. 13. n. 27. mit Epheu- Blättern p. 13. n. 28. mit Gamanderlein Blättern p. 13. n. 30. Meer-Hünerdarm p. 12. n. 22.
Hüner-Füll vid. Pfefferkraut
Hüner-Rauten vid. Händel-Kraut.
Hunds-Aug. p. 45. n. 117. p. 53. n. 136.
Hunds-Blum p. 61. n. 145.
Hunds-Graß p. 127. n. 352.
Hunds-Milch/ vid. Wolffs-Milch.
Hunds-Romey/ p. 44. n. 116.
Hunds-Kirschen p. 42. n. 112.
Hundswürgel p. 203. n. 556.
Hunds-Violen p. 285. n. 740.
Hunds-Zahn/ p. 127. n. 352.
Hunds-Zung / kleine / auch große gemeine mit Blumen/ p. 60. n. 143. p. 64. n. 153.

J.

S. Jacobs-Blum/ S. Jacobs Kraut p. 129. n. 360. mit Winter - Kreß - Blättern/ ibid. n. 361.
Je länger je lieber p. 257. n. 670.

Igels-

Igels-Knospen p. 260. n. 681.
Immer-Grün/ p. 251. n. 655
S. Johannes-Blum p. 24. n. 61.
S. Johannes-Kraut/ p. 128. n. 354.
S. Johannis/ zahme/ wilde und schwartze Beerlein/ Träublein p. 121. 122. n. 333. 334. 335.
Johannis-Würmlein p. 203. n. 556.
Isen-Kraut vid. Eysenhart.
Isopp. Berg-Isopp oder Heiden p. 43. n. 113 wilder Isop/ Kirch-Isop/ Kalbs-Isop/ Zwiebel-Isop. p. 245. n. 643.
Jungfrau/verfluchte Jungfrau p. 48. n. 121.
Jungfer-Tritt. p. 201. n. 552.
Jungfer-Graß p. 202. n. 554.
Jungfrauen-Haar. p. 7. n. 11.

K.

Kälberkropff / Kälber-Korn/ p. 175. n. 486.
Karten-Diestel/ p. 62. n. 148.
Kaninchen-Baum/ vid. Wasser-Hollunder.
Katten-Poten/ p. 65. n. 155.
Kattich/ p. 132. n. 368.
Katzen-Käßchen/ p. 157. n. 428.
Katzen-Klee/ p. 273. n. 710.
Katzen-Müntz/ p. 162. n. 437.
Katzen-Kraut/ zahm. p. 162. n. 437.
Katzen-Körbel-Kraut/ p. 77. n. 192.
Katzen-Leiterlein/ p. 169. n. 463
Katzen-Apt/ p. 162. n. 437.
Katzenschwantz / klein und groß p. 65. n. 157. p. 274. n. 714.
Katzenwädel/ p. 65. n. 158.
Katzenträublein/ p. 252. n. 656
Katzenwurtzel/ vid. Baldrian.
Kellers-Halß p. 139. n. 388.
Kellerwurtz/ p. 178. n. 493.
Kertz/ Unholden-Kertz / Feld-Kertz/ vid. Welck.
Keulwurtz/ p. 178. n. 493.
Kien-Holtz / Kiefer-Holtz p. 196. n. 540.
Kirschen/ Ahl-Kirschen / vid. Faulbaum. Hunds-Kirschen/ Teuffels-Kirschen/ p. 42. n. 112. schwartze Teuffels-Kirschen.
Klapper/ p. 190. n. 525.
Kleb-Kraut/ p. 17. n. 43.
Klee-Blume/ p. 145. n. 402. Buch-Klee/ ibid. Hertz-Klee Hirtz-Günstel/ Hertz-Wund-Kraut. p. 70. n. 174. Geeler Haasen-Klee. p. 144. n. 401. kleine unrauge fünffblättrige gelbe Schoten-Klee/ p. 145. n. 402. Horn-Klee/ Honig-Klee ibid. wilder/ gemeiner oder grosser/ item geeler

geeler Stein-Klee. p. 161. n. 436. braun Wiesen-Klee p. 272. n. 707. weiße Wiesen-Klee ibid. n. 708. geeler Wiesenklee ibid. n. 709. weisser spitziger Berg-Klee/ p. 273. n. 711. Groß brauner Berg-Klee/ p. 273. n. 712. großer Geiß-Klee p. 273. n. 713. Bieber-Klee p. 272. n. 706 Spitz-Klee p. 272. n. 708. Feld-Klee ibid. n. 709. Katzen-Klee p. 273. n. 710. 714. Hasen-Klee p. 274. n. 714. 716. grosser Stein-Klee p. 274. n. 715. Guckgauch-Klee p. 275. n. 716. Buch-Klee/ Saur-Klee ibid. Gülden-Klee/ Hirsch-Klee p. 275. n. 717.

Klette/ grosse Klette mit weissen Blumen p. 137. n 383. mit Purpurfarben Blumen p. 136. n. 382. kleine Klette p. 137. n. 384. Igels-Kletten ibid. Leber-Kletten p. 71. n. 176. Bürenkletten p. 136. n. 382. Roß-Kletten ibid.

Kletten-Kraut p. 60. n. 144.

Knabenwurtz / wilde / item dunckle mißgebürtige Knabenwurtz p. 184. n. 511.

Knavel/ Knäwel p. 203. n. 556

Knoblauch/ Knoblauch-kraut Wald-Knoblauch/ Hunds-Knoblauch / Acker-Knoblauch p. 8. n. 15. 16. Berg-Knoblauch mit Purpurfarber Blüth p. 9. n. 17. Berg-Knoblauch mit runden Purpur-farben Köpflein p. 9. n. 17. Lacken-Knoblauch/ Wasser-Knoblauch p. 248. n. 650.

Kolben / Narrenkolben/ See-Kolben/ Moßkolben/ Deitelkolben/ p. 277. n. 719.

Kölbleskraut/ groß p. 196. n 539

Königs-Blum. p. 5. n. 8.

Königs-Braut p. 71. n. 176.

Königskertze vid. Welck.

Kohl/ Acker-Kohl mit bleichgelben Blumen p. 228. n. 610. Hasen-Kohl p. 258. n. 674. Kuckucks-Kohl p. 275. n. 716.

Körbel / wilder Körbel p. 175. n. 486. mit scharffem Saamen p. 175. n. 487. so keinen Geruch hat. ibid.

Korn/ Kälberkorn p. 175. n. 486. Taub-Korn p. 121. n. 331. groß Tausendkorn p. 202. n. 554.

Korn-Blum/ p. 60. n. 142.

Korn-Brand p. 293. n. 759.

Korn-Müntz/ p. 31. n. 82.

Kozelar / schwartz und weiß/ p. 84. n. 210.

Kräen-Beeren p. 67 n. 164.

Kramot-Baum vid. Wacholder.
Kranich-Schnabel vid. Storch-Schnabel.
Kratzelbeeren/ blaue p. 233. n. 620.
Kreß/Meer-Kreße p. 60. n. 107 wilde Kreß p. 130. n. 362. Brun-Kreß/ Wasser-Kreß die erste und andere p. 176. n. 489. 490. Wiesen-Kreß mit großer Blüth ibid. wilde Kreß mit gantz kleinē zertheilten Blättern ibid.
Kröstincken/ oder Kerstienken-Kraut p. 53. n. 136.
Kreutz-Beer vid. Creutzbeer.
Krottenstiel/ groß und klein/ p. 93. n. 242. 243.
Kröten-Graß p. 115. n. 312.
Kruschken p. 211. n. 583.
Küchern/ braunrothe frühzeitige Wald-Küchern p. 187. n. 518. Würffelsaamichte Küchern mit Wicken-Blättern ibid. wilde Küchern/ p. 138. n. 385.
Küh-Blum p. 32. n. 83.
Kuhmilden p. 85 n. 217.
Kuchen-Schellen p. 209. n. 575.
Kürbeeren p. 55. n. 139.
Kürbs/ Hundes-Kürbs p. 29. n. 75.
Kühwurtz/ Küh-Kraut p. 163. n. 439.
Kunigund Kraut Weible / p. 54. n. 128.

L.

Lab-Kraut vid. Meyer-Kraut.
Läuße/ Bettlers-Läuse p. 137. n. 384. Buben-Läuse/ Igels-Läuse. ibid.
Läuse-Kraut p. 139. n. 388. geel Läuse-Kraut p. 190. n. 525. Läuse-Kraut mit Purpurfarben-Blumen ibid. n. 526. braun Läuse-Kraut/ braun Wiesen-Läuse-Kraut ibid. mit weissen Blumen p. 191. n. 527.
Lahke p. 83. n. 207.
Lakaritze. p. 106. n. 279.
Lattich/ Weg-Lattich/ Wiesen-Lattich/ Hunds-Lattich p. 61. n. 145. Butter-Lattich p. 135. n. 379. Huff-Lattich p. 276. n. 718. Brand-Lattich ibid. Brandletzschen ibid. kleiner Brunn- oder Frosch-Lattich p. 206. n. 566. Lämmer-Lattich p. 278 n. 723.
Lauch/ Ziegen-Lauch/ p. 186. n. 514.
Lauchel/ vid. Knoblauch-Kraut
Laurin/ Aurin/ vid. Tausend-Gülden-Kraut.
Leber-Blumen/ weisse/ p. 108. n. 284. braune/ p. 196. n. 539

Leber-

Leber-Klätten/ vid. Kletten.
Leber-Kraut/ p. 140. n. 393. Stein-Leber-Kraut/ braun Leber-Kraut/ ibid. Stein-Leber-Kraut vid. Meeßke. blau Gülden Leber-Kraut/ Edel Leber-Kraut p. 275. n. 717.
Lein-Baum p. 3. n. 4.
Leindotter mit langen Schoten p. 174. n. 483. rauger Leindotter mit runden Schotlein p. 175. n. 485.
Lein- und Harn-Kraut p. 142. n. 397.
Lerchen-Klau p. 51. n. 130
Liebstock/ wilder p. 49. n. 124.
Lilgen/ Lilien/ groß Lilgen. p. 193. n. 533. bleichrothe punctirte wilde Lilien/ p. 141. n. 394. Berg-Lilien/ heidnische Lilien ibid. Waßer-Lilien/ p. 178. n. 493.
Lilgen-Convalgen. vid Mäyen-Blümlein.
Linde/ Linden-Baum p. 268. n. 700. Stein-Linden p. 260. n. 754.
Linsen/ Waßer-Linsen/ p. 139. n. 389. Meer-Linsen ibid. Sichel-Linsen p. 151. n. 654 groß kriechende Linsen p. 274 n. 715.
Linsen-Kraut/ klein kriechend Linsen-Kraut mit vierekkichter Frucht p. 139. n. 391 schmalblättericht und zerschnittenes p. 140. n. 392.
Löwen-Fuß/ vid. Sinnau.
Löwen-Zahn p. 61. n. 145.
Lob-Kraut/ p. 100. n. 265.
Löffel-Kraut/ Frosch-Löffel-Kraut/ p. 199. n. 547.
Lorbeeren/ Scheiß-Lorbeeren p. 139. n. 388.
Lülch/ Lolch p. 121. n. 331.
Lungen-Blumen p. 102. n. 268
Lungen-Kraut p. 172. n. 473.
Lungen-Mooß mit dunckeln Wurtzeln p. 172. n. 474.

M.

Madelgeer vid. Modelgeer.
Mähl-Baum p. 163. n. 441
Magd-Blum vid. Romey.
Magsahmen/ Feld-Magsaamen p. 188. n. 521.
Mälde/ Hirsch-Mälde/ p. 23. n. 59.
Mangolt/ Hirsch-Mangolt/ p. 265. n. 690. Holtz-Mangolt p. 210. n. 577. Wald-Mangolt p. 210. n. 577. wilder Mangolt p. 135. n. n. 379. Wiesen-Mangolt.
Mans-Treue/ Meer oder See-Mans-Treue p. 69. n. 170.
Margendrehen p. 184. n. 511.
Margen-Graß p. 111. n. 297.

Margen-Rößlein roth/ und wild p. 148. 149. n. 409. 411.
Marien-Graß p. 111. n. 297.
Marien-Rößlein/ klebrichte weiße mit Ohrlöffel-Kraut Blättern p. 150. n. 414.
Marien-Neßel p. 162. n. 437.
Maßholder vid. Leinbaum.
Maßlieben/ große und kleine Maßlieben p. 24. n. 61. 62. Große gelbe Maßlieben p. 25. n. 63. große gelbe Maßlieben mit tieff zerschnittenen Blättern p. 25. n. 63.
Matten-Flachs p. 114. n. 307.
Maur-Näglein p. 39. n. 104.
Mäuß-Oehrlein p. 107. n. 280 blaue Mäus-Oehrlein p. 63 n. 151. blaue Waßer-Mäuß-Oehrlein p. 64. n. 153. groß gerades Mauß-Oehrlein p. 193. n. 534. kriechendes/ rauges/ kleines p 193. n. 535 536. weiße Acker-Mäuß-Oehrlein p. 63. n. 152.
Mäuß-Oehrchen p. 92. n. 239.
Mäuß-Schwäntzlein p. 127. n. 352.
Mayholtz p. 238. n. 630.
Medesüß/ Med-Kraut p. 23. n. 60.
Meer-Fadem/ Meerstrang/ p. 75. n. 186.
Meer-Graß p. 7. n. 14. rund-blättriges und in der Spitz zweyspaltiges Meer-Graß p. 77. n. 191.
Meer-Harn-Kraut vid. Harn-Kraut.
Meer-Hirse/ vid. Hirse.
Meer-Hünerdarm/ vid. Hünerdarm.
Meer-Kresse/ vid. Kreße.
Meer-Mans-Treu/ vid. Mans-Treu.
Meer-Nägelein p. 40. n. 107
Merrettich/ Merrich p. 226. n. 607.
Meerstachel-Wurtz/ p. 133. n. 371.
Meerwurtzel/ p. 69. n. 170.
Meeßke p. 21. n. 52.
Meger-Kraut p. 166. n. 449.
Meliß/ wilde Meliß p. 254. n. 665.
Mengolwurtz/ wild p. 135. n. 379. krause spitze Mengolwurtz p. 136. n. 380.
Mercurius-Kraut p. 163. n. 439.
Mertzen-Blum p. 61. n. 145. weiße Mertzen-Blum p. 219. n. 593.
Mertz-Violen vid. Violen.
Meyē-Blümlein p. 141. n. 395
Meyer/ Meyer-Kraut/ groß und klein p. 12. n. 22. 23. 24. 25. p. 100. n. 265. rother Meyer p. 14. n. 32. weiß glat

glat Meyer-Kraut p. 18. n. 44. wilder Meyer p. 28. n. 70. kleiner und großer rother Meyer p. 28. n. 71. 72. groß Stern-Meyer-Kraut p. 166. n. 449. breitblättriges weißes Meyer-Kraut. Ibid.
Milch-Blum p. 200. n. 549. mit rundlechten Blättern p. 106. n. 278.
Miltz-Kraut / gülden Miltz-Kraut p. 246. n. 645.
Milde / Scheiß-Milde / Purgier-Milde p. 22. n. 57.
Mispel / Mistel / p. 287. n. 745
Modelgeer p. 101. n. 267.
Möhren / Busch-Möhren p. 175. n. 486. mit glattem Saamen / und raugem p. 175. n. 487. wilde dünnblättrige Möhren / p. 189. wilde Möhren / Esels-Möhren / p. 190. n. 524.
Mohn / Waßer-Mohn p. 178. n. 493. wilder Mohn p. 188 n. 521.
Morcheln p. 79. n. 195.
Morgenstern vid. Bocksbart
Moß / Heer-Moß p. 66. n. 160 gemein Erd-Moß p. 166. n. 450. Wald-Feder-Moß p. 167. n. 451. Feder-Moß / so auff alten Dächern sitzt / ibid. p. 452. gespitzter grosser ibid. gespitzter kleiner Feder-Moß mit ästigen Stängelchen p. 167. n. 454. klein kriechender Waldfahren Moß / ibid. n. 455. zweyblättriger liegender Moß / ibid. Moß mit breiten länglichten Blättern p. 168. n. 457. Stern-Moß / ibid. n. 458. Waßer-Moß mit runden ausgebreiteten Blättern / ibid. n. 459. ästiger Cypressen-Moß / ibid. dünner haarichter Bäum-Moß p. 168. n. 461. Maur-Moß p. 170. n. 465. Büchsenförmiger Erd-Moß p. 171. n. 466. Büchsenförmiger Stein-Moß n. 467. gerader / grauer Corallen-Moß n. 468. gerader Corallen-Moß mit röthlichen Hörnern n. 469. Langer Aschfarber Baum-Moß p. 171. n. 471. Meer-Moß p. 172 n. 475. langer See-Moß / n. 476. gehörnter Waßer-Moß n. 477. zähnichter Wasser-Moß p. 173. n. 478 subtieler Netzförmiger Wasser-Moß n. 479. Wasser-Moß von gantz zarten Fädemchen n. 480. mit gantz kleinen subtielen Blättertchen ibid. langer Wasser-

Moß/ so tieff unter der Erden gestanden p. 173. n. 482.
Moß-Beeren/ p. 289. n. 751
Moß-Blum/ Mott-Blum/ vid. Kuh-Blum.
Moß-Kolben p. 277. n. 719.
Motten-Blum vid. Rhein-Blume/ p. 64. n. 155.
Münchs-Blatt/ p. 61. n. 145.
Münchs-Kap. p. 5. n. 8.
Müntz/ Katzen-Müntz p. 162. n. 437. Vorgemüntz/ Stein-Müntz ibid. langblättrige wilde Roß-Müntz n. 438.
Müresmau p. 169. n. 462.
Mummeln/ geel und weiß p. 178. n. 493 495.
Mütterchen p. 99. n. 264.
Mutter-Kraut. vid. Susanken-Kraut.

N.

Nachtschatten p. 256. n. 669.
Näglein/ Acker-Näglein/ wilde rothe bärtige Nägelein/ Thier-Näglein/ kleine Maur- oder Weg-Näglein p. 38. 39. n. 100. 101. 102. 103. 104. Acker-Näglein mit grosser Blüth p. 38. n. 99. rauge Acker-Näglein mit grosser Blüth p. 39. n. 100. weisse Pflaum-Näglein/ Feder-Näglein p. 40. n. 105. weiße wilde Stein-Näglein p. 40. n. 106. Wald- und Heid-Näglein/ Meer-Näglein ibid. n. 107. Korn-Näglein p. 148. n. 410.
Näglein-Graß p. 39. n. 100.
Nabel-Kraut p. 142. n. 397.
Nardenwurtz p. 36. n. 96.
Narren-Kap. p. 5. n. 8.
Narrenkolben p. 277. n. 719.
Natter-Milch/ p. 248. n. 651.
Natterwurtz/ p. 28. n. 69.
Natter-Zung/ p. 177. n. 492.
Natter-Zunglein p. 179. n. 499.
Nept/ p. 162. n. 437.
Nessel/ taube oder todte Nesseln mit weissen/ gelben und blauen Blumen p. 133. n. 372. 373. 374. stinckende braune Wald-Nessel p. 134. n. 373. grosse stinckende taube Wald-Nessel p. 134. n. 373. kleine taube Nessel/ dessen Blätter umb den Stengel herum gehen p. 134. n. 376. Marien-Nessel/ p. 162. n. 437. taube/ wilde Nessel p. 291. n. 755. grosse brennende Nessel/ kleine brennende Eyter- oder heiter-Nessel/ p. 291. 292. n. 756. 757. Donner-Nessel p. 291. n. 756. Creutz-Nessel p. 248. n. 652.
Neßel-Rancken p. 59. n. 141.

Neun-

Neunheil und Neungleich / p. 169. n. 463.
Neunkrafft/ p. 193. n. 531.
Niese-Wurtz / breitblättrige Berg-Niesewurtz mit brauner Blüth p. 123. n. 339. wilde Nießwurtz mit weisser Blüth p. 124. n. 340. schmalblättrige Purpur-braune Berg-Nießwurtz p. 124. n. 341. schmalblättrige Wiesen-Nießwurtz mit weißbrauner Blüth p. 124. n. 342.
Nuß/ vid. Hasel-Nuß. Kleine Erd-Nuß p. 186. n. 514. Wasser-Nuß / Weiher-Nuß/ See-Nuß/ Stachel-Nuß / Spitz-Nuß p. 271. n. 705.

O.

Ochsenbrech p. 17. n. 41.
Ochsen-Zung/ wilde p. 64. n. 154. grosse schmalblättrige gemeine Ochsen-Zung p. 29. n. 76. weisse Ochsen-Zung/ p. 30. n. 76. Wald-Ochsen-Zung p. 30. n. 79. wilde Ochsen-Zung mit liegenden Stengeln p. 30. n. 79. wild-Ochsen-Zung p. 64. n. 154. rothe Ochsen-Zung p. 143. n. 400.
Odermennig/ p. 71. n. 176.
Ohrlöffelein-Kraut / p. 149. n. 413.
S. Otilien-Kraut p. 51. n. 130
Otter-Zung / kleine/ p. 235. n. 624.

P.

Päppel/ grosse wilde Pappel/ p. 156. n. 427. Hasen-Pappeln/ grosse Roß-Päppeln/ ibid. p. 157. rundblättrige kleine Wald-Päppeln/ ibid. n. 428. Gänß-Päppeln p. 157. n. 428. Käß-Päppel/ Hasen-Päppeln / gemeine kleine Päppeln ibid.
Päppel-Baum / schwartzer Päppel-Baum / p. 205. n. 560. Lybischer Päppel-Baum/ p. 205. n. 561.
Parößken quid? p. 291. n. 754.
Pastemen-Kraut vid. Apostemen-Kraut.
Pastenach p. 189. n. 522.
Pawen-Fist/ p. 90. n. 234.
Perlen/ Waßer-Perlen p. 13. n. 29.
Pestilentz-Wurtz / grosse gemeine p. 192. n. 530. kleine Pestilentz-Wurtz/ p. 193. n. 532.
Peterlein/ groß Bocks-Peterlein/ p. 195. n. 537. Stein-Peterlein / ibid. n. 538. Mauer-Peterlein/ ibid.
Pfaffen-Blat/ Pfaffen-Röhrlein/ Pfaffen-Stiehl p. 61. n. 145.

Pfef-

Pfeffer/ Mauer-Pfeffer/ p. 251. n. 655. Frösch-Pfeffer p. 223. n. 600.
Pfeffer-Kraut p. 245. n. 643.
Pfefferling/ p. 82. n. 203.
Pfeil-Kraut/ klein schmalblättrig spitzig Pfeil-Kraut/ p. 235. n. 625. Pfennigblum/ preusche/ p. 145. n. 403.
Pfennig-Kraut p. 177. n. 492.
Pfersing-Kraut/ Weiblein/ p. 191. n. 529.
Pfriemen/ Acker-Pfriemen p. 147. n. 407. klein Färb-Pfriemen p. 101. n. 266.
Pinn-Holtz. p. 70. n. 173.
Pintchen p. 91. n. 235.
Po-Fist. p. 90. n. 234.
Poggen-Aug p. 96. n. 253.
Poggenstiel p. 94. n. 244. 245. 246.
Pömpchen/ p. 86. n. 219.
Polley/ Wald- oder Berg-Polley p. 50. n. 126. Wasser-Polley. p. 177. n. 492.
Potenge vid. Betonien.
Pülske/ Stein-Pülske p. 83. n. 208. Kühe-Pülske ibid. Heide-Pülske Stein-Pülske p. 83. n. 209. Ziegen-Pülske p. 84. n. 212. Schwolst-Pülsken p. 89. n. 230. Blutt-Pülsken p. 90. n. 231. Schlangen-Pülsken p. 92. n. 241. Stein-Pültzken Blüth p. 95. n. 250.

Q.

Qvacken-Kraut p. 51. n. 131.
Qvacken-Graß p. 109. n. 286.
Qvendel vid. Feld-Kümmel
Qvitschen/ Qvitschle-Beer/ p. 260. n. 680.

R.

Raden p. 148. n. 410. Groß Raden ibid.
Ramsel/ p. 200. n. 549.
Rappen-Füßlein/ wild p. 127. n. 352.
Rapuntzel p. 68. n. 165. große Rapuntzel mit einer Fuchs-schwantz-Aehr p. 228. n. 611. Wald-Rapuntzel ibid. Rapuntzel mit blauen Scabiosen-Köpfflein p. 229. n. 612. Pfirschen-blätterig Rapuntzel mit grossen blauen Glocken-Blumen p. 229. n. 614.
Raut/ Hüner-Rauten/ p. 13. n. 26. Leber-Raut p. 146. n. 404. traubichte Mohn-Raute p. 146. n. 404. klein Mohn-Raut/ ibid. große Wiesen-Raut p. 267. n. 696.
Rechholder/ vid. Wacholder.
Reinfarn p. 265. n. 691. weiß Reinfarn p. 63. n. 150.
Reitzken/ p. 79. n. 196. Stein-Reitzken/ p. 80. n. 197. Eich-Reitzken p. 80. n. 198. roth

und

und blau Bruch-Reitzken/ p. 80. n. 199. Ab-Reitzken/ p. 86. n 222. Reitzken Blüth p. 95. n. 249.
Rettich/ Wasser-Rettich / p. 227. n. 608. wilder Rettich ibid. mit zerschnittenen Blättern ibid.
Rhein-Blume/ schwartzblättrige gelbe p. 64. n. 155.
Ried/ Groß Ried / Schwertel-Ried p. 260. n. 684. Ried-Graß p. 119. n. 324.
Rinds-Augen p. 45. n. 117.
Rinds-Wurtzel/ vid. Bilsen-Kraut.
Ritter-Sporn / Ritterblum p. 51. n. 130.
Rödel/ Rödel-Kraut p. 190. n. 525.
Rohr/ gemein Rohr/ Deck-Rohr p. 19. n. 48. Wald-Rohr p. 118. n. 321. Berg-Rohr ibid.
Rohr-Graß/ p. 112. n. 299.
Rohrlein-Kraut/ p. 61. n. 145.
Roht-Köpffchen p. 84. n. 211
Rothlauffen-Kraut / p. 105. n. 276.
Romey/ p. 44 n. 115.
Röstern p. 259. n. 753.
Rosen/ Heck-Rosen p. 232. n. 618. Feld-Rosen/ Frauen-Rosen p. 232. n. 618. Klapper-Rosen/ p. 188. n. 521. Korn-Rosen / ibid. item p. 282. n. 618. Haber-Rose/ Hunds-Rose/ Büttel-Rose Heyd-Rose ibid. Hertz-Rößlein-Graß p. 39. n. 100
Roßmarin / wilde p. 49. n. 125.
Roßripp p. 198. n. 543.
Roßhub vid. Huff-Lattich.
Roß-Müntze p. 162. n. 438.
Roß-Schwantz / Wasser-Roß-Schwantz mit sehr dünnen langen Blättern p. 65. n. 156. Wald Roß-Schwantz ibid. p. 157.
Rotten oder Rotten-Blum p. 148. n. 410.
Ruhr-Kraut/ groß und klein Ruhr-Kraut / p. 107. n. 281. 283. Groß Ruhr-Kraut mit schmalen länglichten Blättern p. 107. n. 282. Berg-Ruhr-Kraut mit runder Blüth p. 107. n. 280.
Ruprechts-Kraut p. 105. n. 276.

S.

Saam-Kraut/ rundblättriges Saam-Kraut p. 205. n. 562. schmalblättrig Saam-Kraut p. 205. n. 564. spitzig Saam-Kraut p. 206. n. 564. Saam-Kraut mit weichen breiten gläntzenden Blättern p. 206. n. 565

Saam-Kraut mit krausen Blättern p. 206. n. 566. klein großächtiges Saam-Kraut p. 206. n. 567. klein großächtiges schmales Saam-Kraut p. 206. n. 568.
Sade-Baum/ wilder/ Wald-Sadebaum p. 170. n. 464.
Saffran/ wilder/ stachlichter Feld-Saffran p. 50. n. 127.
Saltz-Kraut vid. **Knoblauch-Kraut.**
Samlod p. 18. n. 45.
Sanickel p. 244. n. 641.
Sar-Baum p. 205. n. 560.
Saturay p. 245. n. 643.
Sau-Blum/ Sau-Rüssel/ Sau-Schnabel p. 61. n. 145. Sau-Brodt p. 187. n. 517. Sau-Melcken p. 257. n. 674. Saurach p. 163. n. 441. Säu-Todt/ p. 23. n. 58. Sau-Wurtz/ vid. **Braun-Wurtz.** Sau-Distel/ vid. **Diestel.**
Saurampff p. 3. n. 5. Schaaff-Saurampff p. 4. n. 6.
Scabiosen/ groß/ braun und weiß p. 246. n. 646. 647. Groß Scabiosen p. 247. n. 648. gelblicht Scabiosen mit sehr zerschnittnen Blättern p. 247. n. 649.
Schaaff-Garbe/ grosse gemeine p. 164. n. 442. groß Schaaffribb/ Schaaffrip/ ibid. Purpurrothe Schaaff-Garbe/ p. 164. n. 443.
Schaafftheu p. 65. n. 157. Schaafftheu ohne Blätter/ p. 65. n. 159. Groß Schaafftheu ibid. mit vielen Aesten ibid. n. 160. stinckender Schaafftheu/ so unter dem Wasser kreucht p. 66. n. 161. kriechend Wasser-Schaafftheu mit vielen zwey-zänckichten kleinen Blättern p. 67. n. 162.
Schaaffs-Zunge p. 190. n. 546.
Scharter-Kraut p. 253. n. 662.
Scheiß-Kraut/ p. 142. n. 397. p. 163. n. 439.
Scheiß-Lorbeeren p. 139. n. 388.
Schell-Wurtz vid. **Schin-Kraut.**
Schernäckel vid. **Sanickel.**
Schin-Kraut p. 45. n. 118.
Schierling/ vid. **Wehdendunck**/ schmalblättriger Wasser-Schierling p. 49. n. 124.
Schlaff-Kraut/ vid. **Bilsen-Kraut.**
Schlüssel-Blumen/ geel Schlüssel-Blumen/ s. Peters

ters Schlüssel/ p. 279. n. 725.
Schlangen-Aeuglein p. 30. n. 79.
Schlangen-Kraut p. 177. n. 492. klein Wasser-Schlangen-Kraut p. 62. n. 149.
Schlangen-Mord/ p. 248. n. 654.
Schlangen-Wurtz/ grosse/ p. 27. 28. n. 69.
Schlehen-Baum/ wilder p. 208. n. 572.
Schlehen/ Schlehen-Dorn/ ibid. rothe Schlehen p. 231 n. 616.
Slchotten-Blum p. 209. n. 575
Schmaltz-Blum/ vid. Kuh-Blum.
Schmeelen/ klein und groß p. 118. n. 321. p. 119. n. 322.
Schmerbel p. 136. n. 381.
Schnabel-Kraut/ klein Acker-Schnabel-Kraut/ p. 105. n. 275.
Schollwurtz/ kleine/ p. 105. n. 276.
Schön-Härlein p. 50. n. 127.
Schörbocks-Kraut p. 46. n. 119
Schoßwurtz. p. 170. n. 464.
Schoten-Klee/ p. 145. n. 402.
Spergel mit kleinen Flachs-Köpffen p. 261. n. 682. mit Lantzächtigen Blättern p. 261. n. 683.
Schuppenwurtz/ siebenblättriger mit schwartzen Beeren p. 61. n. 146. grosse Schuppen-Wurtz p. 187. n. 517.
Schüttgelb/ wie es bereitet wird von den Mahlern p. 26. n. 67.
Schwaalcken-Zagel/ p. 283. n. 731.
Schwaden/ p. 108. n. 285.
Schwalben-Wurtz/ p. 20. n. 50.
Schwalben-Kraut/ klein p. 105. n. 276. vid. Schin-Kraut.
Schwam/ Schwäme/ Holtz-schwämme p. 90. n. 232. Hollunder-Schwamm p. 92. n. 236. Lungächtiger Klöschen-Schwamm p. 95. n. 248. schwartzer Rehhaarichter Fliegen-Schwamm p. 87. n. 223. rother Fliegen-Schwam/ geeler/ grauer/ Eichen-Hasel-Fliegenschwam ibid. n. 224. 225. 226. weisser Fliegenschwam p. 89. n. 227. Heide Fliegenschwam p. 89. n. 228. weisser Kolbenächtiger Fliegenschwam p. 89. n. 229. wässerichter Galretschwam p. 96. n. 251. Körnichter Corallen-Schwam p. 96. n. 254. Körnichter Fleisch-

 farber

farber Schwam p. 97. n. 255. Scharlach-rother Büchsen-Schwam/ p. 97. n. 256. Kappenschwam p. 97. n. 257. Mehlschwam/ p. 97. n. 258. Holtzächtiger Schwam mit einem langen Stiel. p. 98. n. 259. Scheiben Büchsenschwam. p. 98. n. 260. Käsichter Holtz-Schwam. p. 98. n. 261. Harter Holtzschwam. ibid. n. 262. kleiner Saat-tragender Büchsenschwam. p. 99. n. 263.

Schwartling. p. 95. n. 247.

Schweinkraut. p. 62. n. 149.

Schweinichen. p. 86. n. 218. Geele Schweinichen. ibid. n. 221.

Schwelcken / Schwelcken-Baum vid. Wasser-Hollunder.

Schwertel/ grosse/ braune p. 105. n. 277. kleine schmalblättrige braune Wiesen-schwertel p. 130. n. 263. Cyper-Schwertel/ Bintzen-Schwertel p. 131. n. 365.

Scorpion-Kraut p. 133. n. 371

Seckel-Kraut vid. Täschel-Kraut.

See-Blum/ kleine/ weisse / p. 179. n. 496. geele p. 178. n. 493.

Seekannen/ grosse/ gelbe / p. 177. 178. n. 493. weisse p. 178. n. 495.

See-Kolben/ p. 277. n. 719.

See-Mans-Treu p. 69. n. 170

See-Schoten/ wilde / p. 197. n. 541.

Seegen/ Wasser-Seegen p. 11. n. 21.

Seiden-Kraut p. 59. n. 141.

Seil-Kraut p. 169. n. 463.

Senff/ Bauren-Senff/ p. 226. n. 607. p. 268. n. 698. wild weisser Senff p. 68. n. 166. kleiner und grosser wilder Senff mit schwartzen Blättern/ so an der Erde in die runde herumb liegen p. 68. n. 168. 169. Weg-Senff/ schnöder Senff Schütt-Senff/ Steinsenff/ p. 69. n. 171. haarichter Weg-Senff ibid. p. 172.

Senff-Kraut/ gelb/ breitblätteticht p. 68. n. 165.

Sergen-Kraut vid. Pfeffer-Kraut.

Sesel Æthiopischer p. 254. n. 603.

Seyffen-Kraut p. 244. n. 642

Siebengezeit p. 161. n. 436.

Siegwurtz/ p. 105. n. 277.

Silber-Kraut p. 207. n. 569.

Simarswurtz/ Sygmarswurtz p. 7. n. 12.

Si-

Simonswurtz/ ibid.
Sindau vid. Sonnenthau.
Sinnau/ p. 7. n. 13
Sommerwurtz. vid. Erwenwürger.
Sonnen-Blum/ oder Sonnen-Güntzel. p. 43. n. 113.
Sonnenwend/ Sonnenwirbel Sonnen-Kraut p. 47. n. 121. p. 103. n. 271.
Sonnen-Braut ibid. p. 48.
Sonnen-Löffel/ p. 231. n. 617.
Sonnenthau/ p. 231. n. 617. rundblättriger kleiner Sonnenthau.
Sonnentau p. 7. n. 13.
Sophien-Kraut p. 176. 177. n. 491.
Spargen / Aspargen. p. 20. n. 51.
Speer-Birn/ wilde / Speerwerbaum vid. Qvitschen.
Speer-Kraut/ gekerfft p. 224. n. 604.
Speerdiestel p. 34. n. 91.
Speeren-Stich p. 101. n. 267
Speichelwurtz/ vid. Seyffen-Kraut.
Sperber-Kraut/ p. 196, n. 539
Spindel-Baum p. 188, n. 520 p. 70. n. 173.
Spinnen-Kraut / ohnästiges Erdspinnen-Kraut p. 193. n. 533.
Springkraut/ Springsaamenkraut/ vid. Hirsch-Mälde.
Stabwurtz/ wild p. 2. n. 2.
Stachelkraut / Meerstachelkraut mit Pasternack Saamen p. 132. 133. n. 370. 371.
Ständel-Wurtz/ Fliegenständelwurtz/ fleckichte/ auch glatte braunrothe Fliegenständelwurtz p. 183. n. 508. 509.
Stallkraut/ stachlicht/ p. 17. n. 41.
Standthart p. 181. n. 503.
Stärckkraut p. 147. n. 407.
S. Steffenskraut p. 256. n. 668
Stechdorn/ vid. Creutzbeer.
Steinbart/ p. 172. n. 475.
Steinbeeren p. 234. n. 622.
Steinbrech/ p. 245. n. 644. gülden Steinbrech p. 246. n. 645. rother Steinbrech/ p. 73. n. 181.
Steinflechten/ p. 140. n. 393.
Steinklee p. 161. n. 436. p. 274. n. 715.
Steinkraut p. 202. n. 554.
Steinsaamen p. 143. n. 399.
Sternkraut p. 21. n. 53. Sternkraut p. 164. n. 671. Wasser-Sternkraut p. 54. n. 138.
Stern-Leberkraut p. 21. n. 52
Stichwurtz/ wilde p. 50. n. 127.
Stöbling. p. 81. n. 202.
Stoltzer Heinrich p. 136. n. 381
Storchenschnabel / blauer mit Eisenhutts Blättern p. 102. n. 269, p. 103. n. 271. mit

Schier-

Schierlings Blättern p. 104. n. 274. kleiner liegender Storchschnabel mit Schierlings Blättern p. 105. n. 275
Straßling p. 92. n. 237.
Streel/ Bubenstreel/ Wolfs-Streel. p. 62. n. 148.
Streichkraut/ weiden blättriges. p. 147. n. 407
Streiffwurtz. p. 138. n. 379.
Stroh/ Wall-Stroh. p. 100. n. 265. p. 166. n. 449.
Strömling/ Holtz-Strömling. p. 157. n. 429.
Süßfarn. p. 204. n. 559.
Süß-Holtz. p. 106. n. 279.
Süßling. p. 81. n. 201.
Süßwurtzel. p. 204. n. 559.
Süttgrün vid. Schüttgelb.
Susancken-Kraut. p. 43. 44. n. 114.

T.

Tarant/ blauer. p. 102. n. 268.
Täschel- oder Seckel-Kraut/ groß und klein p. 30. 31. n. 80. 81. p. 268. n. 698.
Taubenfuß. p. 222. n. 548. p. 103. n. 271. Tiefzerschnittener Taubenfuß mit großer Blüht p. 103. n. 271. mit kleiner Blüht. p. 104. n. 283.
Tauben-Kropff p. 77. n. 192.
Tauben-Kraut vid. Eisenhart.
Taube Neßel p. 133. 134. n. 373. 374.
Taubkorn. p. 121. n. 331.
Tausend Güldenkraut. p. 41. n. 109.
Tausendkorn. p. 202. n. 554. 555.
Teuffels Abbiß. vid. Abbiß.
Teuffels-Blumen p. 39. n. 99.
Teuffels-Kirschen. vid. Kirschen.
Thanne. p. 1. n. 1.
Thannenwedel. p. 65. n. 158.
Thwalch/ Gersten Thwalch. p. 73. n. 180.
Tormentill. p. 270. n. 702.
Traut Babbichen sieh mich an. p. 146. n. 404.
Tropffenwurtz. p. 204. n. 559.

U

Uderamp. p. 123. n. 337.
Veelgutta. p. 18. n. 45.
Verfluchte Jungfrau. p. 47. 48. n. 121.
Vergiß mein nicht. p. 63. n. 151.
Vielsaamen. p. 28. n. 70.
Violen/ blaue. p. 275. n. 717. Blaue braune Violen/ Mertz-Violen. p. 285. n. 739. Hundsviolen. ibid. n. 740. weisse Violen. p. 219. n. 593. Wasser-Violen mit nackten Stengeln p. 166. n. 448.

Vo-

Vogelkraut / vid. Meyer/ Vogelkraut mit Coriander Saamen/ p. 13. n. 31.
Vogels-Nest p. 189. n. 522.
Untreu/ p. 133. n. 371.

W.

Wacholder/ Wacholderbaum p. 131. n. 368.
Wald-Cypreß. vid. Sade-Baum
Waldfar/ p. 73. n. 182.
Waldhirse vid. Hirse.
Waldkichern p. 187. n. 517. 518.
Walb-Knoblauch/ vid. Knoblauch.
Wald-Meister/ vid. Meeßke
Wald-Nägelein/ vid. Nägelein
Waldrinde p. 42. n. 112.
Waldviolen p. 219. n. 191. 192.
Wald-Wolffsmilch vid. Wolffsmilch.
Wallwurtz vid. Beinwellen.
Walckenkraut p. 147. n. 408.
Wasser-Aron / vid. Aron.
Wasserbathenig p. 248. n. 650
Wasserdost/ vid. Dost.
Wasser-Eppich/ vid. Eppich.
Wasser-Gall/ p. 75. n. 187.
Wasser-Garb/ vid Garb.
Wasser-Kolben/ vid. Kolben/
Wasser-Kreß/ vid. Kreß.
Wasser-Linsen/ vid. Linsen.
Wassermerck.
Wasser-Nuß/ vid. Nuß.
Wasser-Perlen/ vid. Perlen/
Wasser-Pfeffer/ vid. Pfeffer.
Wasser-Polley. vid. Polley.
Wasser-Rettich/ vid. Rettich
Wasserschlangen-Kraut/ vid. Schlangen-Kraut.
Wassersegen/ p. 11. n. 21.
Wassersichel/ p. 11. n. 21.
Wasser-Violen/ vid. Violen.
Wasser-Wundkraut/ vid. Wund-Kraut.
Weberkarten/ p. 62. n. 148.
Wegholderbaum / vid. Wacholder-Baum.
Wedendunck/ Wehdendunck/ groß und klein/ p. 48. 49. n. 123. 124.
Weg-Blätter/ n. 198. n. 542.
Wegdiestel/ vid. Diestel.
Wegerich/ breiter Wegrich/ p. 199. n. 546. breitblätteriger Wasser- item Frosch-Wegerich / ibid. n. 547.
Wasser-Wegrich mit schmalen langen Blättern/ p. 199. n. 548. grosser Wegrich / p. 197. n. 542. kleiner/ breiter/ kleiner spitzer rohter

rohter breiter Wegrich/ p. 198. n. 543. 544. 545.
Weg-Nägelein/ vid. Nägelein.
Weg-Senff/ vid. Senff.
Wegstroh / unser Frauen Bett- und Wegstroh p. 100 n. 265.
Wegtritt/ p. 201. n. 552. grosser Wegtritt ibid. mit langen schmalen Blättern p. 202. n. 553. kleiner Wegtritt ibid. n. 554. Wegtritt mit kleinen köpfichten und gar zarten Blättern/ p. 203. n. 557. p. 204. n. 558. klein fruchtbahrer Wegtritt/ p. 203. n. 556.
Wegwart/ wilde/ p 47. n. 121
Weiber-Fist/ p. 90. n. 234.
Weide/ grosse und kleine Salweyblättrichte Kampweide p. 235. n. 626. p. 239. n. 635. Saalweide p. 236. n. 626. Band-Weide/ rohte Weide/ p. 237. n. 627. Gold-Weide ibid. rohte Sprott-Weide p. 239. n. 634. Haar-Weide ibid. n. 636. 637. Seilweide. p. 237 238. n. 629. 630. 631. Bachweide/ Dotter-Weide Bruchweide/ ibid. n. 632. 633.
Weiderich/ p. 150. n. 414. Wasser-Weiderich p. 151. n. 416. rauger Schotentragender Weiderich mit grosser Blüth p. 151. n. 417. 418. grosser und kleiner unrauger Schotentragender Weiderich p. 151. 152 n. 419. 420. Dito / mit weisser Blum p. 152. n. 421. spitziger blauer Weiderich p. 155. n. 424. blauer gehelmter ibid. n. 425. rauger gehelmter mit Purpurfarben Blumen p. 156. n. 426. Weiderich-Rößlein/ p. 151. n. 418.
Weihenfuß/ p. 221. n. 597.
Weißwurtz p. 200. n. 550.
Weitzen/ Zwalckweitzen p. 121 n. 331. Kuhweitzen / p. 16. n. 434.
Weitzenbrand/ p. 293. n. 758.
Welck p. 280. n. 726 schwartze Welck p. 280. n. 727.
Wellsaamen p. 177. n. 491.
Wendwurtzel vid. Baldrian.
Wermuth p. 2. n. 3.
Weyher/ klein Weyher / p. 131. n. 366.
Wicken/ geel Wicken p. 138. n. 387. grosse und kleine wilde Wicken p. 284. n. 733. 738. rauge / braune und unrauge

uurauge/ weisse vielblättrige Wicken p. 284. n. 735. 736. Vogels Wicken / n. 734. braune Waldwicken n. 737.
Wiecken p. 260. n. 754.
Wiederstoß roth und weiß / p. 147. 148. n. 400. 408.
WiederTodt / gülden Wiedertodt p. 7. n. 11.
Wiesenblum/Goldwiesenblum vid. Kuhblum.
Winde/ grosse/ glatte / weiße Winde p. 51. n. 131. kleine weisse Glattwinde / ibid. n. 132. Weidenwinde/Weingartwinde / Zaunwinde / kleine Winde mit dreykantigen Saamen / schwartze Winde/ ibidem.
Windhalm / Ackers Windhalm p. 112. n. 299.
Winterblümchen p. 65. n. 155
Wintergrün/ groß rundblätteriges p. 209. n. 577. spitzblättriges Wintergrün mit vielen weißen Blümlein p. 210. n. 579. klein rundblätterig Wintergrün p. 210 n. 578. Wintergrün mit gespitzten und zerkerbten Blättern p. 210. n. 580. staudächtiges Wintergrün mit zerkerbten langlechten Blättern p. 211. n. 581. Wintergrün mit Hünerdarm-Blüth ibid. n. 582.
Wirbel-Dost p. 50. n. 126.
Witscherling vid. Dunck.
Woll/ Wiesen-Woll/ Matten-Woll/ p. 114. n. 307.
Wolfferley p. 21. n. 53.
Wolffsbeer p. 257. n. 671
Wolffsbast p. 139. n. 388.
Wolffsbohnen p. 267. n. 694.
Wolffsmilch p. 269. n. 701. Wald-Wolffsmilch vid. Hirschmälde.
Wolgemuth p. 185. n. 512. klein Wolgemuth p. 50. n. 126.
Worusken/ p. 85. n. 216.
Wull-Kraut vid. Welck. schwartz Wull-Kraut p. 281. n. 727.
Wund-Kraut p. 144. n. 401. vid. Wolffsbohnen/ Wasser-Wund-Kraut p. 54. n. 138. gülden Wund-Kraut mit breiten Blättern p. 287 n. 744. groß Heidnisch Wund-Kraut mit breiten und schmalen Blättern p. 286. n. 742. 743. Gotts-Wunden-Kraut p. 128. n. 354.
Würffel-Saamen / p. 187. n. 519.
Wurmkraut/ vid. Geißbart. vid. Reinfarn.
Wurmwurtz/ p. 196. n. 539.
Wurst-Sucht / eine Pferd-Kranckheit p. 5. n. 8.

Y.

Yloff/ p. 122. n 336.

Z.

Zacharias-Blum p. 60. n. 142.
Zahnkraut/ klein/ kahl p. 187. n. 517.
Zäunling/ p. 42. n. 112.
Zaucken/ p. 141. n. 395.
Zeiland p. 139. n. 388.
Zeitlosen/ groß und klein p. 24. n. 61. 62.
Zeißkraut/ vid. Gliedkraut.
Ziegenbart/ gekraußter p. 92. n. 238. ästiger Ziegenbart/ p. 84. n. 213.
Ziegen-Lauch p. 186. n. 514.
Zigeuner-kraut/ vid. Bilsen-Kraut.
Zirbel-Baum/ wilder Berg-Zirbel-Baum p. 196. n. 540.
Zwey-Blatt/ p. 180. n. 500.
Zwick-Holtz p. 70. n. 173
Zwiebel/ Acker-Zwiebel/ Feld- und wilde Zwiebel p. 186. n. 514.

IN-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0512-7
DFG

)o(

INDEX LATINUS.

* * *

Aaron paluſtre, vid. Dracunculus, p. 62. n. 149.

Abies p. 1. n. 1. Abietis lacryma Cereviſiæ incocta, eandem ab acore præſervat ſed cum infatuandi virtute, p. 1. n. 1. Abies foribus olim applicata lugubre ſignum fuit. Apud Pruſſos Lætum & Nuptiale. *ibid.* Ex abiete olim factus eſt Equus Trojanus, p. 2. Nec non aliæ Deorum ſtatuæ, p. 2. n. 1.

Abrotanum Campeſtre, p. 2. n. 2.

Abſinthium, p. 2. n. 3. Ponticum ibid.

Acanthus Germanica. *vid.* Spondylium.

Acanthium, *vid.* Spina alba.

Accipitrina, p. 177. n. 491.

Acer Major Cordi, p. 3. n. 4. Acer operum elegantiâ Statuis olim inſerviit. p. 3. n. 4.

Acetoſa pratenſis, p. 3. n. 5. Acetoſæ radix decocta cereviſiam formâ externâ æmulatur, p. 4. n. 5.

Acetoſa arvenſis lanceolata, p. 4. n. 6.

Acetoſella, p. 4. n. 6.

Acetabulum, *vid.* Telephium.

Achillæa & millefolium, p. 164. n. 442.

Acinaria paluſtris, p. 289. n. 751.

Acinus ſive ſterilis, p. 50. n. 126

Aconitum racemoſum. p. 4. n. 7.

Aconitum cœruleum, p. 5. n. 8. Aconiti Cærulei ſeu Napelli poculô Ariſtoteles interiit, p. 5. n. 8.

Aconitum ſalutiferum, Pardalianches, monococcum, p. 257. n. 671.

Acorus verus, p. 5. 6. n. 10. Acorus & Acorum. *ibid.*

Acorus adulterinus, p. 6. n. 10. Diarrhæam ſanat, p 6. n. 10.

Aculeoſa Gazæ, p. 34. n. 92.

Adianthum aureum minus, 6.

Adulterorum pœna apud antiquos, p. 226. n. 607.

Ædificiis ſtruendis quænam ligna accommodata, ne dehiſcant ac rimas agant, p. 197. n. 540.

Ægilops Plinii, *vid.* Gramen leporinum, p. 112. n. 300.

Ægopodium, p. 16. n. 40.

Ægylops, *vid.* Feſtuca, p. 73. n. 180. vera, *ibid.*

Agrimonia, *vid.* Eupatorium Veterum, p. 71. n. 176. Agrimonia officinarum, *ibid.*

Agrioriganum ſ. Onitis major, p. 185. n. 512.
Aizoon, *vide* Sedum.
Alcea vulgaris major. p. 7. n. 12. Alceæ radix, loco altheæ ab aliquibus ſubſtituitur, p. 7. n. 12.
Alchimilla, p. 7. n. 13
Alectorolophos, *vid.* pedicularis p. 190. n. 525. tertius, *ibid.* n. 526. tertii alterum genus, Dodonæi prima, *ibid.*
Alga marina, p. 7. n. 14.
Aliſma ſ. Arnica, *vid.* Aſter.
Aliſma tenuifolium, *vid.* Helleborine, p. 124. n. 341. Aliſma, p. 180. n. 500. Aliſma pratorum, p. 279. n. 725
Alleluja, p. 274. n. 716.
Alliaria, p. 8. n. 15. Alliaſtrum, *ibid.*
Allium urſinum, p. 8. n. 16. Allium qui guſtâſſet, à delubro & ſacris olim arcebatur, p. 8. n. 16. Allium montanum bicorne anguſtifolium flore purpuraſcente, p. 9. n. 17. Allium montanum capite rotundo, p. 9. n. 18. Allium medetur Calculo, p. 9. n. 16. Allio coronatus eſt Andronicus Imperator Oriental. p. 10. n. 19.
Alnus, p. 10. n. 19. Alni folia calceis impoſita laſſitudinem levant, *ibid.* Cortex maceratus coriariis atrum colorem ſuppeditat, *ibid.* Aqua Alni, cui AQVILANA dicatur, *ibid.* Podagræ dolores tollit, *ibid.* Flores quid? *ibid.* & verrucæ? Alnus antiquitùs lintribus & ſcaphis fabricandis inſerviit, *ibid.* Emplaſtrum Lœſelii ex Alno, *ibid.* Alnus nigra baccifera ſ. Frangula. p. 11. n. 20. Lac auget à vaccis comeſta, *ibid.*
Aloë paluſtris, p. 11. n. 21.
Alpen *vel* Alprutten quid? p. 235. n. 626. eorum uſus p. ſeq.
Alſinanthemon, p. 211. n. 582.
Alſine marina foliis portulacæ, p. 12. n. 22. Alſine major, p. 12. n. 23. minor repens, p. 12. n. 24. multicaulis, p. 12. n. 25. Alſine triphyllos cœrulea, p. 13. n. 26. Alſine Veronicæ foliis, floſculis caudiculis adhærentibus, *ibid.* Alſine hederulæ folio, *ibid.* n. 28 Alſine ſpergula dicta major, p. 13. n. 29. Alſine foliis Triſſaginis, p. 13. n. 30. Alſine bifolia fructu Coriandri radice geniculatâ, p. 13. n. 31. Alſine alpina, p. 211. n. 582. Alſine myoſotis, *vid.* Echium p. 63. n. 151. Alſine minima

vid.

vid. Bursa Pastoris minor. Alsines minimum genus, p. 202. n. 556.
Alysson, p. 13. n. 27.
Alyssum Galeni, *vid.* Sideritis arvensis angustifolia mera. Alysson Germanicum Echioides, p. 30. n. 79.
Amara dulcis, p. 257. n. 670.
Amaranthus luteus, *vid.* Elichrysum, p. 64. n. 155. Amaranthus Galeni, *ibid.*
Ambrosia, *vide* Abrotanum, p. 2. n. 2.
Amerius montanus tenuifolius minor, p. 40. n. 107. sylvester, p. 41. n. 108.
Amomum falsum & Pseudoamomum, *vid.* Grossularia, p. 121. n. 334.
Ampeloprasson proliferum, p. 9. n. 17.
Anagallis mas phœnicea, p. 14. n. 32. hæmorrhagiæ medetur *ibid.* Anagallis aquatica major folio oblongo, p. 14. n. 33. Anagallis aquatica minor folio oblongo, p. 14. n. 34. Anagallis aquatica folio subrotundo, reptante cauliculo, p. 14. n. 35. Anagallis aquatica breviore oblongo folio semine biscutato, p. 15. n. 36. Anagallis aquatica longiore angusto folio, semine biscutato, p. 15. n. 37.
Anblatum, *vide* Orobanche, p. 187. n. 517. Cordi, *ibid.*
Anchusa mimima, *vid.* Buglossum vulgare minus. Anchusa Alcibiadion, *vid.* Buglossum vulgare. Anchusa sylvestris, *vid.* Echium vulgare, p. 64. n. 154.
Androsaces, *vid.* Cuscuta, p. 59. n. 141.
Anemone montana colore luteo p. 219. n. 592. colore candido, *ibid.* n. 593. Anemone sexta, p. 219, n. 592. nemorosa flore majore, *ibid.* n. 593. quinta, sylvestris vulgaris flore niveo, montana colore candido, *ibid.* montana quædam, p. 225. n. 605.
Anemones species p. 209. n. 575
Angelica aquatica, p. 15. n. 38. Angelica sylvestris major hirsuta, p. 16. n. 39. Angelica sylvestris minor sive erratica, p. 16. n. 40.
Angvillaræ Panax chironium, *vid.* Helenium vulg. p. 123. n. 338.
Angvina aquatica, *vid.* Dracunculus, p. 62. n. 149.
Anonis spinosa flore purpureo, p. 16. n. 41. Anonis spinis carens purpurea, p. 17. n. 42.
Anserina, *vid.* Potentilla, p. 207 n. 569.

Anthemis, *vid.* Chamæmelum.
Anthyllis leguminosa Belgarum p. 144. n. 401. lenti similis, *ibid.*
Antoniana major hirsuta, p. 151. n. 417.
Aparine vulgaris p. 17. n. 43 medetur morsibus phalangiorum & viperarum p. 17. 18. n. 42. Aparine palustris lævis p. 18. n. 44.
Aphaca Aphace *vid.* Vicia sepiũ.
Aphaco *vid.* Dens leonis p. 61. n. 165.
Apium montanum folio ampliore. p. 18. n. 45.
Apium aquaticum p. 222. n. 600
Apium palustre p. 254. n. 667.
Apollinaris tertia *vid.* Hyoscyamus, p. 127. n. 353.
Aquilegia sylvestris, p. 18. n. 46 medetur variolis, morbillis, Ictero. Ophthalmica & Cosmetica est, *ibid.* quæ & quando colligenda? *ibid.*
Aquilina, *ibid.*
Arachus, *vid.* Orobus, p. 187. n. 518.
Aracus, Araca, p. 284. n. 734. 736.
Arbor quotidiè foliis suis aquam stillans, p. 231. n. 617.
Arbores alienas incidere capitale olim supplicium. p. 26. n. 67
Archangelica, p. 15. n. 38.
Archangelica, *vid.* Campanula vulgatior.
Arcion, *vid.* Lappa p. 136. n. 382
Arcium Dioscoridis, *vel* Arctium, *vid.* Lappa, p. 136. n. 382
Argemone altera, p. 207. n. 569.
Argentilla major, *vid.* Barba Capræ. (n. 569.
Argentina *vel* argentilla, p. 207
Aristolochia rotunda, p. 77. n. 193. rotunda vulgaris, *ibid.* flore purpureô, *ibid.* rotunda vulgaris radice majore solidâ, p. 78. n. 194. rotundæ fabæ altera species solida, *vid.* Fumaria bulbosa rotunda flore albô, *ibid.* Aristolochiæ rotundæ concavæ similis herbula, p. 220. n. 594.
Ameria sylvestris altera, *vid.* Caryophyllus barbatus sylvestris, p. 39. n. 102.
Armerius sylvestris, p 41. n. 108
Armoracia, p. 226. n. 607.
Armoraria pratensis sylvestris, p. 41. n. 108.
Arnica s. Alisma, *vid.* Aster.
Arnoglossa, p. 197. n. 542.
Artemisia vulgaris major, p. 18. n. 47. latioris folii, *ibid.* mater herbarum, *ibid.* rubra & alba, *ibid.* uterina & emmenagoga existit, p. 19. n. 47. Carbones sub radice reperibiles quid, & quem usum præstent? *ibid.* Artemisia monoelonos *vid.* Tanacetum vulgare.

Arte-

Artemisia polyclonos Dodonæi *vid.* Jacobea, p. 129. n. 360.
Arundo palustris, p. 19. n. 48. Flos ejus lanosus aures exsurdat, *ibid.* Arundo coronat, *ibid.* mortem infert, *ibid.*
Asarum, p. 19. n. 49. pro diverso præparandi modo, emeticâ, diaphoreticâ, & diureticâ virtute pollet, p. 20. quodnam optimum, & quando colligendum? *ibid.*
Asclepias albo flore, p. 20. n. 50
Asparagus maritimus, p. 20. n. 51 multis & egregiis pollet virtutibus, *ibid.* quomodo ubertas ejus ubique procuranda, *ibid.*
Aspergula, *vid.* Asperula.
Asperugo spuria, p. 30. n. 79.
Asperula s. Rubeola montana odora, p. 21. n. 52.
Asphodelus germanica, p. 193. n. 533
Aster montanus luteus salicis glabrô flore, p. 21. n. 53. Aster Atticus, *ibid.* virtute vulnerariâ pollet, *ibid.* Aster luteus hirsuto salicis folio, p. 21. n. 54.
Astragalus, vid. Orobus, p. 187 n. 517.
Astragloides, *vid.* Orobus, p. 187 n. 519.
Atramentum rebus æri incisis excudendis inserviens ex stramine avenaceo & hordeaceo, nec non aliunde quomodo parandum? p. 293. n. 761.
Atractylis aculeata foliis maximè laciniatis, capitulis albis, p. 21. 22. n. 55.
Attractylis, *vid.* Cnicus, p. 50. n. 127. Attractylis sylvestris, medica, mitior, *vid. ibid.*
Atriplex sylvestris, Fimetaria, p. 22. n. 56. Atriplex sylvestris prima, p. 22. n. 57. Atriplex sylvestris latifolia acutiore folio, p. 23. n. 58.
Avena fatua, græca, sterilis, p. 72. & 73. n. 180.
Auricula muris, p. 193. n. 535. minor, p. 194. n. *ibid.* secunda, p. *ibid.* n. 536.
Auricula muris, *vid.* Echium, p. 63. n. 151. & p. 64. n. 153
Auricula Judæ, *vid.* Fungus non vescus XIV. p. 92. n. 236.
Herba auricularis, p. 149. n. 411.

B

Baccaris, *vid.* Asarum.
Baccharis germanica. p. 179. n. 497.
Bagolæ primum genus Cæsalp. p. 288. n. 748.
Balsamine lutea, seu Noli me tangere. p. 23. n. 59. Attagenes allicit & illaqueat. *ibid.*
Baptisecula *vid.* Cyanus p. 59. n. 142.

S. Bar-

S. Barbaræ herba. *vid.* Eruca lutea latifolia. p. 67. n. 165.
Barba Capræ floribus compactis. Barbicapra. p. 23. n. 60.
Barba hirci *vid.* Tragopogon.
Bardana *vid.* Lappa major p. 136. n. 382.
Barstuccæ subterranei, German. Erd-Männlein quinam olim fuerint p. 241. n. 638.
Basilicum medium p. 179. n. 497. Basilica minor. *ibid.*
Baucia *vid.* Pastinac. Sylv. p. 189. n. 524.
Bechion. *vid.* Tussilago p. 276. n. 718.
Belis major sylvestris caule folioso p. 23. n. 61. Bellis minor sylvestris, p. 24. n. 62. Remedium singulare wieder den hastigen Trunck *ibid.*
Bellis major lutea foliis profundè incisis. p. 24. n. 62.
Benedicta *vide* Caryophyllata.
Berula major, p. 14. n. 33.
Beta sylvestris p. 210. n. 577.
Betonica purpurea, p. 25. n. 64. vulgaris, *ibid.* alba *ibid.*
Betula virgulis erectis p. 25. n. 66. Betulæ folia præsaga sunt aliquando hyemis insecuturæ, p. 25. 26. n. 66. Betula pendulis virgulis, p. 26. n. 67. Aqua Betulæ cui usui inserviat? *ibid.* Betulæ virgæ accensæ succum fundunt oculorum vitiis perutilem, *ibid.* Betula Pumila, p. 27. n. 67.
Betulæ axungia Dagget dicta, vermes & pediculos enecat intus & foris adhibita p. 27. n. 67. Cortex coriis præparandis destinata, *ibid.* Ex Betulâ Fasces Romanorum constabant, *ibid.*
Betulus, p. 188. n. 520.
Bidens foliis tripartitò divisis, p. 34. n. 89.
Bifolium, p. 180. n. 500. bifolium & Satyrion decimum, *ibid.* bifolium bulbosum, *ibid.* n. 502.
Bistorta major, radice minus intortâ, p. 27. n. 69.
Blitum Polyspermon, p. 28. n. 70. piscibus gratissima esca, *ibid.* rubrum majus & minus p. 28. n. 71. 72.
Boletus cervinus, *vid.* Fungus non vescus, p. 95. n. 250.
Branca Leonina, *vid.* Pastinaca sylvestris, p. 189. n. 524.
Branca ursina, *vid.* Spondylium.
Brassica campestris perfoliata flore luteo, p. 29. n. 73. Brassica sylvestris foliis circa radicem cichoraceis, p. 29. n. 74.
Bromos herba, *vid.* Festuca, p. 73. n. 180. Bromos sterilis, *ibid.*
Brunella major, *vid.* Prunella, p. 208.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0518-1
DFG

p. 208. n. 573. Officinarum, *ibid.*
Bryonia alba baccis nigris, p. 29. n. 75. Bryonia nigra, *ibid.*
Bubonium luteum, *vid.* Aster.
Bugloſſum vulgare, p. 29. n. 75. Bugloſſa vulgaris, *ibid.* Bugloſſum ſylveſtre flore albo, p. 30. n. 77. Bugloſſum ſylveſtre minus alterum & aſperius, p. 30. n. 78. Bugloſſum ſylveſtre caulibus procumbentibus, p. 30. n. 89.
Bugula, *vid.* Conſolida.
Bugloſſum ſylveſtre, *vid.* Echium vulgare, p. 64. n. 154. agreſte, *ibid.*
Bulbus ſylveſtris Tragi, p. 186. n. 514. agreſtis. *ibid.* eſculentus, *ibid.* Bulbus ſylveſtris alius bifolius, *ibidem.*
Bulegium agreſte officinarum, *vid.* Calamintha arvenſis verticillata.
Bunonium adulterinum, *vid.* Eruca lutea, p. 67. n. 165.
Buphthalmum majus, *vid.* Bellis major.
Buphthalmum majus, *vide* Chamæmelon inodorum.
Buplevron, p. 278. n. 723.
Burſa paſtoris major, folio ſinuato, p. 30. n. 80. Hæmorrhogiæ medetur, *ibidem.* minor loculo oblongo, p. 31. n. 81.
Butomus, *vid.* Juncus, p. 131. n. 365.

C.

Calamintha arvenſis verticillata, p. 31. n. 82. herba magnæ virtutis eſt, *ibid.*
Calaminthæ primum genus, p. 162. n. 437. Calamintha tertia ſ. Nepeta, *ibid.* montana Gattaria vulgo, *ibid.* Calaminthæ tertium genus Dioſcoridis, p. *ibid.* n. *ibid.*
Calamogroſtis quorundam, *vid.* Gramen arundinaceum p. 119 n. 323.
Calamogroſtis ſecunda, *vid.* Juncus p. 131. n. 365.
Calamus aromaticus officinarum p. 5. n. 6.
Calathiana viola autumnalis *vid.* Gentiana paluſtris p. 102. n. 268.
Caltha paluſtris flore ſimplici, p. 31. n. 83. Caltha in numero plurali genere neutro à Prudentio uſurpata, *ibid.* p. 32.
Cameline p. 174. n. 483. Camelina ſ. Myagrion, *ibid.* 484.
Camelina Dodonæi ſeu Myagrion, *ibid.*
Campanula vulgatior foliis urticæ, *vel* major & aſperior, p. 32. n. 84. Campanula vulgaris monoclonos foliis urticæ, flore candido, p. 32. n. 85.

Campanula pratensis flore glomerato, p. 33. n. 86. Campanula oblongifolia flore cœruleo in summis cauliculis, p. 33. n. 87. Campanula oblongifolia flore albo in summis cauliculis, p. 33. n. 88.
Campanula alba, *vid.* Convolvulus, p. 51. n. 131.
Campanula sylvestris, *vid.* Digitalis, p. 61. n. 147.
Campanula persicifolia nostras, *vel* persicæ folio, p. 229. n. 614. angustifolia, media, *ibid.* alba & cœrulea, p. 230. n. 614.
Canis Plinii, p. 292. n. 757.
Cannabina aquatica, *vid.* Eupatorium cann. p. 70. n. 174.
Cannabina aquatica, *vid.* Conyza. p. 53. n. 137. & p. 54. n. 138.
Cannabis erratica, fœmella erratica paludosa sylvestris sterilis p. 33. n. 89. Decoctum hujus cannabis cimices necat. *ibid.*
Cannabis spuria facie urticæ, p. 292. n. 758.
Capnium phragmites majus, *vid.* Fumaria bulbosa, p. 78. n. 193. capnium phragmites minus, *ibid.* n. 194.
Capnos fumaria, *vid.* Fumaria, p. 77. n. 192. Capnos chelidonia, *vid.* Fumaria bulbosa. p. 78. n. 193.
Caput monachi, *vid.* Dens leonis p. 61. n. 165.
Cardamine altera, p. 176. n. 490. simplici flore, *ibid.*
Carduus in avena proveniens, p. 34. n. 90. avenarius, arvensis, *ibid.* Carduus lanceolatus latifolius, p. 34. n. 91 Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris, Carduus sylvestris tertius Dodonæi, p. 34. n. 92. Carduus spinosissimus angustifolius pratensis, p. 35. n. 93.
Carduus, *vid.* Cnicus, p. 50. n. 127.
Carduus fullonum, *vid.* Dipsacus p. 62. dicitur etiam carduus fullonius erraticus, *ibid.*
Carex minor, *vid.* Gramen junceum spic. p. 114. n. 308.
Carlina acaulos flore magno, p. 35. n. 94.
Carlina sylvestris vulgaris, *vid.* Cnicus, p. 50. n. 127.
Carpinus Theophrasti, *vid.* Euonymus, p. 70. n. 173.
Carthamus, *vid.* Cnicus, p. 50. n. 127.
Carum, Carvi officinarum. Caros, carus, vulgò Carvi, Careum, p. 36. n. 95.
Caryophyllata vulgaris, p. 36. n. 96.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0520-1
DFG

n. 96. aquatica nutante flore, p. 37. n. 97. montana, palustris, *ibid.* prolifera flosculis elegantissimis, p. 37. n. 98.
Caryophyllus arvensis glaber flore majore, p. 38. n. 99.
Caryophyllus arvensis hirsutus flore *majore*, p. 39. n. 100. holostius, *ibid.* flore *minore*, p. 39. n. 101. Barbatus sylvestris, p. 39. n. 102. arvensis calyculo florum numeroso p. 39. n. 103. minimus muralis, p. 39. n. 104. plumarius albus, p. 39. n. 105. Sylvestris vulgaris angustifolius, p. 40. n. 106. montanus albus, *ibid.* montanus minor, pratensis flore laciniato simplici, p. 40. 41. n. 108.
Cassutha, *vid.* Cuscuta, p. 59. n. 141.
Cassytha Plinii, *vid.* Cuscuta, p. 59. n. 141.
Castor delectatur esu corticum salicis, alni, & consimilium arborum, p. 239. n. 637.
Catanance altera, *vid.* Balsamine lutea.
Cattaria s. Mentha Catti. p. 161. n. 437. Herba, *ibid.*
Cauda muris *vel* murina, *vide* Holosteo affinis, p. 127. n. 352.
Ceanothus levis, *vid.* Grossularia p. 121. n. 333. & p. seq. n. seq.
Centaurium minus, Centaurea, p. 41. n. 109. Centaurium minus floribus albis, *ibid.* n. 110.
Centaurois, *vid.* Serratula.
Centiana minor, p. 101. n. 267.
Centinervia, p. 197. n. 542.
Centummorbia, Centmorbia, p. 177. n. 492.
Centumnodia, p. 201. n. 552.
Centunculus, *vid.* Alsine.
Centunculus, *vid.* Gnaphalium, p. 107. n. 281.
Centunculus hirsutior, p. 13. n. 28.
Cerasus avium Racemosa, p. 42. n. 111. Cerasia racemosa rubra, nigra, *ibid.*
Cerdopatium caule nullo, p. 35. n. 94.
Cervicaria major, *vid.* Campanula vulgatior.
Cervicaria tertia sive minor, p. 33. n. 86.
Cervi spina, p. 230. n. 615.
Chamæcerasus p. 42. n. 112.
Chamæcissus sive Chamæcissos terrestris, vulgaris, *vid.* p. 123 n. 337.
Chamæcisi alterum genus, *vid.* Consolida, p. 50. n. 128.
Chamæcistus vulgaris flore luteo p. 43. n. 113.

Chamæcyparissus, p. 170. n. 464.
Chamædaphne s. pusilla laurus, p. 138. n. 388.
Chamædris spuria major altera seu frutescens, p. 43. n. 114.
Chamælæa s. Mezereon, p. 138. n. 388. Germanica, *ibid.* nostras, *ibidem.*
Chamælema, *vid.* Hedera terrestris, p. 123. n. 337.
Chamæleon albus, p. 35. n. 94.
Chamæmelum vulgare Leucanthemum, p. 44. n. 115. Chamæmelum fœtidum, *ibid.* n. 116. inodorum, p. 45. n. 117.
Chamæmelum eranthemon, *vid.* Consolida, p. 51. n. 130.
Chamæpeuce, p. 169. n. 463.
Chamæpeuce, *vid.* Cistus Ledon. p. 49. n. 125.
Chamærubus saxatilis, p. 234. n. 632.
Chamomilla, *vid.* Chamæmelum. Chamomilla fatua, *vid.* Chamæmelon inodorum.
Chelidonium majus vulgare, p. 45. n. 118. Chelidonium minus, p. 46. n. 119.
Chelidonia rotundifolia minor, p. 46. n. 119. Chelidonia capnitis radice nigrâ, *vid.* Fumaria bulbosa, p. 78. n. 194.
Chelidonia palustris, *vid.* Caltha palustris.
Χελιδονίζειν quid apud Veteres? p. 47. n. 119.
Chenopodium, *vid.* Atriplex sylvestris latifolia.
Chironium, Chironica, *vid.* Chamæcissus.
Christophoriana, *vid.* Aconitum racemosum, 4.
Chrysanthemum arvense, p. 25. n. 64. Chrysanthemum foliis Tanaceti, p. 47. n. 120.
Chrysanthemum, *vid.* Caltha palustris.
Chrysanthemum segetum, *vid.* Bellis lutea major.
Chrysocome, *vid.* Elichrysum, p. 64. n. 155. Chrysocome prima vulgaris, *ibid.*
Chrysosplenion, *vid.* Saxifraga aurea.
Cicercula sylvestris. p. 138. n. 385.
Cicutaria palustris latifolia alba, 48. n. 123. *tenuifolia*, *ibid.* n. 124.
Cichoreum sylvestre, agreste officinarum, p. 47. n. 121. Cichoreum sylvestre flore albo, p. 48. n. 122 Cichorea, *ibid.*
Cicutaria, p. 175. n. 486. Cicutaria palustris latifolia alba, p. 48. n. 123. tenuifolia, p. 48. n. 124.
Cicutæ potus, olim pœna, p. 48. n. 123.
Circæa, p. 256. n. 668. 669. 670.
Cirsium, *vid.* Cnicus, p. 50. n. 127.

Cir-

Cirſium Italicum, *vid.* Bugloſſum vulgare.
Ciſtus Ledon, p. 49. n. 125.
Clinopodium vulgare, majus, p. 49. n. 126. Origano ſimile, *ibid.*
Climenum Matthioli, p. 138. n. 385.
Cnicus ſylvèſtris ſpinoſior, p. 50. n. 127.
Cnips quid. p. 260. n. 754.
Colubrina, *vid.* Biſtorta.
Colus ruſtica, *vid.* Cnicus, p. 50. n. 127.
Coma aurea, *vid.* Elychryſum, p. 64. n. 155.
Conſolida major, *vid.* Symphytum.
Conſolida media pratenſis cærulea, p. 50. n. 128. purpurea, *ibid.* n. ſeq. regalis *vel* regia, p. 51. n. 130.
Conſolida minor, minima, p. 208. n. 573.
Convolvulus major albus, p. 51. n. 131. minor, p. 52. n. 132. & ſeq. volubilis, *ibid.*
Conyza cœrulea acris, p. 52. n. 134. Conyza aquatica, *it.* Helenitis, p. 53. n. 135. major, minor, minima, n. ſeq. paluſtris, n. 137. bidens *ibid.* & n. ſeq. Conyza paluſtris foliis tripartitò diviſis, p. 34. n. 89. p. 53. n. 137 foliis ſerratis, p. 54. n. 138.
Cornus fœmina, p. 54 n. 139.
Corona graminea qualis apud Romanos. p. 215.
Corona qverna quænam apud Romanos? p. 215.
Coroneola, *vid.* Geniſta, p. 101. n. 266.
Coronopus ſylveſtris, *vid.* Holoſteo affinis p. 127. n. 352.
Corylus ſylveſtris, p. 55. n. 140. Coryli flores falsò creduntur eſſe Juli. *ibid.* p. 56. Juli ejus pictoribus & tinctoribus inſerviunt *ibid.* Corylus in Pruſſiâ valdè frugifera, p. 55. n. 140. Pictoribus pulverem Schüttgelb dictum ſuppeditat, metallurgis virgam divinatoriam, *ibid.* p. 56. Corylus materies eſt virgulæ metallorum indagatricis, Wünſchel-Rut dictæ, p. 56. n. 140. Corylus eò fructuoſior quò pejus tractatur, p. 57. n. 140.
Cotula alba, fœtida, *vid.* Chamæmelum fœtidum. Cotula inodora, *vid.* Chamæmelum inodorum.
Cotyledon, vid. Sedum. (738.
Cracca major, p 184. n. 737.
Craſſula *vid.* Telephium.
Cratæogonon, p. 161. n. 435.
Crepitus lupi, *vid.* Fungus non veſcus XII. p. 90. n. 234.

Crucialis, *vid.* Bugloſſum ſylveſtre caulibus procumbentibus.
Cruciata, *vid.* Centiana minor p. 101. n. 267. Cruciata gentianella, *ibid.*
Crus Galli, *vid.* Gramen dactylon, p. 110. n. 289.
Cuculi flos, p. 41. n. 108.
Cuminum pratenſe, *vid.* Carum.
Cuminum ſylveſtre, *vid.* Conſolida, p. 51. n. 130.
Cunila bubula Plinii p. 185. n. 512.
Cunila ſativa, *vid.* Satureja hortenſis.
Cupreſſus ac Pinus cariem ac vetuſtatem non ſentiunt, p. 196. n. 540. cauſa *vid. ibid.* Pinus in Iſthmicis ludis primum coronamentum, p. 197. *ibid.*
Cuſcuta major, p. 59. n. 141. Cuſcuta officinarum, *ibid.* Cuſcuta Matth. ibid.
Cyanus ſegetum, p. 59. n. 142. cœruleus *ibid.* flos, vulgaris, major, cœruleus arvenſis, *ibid.* flores cyani pictoribus & aliis colorem ſuppeditant, *ibid.* p. 60.
Cyanus ſylveſtris, montanus, integrifolius, *vid.* Jacea latifolia p. 129. n. 358.
Cyanus ſylveſtris major arvenſis *vid.* Scabioſa major.
Cymbalaria, *vid.* Telephium.
Cynanche, p. 203. n. 556.
Cynocrambe fœmina, *vid.* Mercurialis, p. 16[illegible]. n. 440.
Cynogloſſa minor, *vid.* Echium Scorp. p. 64. n. 153.
Cynogloſſum majus vulgare, p. 60. n. 143. item Cynogloſſus vulgaris, *ibid.* cum flore, *ibid.* minus n. ſeq. 144.
Cynorrhodos procerior, p. 232. n. 618.
Cynosbatos Theoph. *vid.* Meſpilus, p. 163. n. 441.
Cynosbatus Dioſc. p. 231. n. 618. Cynosbatos procerior, p. 232. n. 618.
Cynoſorchis paluſtris lævi folio & anguſto, p. 181. n. 504.
Cyperella Cordi, *vid.* Gramen exile, p. 118. n. 319. Pſeudocyperi ſpecies pumila, *ibid.*
Cytiſus, p. 273. n. 713. lac auget, p. 273. n. 713.

D.

Damaſonium tenuifolium, *vid.* Helleborine, p. 124. n. 341.
Damaſonium callyphyllon, *vid.* Helleborine latifol. p. 124. n. 339.
Daphnodes, p. 138. n. 388.
Daucus officinarum, *vid.* Paſtinaca ſylveſtris, p. 188. n. 522 vulgaris, *ibid.*
Daucus Selinoides, p. 195. n. 538.

Del-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0524-4
DFG

Delphinium, vulgare, *vid.* Consolida p. 51. n. 130.
Dens leonis, p. 61. n. 145. latiore folio, *ibid.* vulgi, *ibid.*
Dentaria heptaphyllos, p. 61. n. 146. baccifera, bulbifera, *ibidem.* Dentaria major, *vid.* Orobanche, p. 187. n. 517. Matthioli, *ibid.*
Diapensia, *vid.* Sanicula.
Digitalis flore luteo p. 61. n. 147. magnô flore, *ibid.*
Dipsacus sylvestris, p. 62. n. 148 purpureus, primus, *ibid.*
Disphendomen, quale genus supplicii fuerit, p. 290. n. 753.
Dracontium palustre, *vid.* Dracunculus, p. 62. n. 149.
Dracunculus palustris, p. 62. n. 149. aquaticus vel aquatilis, *ibid.* palustris minor, *ibidem.* pratensis, p. 63 n. 150.
Dracunculus major, *vid.* Bistorta major.
Dulcamara, p. 257. n. 670.

E.

Ebulus sive Sambucus humilis, p. 243. n. 639. Ebulus glires & mures fugat, p. 243. n. 638. Ebuli oleum corticum radicum vermes expellit externè inunctum, p. 243. n. 639. Ebuli radix amuletum in ulceribus sordidis, p. 243. n. 639.
Echium scorpioides arvense, p. 63. n. 151. flosculis niveis, n. 152. palustre, p. 64. n. 153. Echium vulgare, p. 64. n. 154. floribus purpurantibus, *ibid.* Echium Italicum, spinosum, *Vide* Buglossum vulgare.
Ἐλάτη, *Vid.* Abies.
Elatine, *Vid.* Convolvulus minor, p. 52. n. 133.
Elatine, *Vid.* Cynoglossum, p. 60. n. 144.
Elaphoboscum, *Vid.* Pastinaca sylvestris, p. 189. n. 524. Eraticum. *ibid.*
Elenium, enula, campana enula, *Vide* Helenium vulg. p. 123. n. 338.
Eleoselinum, *Vid.* Sion.
Elichrysum, p. 64. n. 154.
Elleborine, vid. Helleborine, p. 123. n. 339.
Empetron, p. 202. n. 554.
Emplastrum Lœselii ex Alno mirabile, p. 10. 11. n. 19.
Enophyllum. p. 179. n. 499.
Epactis recentiorum, *Vid.* Helleborine p. 123. n. 339. latifolia, *ibid.* p. seq.
Epimedium, p. 275. n. 717.
Equisetum palustre, p. 65. n. 156. sylvaticum, *ibid.* n. 157. palustre, n. seq. tertium, n. 158. foliis nudum, non ramosum

p. 66. n. 159. itemque ramosum, n. seq. Equisetum fœtidum sub aquâ, p. 66. n. 161. pini foliis simile, *ibid.* Equisetum foliis bifurcis sub aquâ repens, p. 67. n. 162.
Equorum morbus, dictus Wurst-Sucht. p. 5.
Erica vel Erice vulgaris glabra, p. 67. n. 163. folio myricæ, *ibid.* vulgarior, *item* prior, *ibid.* baccifera tenuifolia p. 67 n. 164.
Erica baccifera latifolia, p. 289. n. 750.
Ericoides rubrum, *Vid.* Euphrasia pratensis p. 72. n. 178.
Erigeron, *Vid.* Senecio.
Erigerum quartum, *Vid.* Conyza p. 52. n. 134.
Eriophoron gramen, *Vid.* gramen pratense, p. 14. n. 307.
Eruca lutea latifolia sive barbarea, p. 67. n. 165. Barbarea fœmina, *ibid.* Eruca sylvestris minor, p. 68 n. 166. palustris minor, *ibid.* maritima vulgò marina, n. seq. napi flore, *ibid.* Eruca sylvestris minor altera foliis subasperis in orbem sparsis, p. 68. n. 167. sylvestris major iisdem quidem foliis ast multum luxuriantibus *ibid.* n. seq. Erucas sentiunt sæpissimè folia Nymphææ, p. 178. n. 493.
Ervilium, p. 138. n. 385.
Eryngium maritimum vel marinum, p. 69. n. 170.
Erysimum p. 69. n. 171. vulgare, *ibid.* Dioscoridis, *ibid.* nostras, *Vid.* hirsutum n. seq. Erysimum hirsutum siliquis Erucæ, p. 69. n. 172.
Evonymus vulgaris, p. 70. n. 173. Theophrasti, *ibid.*
Eupatorium cannabinum *vid.* Conyza palustris, p. 54. n. 138.
Eupatorium Cannabinum, p. 70. n. 174. Avicennæ, seu vulgare, adulterinum, Mas, *ibid.* Cannabinum alterum flore candido, p. 71. n. 175. Eupatorium Veterum, *ibid.* n. seq. Dioscoridis & aliorum Græcorum vulgare, *ibid.*
Euphragion, *Vid.* Euphrasia, p. 71. n. 177. Euphragia altera major, *ibid.*
Euphrasia sive Euphrosine officinarum, p. 71. n. 177. ocularis Argentinensium, *ibidem.* Pratensis rubra, p. 72. n. 178. Euphrasia altera Dodonæi, *ibid.* Euphrasia cœrulea, *Vid.*
Echium Scorp. p. 64. n. 153.
Euphrasia gramen, *Vid.* Caryophyllus arvensis glaber.

F.

Faba inversa, *Vid.* Telephium.
Fagus p. 72. n. 178.

Fa-

Fagus Sepium, vid. Oſtrya, p. 188. n. 520.
Farfara, *Vid.* Tuſſilago.
Farfugium, *Vid.* Caltha paluſtris flore ſimplici.
Favagello, *Vid.* Chelidonia rotundifolia minor.
Feſtuca avenacea ſterilis elatior, p. 72. n. 180. lolii primum genus, & vitium plerumque hordei eſt. *ibid.*
Filago ſive impia, *Vid.* Gnaphalium p. 107. n. 281. major, *ibid.* n. 282. minor, *ibid.* n. ſeq.
Filicula, p. 204. n. 559. Filicula petræa fœmina, *vid.* Filix ramoſa, p. 74. n. 184.
Filipendia, p. 73. n. 181.
Filipendula prima & ſaxifraga rubra, *vid.* Filipendia, p. 73. n. 181. Filipendula vulgaris, *ibid.*
Filix non ramoſa dentata, p. 73. n. 183. vulgaris, mas ſecunda, fœmina, maſcula, *ibid.* Filix ramoſa major, p. 74. n. 183. fœmina ſylveſtris, mas major, ejus primum genus; *ibid.* Filix ramoſa pinnulis dentatis, p. 74. n. 184. Filix altera tenuifolia, *ibid.* Filix paluſtris maxima, p. 74. n. 185.
Filum marinum, p. 74. n. 186.
Fiſtularia. *vid.* p. 190. n. 526.
Flammula, p. 221. n. 598. folio ſerrato. p. 224. n. 404.
Flammula Ranunculus quartanæ medetur externè. Internè contra Scorbutum. p. 224. n. 604.
Flos ambarvalis, p. 200. n. 539.
Flos hepaticus, *vid.* Gramen Parnaſſi, p. 108. n. 284.
Flos regius vel ſylveſtris, *vid.* Conſolida, p. 51. n. 130.
Flos tinctorius, *vid.* Geniſta tinctoria, p. 101. n. 266.
De fluminibus retandis publicè redemptis, p. 240. n. 637.
Fœniculum aquaticum galericulatum, p. 164. n. 444. fœniculum aquaticum ſecundum p. 166. n. 448.
Folliculus marinus, p. 75. n. 187
Forbeſina Bononienſis, *vid.* Conyza paluſtris, p. 53. n. 137.
Formentone, *vid.* Convolvulus minor, p. 52. n. 133.
Fraga fructu rubro, *vid.* Fragaria vulgaris, p. 75. n. 188.
Fragaria vulgaris, p. 75. n. 188. major, *ibid.* cauliculis maximè reptantibus, *ibid.* n. 189.
Fragula, *vid.* Fragaria vulgaris, p. 75. n. 188.
Fragum, *vid.* Fragaria vulgaris, p. 75. n. 188. Fraga vindemiam quomodo polliceantur, *ibid.*

Frangula, *vid.* Alnus nigra baccifera, p. 11. n. 20. Frangulæ cortex interior luteus vim Catharcticam obtinet, *ibid.*
Fraſſinella, p. 200. n. 550.
Fraxinus, p. 76. n. 199. excelſior, *ibid.* Fraxini lignum certô modô cæſum vulnera ſympatheticè curat, p. 76. n. 190.
Frixago paluſtris, *vid.* Scordium
Fucus marinus, *vid.* Alga marina Fucus marinus, p. 77. n. 191.
Fucus maritimus, p. 216. n. 585
Fucus ex anchuſæ radice & apparatus metricius artificioſus lepidè deſcribitur, p. 143. n. 400.
Fumaria bulboſa ſeu tuberoſa minima, p. 220. n. 594.
Fumaria. p. 77. n. 192. fumaria officinarum & Dioſcoridis, *ibid.* bulboſa major p. 77. n. 193. fumaria altera Matth. *ibid.* bulboſa radice non cavâ. p. 78. n. 194.
Fumus terræ, *vid.* Fumaria, p. 77. n. 192.
Fungi veſci 28. non veſci 42. reperiuntur â p. 79. ad p. 99.
Fungus ovatus, *vid.* Fungus non veſcus XII. p. 90. n. 234.
Fungus fœtidus penis imaginem referens, *vid.* Fungus non veſcus XIII. n. 235.
Fungus Sambucinus, *vid.* Fungus non veſcus XIV. p. 91. n. 236. Fungus ad Sambucum, *ibid.*
Fungus membranaceus auriculam referens ſive ſambucinus *vid.* Fungus non veſcus XIV. p. 91. n. 236.
Fungus virilis penis arrrecti facie, *vid.* Fungus non veſcus XIII. p. 91. n. 235.
Fungus biorchis anthracinus, *vid.* Fungus non veſcus XXV. p. 95. n. 247.
Fungus granuloſus corallinus, *vid.* Fungus non veſcus XXXII p. 96. n. 254. Fungus granuloſus incarnatus, p. 97. n. 255.
Fungus racemoſis vetuſtis lignis adnatus, *vid.* Fungus non veſcus, p. 96. n. 253.
Fungus cucullatus, vid. Fungus non veſcus XXXV. p. 97. n. 257.
Fungus farreus. *vid.* Fungus non veſcus, p. 97. n. 258.
Fungus pyxioides coccineus, *vid.* Fungus non veſcus XXXIV. p. 97. n. 256. Fungus pyxioides ſeminifer, p. 98. n. 263
Fungus digitatus alveariorum, *vid.* Fungus non veſcus XLII. p. 99. n. 264.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0528-7
DFG

Fungos circâ quâ diætâ opus sit? p. 79. n. 195. p. 87. n. 222.
Fusterna quid? p. 1. n. 1.

G.

Galega altera vel sylvestris, p. 284. n. 734.
Galeopsis Matthioli, *vid.* Lamium, p. 133. n. 372. Dioscoridis vera, *ibid.* & n. 373. vulgaris, fœtens, purpurea, secunda, *ibid.* flore croceô luteô p. 134. n. 374. legitima vel vera, *ibid.* n. seq.
Galion album quorundam, p. 166. n. 449. Gallion candidô flore, *ibid.* Gallion tertium, *ibid.* Gallion album, *ibid.* Gallium flore albô, *ibid.*
Galion, *vid.* Gallium, p. 100. n. 265. Galion luteum, *ibid.*
Galla, fructus quercûs, p. 211. n. 584. varia plebi prognostica præbet, *ibid.*
Galli Crus, p. 221. 598.
Gallinaceus pes, *vid.* Fumaria bulbosa, p. 78. n. 193.
Gallion luteum, *vid.* Gallium, p. 100. n. 265.
Gallium luteum, p. 100. n. 265. flore luteo primum. *ibid.* flore luteo, *ibid.* Gallii primum genus, *ibid.* Gallium luteum multis medicis, præsagis etiam pollet virtutibus, p. 101. n. 265.
Gallium album latifolium, p. 166. n. 449. Gallium flore albô. *ibid.* Gallium album palustre, p. 18. n. 44.
Gariofilata, *vid.* Caryophyllata.
Garyofillata, *vid.* Caryophyllata
Gattaria herba, p. 161. n. 437.
Genista tinctoria Germ. p 101. n. 266. vulgaris. *ibid.*
Genistella infectoria vulgi, *vid.* Genista, p, 101. n. 266. Genistella tinctoria, *vid. ibid.*
Gentiana minor, *vid.* Centiana minor, p. 101. n. 267. Gentiana cruciata, *vid. ibid.* cruciata recentiorum. *ibid.* Gentiana III. item III. cruciana, *ibid.* media, *ibid.* Palustris angustifolia p. 102. n. 268. quarta, *ibid.* minima, Gentianæ 4. species. *ibid.*
Geranium batrachioides, p. 102. n. 269. Geranii species tertia *ibid.* Geranii batrach. cæruleum, it. flore albô, *ibid.* foliô Aconiti, p. 102. n. 270.
Geranium columbinum, p. 102. n. 271. foliô malvæ rotundô, *ibid.* Geranii vulgaris species *ibid.* Geranium alterum, item secundum, *ibid.* alterum Dioscoridis, *ibid.* Malvaceum sive Balsaminum, *vid.* Geranium columbinum, p. 103. n. 271. Geranium columbi-

num erectum, *ibid.* n. seq. procumbens tenuius laciniatum, p. 104. n. 273. cicutæ foliô moschatum & inodorum, *ibid.* n. seq. primum, supinum, majus, *ibid.* Geranium myrrhinum, item muscatum, σκανδικόφυλλον, *vid.* Geranium cicutæ foliô, p. 104. n. 274. cicutæ foliô minus & supinum, p. 104. n. 275. minus & primum, *ibid.* arvense, ibid. septimum sive gruinum, *ibid.* p. 105. n. 276. Moscatum inodorum, *ibid.* Rupertianum, *ibid.* tertium, primum, *ibid.* p. 105. n. 276.

Gerhardi Herba, p. 16. n. 40.

Geum rivale, *vid.* Caryophyllata aquatica.

Gladiolus floribus uno versu dispositis major, p. 105. n. 277 Gladiolus verus, item Germanicus, sylvestris, *vid. ibid.* Narbonensis, *ibid.*

Gladiolus palustris, *vid.* Juncus, p. 131. n. 365. aquatilis, *ibid.*

Glaux aquatica, p. 106. n. 278. exigua maritima, *ibid.* An glaux Dioscoridis, *ibid.* marina minor, *ibid.*

Glessum quid. p. 216.

Glossularia multiplici acinô, sive non spinosa, p. 121. n. 333. non spinosa fructu nigrô, *ibid.* n. 334. sylvestris rubra, p. 122. n. 335.

Glyzyrrhiza siliquosa, *vid.* Germanica, p. 106. n. 279. altera, vulgaris, *ibid.*

Gnaphalium montanum, p. 106. n. 280. flore rotundô, purpureum & album, *ibid.* svave rubens, p. 107. *ibid.* vulgare majus, minus, *ibid.* majus alterum, p. 107. n. 282. Anglicum vel Belgicum, *ibid.* medium, *ibid.* n. 283. Gnaphalion. *vid.* Gramen pratense p. 114. n. 307. Gnaphalium Hieronymi Bockii, *ibid.*

Gorcho, quale antiquorum Prussorum Deastrum, p. 213. n. 584

Graminis 49. species à p. 107. ad p. 121.

Gramen Parnassi vel Parnassum, p. 107. n. 284. hederaceum, recentiorum, *ibid.* p. seq. Gramen mannæ, p. 108. n. 285. Diversum est à gramine mannæ esculentô Lob. *ibid.* Manna quomodo ad edendum præparetur, *vid. ibid.* Gramen officinarum p. 109. n. 286. caninum sive Dioscoridis, item, canarium, medicatum officinarum, *vid. ibid.*

Gramen caninum supinum minus p. 109. n. 287. secundum *ibid.*

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0530-6
DFG

ibid. geniculatum caninum marinum vel maritimum, item spicatum, *ibid.* caninum tertium, *ibid.* Gramen dactylon, p. 109. n. 289.

Gramen montanum, p. 110. n. 290. arvense duplicis generis, *ibid.* n. 291. & seq. cristatum, *ibid.* n. 293. montanum aliud p. 111. n. 294. Pratense, *ibid.* n. seq. minus vel secundum, *ibid.* Paniculatum, *ibid.* n. 296. Gramen Mariæ Borussorum, *ibid.* n. 297. paniculatum odoratum *ibid.* Gramen segetum vel segetale, n. seq. segetale aliud, p. 112. n. 299.

Gramen pratense tertium, *vid.* Gramen segetum p. 112. n. 299. harundinaceum arvense, loliaceum, gramen agrorum, vel agrorum venti spica. *ibid.* leporinum, tremulum, tremulum majus, p. 112. n. 300. loliacei decimum genus, *ibid.* Gramen Caryophyllatum polycarpon, *ibid.* n. 301. montanum an spicâ variâ. *ibid.* Gramen hirsutum nemorosum, item pilosum, vel latifolium majus, p. 113. n. 302.

Gramen thyphoides maximum, p. 113. n. 303. asperum primum, item typhinum primum, *ibid.* n. 304. thyphoides spicâ angustiore, alopecuroides minus vel alopecurinum secundum, *ibid.* n. 305. typhoides culmô reclinatô, *ibid.* n. 306. alopecurinum tertium, it. alopecuroides minus, *ibid.* Gramen pratense tomentosum p. 114. n. 307. tomentarium, pratense, junceum lanigerum, *ibid.*

Gramen junceum spicatum p. 114. n. 308. marinum spicatum. *ibid.* mixtum ex junco & gramine *ibid.* junceum folio artic. sylv. *ibid.* n. 309 junceum sylvaticum, *ibid.* junceum aquaticum, *ibid.* n. 310. junceum semine acuminatô, p. 115. n. 311. junceum sextum, nemorosum, epigonatocavlon, *ibid.* n. 312. Cyperoides palustre majus, p. 115. n. 313. Cyperinum minus, *ibid.* Gramen Cyperoides palustr. spicâ pendulâ p. 116. n. 314. cyperoides minus spicâ divisâ, *ibid.* n. 315. spicis curtis divulsis, p. 117. n. 316. spicâ variante, *ibid.* n. 317. exile spicis nigris, *ibid.* n. 318. exile hirsutum, p. 118. n. 319. hirsutum capitulis Psyllii, *ibid.*

ibid. Cyperinum pilosum, *ibid.* hirsutum repens, p. 118 n. 320.
Gramen arundinaceum enode majus montanum. p. 118. n. 321. minus sylvaticum p. 119. n. 322. arundinaceum paniculâ molli spadiceâ majus *ibid.* n. 323. loliacei 8vi alia species *ibid.* tomentosum *ibid.* Gramen paiustre paniculatum altissimum, p. 119. n. 324. aquaticum panic. arundinaceum, *ibid.* Gramen arundinaceum foliis acutissimis paniculâ multiplici, p. 119. n. 325. arundinaceum paniceum divisâ paniculâ *ibid.* n. 326. paniceum spinâ simplici p. 120. n. 327. panici effigie & simplici spinâ, *ibid.* Gramen panicum spicâ aristis longis armata, p. 120. n. 328. paniceum secundum, *ibid.* panici effigie cum aristis, *ibid.* Marinum spicâ secalinâ p. 120. n. 329, latifolium spicâ triticeâ divulsâ, *ibid.* n. 330. Gramen loliaceum spicâ longiore,, p. 121. n. 331. montanum avenaceum spicatum, *ibid.* n. 332. sylvaticum secundum, item, montanum spicatum, *ibid.*
Gramen Levcanthemum floridum, *vid.* p. 38. n. 99.
Gramen Mannæ esculentum Prutenicum, quomodo præparetur? p. 108. n. 285.
Gramen Polyanthemum minus, *vid.* Caryophyllus montanus minor.
Gratia DEI., *vid.* Geranium Robertianum, *vid.* p. 105. p. 276
Grossularia, *vid.* Glossularia.

H.

Halimus, *vid.* Chamæcerasus.
Harundo, *vid.* Arundo.
Hedera helix, p. 122. n. 336. pervoluta sterilis Hederæ, *ibid.* Hederæ species tertia, item arboreæ sylvestre genus, major sterilis, *ibid.* Hedera terrestris, *ibid.* n. 337. vulgaris terrestris, humilis, hederula corona terræ, *ibid.* p. 123.
Hedypnois, *vid.* Dens leonis, p. 61. n. 165.
Helenium vulgare, p. 123. n. 338. item Helenion, *ibid.*
Helianthemum Plinii, *vid.* Chamæcissus.
Helichryson, *vid.* Elichrysum, p. 64 n. 155.
Heliochrysos sylvestris *vid.* Gnaphalium, p. 107. n. 281.
Heliotropium minus, *vid.* Echium scorpioides, p. 63. n. 151.
Helix *vid.* Hedera p. 122. n. 336.
Helleborine latifolia p. 123. n. 339.

339. recentiorum secunda, *ibid.* montana, n. 340. angustifolia, quinta, sexta recentiorum, p. 124. n. 341. angustifolia pratensis, *ibid.* n. seq.
Helxine cissampelos, *vid.* Convolvulus, p. 51. n. 131. & seq. Helxine sylvestris sive fluviatilis, p. 256. n. 668.
Hemeris, p. 211. n. 584.
Hemerocallis flore rubello, p. 140. n. 394. Herbariorum, p. 141. n. *ibid.*
Henricus bonus, sive tota bona, spinaciæ facie, Dodonæi, *vid.* Lapathum, p. 136. n. 381.
Hepatica alba, *vid.* Gramen Parnassi p. 107. n. 248.
Hepatica aurea, nobilis p. 275. 717.
Hepatica palustris, *vid.* Saxifraga aurea.
Hepatica stellata, *vid.* Asperula.
Hepatorium aquaticum. p. 34. n. 89. Hepatorium aquatile, *vid.* Conyza, p. 53. n. 137. Hepatorium vulgare, *Vid.* Eupatorium cann. p. 70. n. 174.
Heptaphyllum, *Vid.* Tormentilla.
Heraclea. *vid* Lamium, p. 134. n. 375.
Herba Gerhardi, p. 16. n. 40.
Herbarum proventus in areis hortorum quomodo impediendus? p. 293. n. 759.
Herculis simulacrum ex abiete confectum p. 2. n. 1.
Herniaria, p. 202. n. 554. multigrana serpilli facie, *ibid.*
Hieracium foliis & facie Chondrillæ, Lobelii, folio hirsutum, secundum, p. 124. n. 343. Hieracium Chondrillæ folio glabrum, *ibid.* Aphacoides, *ibid.* p. 125. Hieracium phlomoides, p. 125. n. 345. alpinum latifolium Pannonicum, primum latifolium, *ibid.* montanum, latifol. non sinuatum, *ibid.* n. 346. montanum hirsutum ramosum, *ibid.* n. 347. Hieracium montanum latifolium glabrum minus, p. 126. n. 348. alterum grandius *ibid.* n. 349. montanum angustifolium fruticosum majus, primum, Sabaudum, tertium vel tertii generis, *ibid.* Hieracium dentis leonis folio monoclonon, *ibid.* n. 350. intybaceum, *ibid.* foliis oblongis, in ambitu aculeatis, monoclonon, Joh. Lœs. *ibid.* n. 351.
Hieracium majus, *Vid.* Dens leonis, p. 61. n. 105. minus vel parvum, *ibid.*
Hippia, *vid.* Alsine.
Hippolapathum minus, *vid.* Lapathum, p. 135. n. 378. sylvestre, n. seq.

Hip-

Hippuris minor, *vid.* Equiſetum ſylveſtre, p. 65. n. 157. major, nuda, major altera, p. 66. n. 159.
Hirundinaria, *vid.* Aſclepias & Chelidonium.
Hirundinare, quid? apud veteres, p. 47. n. 119.
Holoſteum Dioſcoridis floribus albis, *vid.* Caryophyllus arvenſis glaber flore majore. Holoſtium Caryophyllæum, *vid.* Caryophyllus arvenſis hirſutus flore majore.
Holoſteum vel Holoſtium, *vid.* Gramen junceum ſextum, p. 115. n. 312.
Holoſteo affinis, p. 127. n. 352. item, Holoſteon vel Holoſtium Loniceri, *ibid.*
Holoſtium Lacunæ, p. 194. n. 535.
Hydrolapathum, magnum ſive aquaticum ſylveſtre, *vid.* Lapathum p. 135. n. 377. minus, *ibid.* n. 378.
Hydropiper, *vid.* p. 191. n. 528
Hyoſcyamus albus, candidus, alterum genus in maritimis, item, ſecundus, p. 127. n. 353.
Hypericum, vulgare & herba perforata, *vid.* p. 127. & ſeq. n. 354.
Hypogeniſta, p. 186. n. 515.
Hyſſopus campeſtris, montanus, ſylveſtris, *vid.* Chamæciſſus.
Hyſſopus agreſtis, *vid.* Satureja hortenſis.

I.

Jacea, p. 285. n. 741.
Jacea nigra major, ſqvamosô capite, montana prima, Auſtriaca prima, p. 128. n. 355. flore albô, *ibid* n. ſeq. Jacea laciniata ſqvamata, tertia Cretica p. 129. n. 357. latifolia capite hirſutô; auſtriaca ſecunda, montana villosô capite, quarta elatior, *ibid.* n. 358. latifol. cap. hirſuto flore albô *ibid.* n. 359.
Jacobea vel Jacobæa vulgaris, laciniata, item herba Jacobæa,
Jacobæa ſenecio, p. 129. n. 360. flos Jacobæus, *ibid.*
Jacobæa Barbareæ inſtar laciniata p. 129. n. 361.
S. Jacobi Flos ſive herba, item Flos Jacobæus, *vide* Jacobea p. 129. n. 360.
Iberis Naſturtii foliô p. 130. n. 362. item Iberis ſecunda.
Icteri cura magnetica, p. 48. n. 121.
Ilex urbe Româ vetuſtior, p. 213. n. 584.
Impia Plinii, *vid.* Gnaphalium p. 107. n. 281. vel impia herba, *ibid.*
Intybum & Intubum agreſte ſylveſtre, *vid.* Cichoreum ſylveſtre.

Inu-

Inula, *Vid.* Helenium p. 123. n. 338.
Jovis barba, *vid.* Sedum majus.
Ips qualis vermiculus? p. 291. n. 754.
Irio, *vid.* Erysimum, p. 69. n. 171.
Iris pratensis angustifolia humilior, p. 130. n. 363. tenuifolia, undecimæ altera species, angustifoliæ secundæ species altera, *ibid.* Ischæmon Plinii, item vulgare, *ibid.* Gramen dactylon, p. 110. n. 289.
Isopyron, *vid.* Trifolium palustre.
Juncus palustris major, maximus, aquaticus maximo, holoschœnos grandis, levis aquaticus, rotundus tertius, p. 130. n. 364. floridus, major n. seq. cyperinus, cyperoides paludosus & floridus, *ibid.* p. 131. lævis paniculâ non sparsâ, *ibid.* n. 366. palustris minor *ibid.*
Juncus bombycinus, *vid.* Gramen pratense, p. 114. n. 307.
Juncus λυχνάνθεμος major, *vid.* Gramen arundinaceum, p. 118. n. 321. tenuis minor, p. 119. n. 322.
Juncellus Cyperoides capitulô simplici, p. 131. n. 367.
Juniperus fruticosa, p. 131. n. 368. vulgaris, it. bacciferâ, minor, primum genus, humilis, nostras, *ibid.* vulgaris arbor, p. 132. n. 369. vulgaris celsior & arborescens, *ibid.*

K.

Kali foliô gramineô, p. 132. n. 370. spinoso affinis, p. 133. n. 371.
Κόβαλοι, Germ. Kobold quinam olim dicti dæmones visibiles, p. 241. n. 638.
S. Kunigundis herba p. 70. n. 174. dicta prima, *ibid.*

L.

Labrum Veneris *vid.* Dipsacus p. 62. ejus species *ibid.*
Lactuca agnina, p. 278. n. 723.
Lactucella, p. 194. n. 536.
Lagopodium flore luteo, p. 144. n. 399.
Lagopus p. 274. n. 714.
Lagopus, *vid.* Gnaphalium, p. 106. n. 280.
Lamium purpureum & album non fœtens p. 133. n. 372. album & purpureum, *ibid.* primum, *ibid.* purpureum fœtidum, p. 133. n. 373. luteum, foliô oblongô, p. 134. n. 374. flore luteô, *ibid.* maximum, sylvestre fœtidum, *ibid.* n. 375 minus folio caulem ambiente, n. seq.

Lampſana p. 228. n. 610. flore melinô. *ibid.*
Lampſana ſylvatica, p. 259. n. 679.
Lancea Chriſti, p. 179. n. 499.
Lanceola, p. 198. n. 543. minor, *ibid.* n. ſeq.
Laparſum, *vid.* Acetoſa.
Lapathum aquaticum folio cubitali ſive magnum, p. 135. n. 377. ſativum, paluſtre, *ibid.* aquaticum minus, *ibid.* n. 378. foliô ſubrotundô, n. 379. foliô minus acutô, vel retusô, *ibid.* Lapathum foliô acuto, p. 135. n. 380. unctuoſum, p. 136. n. 381.
Lappa major, purp. perſonata, vel perſonatia, p. 136. n. 382.
Lappa major candida, p. 137. n. 383. minor, *ibid.* n. 384.
Lathyris latiore folio, p. 138. n. 385. Lathyris Narbonenſis, *ibid.*
Lathyrus latifolius p. 138. n. 385. minor, *ibid.*
Lathyrus Anguſtifolius, p. 138. n. 386. Lathyrus ſylveſtris, *ibid.* n. 387.
Laureola folio deciduo flore purpureo p. 138. n. 388.
Laurus puſilla, p. 138. n. 388.
Ledum Sileſiacum, *vid.* Ciſtus, Ledon. p. 49. n. 125.
Ledum temulentiam accerſit, p. 49. n. 125. Ledum in haram congeſtum porcos à phthyriaſi curat, *ibid.*
Legumen Leoninum, p. 186. n. 515.
Leonina herba, p. 186. n. 515.
Leontopetalon alterum, *vid.* Fumaria bulboſa, p. 78. n. 193.
Leontopodium alterum vulgare *vid.* Gnaphalium p. 107. n. 282.
Lepores Chelidonii quid? p. 47. n. 119.
Leptophylla omnium viliſſima, p. 181. n. 504.
Lens major repens, p. 274. n. 715.
Lenticula paluſtris vulgaris, p. 139. n. 389. Aquatica *ibid.* Lenticula aquatica triſulca, *ibid.* n. 390. paluſtris bifolia *ibid.* n. 391. Lenticula paluſtris anguſtifolia, p. 140. n. 392.
Leucas montana, *vid.* Lamium p. 134. n. 374. quarta, *ibid.* n. 376.
Libanotis alba, *Vide* Seſeli Æthiopicum.
Lichen petræus latifolius, p. 140. n. 393.
Licopodium & Lycopodium, p. 169. n. 463.
Liliago cordi, p. 193. n. 533,
Lilium floribus reflexis alterum. lanugine hirſutum, p. 140. n. 394

394. Lilium montanum, *ibid.* Saracenicum, *ibid.* purpureum mas, *ibid.* Lilium convallium album, p. 141. n. 95. Lilium convallium minus, *ibid.* n. 396.
Limodoron, seu Orobanche, p. 186. n. 515.
Limnopeuce, *Vid.* Equisetum palustre, p. 65. n. 158.
Limonium, sylvestre, p. 210. n. 577.
Limonium pratense, *Vid.* Trifolium palustre.
Limonium, *vid.* Bistorta.
Linaria vulgaris lutea flore majore, p. 142. n. 397. Linaria maritima floribus odoratis, *ibid.* n. 398. Linaria quinta, p. 174. n. 484.
Lingva avis, *Vide* Fraxinus, p. 76. n. 190.
Lingva passerina, *vide* Fraxinus p. 76. n. 190.
Lingva serpentina, p. 179. n. 499.
Lingula vulneraria, p. 179. n. 499.
Linum pratense, *vid.* Gramen pratense, p. 114. n. 307.
Liquiricia, *vid.* Glyzyrrhiza, p. 106. n. 297.
Λιθοπώγων p. 172. n. 475.
Lithospermum majus erectum, p. 142. n. 399. arvense, radice rubrâ, p. 143. n. 400.
Lolium decimum. vid. Gramen leporinum, p. 112. n. 300.
Lolium 6. & Miliaria herba Plinii, p. 120. n. 327. Lolium & triticum temulentum, p. 121. n. 331.
Loto affinis vulneraria pratensis, p. 144. n. 401. Lotus sive Melilotus pentaphyllos minor glabra, p. 145. n. 402. Lotus coronata, *ibid.* Lotus urbana, p. 161. n. 436. Lotus sylvestris, *ibid.*
Lotus palustris, *vid.* Trifolium palustre.
Lunaria græca nostras, p. 145. n. 403. Lunaria racemosa, p. 146. n. 404. Lunaria botryitis polyphyllos, *ibid.*
Lupulus mas, p. 146. n. 405. Lupulus sativus & sylvestris, *ibid.* Lupulus salictarius *ibid.*
Lupulus fœmina, p. 147. n. 406.
Lusus Augusti nucibus ocellatis & quales hæ fuerint, p. 57. n. 140. quomodo ludicræ præterea rei materia sit, *ibid.*
Luteola herba salicis folio, p. 147 n. 407.
Lychnis sylvestris alba simplex, p. 147. n. 408. Lychnis sylvestris floribus purpureorubentibus, p. 148. n. 409. Lychnis sylvestris rubra, *ibid.* Lychnis sylvestris rubello flore,

te, *ibid.* Lychnis ſylveſtris aquatica purpurea ſimplex, *ibid.* Lychnis ſegetum major p. 148. n. 410. Lychnis arvenſis, *ibid.* Lychnis inter triticum, *ibid.* Lychnis ſylveſtris Beenalbum vulgò p. 148 n. 411. Lychnis ſylveſtris viſcoſa rubra anguſtifolia, p. 149. n. 412. Lychnis ſylveſtris purpurea, *ibid.* ſylveſtris quarta, *ibid.* Lychnis ſylveſtris flore incarnato, *ibid.* Lychnis viſcoſa flore muſcoſo, p. 149. n. 413. Lychnis ſylveſtris viſcoſa foliis Otitidis, p. 150. n. 414.

Lycopſis *vid.* Bugloſſum ſylveſtre minus.

Lycopſis, *vid.* Echium vulgare p. 64. n. 154.

Lycoſtaphylon fœmina, *vid.* Sambucus aquatica.

Lyſimachia lutea major, p. 150. n. 415. Lyſimachia lutea communis *ibid.* Lyſimachium luteum, *ibid.* Lyſimachia prima, *ibid.* Lyſimachia vera, *ibid.* Lyſimachia lutea ſalicaria, *ibid.* purpurea, p. 153. n. 415. Lyſimachia Communis perpetua major, *ibid.* Lyſimachia bifolia flore globoſo luteo, p. 151. n. 416. Lyſimachium aquatile, *ibid.* Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta magnô flore p. *ibid.* n. 417. Lyſimachia purpurea, *ibid.* Lyſimachia ſiliquoſa prima, *ibid.* Lyſimachia vel ſalicaria prima, *ibid.* Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta parvo flore, p. 151 n. 418. Lyſimachia ſiliquoſa ſecunda, *ibid.* Lyſimachia ſiliquoſa glabra major, *ibid.* Lyſimachia ſiliquoſa flore albô, p. 152. n. 419. Lyſimachia glabra minor, p. 152. n. 420. Lyſimachia ſiliqvoſa glabra minor flore albo, p. 152 n. 421. Lyſimachia Chamænerion dicta latifolia, p. 152. n. 422. Lyſimachia Antoniana, *ibid.* Lyſimachia ſpicata purpurea fortè Plinii, p. 152. n. 423. Lyſimachia purpurea *ibid.* Lyſimachia ſpicata cœrulea, p. 153. n. 424. Lyſimachia cœrulea hortenſis, quorundam veronica recta. *ib.*

Lyſimachia cœrulea galericulata p. 155. n. 425. Lyſimachia galericata, *ibid.* Lyſimachia hirſuta purpurea flore galericato, p. 156. n. 426.

M.

Malva ſylveſtris folio ſinuato, p. 156. n. 427. Malva ſylveſtris major, *ibid.* Malva agreſtis major, *ibid.* Malvæ vulgaris al-

altera ſpecies, *ibid.* Malva ſylveſtris procerior vulgaris, *ibid.* Malva vulgaris major, *ibid.* Malva ſylveſtris elatior, *ibid.* Malva ſylveſtris recta, *ibid.* Malva ſylveſtris rotundo folio p. 157. n. 428. Malva ſylveſtris pumila, *ibid.* vulgatiſſima, *ibid.* Malva minor *ibid.* Malva vulgaris minor, *ibid.* Malva ſylveſtris minor *ibid.* ſylveſtris recens pumila *ibid.* Malva agreſtis minor, *ibid.* Malva ſylveſtris ſupina, *ibid.*

Malus ſylveſtris minor p. 157. n. 429. Mala ſylveſtria, *ibid.* Malus ſylveſtris major alba, *ibid.*

Malum cur homini os claudat, Mala verò aperiant? *vid.* p. 158. n. 429,

Manna, quomodo ad edendum præparetur, *vid.* Gramen Mannæ, p. 108. n. 285.

Maratriphyllum paluſtre alterum p. 165. n. 446.

Marrubium album vulgare, p. 158. n. 430. Marrubium vulgare, *ibid.* Marrubium album, *ibid.* Marrubium candidum, *ibid.* Marrubium craſſum, *ibid.* Marrubium album odorum, *ibid.* Marrubium nigrum fœtidum, p 159. n. 431. Marrubium majus. *ibidem.*

Marrubium Cardiaca dictum p. 159. n. 432. Marrubium paluſtre glabrum p. 160. n. 433. Marrubium Aquaticum, *ibid.* Marrubium Aquaticum vulgi, *ibid.*

Matriſylva, *vid.* Aſperula.

Medica fruteſcens, *vid.* Trifolium ſylveſtre luteum.

Melampyrum luteum latifolium p. 160. n. 435. Melampyrum purpuraſcente comâ, p. 160. n. 434. Melampyrum primum p. 161. n. 435.

Melilotus officinarum germaniæ p. 161. n. 436. Melilotus Germanica flore luteo, *ib.* Melilotus vulgaris major, *ibid.* Melilotus vera, *ibid.*

Meliſſa ſylveſtris, p. 159. n. 432.

Membrum virile priſcis temporibus Veneri & Baccho ſacrum, variis afficiebatur honoribus, p. 91. n. 235.

Mentha Cataria vulgaris & major, p. 161. n. 437. Mentha felina, *ibid.* Mentha ſylveſtris folio longiore, p. 162. n. 438 Mentha ſylveſtris altera, *ibid.*

Menthaſtrum vel mentha ſylveſtris altera, p. 162. n. 438. Menthaſtrum ſylveſtre, *ibid.*

Mercurialis ſpicata ſeu fœmina, p. 162. n. 439. Mercurialis vulgaris & prima, *ibid.*
Mercurialis montoſa ſpicata, p. 163. n. 440. ſylveſtris fœmina, *ibid.* Meſpilus apii folio ſylveſtris ſpinoſa, p. 163. n. 441.
Μήτρα vocabulum æquivocum, p. 243. n. 638.
Militaris, 164. n. 442. Militaris ſeu millefolium flore purpureo, *ibid.* n. 443.
Millefolium vulgare album, p. 164. n. 442. vulgare, *ibid.* terreſtre vulgare Dioſcoridis, *ibidem.* flore albô ſeu militaris, *ibidem.* album, *ibidem.* Stratiotes millefolia, *ibid.* terreſtre majus, *ibid.* millefolia ſtratiotes *ibid.* Millefolium & Achillæa. *ibid.* Millefolium, *ibid.* Achillæa, *ibid.* Millefolium purpureum 164. n. 443. purpurei floris, *ibid.* vulgare purpureum minus, *ibid.* Terreſtre purpureis floribus, *ibid.* millefolium minus, *ibid.* Vulgare flore diluti ruboris, *ibid.* Rubrô colore, Millefolium aquaticum lenticulatum, p. 164. n. 444. Aquaticum filamentis foliaceis. p. 164. n. 446. Aqvaticum flore luteo galericulato *ibid.* n. 444. Millefolium aquaticum floſculis ad foliorum nodos, p. 165. n. 445. Millefolium aquaticum foliis fœniculi, ranunculi flore & capitulo, p. 165. n. 446. Millefolium aquaticum pennatum ſpicatum, *ibid.* n. 447. filamentis foliaceis, *ibid.* Millefolium aquaticum ſeu viola aquatica caule nudo, *ibid.* p. 166. n. 448.
Millegrana minima, p. 202. n. (555.
Moly montanum, p. 9. n. 17. 18
Mollugo montana anguſtifolia, Mollugo vulgatior herbariorum, Mollugo prima, mollugo montana ſeu ſecunda. p. 166. n. 449.
Μονόφυλλος bulboſa p. 180. n. 501.
Monorchis floſculis pallidè viridibus, p. 184. n. 510.
Moſchatella Cordi, p. 220. n. 594.
Morſus Diaboli *vid.* Succiſa.
Morſus Gallinæ *vid.* p. 134. n. 376.
Morſus Gallinæ folio hederulæ, p. 13. n. 28.
Morſus Ranæ, p. 178. n. 496.
Mulieres olim faciem fucabant ſucco mororum acidorum p. 233. n. 619.
Multibona ſeu Veelgutta, *vid.* Api-

Apium montanum, & Oreoselinum, p. 18. n. 45.
Muscus terrestris vulgaris, p. 166 n. 450. palustris, *ibid.* vulgatissimus, *ibid*, Hortensis, *ibid.* Pennatus, p. 167. n. 451. Pennatus tectis vetustis insidens, p. 167. n. 452. Muscus pennatus major cauliculis ramosis in summitate velut spicatus p. 167. n. 453. Muscus pennatus minor cauliculis ramosis in summitate velut spicatus p. 167. n. 454. Muscus filicinus minor repens, *ibid.* n. 455. Muscus bifolius procumbens foliis subrotundis p. 167 n. 456. Muscus ramosus erectus oblongifolius p. 168. n. 457. Muscus erectus foliis in orbem sparsis, p. 168. n. 458. Muscus uvida amans foliis subrotundis expansis, p. 168. n. 459. Muscus Cupressiformis ramosus p. 168. n. 460. Muscus membraneus pilosus, *ibid.* n. 461. Muscus erectus ramosus saturè viridis p. 169. n. 462. Muscus terrestris globatus p. 169. n. 463 terrestris, *ibid.* terrestris sive Lycopodium, *ibid.* Musci genus pro spicâ celticâ, p. 169. n. 463. Muscus clavatus foliis cupressi, p. 170. n. 464 Muscus coralloides muralis, p. 170. n. 465. Muscus pyxioides terrestris, p. 171. n. 466. Muscus terrestris pyxidatos alabastriculos imitatus, *ibid.* n. 466. Muscus terrestris coralloides erectus incanus, p. 171. n. 468. Muscus pyxioides saxatilis, *ibid.* n. 467. Muscus terrestris coralloides erectus cornibus ruffescentibus, *ibid.* n. 469. Muscus arboreus pyxioides pilosus, *ibid.* n. 470. Muscus capillaceus cinerei coloris è ramis ilicis dependens, *ibid.* n. 471. Muscus capillaceus longissimus, *ibid.* Muscus arboreus, *ibid.* n. 472. Muscus arborum, *ibid.* Muscus qvernus, *ibid.*
Muscus pulmonarius sive pulmonaria officinarum, p. 172. n. 473. Muscus pulmonarius corpusculis fuscis papillatus, *ibid.* n. 474. Muscus marinus λιτοπώγων dictus, *ibid.* n. 475. Muscus marinus capillaceus *ibid.* n. 476. Muscus aquaticus ceratoides, *ibid.* n. 477. Muscus aquaticus denticulatus, p. 173. n 478. Muscus aquaticus bombycinus retiformis, p. 173. n. 479. Muscus aquaticus bombycinus tenuissimis filamentis, *ibid.* n. 480. Muscus aquaticus tenuissimis foliis cauliculis adhæren-

hærentibus, *ibid.* n. 481. Muſcus aquaticus ſubterraneus, *ibid.* n. 482. Muſcus quidam incognitus cubitô longior ex puteo egeſtus, *vid.* p. 174. n. 482.

Myagrum ſiliquâ longâ, p. 174. n. 483. Alterum Thlaſpi effigie, *ibid.* Myagrum ſecundum *ibid.* Myagrum ſativum, *ibid.* n. 484. Myagrum primum, *ibid.* Myagrion ſive Camelina, *ibid.* Myagrum monoſpermon hirſutum ſiliquis rotundis, *ibid.* n. 485.

Myoſotis hirſuta reptans, *vid.* Echium p. 63. n. 151. Myoſotis ſcorp. p. 64. n. 153.

Myoſuros vel Myoſuron, *vid.* Holoſteo affinis, p. 127. n. 352.

Μυριόφυλλον, p. 177. n. 491.

Myriophyllon aquaticum minus, p. 165. n 445. Myriophyllum, *ibid.* n. 446. Myriophylli ſpecies coliculis fluitantibus, *ibid.* n. 446. Myriophyllum alterum equiſetifolium fluviatile, p. 166. n. 448. Myriophyllum alterum, *ibid.*

Myrrhida Plinii, *vid.* Geranium cicutæ folio moſchatum, p. 104. n. 274. & n. ſeq.

Myrrhis ſylveſtris ſeminibus lævibus, p. 175. n. 486. Myrrhis, *ibid.* ſylveſtris, *ibid.* ſeminibus aſperis, *ibid.* n. 487. nova Æquicolorum, *ibid.* inodora, *ibid.* n. 488.

Myrtillus p. 288. n. 748. Myrtillus exiguus, p. 289. n. 749.

N.

Napellus, *vid.* Aconitum cœruleum, p. 5. n. 8.

Napeta vulgaris, p. 161. n. 437. Napeta fruticoſa, *ibid.* Napeta Germanica. *ibid.*

Naſturtium aquaticum, p. 175. n. 489. Et ſecundum, *ibid.* ſupinum, *ibid.* Pratenſe, *ibid.* n. 490. Pratenſe magno flore, *ibid.* Aquaticum ſimplici flore, agreſte, *ibid.* Sylveſtre tenuiſſimè diviſum, *ibid.* 491. Naſturtium μυριόφυλλον, p. 177. n. 491.

Naſturtium paluſtre, *vid.* Eruca lutea, p. 68. n. 165. hybernum, *ibid.*

Nenuphar luteum, p. 177. n. 493. Nenuphar album, *ibid.* n. 495.

Neottia, p. 184. n. 511.

Nepeta agreſtis, *vid.* Calamintha arvenſis verticillata.

Noli me tangere, *vid.* Balſamine lutea.

Nummularia major lutea, p. 177 n. 492. Nummularia, *ibid.* Nummularia ſive Centmorbia, *ibid.*

Nux

Nux avellana, sylvestris agrestis, pontica, *vid.* Corylus, p. 55. n. 140. est admodum fructifera, *ibid.* quatuor earum differentiæ, *ibid.* cur nuces olim in nuptiis sparserint, p. 57. n. 140. Nuces in epulò sartorum amygdalarum locò appositæ, *vid.* Historia p. 58. Nux miraculum præbuit *ibid.* & seq.

Nux quadruplex in Prussiâ observatur p. 55. n. 140. Nux varios ludos antiquis subministravit. *ibid.* p. 57. Nuces spargere quid? *ibid.*

Nux sympatheticè melancholiam curat, p. 57. n. 140. Nux ridiculam aliquando Regiomonti præbuit historiam. *ib.* p. 58.

Nux post mortem alicujus miraculum præbuit, p. 58. n. 140.

Nymphæa lutea major p. 177. n. 493. Lutea *ibid.* Citrina *ibid.* altera flore ex toto luteò *ibid.* Nymphæa lutea minor parvo flore *ibid.* n. 494. Nymphæa parva alia *ibid.* Nymphæa lutea minor septentrionalium *ib.* Nymphæa alba major, *ibid.* n. 495. alba *ibid.* candida *ibid.* Nymphæa alba, lotus Ægyptia Alpini, major alba, *ibid.* Alba minima *ibid.* n. 496. Alba minor, *ibid.*

O.

Ocimastrum verrucarium, p. 256. n. 668.

Ocimastrum alterum, *vide* Scrophularia.

Ocimum vulgatius, p. 179. n. 497. Medium vulgatius, *ibid.* Ocimum medium, *ibid.* magnum *ibid.* mediocre, *ibid.* tertium & medium, *ibid.*

Oculus bovis, *vid.* Bellis major.

Ocymastrum sive Ocimoides, p. 147. n. 408.

Ocymoides rubrum, p. 148. n. 409. Ocymoides purpureum vel roseum, *ibid.*

Odontis, Odontitis, p. 41. n. 108.

Odontitis Plinii, p. 41. n. 108.

Oenanthe, *vid.* Filipendia, p. 73. n. 181. Oenanthe filipendula, item vulgaris, *vid. ibid.*

Oleaster Germanicus, p. 231. n. 616.

Onagra campestris hirsuta, p. 151. n. 417.

Onitis major, p. 185. n. 512.

Onobrychis floribus viciæ dilutè cæruleis, p. 179. n. 498 secunda, *ibid.* Clusii secunda, *ibid.*

Ononis, *Vid.* Anonis spinosa, p. 16. n. 41. Ononidis radix medetur calculo, Ictero,

Hydropi omnesque viſcerum infarctus expedit, p. 17. n. 41. Ononis in hortis coli non debet, *ibid.* quænam optima? *ibid.*

Ophioglosson, p. 179. n. 499. vulgatum, *ibid.* Ophioglossum *ibid.*

Ophris bifolia, 180. n. 500. Ophris μονόφυλλος bulboſa, *ibid.* n. 501. Ophris δύφυλλος bulboſa, *ibid.* n. 502 Ophris bifolia bulboſa, *ibid.*

Orchis alba bifolia minor calcare oblongo, p. 181. n. 503. Orchis bifolius, *ibid.* Orchis flore albo minor, *ibid.* Orchis ſerapias primus. *ibid.* Orchis palmata paluſtris tertia, ibid. n. 504. Orchis palmata pratenſis maculata, *ibid.* n. 505. Orchis ſerapias Lobelii, *ibid.* Orchis palmata flore galericulato dilutè viridi, p. 182. n. 506. Orchis palmata palmis inverſis flore albo. *ibid.* n. 507. Orchis muſcam referens major, p. 183. n. 508. Orchis myodes altera, *ibid.* Orchis muſcæ corpus referens muſculoſa, *ibid.* n. 509. Orchis Coleô unicô ſeu Monorchis floſculis pallidè viridibus p. 184. n. 520. Orchis abortiva fuſca, *ibid.* n. 511. Orchis abortiva, *ibid.* Orchis ſylveſtris, *ibid.* Orchis abortiva Lobelii. *ibid.*

Oreoſelinum, p. 18. n. 45.

Origanum vulgare, p. 184. n. 512. Origanum ſylveſtre, p. 185. n. 512. Oryganum 185 n. 512. Oryganum Italicum, *ibid.* Oryganum ſylveſtre album, p. 186. n. 513. Origanum album ſylveſtre flore albo, *ibid.* Origanum minus, *Vid.* Clinopodium p. 49. n. 126. item Verticillatum, *ibid.*

Ornithogalum luteum, p. 186. n. 514.

Ornus, *vid.* Oſtrya, p. 188. n. 250.

Orobanche major garyophyllum olens, p. 188. n. 515. Orobanche, *ibid.* Orobanche vera, *ibid.* Orobanche prima, *ibid.* Orobanche ſecunda, *ibid.* Orobanche ſeu Limodoron, *ibid.*

Orobanche μονόκλωνος radice acuminata, p. 187. n. 516. radicè dentatâ major, *ibid.* n. ſeq. Orobanche, *vid.* Convolvulus minor arvenſis, p. 52. n. 133.

Orobus ſylvaticus purpureus vernus, p. 187. n. 518. pannonicus primus *ibid.* viciæ foliis p. 187. n. 519. pannonicus ſecundus, *ibid.*

Orobus ſylveſtris, *vid.* Vicia ſepium.

Oſtrya

Oſtrya ulmo ſimilis, fructu in umbilicis foliaceis, p. 188. n. 520.
Otites Lychnidis ſylveſtre genus p. 149. n. 413.
Oxygalis, *vid.* Acetoſa, 1.
Oxycantha, *vid.* Meſpilus, p. 163. n. 441. acuta ſpina, *ibid.* Matthioli, Dioſcoridis, & Plinii ſpina appendix, *ibid.*
Oxycoccus, Oxycoccum, p. 289 n. 751.
Oxytriphyllon, p. 274. n. 716.

P.

Palma Chriſti paluſtris ſecunda, p. 181. n 504. Palma Chriſti maculata, *ibid.* n. 505. Palma Chriſti, *ibid.* Palma officinarum Chriſti, *ibid.* Palma Chriſti, p. 182. n. 504.
Panicaſtrella, *vid.* Gramen paniceum, p. 120. n. 329.
Panis forma ſeu figura olim varia fingebatur, p. 271. n. 705
Papaver erraticum majus, p. 188 n. 521. erraticum rubrum, *ibid.* Papaver Rhæas, *ibid.* rubrum, *ibid.* erraticum primum, *ibid.*
Papaver ſpumeum ſeu Ocymaſtrum alterum, p. 148. n. 411.
Paralyſis herba, *vid.* Primula veris, p. 279. n. 725.
Parietaria ſylveſtris ſecunda, p. 161. n. 435. Parietaria Sylveſtris Eyſtett. *ibid.*
Paris herba, p. 257. n. 671.
Paronychia, *vid.* Burſa Paſtoris minor.
Paſtinaca ſylveſtris tenuifolia, p. 188. n. 522. Dioſcoridis, *ibid.* Matthioli, *ibid.* erratica, p. 189. genuina, *ibid.* altera, *ibid.* n. 523.
Paſtinaca ſylveſtris, p. 189. n. 524. Arabum, p. 190. latifolia, *ibid.*
Pedicularia lutea, *vid.* Pedicularis pratenſis, p. 190. n. 525. Pedicularis pratenſis lutea, p. 190. n. 525. ſecunda, *ibid.* purpurea, *ibid.* n. 526. altera *ibid.* campeſtris prior, *ibid.* candida, p. 191. n. 527.
Pentaphyllum (lon) vulgare, p. 216. n. 586. primum & ſecundum, *ibid.* minus, *ibid.* majus, p. 217. *ibid.* minus luteum, *ibid.* Pentaphyllum majus vulgare, p. 216. 217. n. 586. Epilepſiæ medetur, *ibid.*
Percunos qualis Pruſſorum antiquorum Deaſter? p. 214.
Perfoliata Maſcula, p. 180. n. 500. Perfoliata napifolia ſiliquoſa, p. 2[illegible]. n. 73.
Periclymenum, *vid.* Chamæceraſus.
Perſicaria urens, p. 191. n. 528. prima, primum genus, mordax,

dax, *ibid.* mas, *ibid.* mitis, maculosa & non maculosa, n. 529. altera, *ibid.* minor, p. 192. n. 530. pumila, pusilla repens, *ibid.* Persicaria siliquosa, *vid.* Balsamine lutea.
Pes columbinus, *vid.* Geranium columbinum, p. 102. n. 271.
Pes Leonis, *vid.* Alchimilla.
Petasites major & vulgaris, p. 192. n. 531. florens & sine flore, flore punicante, mas *ibid.* minor, p. 193. n. 532. albo flore, candido, fœmina & Leucanthemos, *ibid.*
Peucedanum aquaticum, p. 165. n. 446.
Phalangium non ramosum, p. 193. n. 533. parvo flore, cauliculis simplicibus, *ibid.*
Phalaris pratensis minor, *vid.* Gramen leporinum, p. 112. n. 300.
Phellandrium, *vid.* Cicutaria palustris tenui folio.
Phragmites, *vid.* Arundo.
Phu, *vid.* Valeriana.
Phyllitis lacustris p. 206. n. 564
Phyllon Thalygonon Theophrasti p. 162. n. 439.
Φύσιγξ quid propriè significet? p. 9. 10. n. 18.
Phytevma foliis rapunculi, p. 228 n. 611. Matthioli, p. 229. n. 614.
Picea, *vid.* Abies, p. 1. n. 1.
Pilosella, p. 193. n. 534. major altera, *ibid.* repens hirsuta, n. 535. prima, *ibid.* media, p. 194. n. eod. minus hirsuta, vulgò, p. 194. n. 536.
Pilosella minor, *vid.* Gnaphalium montanum, p. 107. n. 280. Pilosella Dodonæi, *ibid.*
Pimpinella saxifraga major umbellâ candidâ, p. 194. n. 137. magna, p. 195. *ibid.* nostras communis major, vulgaris major, *ibid.* Saxifraga minor p. 195. n. 538. nostras communis minor, *ibid.* hircina, parva, tertia species, hircina minor, Germanica minor, saxifraga altera, *ibid.* Sangvisorba major, *ibid.* n. 539. major altera Italica, ejusque secundum genus, *ibid.* p. seq.
Pinus sylvestris sive pinaster, p. 196. n. 540. sylvestris montana, sponte proveniens, *ibid.*
Piper montanum, p. 138. n. 388
Pirola, p. 209. n. 577.
Pistolochia, *vid.* Fumaria bulbosa, p. 77. n. 193.
Pisum marinum, p. 197. n. 541.
Plantæ siccatæ plerumque citius nigrescunt parte pronâ, quàm aversâ. p. 160. n. 432.
Plantago latifolia sinuata, p. 197. n. 542. major, latifolia lævis, rubea, polycopos major, *ibid.* Angustifolia major,

jor, p. 198. n. 543. Plantago qvinquenervia lanceolata, minor, *ibid.* anguſtifolia minor, *ibid.* n. 544. pentacopos minor, *ibid.* latifolia glabra, minor, *ibid.* n. ſeq. Plantago latifolia incana, p. 198. n. 546. major, incana, media, Dodonæi ſecunda, minor Dioſcoridis *ibid.* p. ſeq. aquatica, latifolia, p. 199. n. 547. aquatica, foliis Betæ aut Plantaginis, flore albi Gallii, *ibid.* aquatica leptomacrophyllos, *ibid.* n. ſeq.

Plantaria, Plantanaria, *vid.* Sparganium.

Platanus ingens, p. 213. n. 584

Pneumonanthe, *vid.* Gentiana, p. 102. n. 268. Cordi, *ibid.*

Podagraria, p. 16. n. 40.

Podagræ remedium ex verbaſco p. 280. n. 726.

Pœna olim adulteri, p. 227. n. 607.

Polemonium primum Dodonæi p. 149. n. 411.

Polycantha Theophraſti p. 34. n. 92.

Polycmenum, *vid.* Clinopodium, p. 40. n. 126.

Polygala vulgaris, p. 199. n. 549. minor, *ibid.* Polygalon, ſive Polygala recentiorum rubeis & albis floribus, p. 200. n. 539. flore rubro purpuraſcente, & flore cæruleo, *ibid.* Polygala Tragi, cærulea, purpurea, alba, *ibid.*

Polygonaton & Roſa Mariana quinta, p. 149 n. 411.

Polygonatum, latifolium, vulgare, vel vulgatius, majus, p. 200. n. 550. baccis nigris, *ibid.* anguſtifolium non ramoſum p 201. n. 551. anguſtifolium primum, *ibid.* polygonatum quintum, alterum, tenuifolium, erectum, minus, rubris foliis, ambitu ſtellato, tenuifolium majus *ibid.* Polygonon I. Polygonum latifolium p. 201. n. 552, mas, vulgare, maſculum, majus, *ibid.* oblongô, anguſtô foliô p. 202. n. 553. tertium *ibid.* minus, *ibid.* n. ſeq. minimum, p. 202. n. 555. minus polycarpum p. 202. n. 556 fœmina, anguſtiſſimo & acutô vel gramineô folio, *ibid.* foliis gramineis n. 557. *ibid.* fol. gramin. alterum, p. 204. n. 556. Polygonum ſive Polyganus fœmina, *vid.* Equiſetum paluſtre, p. 65. n. 158 & ſeq. ſangvinalis fœmina, *ibid.* ſemine vidua, *ibid.*

Polypodium, p. 204. n. 559. vulgare, majus, *ibid.*

Polyſpermon, *vid.* Blitum Polyſpermon.
Polytrichon, *vid.* Adianthum.
Populago, *vid.* Caltha paluſtris.
Populus nigra, p. 204. n. 560. alba, *ibid.* p. ſeq. tremula, p. 205. n. 561. lybica, nigræ ſimilis in alpibus, populi tertia ſpecies, *ibid.*
Potamogeton rotundifolium, p. 205. n. 562. rotundiore folio, λειόφυλλον *ibid.* rotundifolium alterum, *ibid.* n. 563 Salicis folio. *ibid.* n. 564. Potamogeton, anguſtifol. fontalis & ſpicata, ἰτιόφυλλον, p. 206. *ibid.* foliis latis ſplendẽtibus, *ibid.* n. 565. altera, μαλακόφυλλον, *ibid.* Potamogeton foliis criſpis, p. 206. n. 566. ἑλόφυλλον. ſeu criſpum aut fimbricatum, *ibid.* gramineum latifolium, *ibid.* n. 567. gramineum tenuifolium, *ibid.* n. 568.
Potentilla p. 206. n. 569. repens hirſutie incanâ, p. 207. n. 570. erecta major, *ibid.* n. ſeq.
Potentilla plantula in jus euntibus à Sagis commendatiſſima p. 207. n. 569.
Potollo, quale antiquorum Pruſſorum Deaſtrum? p. 213. n. 584.
Potrympo qualis Pruſſorum Deaſter? p. 214.
Prædium, ejus etymologia, p. 269. n. 700.
Primula veris, *vid.* Bellis ſylveſtris minor. Primula veris hortenſis, p. 279. n. 725.
Promachium Feſtum apud Lacedæmonios, p. 19. n 48.
Propolis apum natales, p. 25. n. 66. lac imminuit, *ibid.* arthritidis dolor diſcutit, *ibid.*
Prunella, *vid.* Con da, p. 50. n. 28.
Prunella p. 208. n. 573. flore purpureo, vulgaris vel ſexta, *ibid.* Officinarum, *ibid.* flore albò, p. 209. n 574.
Prunus ſylveſtris, p. 207. n. 572 vulgaris, *ibid.*
Pſeudocrania, *vid.* Cornus p. 55. n. 139.
Pſeudohepatorium, *Vid.* Conyza p. 53. n. 137.
Pſeudolyſimachium purpureum, p 152. n. 419.
Pſeudolyſimachium cæruleum, p. 155. n. 424.
Pſeudomelanthium, p. 148. n. 410. Pſeudomelanthium flore rubeſcente, *ibid.*
Pſeudomelus, *vid.* Caryophyllus montanus minor.
Pſeudomyagrum, p. 174. n. 484.
Pſeudoorchis p. 180. n. 500.

Pſeu-

Pseudostruthium, p. 147. n. 407.
Ptarmica - sive Ptarmice, *vid.* Dracunculus Pratensis, p. 63. n. 156. Ptarmica Fuchsii, sylvestris, item vulgaris, *ibid.*
Pteridion masculum, *vid.* Filix ramosa, p. 74. n. 184.
Pulegium montanum, *vid.* Clinopodium, p. 49. n. 126.
Pulicaria mascula, p. 91. n. 528. fœmina, n. 528.
Pulmonaria p. 172. n. 473. Pulmonaria tertia, *ibid.* Pulmonaria secunda, *ibid.* Pulmonaria vulgaris *ibid.* Pulmonaria Lichenis quoddam genus, *ibid.* Pulmonaria latifolia, *vid.* Symphytum maculosum.
Pulsatila vulgaris. p. 209. n. 575. recentiorum, communis, flore crassiore & majore dilutiore, *ibid* foliô Anemones secund. n. seq.
Pulvis argentum constanter deaurans, p. 45. n. 118
Pycnocomus, p. 16. n. 40.
Pyra sylvestria, p. 211. n. 583. majora *ibid.*
Pyrola, rotundifolia major, p. 209. n. 577. à pyri folio, p. 210. *ibid.* major, vulgatior, in campestribus alia, *ibid.* rotundifolia minor, *ibid.* n. 578 quarta minima, *ibid.* acutifolia geniculatâ radice, *ibid.* p. 210. n. 579. folio mucronato serrato, *ibid.* n. 580. minor, secunda tenerior, *ibid.* Pyrola frutescens arbuti folio p. 211. n. 571. alsines flore Europæa, *ibid.* n. seq.
Pyrus sylvestris, p. 211. n. 583.

Q.

Qvercus, p. 211. n. 584. cum longo pediculo, vulgaris, pannonica latifolia, *ibid.* marina p. 216. n. 585. maritima vesiculas habens, *ibid.* Qvercus ingens olim in Prussiâ Idololatrica, p. 213. n. 584. Qvercus ultra ter centum annos durat, *ibid.* p. 213. Qvercus fascino impotentiam creat, p. 214. Qvercus asylum antiquis, p. 214. à quercu loqui quid? p. 214. Emplastrum ex qvercu Lœselii, p. 212. n. 584.
Qvinquefolium majus repens, p. 216. n. 586. vulgare quartum. majus luteum, *ibid.* majus repens luteum, p. 217. n. 587. minimum genus vel primum, *ibid.* minus luteum, *ibid.* minus repens lanuginosum luteum, minus, *ibid.* n. 588. quinquefolii quarti flavô flore prima species & secunda, *ibid.* Qvinquefolium erectum luteum, p. 118. n. 589. hirsutum lu-

luteum, *ibid.* n. 590. paluſtre rubrum, *ibid.* n. 591.

R.

Radicula magna, p. 226. n. 607
Radicula ſylveſtris, p. 227. n. 608. radix ſylveſtris p. 228. n. 610.
Radix dulcis, communis, *vid.* Glyzyrrhiza, p. 106. n. 279.
Radix cava, item Radix cava major, *vide* Fumaria bulboſa p. 77. n. 193. radix cava herbariorum, *ibid.* & p. ſeq.
Ranunculus nemoroſus luteus, Ranunculus phragmites, p. 219. n. 592. ſylveſtris alterum genus, *ibid.* ranunculi ſpecies tertia, quarta, *ibid.* ranunculus nonus, nemoroſus, *ibid.* nemoroſus albus, *ibid.* n. 593 candidus, quarta ſpecies, lactea, ſylvarum, *ibid.* ranunculus octavus phr gmites, flore albo, ranunculi tertii tertium & quartum genus, *ibid.* Ranunculus nemoroſus Muſcatellina dictus, p. 220. n. 594. minimus, Septentrionalium, *ibid.* nemoroſus hirſutus foliis caryophyllatæ, *ibid.* n 595. pratenſis, erectus, acris, *ibid.* n. 596. pratenſis ſurrectis cauliculis, ſylveſtris & ſecundus, hortenſis ſecundus, polyanthemus maculatus, p. 221. n. 596. pratenſis repens hirſutus, p. 221. n. 597. Ranunculus pratenſis radice verticillæ modo rotundâ, Ranunculus bulboſus, p. 221. n. 598. radice bulboſâ, *ibid.* tuberoſus, exiguus & primus; ranunculi tertia ſpecies, *ibid.* minor, nona ſpecies, ranunculus quintus lanuginoſus primus, *ibid.* Arvenſis echinatus, p. 222. n. 599. arvorum, arvenſis anguſtifolius ſive decimus quartus, ſylveſtris tertius, ſativus, hortenſis ſimplicis prima ſpecies, ſativus, quinta ſpecies, *ibid.* Ranunculus paluſtris Apii foliô lævis, p. 222. n. 600. rotundiore foliô, foliô Apii tertius, primus. *ibid.* primum ejus genus, tertius. p. 223. *ibid.* Paluſtris apii foliô lanuginoſus, *ibid.* n. 601. Ranunculi ſecunda ſpecies, vel ſecundus, p. 223. n. 601. Aqvaticus folio rotundô, &c. *ibid.* n. 602 aquaticus Hepaticæ facie, fluviatilis, *ibid.*
Ranunculus longifolius paluſtris major, p. 223. n. 603. lanceatus major, πλατύφυλλος, *ibid.* Paluſtris ſerratus p. 224 n. 604. aquatilis anguſtifol. ſerratus lanceatus ſive decimus nonus

nonus, *ibid.* montanus Aconiti foliô, flore globosô, p. 225. n. 605. alpinus, luteus sive undecimus, sextus, montanus, alpinus, glomeratus, globosus sive montanus, *ibid.* Aconitifolius, folio rotundo ad radicem præstolante, *ibid.* n. 606.

Raphanis magna, p. 226. n. 607

Raphanus sylvestris, p. 225. n. 607. major, vulgaris seu rusticanus, crassâ radice, agrestis, *ibid.* p. 226. aquaticus p. 227. n. 608. sylvestris officinarum aquaticus, *ibid.* aquaticus alter, *ibid.* n. 609. Raphanus pœna olim adulterorum, p. 226. n. 607. quomodo Raphanus vulgaris orbes stanneos vel ligneos attollat, p. 227. n. 607.

Rapistrum aquaticum, p. 227. n. 609. flore luteô p. 228. n. 610. arvorum, *ibid.*

Rapum divi Antonii, p. 221. n. 598.

Rapum genistæ, p. 186. n. 515.

Rapi sylvestris genus, *vid.* Campanula pratensis flore conglomerato, p. 33. n. 86.

Rapunculus spicatus, p. 228. n. 611. quintus, sive nemorosus primus, sylvestris, spic. albens, flore albô spicatô, *ibid.* rapunculus alopecuroides, *ibid.* Rapunculus scabiosæ capitulo cæruleo, p. 229. n. 612. scabiosæ capitulo candido, *ibid.* n. 613. Persicifolius, magnô flore, *ibid.* n. 614. campanulatus Nerii folius primus, *ibid.* Rapunculum sylvestre, p. 228. n. 611. alopecuroides. *ibid.*

Rapuntium majus Alopecuri, p. 228. n. 611. montanum capitatum leptophyllon, p. 229. n. 612.

Regina Prati, *vid.* Barba capræ.

Resta bovis, p. 16. n. 41.

Rhamnus catharticus p. 230. n. 615. alia species, Rhamnus solutivus, *ibid.* salicis folio angusto, fructu flavescente; Rhamnus secundus, *ibid.* n. 616. primus Dioscoridis creditus p. 231. n. 616. Rhamnus quorundam, *ibid.*

Ribes officinarum. item. Arabum, rubra, Fuchs. vulgaris, hortensis, vulgò, p. 121. n. 333. vulgaris nigrô fructu, it. sylvestris, nigra, baccis nigris, *ibid.* n. 334. sylvestris. p. 122 n. 335.

Ribesium fructu nigrô, *vid.* Grossularia, p. 121. n. 334.

Rickojothi quale antiquorum Prussorum Deastrum? p. 213.

Robertiana & herba Roberti, *vid.* Geranium Robert. p. 105. n. 276.
Robigo, p. 292. n. 759.
Rorella, p. 231. n. 617. minor prima, *ibid.*
Ros Solis, p. 231. n. 617. foliô rotundô, *ibid.* major, *ibid.*
Rosa sylvestris vulgaris flore odorato, p. 231. n. 618. odorata incarnato flore, ejus primum genus, *ibid.* p. 232. canina, odorata, sylv. altior. *ib.*
Rosmarinum sylvestre, *vid.* Cistus Ledon, p. 49. n. 125.
Rostrum ciconiæ, *vid.* Geranium cicutæ foliô p. 104. n. 274. inodorum, item vulgare, *ibid.* n. seq.
Rubeola, *vid.* Asperula.
Rubertiana vulgò, *vid.* Geranium Robertianum, p. 105. n. 276.
Rubigo, p. 292. n. 759.
Rubus vulgaris sive fructu nigrô, p. 232. n. 619. primus arvensis, grandis & secundus, vulgaris. *ibid.* Batis *ibid.* repens p. 233. n. 620. minor, humilis Belgicus, humilis & primus, *ibid.* rubi alterum genus, reptans, *ibid.* idæus, spinosus, idæus Diosc. *ibid.* n. 621, idæus vulgaris, exiliibus spinis, *ibid.*
Rubus tertius montibus proprius p. 234 n. 621. saxatilis alpinus, ibid. 622. parvus saxatilis, alpinus, alpinus humilis, *ibid.*
Rumex palustris *vid.* Lapathum p. 135. n. 377. Rumicis quintum genus, *ibid.* agrestis, *ib.* n. 379. tertium genus, p. 136. n. 381.
Russi quomodo pulvere clavorum musci terrestris ignes suos celebrent Chaldaicos, ac flammas ludicras excitent, p. p. 170. n. 463.
Ruta pratensis, herbariorum, p. 267. n. 659.

S.

Saginæ spergula, p. 13. n. 29.
Sagitta aquatica foliis variis p. 234. n. 623. aquatica, minor latifolia, sagittalis, sagittaria minor, *ibid.* Sagitta aquatica minor angustifolia, p. 235. n. 625.
Salix prima vel procera, p. 235. n. 626. Salix perticalis, quartum genus, Dioscoridis, *ibid.* vulgaris alba arborescens, *ibid.* caprea rotundifolia, p. 236. n. 627. latô foliô, latifolia, rotunda platiphyllos, alia *ibid.* vulgaris rubens, *ibid.* n. 628. primum item tertium genus, *ibid.* Salix Sabina seu Amerina,

rina, minor, viminalis & Gallica, p. 237. n. 628.
Salix caprea latifolia, p. 237. n. 629, folio ex rotunditate acuminatô, *ibid.* sylvestris latifolia, *ibid.* n. 630. sylvestris angustifolia p. 238. n. 631. alterum genus sativa lutea tertia, vitellina, *ibid.* fragilis latifolia, salicis tertium genus & salix alba, candida, candidô cortice *ibid.* n. 632. fragilis tenuifolia, *ibid.* n. 633.
Salix rubra obtusô latiore folio, p. 239. n. 634. oblongô salviæ folio, *ibid.* n. 635. humilis angustiore oblongo folio, *ibid.* n. 636. pumila angustifolia prima, *ibid.* n. 637. altera pumila angustifolia, *ibid.* pumila brevi angustôque foliô incanô. *ibid.*
Salix Amerina olim erat coronamentum, p. 239. n. 637.
Salsirora, p. 231. n. 617.
Sambucus, p. 240. n. 638. Ejus primum genus, fructu in umbellâ nigrô, vulgaris, campestris, *ibid.*
Sambucus olim erat domicilium Putschæti tutelaris numinis, cui rustici quondam litare soliti sunt ad propitium ipsis reddendum Marcopolum Deum Magnatum, p. 241.
Sambucus glires & mures fugat. p. 243. n. 638.
Sambucus humilis sive Ebulus, p. 243. n. 639.
Sambucus aquatica flore simplici p. 243. n. 640. Sambucus palustris, *ibid.* p. 244. Syrupus ejus ex succo affectibus faucium salutaris, *ibid.* p. 244. Baccæ emeticæ sunt, *ibid.*
Sanctum derivatur à sagminibus, p. 282. n. 729.
Sangven *vid.* Cornus, p. 55. n. n. 139.
Sangvinaria *vid.* Gramen dactylon, p. 110. n. 289.
Sangvinaria, p. 201. n. 552.
Sanicula, Officinarum, p. 244. n. 641.
Sapinus quid? p. 1. n. 1.
Saponaria major lævis, p. 244. n. 642. in lue Gallicâ utilis, *ibid.*
Sardous ranunculus, p. 223. n. 601.
Satureja hortensis, sativa, p. 245. n. 643.
Satyrium octavum, *vid.* Helleborine, p. 123. n. 339.
Satyrion decimum, p. 180. n. 500. Satyrium fœmina foliis maculatis, p. 181. n. 505. Satyrion fœmina, *ibid.* Satyrion Basilicon Græcorum, *ibid.* Satyrion Basilicon fœmina, *ibid.*

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0553-5 DFG

Satyrion aborrivum ſpecies Hypocyſti, p. 184. n. 511. Satyrium novum, *ibid.*
Savina ſylveſtris, p. 170. n. 464. Savina ſylveſtris Tragi, *ibid.* Savina Tragi ſylveſtris ſeu ſilaginis Plinianæ prima ſpecies p. 170. n. 464.
Saxifraga rotundifolia alba, p. 245. n. 644. Chelidonides dicta. *ibid.*
Saxifraga lutea, p. 161. n. 436.
Saxifraga Anglica, p. 203. n. 556. Saxifraga rotundifolia aurea, p. 246. n. 644.
Saxifragia, *vid.* Saxifraga.
Saxum ingens in fruſta artificialiter redigere, p. 215.
Scabioſa major ſquamatis capitulis flore purpureô p. 240. n. 646. floſculis candidiſſimis, *ibid.* n. 647.
Scabioſa pratenſis hirſuta officinarum ſeu vulgaris, p. 247. n. 648.
Scabioſa multifido folio, flore flaveſcente, p. 247. n. 649.
Scabioſa ſylveſtris minor cœrulea p. 229. n. 612. media, ſerrato anguſtifolio flore globulariæ, *ibid.*
Scirpi primum genus, *vid.* Gramen arundinaceum, p. 118. n. 321. Scirpi alterum genus, p. 119. n. 322.
Scordium, p. 247. n. 650. magnis & multis virtutibus pollet, *ibid.*
Scorpioides tertium, p. 63. n. 151. minus, aquaticum, *vid.* Echium, p. 63. n. 151. majus Dodonæi, p. 64. n 153.
Scorzonera foliis nervoſis, Germanica, p. 248. n. 651.
Scrophularia aquatica major caule fimbriato, p. 248. n. 652. Tineis & phagedænæ medetur, *ibid.* p. 249. Amuletum præſtat, *ibid.* p. 250,
Scrophularia nodoſa fœtida, p. 250. n. 653. multis morbis medetur. *ibid.*
Securidaca, p. 250. n. 654.
Sedum aquatile, *vid.* Aloe paluſtris. Sedum majus vulgare, p. 251. n. 655. Sedum minus, *vid.* ſempervivum minus.
Selago tertia, p. 169, n. 462. Selaginis ſpecies altera, *ibid.* n. 463.
Sempervivum majus, p. 251. n. 655 Sempervivum minus vermiculatum acre, p. 251. n. 656. Sempervivum caulicu lis repentibus, p. 252. n. 657.
Senecio minor vulgaris. p. 252. n. 658. inflammationi mammarum, nec non ictui apis medetur. *ibid.*
Seriphium Germanicum, p. 177 n. 491.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0554-1
DFG

n. 491. Seriphium absynthium, *ibid.* Seriphium *ibid.*
Seris Picris, *vid.* Cichoreum sylvestre.
Serpillum vulgare majus, p. 253. n. 659. Serpillum minus, *ibid.* n. 660. Serpillum minimum repens, flore candido, *ibid.* n. 661.
Serratula, p. 253. n. 662.
Serretta sive Ceretta, *Vid.* Serratula.
Sesamoides magnum Salmanticum, p. 149 n. 413.
Sesanum. p. 174. n. 484.
Seseli Æthiopicum, p. 253. n. 663
Sideritis vulgaris hirsuta erecta, p. 254. n. 664. Sideritis arvensis latifolia glabra, p. 255. n. 665. Sideritis arvensis angustifolia rubra, p. 255 n. 666
Sideritis prima Heraclia, p. 160. n. 433. Sideritis secunda Matthioli, *ibid.*
Sideritis secunda Dioscoridis. p. 196. n. 539. Sideritis cærulea, p. 156. n. 425.
Sigillum S. Mariæ. *vid.* Helleborine, p. 124. n. 339. Sigillum S. Mar. tertium, *ibid.* n. 341.
Sigillum Salomonis, latifolium, p. 200. n. 550. angustifolium p. 201. n. 551.
Siler Plinii, *vid.* Evonymus, p. 70. n. 173.
Sinapis agrestis, p. 228. n. 610.
Sion, Sium, sive Apium palustre foliis oblongis, p. 254. n. 667
Sion Cratevæ Erucæfolium. p. 176. n. 489.
Siser sylvestre, *vid.* Pastinaca sylvestris, p. 189. n. 524.
Sisymbrium aquaticum, p. 176. n. 489. Sisymbrium aquaticum primum, *ibid.* Sisymbrium Cardamine, *ibid.* Sisymbrium alterum, *ibid.* Sisymbrium alterum Dioscoridis, *ibid.* Sisymbrium aquaticum secundum, *ibid.* n. 490. Sisymbrium Cardamine secundum *ibid.* Sisymbrium sylvestre, p. 227. n. 608.
Sisyrinchion p. 186. n. 514.
Smilax lævis, *vid.* Convolvulus, p. 51. n. 131. & seq.
Snips quid? p. 260. n. 754.
Solanifolia Circæa dicta major, p. 256. n. 668.
Solanum officinarum &c. p. 256 n. 669. Solanum scandens seu dulcamara, p. 256. n. 670 Solanum quadrifolium bacciferum, p. 257. n. 671.
Solidago Saracenica latifolia & angustifolia serrata, p. 286. n. 742. 743.
Sonchus asper, p. 258. n. 674. Sonchus asper laciniatus latifolius, p. 257. n. 672. Sonchus

chus angustifolius, p. 258. n. 673. lævis lanceatus angustifolius, *ibid.* n. 674.
Sonchus lævis minor paucioribus laciniis, p. 259. n. 676. Sonchus laciniatus latifolius, *ibid.* n. 677. Sonchus laciniatus muralis parvis floribus, *ibid.* n. 678.
Soncho affinis, Lampsana sylvatica, p. 259. n. 679.
Sophia Chirurgorum, p. 177. n. 491. Sophia, *ibid.* Sophia latifolia, *ibid.*
Sorbus sylvestris domesticæ similis, p. 260. n. 680. contra calculum & Ischuriam facit, *ibid.*
Sorbus aculeata, *vid.* Mespilus, p. 163. n. 441.
Stœchas citrina, *vid.* Elichrysum. p. 64. n. 155.
Sparganium ramosum, p. 260. n. 681.
Spergula, p. 13. n. 29.
Spergula bifolia lini capitulis, p. 261. n. 682. Spergula perpusilla lanceatis foliolis, p. 261. n. 683.
Spica Celtica p. 169. n. 463.
Spina alba tomentosa latifolia sylvestris, p. 261. n. 684.
Spina cervina, alba, infectoria, pumila prima, p. 230. n. 615. cervalis, *ibid.*
Spondylium vulgare hirsutum, p. 262. n. 685. ridiculam præbet historiam, *ibid.*
Sponsa Solis, p. 231. n. 617.
Sportulæ quid? p. 207. n. 569.
Sputatores adversus & tussientes singularis antipathia mulieris cujusdam, p. 282. n. 730.
Sqmamatia, *vid.* Orobanche, p. 187. n. 517.
Staphylinus sylvestris, *vid.* Pastinaca sylv. p. 188. n. 522.
Stuppars, *vid.* Conyza, p. 54. n. 137.
Stelis quid? p. 1. n. 1.
Stellaria, *vid.* Alchimilla, p. 7. n. 13.
D. Stephani herba, p. 256. n. 668.
Straminea aut scirpea antiquorum simulachra in spectaculis adhibita, quid sint, p. 118. 119. n. 321.
Stratiotes, *vid.* Aloe palustris.
Stratiotes millefolia, 164. n. 442
Stratiotes fluviatilis, p. 166. n. 448.
Succisa hirsuta cœrulea, s. Morsus Diaboli p. 262. 263. n. 686. Herba polychresta est, *ibid.*
Succisa hirsuta candida, hirsuta cærulea p. 263. n. 687. foliis incisis laciniatis, p. 263. n. 688.

Su-

Superba, *Vid.* Caryophyllus plumarius albus.
Symphytum, Consolida major, p. 264. n. 689. ungventum hopliatricum Anshelmi, *ibid.* Symphytum maculosum, seu Pulmonaria latifolia, p. 265. n. 690. Symphytum Petræum. p. 208. n. 573.
Symphytum medium, *vid.* Consolida media, p. 50. n. 128.

T.

Tanacetum vulgare luteum, p. 256. n. 691. Helminthagogum est hydroticum & diureticum, *ib* p. 268. Tanacetum foliis crispis, p. 266. n.692.
Tanacetum album seu acutum, *vid.* Dracunculus pratensis, p. 63. n. 150.
Taraxacon minus, *vid.* Dens leonis, p. 61. n.165.
Taxus, p. 266. n. 693. scobs taxi canibus rabidis medetur, *ib.*
Telephium vulgare, p. 266 n. 694. superstitiosè usurpatur à vulgo. p. 267. n. 694.
Testiculus vulpinus primus, cujus flores culices exprimunt, p. 181. n. 503. Testiculus latifolius, *ibid.* Testiculus bifolius, *ibid.* Testiculus muscarius quartus p. 183. n.508
Teucrium, *vid.* Chamædris spuria major.
Teucrium, *Vid.* Veronica.
Thalictrum majus siliquâ angulosâ aut striatâ, p. 267. n.695.
Thalictrum pratense angustifolium, *ibid.* n. 696. Thalictrum angustissimô foliô, p. 268. n. 697.
Thalictrum p. 177. n. 491. Dodonæi, *ibid.* Sophiæ, *ibid.*
Thapsus barbatus, *vid.* Verbascum mas, p. 279. n. 726.
Theligono affinis herba, p. 246. n. 644.
Thilypteris filix fœmina, p. 74. n. 183.
Thlaspi arvense siliquis latis, p. 268. n. 698. Thlaspi fruticosum incanum, *ibid.* n. 699.
Thlaspi alterum p. 225. n. 607. majus vel magnum, p. 226. n. 607.
Thymbra vera & sativa, *vid.* Satureja hortensis.
Thymelæa, p. 138. n.388.
Tilia fœmina folio majore, p. 268. n. 700. arbor Borussis olim idololatrica fuit, p. 269 n. 700.
Tiliæ lignum teredinis expers, p. 268. n. 700. Tiliæ lignum materia simulachrorum fuit, *ibid.* Tiliæ cortex materiam funibus rebusque aliis parandis præbet, *ibid* Tiliæ scobs aurum subitò colliquari facit, p. 269. n. 700.

Ti-

Tithymalus helioſcopius, p. 269 n. 700.
Tithymalus ſylveſtris *vid.* Balſamine lutea.
Tomentum ſeu centunculus, *vid.* Gnaphalium, p. 107. n. 281.
Tormentilla ſylveſtris, p. 270. n. 702.
Trachelium vulgare, foliis urticæ, *vid.* Campanula vulgatior.
Trachelium minus, p. 33. n. 86.
Tragopogon luteum abortivum p. 270. n. 703. Tragopogon pratenſe luteum majus p. 270. n. 704.
Tragoſelinum majus. p. 194. n. 537.
Tragoſelinum petræum, p. 195. n. 538.
Tragum, Tragon, vel Tragus, *Vid.* Kali, p. 133, n. 371.
Tribulus aqvaticus p. 271. n. 705. Tribulus olim Thracibus panem ſubminiſtrabat, *ib.*
Trifolium paluſtre, fibrinum, Caſtoris. &c. p. 271. n. 706. Trifolium pratenſe purpureum, p. 272. n. 707. Trifolium album, p. 272. n. 708. Trifolium luteum capitulo breviore, *ibid.* n. 709. Trifolium pratenſe luteum capitulo lupuli, vel Agrarium, p. 273. n. 710. Trifolium montanum album, *ibid.* n. 711. Trifolium purpureum majus, *ibid.* n. 712. Trifolium ſpicâ longiſſimâ rubente, p. 273. n. 713. lac auget p. 274. n. n. 713. Trifolium arvenſe humile ſpicatum, ſive lagopus, p. 274. n. 714. Trifolium ſylveſtre luteum ſiliquâ cornutâ, p. 274. n. 715. Trifolium acetoſum vulgare, *ib.* n. 716. hepaticum flore ſimplici, p. 275. n. 717.
Trifolium frugiferum, *Vid.* Fragaria vulgaris, p. 75. n. 188.
Trifolium hepaticum flore ſimplici, p. 275. n. 717.
Trifolium odoratum ſ. Melilotus, p. 161. n. 436. Trifolium odoratum primum Dodonæi, *ibid.*
Triglochin, *Vid.* Gramen junceum, p. 114. n. 308.
Trinitas, Trinitatis herba, p. 275. n. 717.
Trinitatis flos, p. 285. n. 741.
Trips, qualis vermiculus, p. 291. n. 754.
Triticum vaccinum, p. 160. n. 434.
Trollius flos, p. 225. n. 605.
Tunica minima, *Vid.* Caryophyllus minimus muralis.
Turca, p. 202. n. 554.
Tuſſientes adversùs & ſputatores ſingularis antipathia, p. 282. n. 730. Tuſſi-

Tussilago vulgaris p. 275. n. 718. lanugo ejus certo modo præparata fomitem igniarium tenerrimum subministrat p. 276. *ibid.* Tussilaginatum optimum loco Tabaci præparare, *ibid.*

Tussilago altera, p. 31. n. 83. Tussilago major, p. 192. n. 531.

Typha palustris major, p. 277. n. 719.

V.

Vaccinia nigra, p. 288. n. 748. Vaccinia rubra, *ibid.* n. 749. Vaccinia palustris, *ibid.* n. 751.

Valeriana sylvestris major, item vulgaris, p. 277. n. 720. Semen catharcticum est *ibid.* p. 278. Radix locô amuleti oculos confortat, *ibid.*

Valeriana Græca, cœrulea, peregrina, p. 278. n. 721. palustris minor, *ibid.* n. 722. campestris inodora major, *ibid.* n. 723.

Valeriana palustris foliis subrotundis parùm incisis, p. 279. n. 724.

Venti herba, p. 209. n. 575.

Verbasculum pratense odoratum p. 279. n. 725. Verbascum mas latifolium luteum, *ibid.* n. 726. Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascente, *ibid.* n. 727. nigrum flore candido, *ibid.* n. 728.

Verbasci lanugo certo modo præparata fomitem igniarium tenerrimum præbet. p. 276. n. 718.

Verbena communis cæruleo flore p. 251. n. 729. Verbena recta, *ibid.* Verbenaca *ibid.* Verbena supina, *ibid.*

Verbena supina, p. 34. n. 89.

Verbena supina, item recta. *vid.* Conyza palustris, p. 53. n. 137.

Verbena fœmina, *Vid.* Senecio minor vulgaris.

Veronica mas supina & vulgatissima, p. 182. n. 730. Veronica spicata angustifolia, recta p. 283. n. 731. Veronica pratensis serpillifolia, *ibid.* n. 732.

Vetonica, *Vid.* Betonica.

Vicia sepium folio rotundiore acuto, p. 283. n. 733. Vicia multiflora hirsuta, cœrulea, p. 284. n. 734. purpurea, p. 284. n. 735. candida glabra, *ibid.* n. 736.

Vicia semine rotundo nigro, p. 284. n. 737. Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis, p. 284. n. 738.

Victorialis rotunda, *vid.* Gladiolus, p. 105. n. 277. Victoria-

rialis herba, *ibid.* fœmina, *ibid.*
Vincetoxicum, *Vid.* Asclepias.
Vicia martia, purpurea flore simplici odoro, p. 285. n. 739. Viola inodora sylvestris, *ibid.* n. 740. Viola tricolor hortensis repens, *ibid.* n. 741. Viola flammea, *ibid.*
Viola aquatilis, p. 166. n 448.
Virga aurea, Solidago Saracenica dicta, latifolia & angustifolia serrata, p. 286. n. 742. 743. Virga latifolia serrata, p. 287. n. 744. vulneraria est & lithontriptica, *ibid.*
Virga pastoris major, *vid.* Dipsacus p. 62.
Virga sangvinea, *vid.* Cornus, p. 55. n. 139. Ossea, *ibid.*
Virgula divinatoria quomodo paretur. p. 56. n. 140.
Virgulæ metallorum indagatricis materies est Corylus, p. 56. n. 140. illa quomodo cædatur & tractetur, *ibid.*
Viscum, p. 287. n. 745. quercûs & Coryli antepilepticum est, pyri sylvestris contracturas sanat. *ibid.* p. 287. 288. Viscum fraxini baccis ex albo luteis, p. 288. n. 746.
Vitis Idæa foliis subrotundis exalbidis, p. 288. n. 747. Vitis foliis oblongis crenatis fructu nigricante; p. 288. n. 748
Vitis Idæa foliis subrotundis non crenatis baccis rubris, p. 289. n. 749. Vitis Idæa foliis oblongis non crenatis baccis rubris. *ib.* n. 750. Vitis Idæa palustris, *ibid.* n. 751. Vitis Idæa Rorismarini folio aversâ parte albido & nervoso. *ibid.* n. 752.
Vitis nigra. *vid.* Bryonia alba p. 29. n. 75.
Ulmaria vulgi, *vid.* Barba capræ.
Ulmus p. 289. n. 753. vulneraria est. *ibid.* Ulmi præcox foliorum decidium pestem jumentis portendit, *ibid.* p. 260 Ulmo affinis arbor, *ibid.* n. 754.
Ungula Caballina, *vid.* Tussilago
Urinæ incontinentia auditu Phormyngis aut Screatûs. p. 282. 283. n. 730.
Urinaria, *vid.* Dens leonis, p. 61. n. 165.
Urtica vulgaris mortua, labeo fœmina, iners *vid.* Lamium, p. 133. n. 372. non mordax vulgaris, fœtens, purpurea, iners altera, *ibid.* n. seq. iners tertia, sexta tabea, p. 34. n. 374. Herculea, undecima, fœtida maxima porphyranthemos, *ibid.* n. seq.
Urtica urens maxima, cui usui inserviat? p. 291. n. 755. Urtica sceptrum ministravit Antigono, p. 292. n. 756.

Ur-

Urtica fatua ſylveſtris p. 292. n. 758. aculeata, p. 291. n. 755. Urtica urens maxima ſive major, p. 291. n. 756. Urtica urens minor, p. 292. n. 757.
Urtica aculeata foliis non ſerratis, p. 292. n. 758.
Uſtilago, p. 292. 293. Uſtilago pictoribus colorem fuſcum ſuppeditat, *ibid.* n. 759.
Uſtilago Tritici, p. 292. n. 758. Uſtilago ſecalis, p. 292. n. 759. Uſtilago hordei, p. 293. n. 760. Uſtilago avenæ, p. 293. n. 761.
Uſnea Officinarum, p. 171. n. 472.
Uvularia major, *vid.* Campanula vulgatior.
Uvularia exigua in pratis, p. 33. n. 86.

X.

Xanthium Dioſcoridis, p. 137. n. 384. Xanthion ſeu Lappa minor, *ibid.* Xanthium ſeu ſtrumaria, *ibid.*
Xiphium ſeu gladiolus cœruleus minor, *vid.* Iris pratenſis, p. 130. n. 363.
Xiphion-Spatha, *vid.* Gladiolus p. 105. n. 277. Xiphion minus, *ibid.*
Xyloſteum, *vid.* Chamæceraſus
Xyris minor, *vid.* Iris pratenſis p. 130. n. 363.

FINIS.

Corrigenda.

Numerus prior paginam, alter lineam, l. lege, denotat.

3. 15. tuſa l. tuſa. 6. 19. Anckerwurtz / l. Ackerwurtz. 17. 29. Kelb-Kraut/ l. Kleb-Kraut. 21. 30. Artractylis l. Atractylis. 22. 20. Schweiß l. Scheiß. 23. 26. Greiß-Bart l. Geiß-Bart. 24. 15. Viperibus l. viſceribus. 24. 29. Camp. l. Cam. 27. 3. addit l. additur. 27. 3. dilucior l. dilucidior. 27. 4. incolo l. in colo 29. 24. Card. l. Cord. 35. 28. Cer-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0561-9 DFG

CORRIGENDA.

Cerdopatium. l. Cardopatium. 36. 23. Burnf. l. Brunsf. 37. 5. catharros l. catarrhos. 39. 25. ſtipatis l. ſtipatos, 41. 1. floſculi l. flos Cuculi. 58. 6. Renano l. Re anno. 78. 26. illis l. locis 79. 6. fari l. favi. 96. 23. punulis l. punctulis. 98. 4. foſſulum l. foſſulam. 98. 7. Spithamum l. ſpithamam. 123. 14. Hippocomis l. Hippocamis. 139. 3. Traog. l. Trago. 164 12. Cod. l. Cord. 179. 13. Thab. l. Tab. 196. 24. vox *Gabatæ* deleatur. 219. 1. lege ita: *pag. 326.* Roth Waſſer-Fünff-Finger-Kraut. *In pratis uliginoſis paſſim.* DXCII. Ranunculus Nemoroſus Luteus. C. B. Pin. *pag. 178.* &c. 22. 24. levis l. lævis. 234. 1. rertius l. tertius. 279. 1. Valeriana. l. * Valeriana. 2 85. 10. Lond. l. Lonic.

Corrigenda in Indice Latino.

Ss, Tt 2, Vv 3 &c. folia quaternionum, literæ *a*, *b*, *c*, *d*, quatuor columnas ſingulorum foliorum, numeri lineam Columnarum denotant.

Ss. 3. *a.* 6. mera l. rubra. Ss. 4. *c.* 17. Belis l. Bellis. Tt. *c.* 17. Canis l. Cania. Tt. *d.* 33. Careum l. Carvum. Tt 2. *b.* 21. Cerdopatium l. Cardopatium. Vv. *c.* 16. metricius l. meretricius. Vv 2. *b.* 24. Geranii l. Geranium. Xx. 2. *c.* 31. pro 415. l. 423. Yy *c.* 31. muſculoſa l. maculoſa.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0562-5
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0563-1
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0564-7
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0566-8
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0567-4
DFG