101. Tafel.

Günsel. Pl. G. 761. 14 Klasse. Güldengünsel. Blauer Gukguk. Güldenwundkraut. Lorenzkraut.
Linne Pfl. S. Th. S.

a. Die einblätrige halbfünfspaltige haarigte Blumendecke.
b. Die einblätrige rachenförmige Krone geöfnet, mit den 4 Staubfäden deren 2 kürzer, 2 länger sind.
c. Ein abgesonderter Staubfaden.
d. Der 4spaltige Fruchtknoten mit dem langen Griffel und den 2 zarten Narben.

Wächst an Wegen und bergigten trokenen Gegenden, ohngefähr einen halben Fuß hoch, blüht im Junius und Julius. Dieses ist die eigentliche Consolida media, an deren Stelle aber meistens die Tab. XI. abgebildete Ajuga reptans genommen wird.

Tab. 101.

Ajuga pyramidalis. Cl. XIV.
Ajuga tetragono pyramidalis villosa, foliis radicalibus maximis. L. 438.
Consolida media pratensis coerulea. Bugula.
a. Perianthium monophyllum, Semiquinquefidum villosum.
b. Corolla monopetala ringens aperta, cum staminibus 4, quorum 2 breviora, 2 longiora.
c. Stamen separatum.
d. Germen quadrifidum cum stylo longo et duobus stigmatibus tenuibus.

Crescit ad vias, loca sicca montosa &c. Floret Junio et Julio altitudine circiter semipedali.

Haec est Consolida media proprie dicta, cujus autem loco falso plerumque illa, Tab. XI. depicta, Ajuga reptans sumitur.

102. Tafel.

Heide. Pl. G. 523. 8 Klasse. Heidekraut.
Linne Pfl. S. 3 Th. S. 424.

a. Die 4blätrige Blumendecke.
b. Eben diese nebst der zwoten deren 4 kleine Blättgen herunter hängen und sich an den Stiel anschliessen.
c. Die 4blätrige äussere Krone deren Blättgen nicht zusammenhängen, in dieser ist

d. Die

Tab. 102.

Erica vulgaris. Cl. VIII.
Erica antheris aristatis, corollis campanulatis subaequalibus, calycibus duplicatis, foliis oppositis sagittatis. L. 301.
a. Perianthium tetraphyllum.
b. Idem cum duplici, quorum 4 petala parva dependunt et pedunculo annexae sunt.
c. Corolla tetrapetala exterior, petalis non connexis, ambiens

d. Co-

d. die innere einblätrige, tief 4spaltige Krone, mit den Geschlechtstheilen.
e. Die 8 Staubfäden mit Aehrenähnlichen, 2 spizigen Staubbeuteln.
f. Einer derselben geschlossen und
g. geöfnet.
h. Der Fruchtknoten mit dem Griffel und der 4spaltigen Narbe.

Wächst auf trockenen dürren Heiden bis gegen 2 Fuß hoch, blüht im August und September.

d. Corollam interiorem monopetalam profunde quadripartitam, cum genitalibus.
e. Stamina 8 antheris aristatis bifidis.
f. Filamentum anthera clausa.
g. aperta.
h. Germen cum stylo et stigmate quadrifido.

Crescit in locis aridis desolatis ad altitudinem bipedalem, floret augusto et septembre.

103. Tafel.

Bingelkraut. Pl. G. 1225. 22. Klasse.
Bengelkraut. Hundskohl.
Spekmelde. Kühkraut.
Linne Pfl. S. Th. S.

Männliche Pflanze.

a. Die 3theilige Blumendecke.
b. Die 12 Staubfäden.
c. Ein abgesonderter mit dem 2knöpfigten Staubbeutel.

Tab. 103.

Mercurialis annua. Cl. XXII.
Mercurialis caule brachiato, foliis glabris floribus spicatis. L. 746.
Mercurialis testiculata s. mas.

Planta mascula.

a. Perianthium tripartitum.
b. Stamina duodecim.
c. Stamen separatum cum anthera didyma.

104. Tafel.

Bingelkraut. Siehe vorhergehende Tafel.

Weibliche Pflanze.

a. Eine unbefruchtete weibliche Blume, deren oft viele an einer Pflanze stehen bleiben.
b. Die 3theilige Blumendecke.
c. Die 2 Honigbehältnisse die man auch an der Seite des Fruchtknotens e. gewahr wird.

d. Der

Tab. 104.

Mercurialis annua. Vide Tab. antecedentem.

Planta foeminea.

a. Flos foemineus sterilis, quorum plures saepius in planta remanent.
b. Perianthium tripartitum.
c. Nectaria duo, quae etiam a latere germinis, e, conspiciuntur.

d. Ger-

d. Der borstige Fruchtknoten, mit den 2 Griffeln und dem Kelche.
e. Die Hodenförmige 2fächerige Frucht, mit dem Honigbehältniß.
f. Ebendiese aufgeschnitten, mit den 2 Saamen.
g. Saamen.

Wächst als Unkraut in Gärten, Weinbergen ꝛc. wird ohngefehr 1 Fuß hoch, blüht im Julius oder August.

Die männlichen (der vorhergehenden Tafel) und die weiblichen wachsen immer nahe beisammen.

d. Germen hispidum cum stylis 2 et perianthio.
e. Capsula scrotiformis, bilocularis, cum nectario.
f. eadem aperta, cum 2 seminibus.
g. Semina.

Crescit ut mala herba in hortis et vinetis, altitudine circiter pedali, floret Julio et Augusto.

Mascula planta (Tab. praeced.) et foeminea semper vicina.

105. Tafel.

Spargel. Pl. G. 455. 6 Klasse.

Linne Pfl. S. Th. S.

a. Die 6blätrige Krone.
b. Eben diese geöfnet mit den 6 Staubfäden.
c. Ein abgesonderter Staubfaden.
d. Der 3eckigte Fruchtknoten mit der Narbe.
e. Die zeitigen Beere.
f. Die 2 Saamen.

Wird meistens in Gärten gezogen, 3-4 Fuß hoch, blüht im Junius.

Tab. 105.

Asparagus officinalis. Cl. VI.
Asparagus caule herbaceo tereti erecto foliis setaceis, stipulis paribus. L. 274.
a. Corolla hexapetala.
b. eadem aperta, cum staminibus 6
c. Stamen separatum.
d. Germen trigonum, cum stigmate.
e. Baccae maturae.
f. Semina bina.

Colitur plerumque in hortis, altitudine 3-4 pedali, floret Junio.

106. Tafel.

Knöterich. Pl. G. 535. 8 Klasse.

Heidekorn. Buchwaizen.

Linne Pfl. S. Th. S.

Tab. 106.

Polygonum fagopyrum. Cl. VIII.
Polygonum foliis cordato sagittatis, caule erectiusculo inermi Seminum angulis aequalibus. L. 313.

a. Die 5blätrige Krone.
b. Die 8 Staubfäden mit den 3 Stempfeln.
c. Ein abgesonderter Staubfaden.
d. Der 3seitige Fruchtknoten mit den 3 Griffeln und den runden Narben.

Wächst in Aeckern oder wird in Gärten gezogen, wird gegen 2 Fuß hoch, blüht im Junius.

Fagopyrum. Triticum faginum.
a. Corolla pentapetala.
b. Stamina 8 cum 3 pistillis.
c. Stamen separatum.
d. Germen triquetrum cum stylis 3 et antheris subrotundis.

Crescit in agris vel in hortis colitur, altitudine bipedali, floret Junio.

107. Tafel.

Nessel. Pl. G. 1143. 21 Klasse.
Römische Nessel.
Linne Pfl. S. Th. S.

Männliche Blüthe.

a. Die 4blätrige Blumendecke von aussen.
b. Eben diese von innen mit den 4 Staubfäden.
c. Die 4 Staubfäden mit dem Honigbehältniß in der mitten.
d. Ein abgesonderter Staubfaden, mit dem 2fächerigen Staubbeutel, der sich endlich in 3 Blättgen zertheilt.

Weibliche Blüthe auf dergleichen Pflanze.

e. Die 2 Klappigte Blumendecke.
f. Der Fruchtknoten mit der Narbe; vergrössert.
g. Der geschlossene Kelch mit dem Saamen.
h. Eine Kugel aus lauter solchen herzförmigen Kapseln.

Bei uns wird diese in Gärten gezogen, sie wächst gegen 2 Fuß hoch, und blüht im Junius.

Tab. 107.

Urtica pilulifera. Cl. XXI.
Urtica foliis oppositis ovatis serratis, amentis fructiferis globosis. L. 709.

Flos masculus.

a. Perianthium tetraphyllum a parte exteriore.
b. idem ab interiore parte cum Staminibus 4.
c. Stamina 4 cum Nectario in Centro.
d. Stamen separatum cum anthera biloculari quod se in 3 folia tandem dividit.

Flos foemineus in eadem planta.

e. Perianthium bivalve.
f. Germen cum stigmate, magnitudine aucta.
g. Perianthium connivens cum seminibus.
h. Globula ex talibus perianthiis cordiformibus composita.

Colitur apud nos in hortis, altitudine circiter bipedali crescit et Junio floret.

Tab.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147597-p0018-6
DFG

108. Tafel.

Bibernell. Pl. G. 394. 5. Klasse.
Pimpinell. Steinpeterlein.
Linne Pfl. S. Th. S.

a. Die 5blätrige besondere Krone von unten mit der kaum merklichen Blumendecke.
b. Ebendiese von oben mit den 5 langen Staubfäden.
c. Ein abgesonderter Staubfaden.
d. Der Fruchtknoten mit den 2 aneinander liegenden Griffeln und den runden Narben.
e. e. Die Frucht.
f. Die 2 Saamen.

Diese ist die eigentliche gute Berg-Bibernell, meistens ist die Blüthe weiß, und diese rothe ist nur eine Abänderung davon. Sie wächst bei 4 Fuß hoch, und blüht im Junius. Sie macht sehr viele Aeste.

Tab. 108.

Pimpinella magna. Cl. V.
Pimpinella foliolis omnibus lobatis, impari trilobo. L. 241.
Pimpinella saxifraga major, umbella rubente.
a. Corolla propria pentapetala a parte inferiore, cum perianthio vix notabili.
b. Eadem à superiore parte cum 5 staminibus.
c. Stamen separatum.
d. Germen cum stylis 2 contingentibus et antheris subrotundis.
e. e. Fructus.
f. Semina bina.

Species haec optima illa Pimpinella montana est, saepius flore albo gaudet, rubra haec varietas est.

Crescit altitudine 4 pedum, floret Junio; sorte ramosa est.

109. Tafel.

Sanikel. Pl. G. 254. 5. Klasse.
Bruchkraut.
Linne Pfl. S. Th. S.
a. Die besondere 5theilige Blümgenhülle.
b. Die 5blätrige Krone mit den 5 langen Staubfäden.
c. Ein abgesonderter Staubfaden mit dem Kronblatt.
d. Der borstige Fruchtknoten, mit den 2 zurückgeschlagenen Griffeln.

Wachst in schattigten Wäldern, gegen 2 Fuß hoch, blüht im Junius.

Tab. 109.

Sanicula europaea. Cl. V.
Sanicula foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. L. 225.
a. Perianthium partiale 5 partitum.
b. Corolla 5 petala cum staminibus 5 longis.
c. Stamen separatum cum petalo.
d. Germen hispidum, cum stylis 2, reflexis.

Crescit in sylvis nemorosis, altitudine circiter bipedali, flore Junio.

110. Tafel.

Schuppenwurz. Pl. G. 799. 14 Klasse.
Lahnkraut. Ohnblatt.
Streubeinwurz. Kreuzwurz.
Maiwurz. Kaalkraut.
Linne Pfl. S. Th. S.

a. Die einblätrige 4spaltige Blumendecke.
b. Die einblatrige rachenförmige Krone.
c. Eben diese geöfnet, mit den 2 längern und 2 kürzern Staubfaden.
d. Der Fruchtknoten mit dem Griffel und der überhängenden Narbe.
e. Die geöfnete Saamenkaptel.

Wächst in den dicksten Gebüschen, an den Wurzeln der Stauden, ohngefehr 1 und ein halben Fuß hoch, blüht im Junius.

Tab. 110.

Lathraea squamaria. Cl. XIV.
Lathraea caule simplicissimo, corollis pendulis, labio inferiori trifido. L. 461.
Anblatum flore e rufo candicante.
Dentaria major.
a. Perianthium monophyllum quadrifidum.
b. Corolla monopetala ringens.
c. eadem aperta cum staminibus 4, quorum 2 longiora, 2 breviora.
d. Germen cum stylo et stigmate nutante.
e. Capsula seminalis aperta.

Crescit in dumetis densissimis, ad eorum radices, altitudine circiter semipedali, floret Junio.

111. Tafel.

Melisse. Pl. G. 784. 14. Klasse.
Bergmünze. Ackermünze.
Bergmelisse. Kalaminthe.
Linne Pfl. S. Th. S.

a. Die einblätrige, gestreifte Blumendecke mit 3zänigter zurückgeschlagener Ober- und 2 theiliger Unter-Lippe.
b. Die einblätrige, rachenförmige Krone mit den 2 längern, und 2 kürzern Staubfäden, aufgeschnitten.
c. Ein abgesonderter Staubfaden.

Tab. 111.

Melissa calamintha. Cl. XIV.
Melissa pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum. L. 453.
Calamintha montana, magno flore.
a. Perianthium monophyllum striatum, labio superiore tridentato reflexo, inferiore bipartito.
b. Corolla monopetala ringens, aperta, cum 2 staminibus longioribus, 2 brevioribus.
c. Stamen separatum.

d. Ger-

d. Der 4spaltige Fruchtknoten, mit dem langen Griffel und der 2spaltigen Narbe.

Wächst in bergigten, sonnenreichen Gegenden, gegen 2 Fuß mit vielen Aesten. Blüht im Julius.

d. Germen quadrifidum, cum stylo longo, et stigmate bifido.

Crescit in locis opricis montanis, altitudine 3 pedum, valde ramosa est, et floret Julio.

112. Tafel.

Hartriegel. Pl. G. 18. 2 Klasse.
Reihnweide. Mundholz.
Zaunriegel. Grünfaulbaum.
Linne Pfl. S. 3. Th. S. 15.

a. Die einblätrige, sehr kleine, 4zänigte Blumendecke.
b. Die einblätrige, trichterförmige Krone mit 4theiliger Mündung, und den 2 Staubfäden.
c. Der rundlichte Fruchtknoten mit dem Griffel und der 2spaltigen Narbe.
d. Die zeitige Frucht.
e. Die Beere in die Länge —
f. In die Queere durchschnitten.
g. Saamen.

Wächst häuffig an Gehegen, 5-6 Fuß hoch, blüht im Junius und Julius.

Tab. 112.

Ligustrum vulgare. Cl. II.
Ligustrum vulgare. L. 54.
Phylliraea. Dod.

a. Perianthium monophyllum minimum quadridentatum.
b. Corolla monopetala infundibuliformis, limbo quadripartito, et 2 staminibus.
c. Germen subrotundum cum stylo et stigmate bifido.
d. Bacca matura.
e. Bacca longitudinaliter —
f. Transversim dissecta.
g. Semina.

Crescit copiose inter dumeta, altitudine 5-6 pedum, floret Junio et Julio.

113. Tafel.

Partike. Pl. G. 658. 11. Klasse.
Rother- oder Brauner Weiderich.
Linne Pfl. S. Th. S.

a. Die einblätrige gestreifte Blumendecke, mit 12 Zähngen.
b. Die 6blätrige Krone mit den 12 Staubfäden, deren 6 die Helfte kürzer sind.

c. Ein

Tab. 113.

Lythrum salicaria. Cl. XI.
Lythrum foliis oppositis cordato lanceolatis, floribus spicatis dodecandris. L. 371.
Salicaria.

a. Perianthium monophyllum striatum denticulis 12.
b. Corolla hexapetala cum staminibus 12, quorum 6 dimidiam partem breviora sunt.

c. Sta-

c. Ein abgesonderter Staubfaden.

c. Stamen separatum.

d. Der länglichte Fruchtknoten, mit dem niedergebogenen Griffel und der runden Narbe.

d. Germen oblongum cum stylo declinato, et stigmate orbiculato.

Es finden sich viele Blumen mit 5 Kronblättern, 10 Staubfäden, und einem 10zähnigten Kelche.

Inveniuntur plures flores petalis 5, staminibus 10, et calyce 10 dentato.

Wächst an Bächen und in nassen Wiesen, wird ohngefähr 2 Fuß hoch, blüht im Julius.

Crescit ad rivulos et in pratis humidis, altitudine bipedali, floret Julio.

114. Tafel.

Tab. 114.

Wolfstrapp. Pl. G. 778. 14. Klasse.
Wildmutterkraut. Herzgespankraut.
Linne Pfl. S. Th. S.

Leonurus Cardiaca. Cl. XIV.
Leonurus foliis caulinis lanceolatis trilobis. L. 449.
Cardiaca. Marrubium cardiaca dictum.
Branca f. Pata lupina.

a. Die einblätrige, 5zänigte Blumendecke.

a. Perianthium monophyllum 5 dentatum.

b. Die einblätrige, rachenförmige Krone geöfnet, mit den 2 längern und 2 kürzern Staubfäden.

b. Corolla monopetala ringens, aperta, cum staminibus 2 longioribus, 2 brevioribus.

c. Ein abgesonderter Staubfaden, mit dem 2spaltigen Staubbeutel.

c. Stamen separatum cum anthera bifida.

d. Die 4 Fruchtknoten mit dem Griffel und der 2spaltigen Narbe.

d. Germina 4, cum stylo et stigmate bifido.

Wächst an steinigten ungebauten Orten, wird gegen 3 Fuß hoch, blüht im Julius und treibt viele Seitenäste.

Crescit in locis ruderalibus, altitudine prope 3 pedum, floret Julio, et valde ramosa est.

Tab.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147597-p0022-6
DFG

115. Tafel.

Wegerich. Pl. G. 149. 4 Klasse.

Flöhsaamenkraut.

Linne Pfl. S. Th. S.

a. Die 4theilige Blumendecke.

b. Die einblätrige röhrichte Krone, mit 4theiliger Mündung.

c. Eben diese aufgeschnitten, mit den 4 Staubfäden.

d. Ein abgesonderter Staubfaden.

e. Der eirunde Fruchtknoten mit dem fadenförmigen Griffel und der kaum merklichen Narbe.

Wird meistens bei uns in Gärten gezogen, in wärmern Gegenden wächst es in sandigten Orten bis 1 und ein halben Fuß hoch, blüht im Julius.

Tab. 115.

Plantago psyllium. Cl. IV.

Plantago caule ramoso herbaceo, foliis subdentatis recurvatis, capitulis aphyllis. L. 132.

Pulicaria.

a. Perianthium quadrifidum.

b. Corolla monopetala tubulosa, ore quadrifido.

c. eadem aperta cum staminibus 4.

d. Stamen separatum.

e. Germen ovatum cum stylo filiformi et stigmate vix notabili.

Colitur plerumque apud nos in hortis, crescit in regionibus calidioribus in locis sabulosis ad altitudinem sesquipedalem, floret Julio.

116. Tafel.

Bokshorn. Pl. G. 967. 17. Klasse.

Linne Pfl. S. Th. S.

a. Die einblätrige halbfünfspaltige Blumendecke.

b. Die Schmetterlingsförmige 3blätrige Krone, geöfnet.

c. Die abgesonderte Fahne.

d. Die Staubfäden in 2 Partheien, 1 allein, 9 beisammen.

e. Der

Tab. 116.

Trigonella foenum graecum. Cl. XVII.

Trigonella leguminibus sessilibus strictis erectiusculis subfalcatis acuminatis, caule erecto. L. 576.

a. Perianthium monophyllum semiquinquefidum.

b. Corolla papilionacea tripetala aperta.

c. Vexillum separatum.

d Stamina diadelpha, simplex et novemfidum.

K e. Pi-

e. Der Stempfel.
f. Die Schote.
g. Saamen.

Wird bei uns in Gärten oder Aeckern gezogen, wächst gegen 2 Fuß hoch, blüht im Julius und August.

e. Pistillum.
f. Legumen.
g. Semen.

Colitur apud nos in hortis vel agris, altitudinem 2 pedum attingit, floret Julio et Augusto.

117. Tafel.

Baldrian. Pl. G. 48. 3. Klasse.
Augenwurzel. Katzenwurz.
Linne Pfl. S. Th. S.

a. Der kaum merkliche Kelch.
b. Die Krone mit der buklichten Röhre und 5spaltiger Mündung.
c. Eben diese aufgeschnitten mit den 3 Staubfaden.
d. Ein abgesonderter Staubfaden.
e. Der Fruchtknoten mit dem fadenförmigen Griffel und der 3spaltigen Narbe.

Wächst in nassen Wiesen und Wäldern, wird ohngefähr 3 Fuß hoch, blüht im Julius.

Tab. 117.

Valeriana officinalis. Cl. III.
Valeriana floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. L. 72.
Valeriana minor. Phu vulgare.
a. Calix vix notabilis.
b. Corolla tubo gibbo et limbo quinquefido.
c. eadem aperta cum staminibus 3.
d. Stamen separatum.
e. Germen cum stylo filiformi et stigmate trifido.

Crescit in pratis humidis et sylvis, altitudine 3 pedali, floret Julio.

118. Tafel.

Glanzgraß. Pl. G. 80. 3. Klasse.
Kanarisaamen.
Linne Pfl. S. Th. S.
a. a. Der einblüthige, 2spelzige Kelch.

b. b. Die

Tab. 118.

Phalaris canariensis. Cl. III.
Phalaris panicula subovata spiciformi, glumis carinatis. L. 88.
Canariense semen.
a. a. gluma uniflora, bivalvis.

b. b. Co-

b. b. Die 2spelzige Krone.

c. Eben diese geöfnet, mit den 3 Staubfäden.

d. Der Fruchtknoten mit den 2 Griffeln und den haarigten Narben.

e. Saamen.

Wird bei uns in Gärten oder Aeckern gezogen, wächst über 2 Fuß hoch, blüht im Julius.

b. b. Corolla bivalvis.

c. eadem aperta cum 3 staminibus.

d. Germen cum stylis 2 et stigmatibus villosis.

e. Semen.

Colitur apud nos in hortis vel agris, altitudinem bipedalem superat, Julio floret.

119. Tafel.

Nardensaame. Pl. G. 740. 13. Klasse.

Schwarzer Kümmel.

Linne Pfl. S. Th. S.

a. Die 5blätrige Krone.

b. Die 8 Honigbehältnisse.

c. Eines derselben von aussen.

d. von innen, mit 2 Tüpfeln gezeichnet.

e. Die sehr vielen Staubfäden.

f. Ein abgesonderter.

g. Die 5 Fruchtknoten, mit den langen Griffeln und Narben.

Wird bei uns in Gärten gezogen, wächst bei 1 und ein halben Fuß hoch, blüht im Julius.

Tab. 119.

Nigella sativa. Cl. XIII.

Nigella pistillis quinis, capsulis muricatis subrotundis foliis subpilosis. L. 421.

Melanthium. Cuminum nigrum.

a. Corolla pentapetala.

b. Nectaria 8.

c. Unum eorum à parte exteriore.

d. ab interiore parte 2 punctis notatum.

e. Stamina numerosa.

f. Stamen separatum.

g. Germina 5, cum stylis longissimis, et stigmatibus.

Colitur apud nos in hortis, altitudine sesquipedali, floret Julio.

120. Tafel.

Gamander. Pl. G. 762. 14. Klasse.

Schlagkraut. Erdkiefer.

Feld-

Tab. 120.

Teucrium chamaepitys. Cl. XIV.

Teucrium foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessili-

Feldcypreß. Je länger je lieber.
Linne Pfl. S. Th. S.

a. Die einblätrige halbfünfspaltige Blumendecke.

b. Die einblätrige rachenförmige Krone geöfnet, mit den 2 längern und 2 kürzern Staubfäden.

c. Der 4spaltige Fruchtknoten mit dem fadenförmigen Griffel und den 2 spitzigen Narben.

Wächst auf Aeckern in wärmern Gegenden, wird nicht viel über 1 halben Fuß hoch, blüht im Mai und Junius.

filibus lateralibus solitariis caule diffuso. L. 438.

Iva arthetica.

a. Perianthium monophyllum semiquinquefidum.

b. Corolla monopetala ringens, aperta, cum staminibus 2 longioribus, 2 brevioribus.

c. Germen quadripartitum cum stylo filiformi et stigmatibus 2 tenuibus.

Crescit in agris in regionibus calidioribus, altitudinem semipedalem non multum superat, floret majo et Junio.

121. Tafel.

Glaskraut. Pl. G. 1256. 23. Klasse.

Tag und Nachtkraut. Petterskraut. Gnadenkraut. Mauerkraut.

Linne Pfl. S. Th. S.

a. 2 Zwitterblumen in einer Hülle, deren 6 Blättgen von einander entfernt sind.

b. Eine solche Zwitterblume abgesondert.

c. Die einblätrige 4spaltige Blumendecke.

d. 4 eigentliche, röthlichgefärbte, unten zusammenhängende Kronblättgen.

e. Eben diese geöfnet, mit den 4 Staubfäden und dem Fruchtknoten.

f. Der abgesonderte Fruchtknoten.

g. Die

Tab. 121.

Parietaria officinalis. Cl. XXIII.

Parietaria foliis lanceolato ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis. L. 763.

Helxine.

a. Flores 2 hermaphroditi in involucro, quorum petala 6 dispersa sunt.

b. Flos hermaphroditus separatus.

c. Perianthium monophyllum quadripartitum.

d. Petala propria subrubra in basi contingentia.

e. eadem aperta, cum staminibus 4 et germine.

f. Germen separatum.

g. Flos

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147597-p0026-0 DFG