Obſerv. Lob. 216. Fuchſ. fol. 831. Eyſtett. Dod. Lateiniſch f. 76. Tab. lib. 2. fol. 536. Cæſ. lib. 9. c. 41. p. 394. Lon. deutſch fol. 158. Cam. hort. p. 77. Hypericum vulgare C. B. Pin. pag. 279. Aſcyron. Cord. in Dioſc. f. 61. Hypericum vulgare, & herba perforata, Trag. Seb. in Trag. deutſch f. 56. S. Joh. Kraut Tab. Lon. Fuchſ. Matth. Gemein Harthau Seb. in Trag. Unſeres Herren Gottes Wunden-Kraut Noſtratibus. In ſabuloſis bey Königsb. paſſim.

Herba hæc, quæ eo nomine fuga Dæmonum ſalutatur, vulgò ſeminis ſuffitu omnem fugat Dæmonem, corpori vel domui appropinqvantem, uti nugigerulus mulierum fabulatur ſexus. De Sexu hoc obiter cape, quod habet Baal Hatturim ad margin. Bibl. Venetor. & Baſil. Gen. 3. v. 20. Decem cabi Confabulationum, inqvit, deſcenderunt in mundum, & novem iſtorum abſtulerunt mulieres. Inde Adam vocavit nomen mulier Chavah, quia (multum) loqvitur.

Hypericum ſub elevatione Poli 45. 46. 47. optimum. Flores colligendi Sole 10. ♋ obſidente. Tota planta legatur Sole 6. ♌ occupante; ſemen, Sole 15. Libræ ingreſſo.

CCCLV. Jacea nigra ſqvamoſo capite major. C. B. Pin. 271. Jacea ſqvamato capite montana prima. Cluſ. hiſt. lib. 4. fol. 6. Jacea Auſtriaca prima, Cluſ. Pann. pag. 542. Groß Schwartz Flocken-Blum mit ſchuppichten Köpffen. Flore eſt purpureo. Vulneraria eſt planta. Hinc â Chirurgis in fracturis & vulneribus conſolidandis extollitur: ſunt, qui eâdem in faucium & tonſillarum tumoribus utuntur. Paſſim in locis ſiccioribus bey Königsb.

CCCLVI. Jacea nigra ſqvamoſo capite, flore albo. Joh. Lœſ. weiß-blühende ſchwartze Flocken-Blum mit ſchuppichten Köpffen. Hinter Germau am Berge. A priore nihil differt, niſi florum colore.

CCCLVII.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0221-0
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0222-6
DFG

CCCLVII. Jacea laciniata sqvamata, C. B. Pin. 271. Jacea sqvamato capite tertia Cretica, Clus. hist. lib. 4. fol. 6. Flocken-Blum mit zerschnittenen Blättern/ und schuppichten Köpffen. Bey Lauten-Mühl, circa vias.

CCCLVIII. Jacea latifolia capite hirsuto. C. B. Pin. 271. Jacea Austriaca secunda, vel Jacea mõtana villoso capite elatior. Clus. Pann. p. 543. Iacea Austriaca villoso capite, sive quarta elatior, Clus. hist. lib. 4. f. 6. & 7. Cyanus sylv. montanus integrifolius, Cyanus sylv. πολυγλωσσόφυλλος, Thal. p. 29. breit-blättrige Flockẽ-Blum mit harichtẽ Köpffẽ. Flore est purpureo; foliis tenuiter crenatis, & thyrsulis subrubentibus. Crenas in suo cyano prorsus abesse tradit Thal. Beym Penartschẽ Walde am Fluß.

CCCLIX. Jacea latifolia capite hirsuto flore albo. Joh. Læs. Weiß-blühende Flocken-Blum mit haarichten Köpffen. Folia cum caulibus dilutè virescens. Hinter der Löbnichtschen Wind-Mühl. Vor dem Sackheimschen Thor.

CCCLX, Jacobea. Dod. Lateinisch. fol. 642. Jacobæa vulgaris laciniata. C. B. Pin. p. 131. Jacobæa vulgaris Clus. hist. lib. 4. fol. 22. S. Jacobs-Blum. Brunf. deutsch fol. 317. Flos S. Jacobi, Trag. Seb. in Trag. deutsch. fol. 228. Lon. deutsch. fol. 128. Herba Jacobæa 1. Tab. lib. 1. fol. 576. Senecio major, sive flos S. Jacobi. Matth. Bauh. in Matth. 794. Jacobæa Senecio, & herba S. Jacobi. Lob. ic. p. 227. Jacobæa Senecio Adv. Lob. fol. 79. Herba S. Jacobi Cæs. lib. 12. c. 37. p. 500. Fuchs. fol. 742. Artemisia polyclonos Dodonæi, sive flos Jacobæus, Thal. 9. S. Jacobs-Blum. Seb. in Trag. Lon. Fuchs. Tab. S. Jacobs-Kraut vulgò. S. Jacobs-Blum/ quibusd. Abstergit & consolidat. In faucium ulceribus gargarrisatu utilis. In agrorum marginibus passim.

CCCLXI. *Jacobæa Barbareæ instar lanciniata Joh. Læs. S. Jacobs-Blum mit Winter-Kreß-Blättern. Foliis “

„ est barbareæ sive Pseudobuniados, per ambitum incisis, & post insigniter laciniatis. Bey dem Zollhause auff der Wiese.

CCCLXII. Iberis Nasturtii folio. C. B. Pin. 97. Iberis Matth. deutsch. fol. 212. Iberis secunda, Tab. lib. 2. fol. 170 Groß Besem Kraut und wilde Kreßen. Tab. Viâ quâ itur nach der neuen Brück in simetis copiosè.

CCCLXIII. Iris pratensis angustifolia humilior, C. B. Pin. 32. Kleine schmall blättrige blaue Wiesen Schwertel. Iris tenuifolia. Cord. hist. fol. 133. Gesn. hort. fol. 263. Xiphion, seu gladiolus cœruleus minor Trag. Seb. in Trag. deutsch. 557. Iridis undecimæ altera species, Clus. Pann. p. 253. Iridis Angustifoliæ secundæ species altera. Clus. Pann. lib. 2. fol. 229. Xyris minor, Cam. hort. p. 183. Kleine blaue Schwertel Seb. in Trag. Bey dem Penartschen Walde ad margines pratorum; It. bey Birckenfelde in pratis nach der Ziegelscheune zu. Iridis flores lupos nominari Philinus scribit apud Athenæum, quod lupi rictui labrisq; similes sint.

CCCLXIV. Juncus palustris major. Trag. Seb. in Trag. deutsch 542. Tab. lib. 1. fol. 695. Juncus maximus, sive scirpus major. C. B. Pin. p. 12. Juncus aqvaticus maximus. Lob. ic. pag. 85. Iuncus holoschœnos. Dod. Lateinisch. fol. 605. Juncus grandis holoschœnos, Cord. in Diosc. fol. 65. & 66. Juncus levis aquaticus maximus. Thal. p. 60. Juncus rotundus tertius. Cæs. lib. 4. c. 60. p. 188. Groß weicher Bintzen. Seb. in Trag. Tab.

Accolæ lacûs Curlandici elychnia sua ac redimicula pileorum parant ex medullâ. Aliàs ex junco sellarum fiunt sedes, ac storeæ. Im Pregel nach Jerusalem zu copiosè. It. im frischen und Curischen Haff passim.

CCCLXV. Juncus floridus major. C. B. Pin. 13.

Blü-

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0225-3
DFG




Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148468-p0226-9
DFG

Blühende Waßer-Binsen. Juncus floridus, Matth. Bauh. in Matth. fol. 731. Juncus Cyperinus floridus. Tab. lib. 1. f. 696. Calamogrostis secunda, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 537. Gladiolus palustris. Cord. hist. fol. 124. Gladiolus aquatilis. Dod. Lateinisch. fol. 601. Juncus cyperoides paludosus. Eystett. Juncus cyperoides floridus paludosus. Lob. ic. p. 86. Adv. Lob. 44. Butomus, Cæs. lib. 14. c. 17. p. 553. Cyper-Schwertel. Tab. Bintzen-Schwertel quibusd. Flore quandoq; conspicitur candido. In palustribus passim bey Königsberg.

CCCLXVI. Juncus lævis paniculâ non sparsâ, C. B. Pin. p. 12. glatte Waßer-Binsen. Juncus Matth. deutsch. fol. 445. Juncus palustris minor, Tab. lib. 1. fol. 695. An juncus rotundus primus? Cæs. lib. 4. c. 60. p. 188. Juncus lævis glomerato flore, Lob. ic. p. 84. klein Waßer-Bintzen/ Tab. Bintzen Matth. klein Weyher/ oder Wasser-Bintzen/ vulgò. Passim in uliginosis.

CCCLXVII. *Juncellus cyperoides capitulo simplici. Ioh. Læs. Schlechtköpffigte kleine Cyper-Bintzen. In pratis nach dem Breter-Kruge zu passim.

CCCLXVIII. Juniperus fruticosa baccifera. Juniperus vulgaris fruticosa C. B. Pin. 488. Juniperus vulgaris, Trag. Seb. in Trag. deutsch 850. Juniperus vulgatior. Adv. Lob. 448. Juniperus. Brunf. tom. 3. fol. 182. Lob. ic. p. 222. o. Dod. Lateinisch. fol. 852. Matth. Bauh. in Matth. f. 118. Lon. deutsch. fol. 40. Juniperus, & juniperus baccifera, Tab. lib. 3. fol. 650. Juniperus minor, Cord. in Diosc. 17. Fuchs. fol. 78. Juniperi primum genus, Cæs. lib. 3. c. 58. p. 136. Juniperus humilis, Gesn. hort. f. 263. Juniperus nostras, Cam. hort. p. 81. Weckholder-Baum/ Matth. Lon. Seb. in Trag. Weckholder Tab. Brunf. Fuchs. Wacholder oder Wacholder-Baum

und Kranot-Baum vulgò. Helvetiis Rechholder/ fortè quasi Reuchholder à suffitu. Cord. in Dios. Nostratibus Kattick. Calfacit & siccat. Baccæ venenis resistunt, crassos & glutinosos humores tenuant, renes detergunt, & urinam mensesque pellunt. Pota vitiis thoracis, tussibus, inflammationibus, & torminibus auxiliantur. Lacryma Arabum est Sandaracha, officinarum vernix. In hæmoptoë, dysenteriâ, diarrhæâ, mensium ac hæmorrhoidum fluxu salutaris. Bey Brandenburg und Königsberg inter ericeta copiosissimè.

CCCLXIX. Juniperus vulgaris arbor. C. B. Pin. 488. Juniperus vulgaris celsior & arborescens. Clus. hist. 1. fol. 38. Clus. Hispan. p. 101. In districtu Insterburgicò, zu Cumetschen. Juniperus quondam annosa & vegeta visa fuit, cujus caudicis perimeter cubitorum ferè trium, altitudo sedecim cubitorum. Tres ejus rami cubitalis fuerunt crassitudinis. Baccifera exstitit adolescens, pòst ad senium devergens, spatio jam qvinqvaginta annorum, nullas ampliùs genuit baccas, attestante hoc cernuo ac decrepito quodam Sene. Gummi adhæc copiosum fudit antehinc, tunc nullum. Nascitur ibidem & alia, cubitum, & quod excedit, crassa, baccas ferens non rotundas, sed oblongas, prorsum similes iis, quas frutex juniperus excludit. Ætate fertur viginti annorum, & necdum gummifera est.

CCCLXX. Kali folio gramineo semine pastinacæ. Joh. Loes. Meerstachel-Kraut mit Pasternack Saamen. Radix oblonga, lignosa, alba, pauculis fibris, gustu modicè acris, caulem edit virescentem, cubitalem & minorem sæpè, incurvum, in plures ramos, inordinatè dispositos brachiatum, quos folia longiuscula, subhirsuta, aculeata nonnihil, ac pallidè virescentia alternatim excipiunt: Flos ex duobus foliolis nanis & candidis, Julio erumpentibus, constituitur, cui semen succedit