MÉLANGE EMMÉNAGOGUE. (*Mansfeld.*)

Sulfure de carbone	(1 once)	—32 gram.
Iode	(5 grains)	—25 cent.

Deux gouttes dans une tasse de gruau sucré.

LINIMENT AVEC LE SULFURE DE CARBONE.
(*Wutzer et Pellengam.*)

Sulfure de carbone	(2 gros)	— 8 gram.
Eau-de-vie camphrée	(4 onces)	—125 gram.
ou Huile d'olives	(*2 onces*)	— *64* gram.

En frictions contre les rhumatismes et les tumeurs arthritiques.

MÉDICATION EMÉTIQUE.

On donne le nom d'émétiques aux médicaments qui déterminent le vomissement, et qu'on administre dans ce but. J'ajoute à ma définition cette dernière partie, car la plupart des poisons, même les narcotiques, introduits dans la circulation, déterminent le vomissement, et cependant on ne les administre jamais dans ce but.

ÉMÉTIQUE.

L'émétique appliqué à l'extérieur, est un irritant assez énergique. Administré à l'intérieur, il peut agir ou comme vomitif, ou comme purgatif, ou comme altérant, ou comme contro-stimulant. Nous allons seulement indiquer ici les préparations qui sont employées pour provoquer le vomissement.

L'émétique est un des vomitifs les plus commodes et les plus employés; il est surtout utile lorsqu'une déplétion complète et rapide est nécessaire; mais c'est un agent qui irrite violemment et qui, administré mal à propos et chez certains individus peut déterminer de redoutables accidents.

Substances incompatibles. — Le tannin et les substances qui en contiennent, les savons, etc.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0236-7 DFG

Contrepoison. — Une infusion de quinquina ou de noix de galle.

Le *kermès* et le *soufre doré d'antimoine* jouissent aussi de propriétés vomitives ; mais ils sont rarement employés dans ce but ; il faut alors les administrer à doses dix fois plus considérables que l'émétique.

Pour faire vomir avec l'émétique, on en fait dissoudre (1, 2 ou 3 grains) — 5 à 15 centigrammes dans un demi-verre d'eau tiède. On le donne en une ou deux fois, à un quart d'heure d'intervalle. On boit beaucoup d'eau tiède pendant l'effet.

VIN ANTIMONIÉ. (*Vin émétique.*) Tartrate de potasse et d'antimoine 2 ; vin de Malaga 564. Faites dissoudre. (Chaque once) 32 gram. contiennent (2 grains) 1 décig. d'émétique. Dose vomitive (1 once) 32 gram.

POTION VOMITIVE.

Emétique	(2 grains) —	1 décigr.
Eau distillée de menthe	(1 once) —	32 gram.
Eau distillée simple	(8 onc.) —	250 gram.

En trois fois, à une petite demi-heure d'intervalle.

POTION VOMITIVE DITE EAU BÉNITE. (F.H. P.)

Emétique	*(6 grains)* —	*3 décigr.*
Eau	(8 onc.) —	250 gram.

Mêlez. Vomitif violent qui fait partie du traitement de la colique des peintres.

POTION AVEC L'ÉMÉTIQUE. (*Cayol.*)

Emétique	(2 grains) —	1 décigr.
Eau de camomille	(4 onc.) —	125 gram.
Sirop d'ipécacuanha	(1 once) —	32 gram.
Eau de fleurs d'oranger	(3 gros) —	12 gram.

Donnez en deux ou trois fois à une demi-heure de distance.

POTION CONTRE LE CROUP.

Emétique	(1 grain 1/2) —	7 cent.
Sirop d'ipécacuanha	(1 onc.) —	32 gram.
Oxymel scillitique	(3 gros) —	12 gram.
Infusion de polygala	(4 onc.) —	125 gram.

Par cuillerées pour faciliter l'expulsion des fausses membranes. Employé à l'hôpital des enfants.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0237-3 DFG

POTION STIBIÉE OPIACÉE.

Emétique	(1 grain)—	5 cent.
Eau de fleurs d'oranger	(1/2 once)—	16 gram.
Eau	(8 onc.)—	250 gram.
Sirop d'opium	(1 once)—	32 gram.

A prendre par cuillerées toutes les demi-heures dans le traitement des fièvres intermittentes.

POTION ÉMÉTISÉE.

Emétique	(8 grains)—	4 décig.
Infusion d'arnica	(4 onc.)—	125 gram.
Ajoutez : Sirop diacode	(1 onc.)—	32 gram.

Par cuillerées toutes les heures dans le traitement du tétanos.

POTION ÉMÉTO-CATHARTIQUE.

Emétique	(2 grains)—	1 décig.
Sulfate de soude	4 gros)—	16 gram.
Eau chaude	(8 onc.)—	250 gram.

En trois doses, à un quart d'heure d'intervalle.

IPÉCACUANHA.

Médicament des plus recommandables, non seulement comme émétique, mais encore comme expectorant et comme agent de substitution, en variant les doses et le mode d'administration. S'il procure moins sûrement le vomissement que le tartre stibié, il est aussi moins sujet à déterminer des accidents, et son action est plus durable.

L'ipécacuanha a été particulièrement recommandé dans la péritonite puerpérale, dans le choléra spasmodique, dans les diarrhées et les dysenteries chroniques; dans ces dernières maladies il se comporte comme agent de substitution.

L'*émétine* est le principe actif de l'ipécacuanha. On n'emploie pas *l'émétine pure*, parce qu'on ne connaît pas de procédé pour l'obtenir facilement ; on se contente de prescrire quelquefois un extrait particulier connu sous le nom d'*émétine brune*, mais l'ipécacuanha suffit à toutes les indications.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0238-9 DFG

Ipécacuanha en poudre. C'est la préparation à laquelle on a le plus souvent recours. On prescrit (24 grains)—13 décigrammes d'ipecacuanha. On divise en trois doses. A prendre à un quart d'heure d'intervalle. On facilite l'effet par l'administration de l'eau tiède

Teinture alcoolique (1/2 once) 16 gram. en trois doses, comme émétique.

Extrait alcoolique (6 grains)—3 décigr. en pilules, comme emétique.

Sirop d'ipécacuanha. Extrait alcoolique d'ipécacuanha 32; eau pure 250; sirop simple 4500.

Faites dissoudre l'extrait dans l'eau; filtrez; d'autre part portez le sirop à l'ebullition; ajoutez-y la dissolution d'extrait; entretenez l'ebullition jusqu'à ce que le sirop ait repris sa consistance première, et passez.

Chaque once de sirop d'ipécacuanha contient quatre grains d'extrait ou la substance de seize grains de racine.

C'est un médicament émétique précieux pour les enfants (1/2 once)—16 gram. en deux fois, suffit pour un enfant de trois ans.

Emétine médicinale. (*Émétine brune.*) Poudre de racine d'ipécacuanha 500; alcool à (93 cent.) 2000.

Faites macérer pendant quelques jours, passez avec expression et filtrez; versez sur le marc trois nouvelles parties d'alcool et opérez de même. Réunissez les liqueurs et distillez; faites dissoudre le résidu dans quatre parties d'eau froide, filtrez, évaporez en consistance de sirop, et achevez la dessiccation à l'étuve.

(4 grains)—2 décig. en deux fois, comme vomitive.

TABLETTES D'ÉMÉTINE VOMITIVE. (*Magendie.*)

Sucre en poudre	(1 once)—	32 gram.
Emétine brune	(16 grains)—	9 décigr.
Mucilage de gomme adragante		q. s.

F. s. a. des tablettes d'un gramme.

Une à deux suffisent pour faire vomir un enfant de trois ans.

POTION VOMITIVE. (*Magendie.*)

Emétine brune	(4 grains)—	2 décig.

Faites dissoudre dans

Infusion de feuilles d'oranger	(2 onces)—	64 gram.

Edulcorez avec

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0239-7 DFG

Sirop de fleurs d'oranger (4 gros)—16 gram.

Une cuillerée toutes les demi-heures. Catarrhes pulmonaires, diarrhées chroniques.

POUDRE VOMITIVE.

Ipécacuanha	(24 grains)—13 décig.
Emétique	(1 grain)— 5 cent.

Mêlez et divisez en trois paquets.

Un tous les quarts d'heure. Si les deux premières suffisent, on ne donne pas la troisième. On facilite les vomissements en faisant boire beaucoup d'eau chaude au malade.

C'est un des meilleurs émétiques qu'on puisse employer.

JULEP ANTIDYSENTÉRIQUE.

Ipécacuanha gris concassé	(1 gros)— 4 gram.
Fait. bouill. 1/4 d'h. dans eau	(4 onces)—125 gram.
Pass. et aj. sir. de fl d'orang.	(1 once)— 32 gram.

Par cuillerées, toutes les dix minutes.

POTION ANTIDYSENTERIQUE. (*Spielmann.*)

Ipécacuanha	(2 gros)— 8 gram.
Eau	(12 onces)—375 gram.

On partage l'eau en trois parties, et chacune d'elles sert à faire une décoction. La quantité totale du produit doit être de (6 onces)—192 gram.

On y ajoute sirop de gomme (2 onces)—64 gram.

On administre en trois fois, à trois heures d'intervalle, dans les dysenteries et les diarrhées chroniques. C'est un médicament énergique d'une grande efficacité.

MIXTURE D'IPÉCACUANHA ET DE CRAIE COMPOSÉE. (*Hooper.*)

Ipécacuanha en poudre	(5 grains)—25 cent
Délayez dans sirop diacode	(1 gros)— 4 gram.
Alcoolat de cannelle	(2 gros)— 8 gram.
Mixture de craie	(13 gros)—52 gram.

En une seule fois. Répéter tous les quarts d'heure, dans le traitement de la diarrhée, de la dysenterie chroniques.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0240-8 DFG