Carthamus tinctorius. L.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-170246-p0208-7
DFG

SAFFLOER, WILDE SAFFRAAN.

De XIXde CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.* door HOUTTUIJN, *IIde Deel Xde St., bl.* 521.

SAFFLOER *met Lancetvormig Eijronde, onverdeelde, Zaagswijs' gedoornde Bladen.*

a. *De algemeene Kelk, uit Bladerachtige Schubben beſtaande.*

b. *Het Bloemhoofdje, ſamengeſteld uit veele Blommetjes,*

c. *Die eenbladig zijn en vijfdeelig, hoogrood, met een geelachtigen Stijl en pluizig Vrugtbeginzel.*

d. *De Meelknopjes, daar binnen, aan elkander gegroeid, met hunne loſſe Meeldraadjes.*

e. *Het Vrugtbeginzel met den Stijl en enkelden Stempel.*

BLOEITIJD. *De natuurlijke Groeiplaats wordt geſteld in Egijpte en andere Oosterſche Landen. Hier teelt men het in Tuinen, daar het in de Nazomer bloeit, groeijende omtrent twee Voeten hoog. 't Is een Zaaijplant.*

CARTHAMUS TINCTORIUS.

CLASSIS XVIIIva.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat.* Ed. GMELINI, *Tom. IIdi Part. IIdæ pag.* 1192.

CARTHAMUS Foliis Lanceolato-ovatis integris, ſerrato-aculeatis.

a. Calijx communis, ſquamis Foliosis imbricatus.

b. Capitulum Florale compoſitum plurimis Floſculis,

c. Monopetalis, quinquepartitis, ruberrimis, Stijlo inſtructis flaveſcente & Germine pappoſo.

d. Antheræ, ex hoc Floſculo, coalitæ, cum Staminibus liberis.

e. Germen cum Stijlo & Stigmate ſimplici.

TEMP. FLOR. Naturaliter hæc Planta dicitur creſcere in Egijpto, aliiſque Regionibus Orientalibus. Hic colitur in Hortis, ubi Autumno floret, altitudine circiter bipedali: Annua est.

GEBRUIK. Behalve het algemeene gebruik der Bloemen van deeze Plant, in de gemelde Landen, tot het bereiden van eene hooggeele, roode of Oranjekleur, veel naar die van *Saffraan* gelijkende; (daar men ook in Europa en misſchien wel in ons Land, tot het kleuren van de Boter, gebruik van maakt;) wordt aan de Zaaden een purgeerende kragt toegeſchreeven. In Maag- en Borstkwaalen, uit Slijm ontſtaande, heeft menze geroemd; doch hedendaags zijn zij in weinig achtinge. In de Oosterſche Landen worden de jonge Bladen als Salade gegeten, en het Sap, daar van, om de Melk te doen ſtremmen, gebruikt.