GROEN EIKE BOOM.

De XXIste CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.* door HOUTTUIJN, *IIde Deel IIIde St., bl.* 295.

EIKEBOOM *met langwerpig ovaale onverdeelde, zaagswijse getande en gesteelde van onderen grijze Bladen, hebbende de Schors zonder barsten.*

a. *De Mannelijke Bloem in een Katje.*

b. *Een Bloempje van het Katje met drie Meelaraadjes en viersplee-tige Kelk.*

c, c, c, c. *De thans puntige op de rijpe Vrugt zittende Stempel.*

d. *De grooter gewordene Vrugt.*

e. *De rijpe Noot van de Kelk gelost.*

f. *De Pit uit de Noot genomen.*

g, g, g, g. *Scharlaaken of Kermes Graantjes, in gedaante van kleine korreltjes, enkeld en zamengegaard op de Schors zittende, een nest van insecten.*

BLOETIJD. *Groeit in 't Zuidelijke Europa en de Zuidelijke streeken van Vrankrijk, Italien en Spanjen. De Boom groeit langsaam en word meerendeels in de gedaante van een Heester gevonden. De jonge struiken worden door de koude bezeerd, en uit dien hoofde verdraagd hij de verandering van ons Climaat niet. Hij is altoos groen.*

QUERCUS ILEX.

CLASSIS VIIIva.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat.* Ed. GMELINI, *Tom. IIdi Part. Imæ pag.* 644.

QUERCUS Foliis ovato oblongis indivirsis serratisque, subtus incanis, Cortice integro.

a. Masculi Flores in Amentum collecti.

b. Flos Amento solutus tristemos calijce quadrifido ob vallatus.

c, c, c, c. Stigma Fructibus jam maturis insidens, nunc acuminatum.

d. Fructus jam increscens.

e. Nux matura e Calijce soluta.

f. Nucleus e Nuce solutus.

g, g, g, g. Grana Kermes in Forma globulorum minorum, solitarie & agregata Cortici adhærentia, opus Insectorum.

TEMP. FLOR. Habitat in Europa Australi, & in meridionalibus Galliæ & Hispaniæ regionibus. Tarde Grandescit, & hinc plerumque sub humiliori Fruticis forma deprehenditur. Junior Frutex a Frigore læditur, hinc tempestatum injuriis apud nos relinqui nequit. Semper viret.

GEBRUIK. *Grana Kermes*, deeze groeijen zo wel op deeze Boom als op de *Quercus Coccifera.* Een Insect steekt in de Schors en Bladen, legd zijne Eijeren daarin neder, en daarvan dan komen de zogenoemde *Scharlaaken of Kermes Graantjes.* Ten opzichte van de Schors smaaken zij bitter en samentrekkend, en van wegens het in hun zijnde Insect iets scherp. Van hun vlugge loogzout meent men dat zij urindrijvend, en wegens de Schors sterkend zijn. Men gebruikt ze veel om stroopen of 't een of 't ander kleur te geeven. Eertijds waren zij veel in aanzien, thans niet meer. Men heeft verscheiden Composities en de voornaamste is de *Confect. alkermes.* Eenige Artsen hebben ze bij de vallende Ziekte, Duizeling en andere ziektens van Zenuwesswakte geroemd. De Kermes Graantjes zijn eenezeer goede roode verwstof.

KORK

Quercus Ilex L.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-170281-p0149-7
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-170281-p0150-8
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-170281-p0151-4
DFG