Apium petroselinum L.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-170294-p0030-2
DFG

GEMEENE PETERSELIE.

DE Vde CLASLE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.* door HOUTTUIJN *IIde Deels 8ste St. bl.* 227.

EPPE *met de Stengbladen Liniaal en met zeer kleine omwindzeltjes.*

a. *De algemeene bloemenkroon, bestaande uit weinig straalen, die in de byzondere trosjes meerder in getal zijn.*
b. *De bijzondere trosjes in den bloeitijd.*
c. *Een der geopende bloemetjes, om de vijf helmstijltjes te doen zien.*
d. *Een der blaadjes van het algemeen omwindsel.*
e. *De Bloemenkroon, na het afvallen der bloemetjes met de halfrijpe zaaden.*
f. *Een der lijnvormige stengbladen.*
g. *Een der geveerde wortelbladen.*
h. *De spilvormige wortel.*

BLOEITIJD. *Dit zo gebruikelijke kruit wordt alomme in de tuinen aangekweekt. In het zuidelijk Europa, bij voorbeeld in Sardinien, is het zelfs inlandsch geworden en wordt in overvloed aan de fontijnen en beeken gevonden.*

APIUM PETROSELINUM.

CLASSIS Vta.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat.* Ed. GMELINI *Tom. IIdi part. Imæ pag.* 493.

APIUM foliis caulinis linearibus, involucellis minutis.

a. Umbella universalis radiis parcioribus, partialis radiis pluribus.
b. Umbellæ partiales inflorescentiæ tempore.
c. Unus flosculorum apertus, ut apparerent quinque stamina.
d. Foliolum involucri universalis.
e. Umbella post florum delapsum, cum seminibus semimaturis.
f. Folium caulinum lineare.
g. Folium radicale pinnatum.
h. Radix fusiformis.

TEMP. FLOR. Herba haec usitatissima ubique in hortis colitur & media æstate floret. In Australiori Europa, uti in Sardinia, domestica evasit hæc, e calidioribus regionibus adlata planta, & copiose ad fontes rivulosque reperitur.

GEBRUIK. Behalven het huishoudelijk alom bekend gebruik, bezitten alle de deelen deezer Plant een openend en pisafdrijvend vermogen. De Wortel is een der vijf openende wortelen. Het gedisteleerde water is zagt prikkelend en afdrijvend. Men zegt dat de Peterselie voor 't gezicht nadeelig en voor de Pappegaaijen vergiftig is.