Calamus rotang L.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-170294-p0108-8
DFG

ROTTING GEWAS.

DE VIde CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.* door HOUTTUIJN, *IIde Deel 4de St. bl.* 445.

LINNÆUS *stelt maar eene zoort van* CALAMUS *en geeft daarom geene zoortonderscheidende beschrijving.*

a. *Een tak van deezen Heester, vertoonende de geveerde, gedoornde bladen, benedenwaards, als scheden geschikt.*

b. *De onvolkomene bloemen van het Rotting-gewas, bezittende een zesbladigen Bloemkelk, doch zonder Bloemkrans. Aan hetzelfde takje vertoonen zich de beginzelen der onrijpe vruchten.*

c. *De rijpe vruchten, bestaande uit een vliesachtig bolrond Zaadhuis, gedekt met achterwaards schuin op elkanderen geplaatste schubben*

d. *De geveerde bladen apart te zien.*

e. *De onrijpe vrucht, zo lang hij zappig is, overdwars midden doorgesneeden.*

f. *Het vleezig bolrond zaad.*

BLOEITIJD. *Deeze Heester, die bijna alomme in de Indiën groeit, wordt aldaar in verschillende zoorten verdeeld, en bloeit ongeveer, geduurende het geheele jaar, gelijk zulks, over 't algemeen, eigen is aan de gewassen, die in de verzengde luchtstreek groeijen.*

CALAMUS ROTANG.

CLASSIS VIta.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat.* Ed. GMELINI *Tom. IIdi part. 1mæ pag.* 570.

LINNÆUS unicam tantum admittit CALAMI speciem, & hinc non exhibet descriptionem specificam.

a. Ramus hujus Fruticis exhibens folia pinnata, aculeata, inferne vaginarum instar disposita.

b. Flores Calami incompleti, gaudentes Perianthio hexaphijllo, sed corolla carentes. In eodem ramulo apparent fructuum inmaturorum initia.

c. Fructus maturi, constantes e Pericarpio membranaceo globoso, tecto squamis, retrorsum imbricatis.

d. Folia pinnata seorsim.

e. Fructus inmaturus, quamdiu pulposus est, transversim sectus.

f. Semen carnosum globosum.

TEMP. FLOR. Hic Frutex, ubique fere in Indiis obvius est, ubi in plures species dividitur, floretque fere per totum annum, uti id in universum, plantis, sub Zona torrida obviis, proprium est.

GEBRUIK. Geweldig zou men dwaalen, zo men, van wege den naam deezes Heesters, wilde stellen, dat alle onze gewoone handrottingen voortbrengzels van dit Gewas zouden zijn. Dezelve komen uit Malakka en Siam, en zijn waarschijnlijk uitloopers van eene zoort van Bamboezen. Daarentegen is het Rottingriet, gebruikelijk, tot het uitkloppen van matten enz., ongetwijfeld een voortbrengzel van dit Gewas.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-170294-p0109-6