Inhaltsverzeichnis für Band V, Teil II.

88. Familie Cactaceae . . . . . Seite 679
Opuntia 688
Familie Geissolomataceae 697
Familie Penaeaceae 698
Familie Oliniaceae 698
Familie Cynomoriaceae 698
89. Familie Thymelaeaceae 698
Daphne 703
Thymelaea 725
90. Familie Elaeagnaceae 727
Elaeagnus 730
Hippophaë 731
91. Familie Lythraceae 741
Peplis 749
Lythrum 752
92. Familie Punicaceae 761
Punica 762
Familie Lecythidaceae 765
Familie Rhizophoraceae 768
Familie Nyssaceae 769
Familie Alangiaceae 770
Familie Combretaceae 771
93. Familie Myrtaceae 773
Pimenta 776
Eugenia 777
Eucalyptus 781
Melaleuca 786
Myrtus 789
Familie Melastomataceae 794
94. Familie Oenotheraceae 797
Fuchsia 801
Ludwigia 804
Epilobium 806
Oenothera 857
Circaea 873
95. Familie Hydrocaryaceae 882
Trapa 882
96. Familie Halorrhagidaceae 895
Myriophyllum 896
97. Familie Hippuridaceae 905
Hippuris 905
98. Familie Araliaceae 910
Hedera 914
99. Familie Umbelliferae 926
Hydrocotyle 951
Sanicula 957
Hacquetia 959
Astrantia 961
Eryngium 974
Lagoecia 992
Echinophora 992
Biasolettia (Freyera) 993
Physocaulis . . . . . Seite 994
Chaerophyllum 984
Chaerefolium (Anthriscus) 1014
Scandicium 1032
Scandix 1032
Myrrhis 1041
Molopospermum 1046
Torilis 1048
Astrodaucus 1060
Caucalis (Turgenia) 1061
Orlaya 1066
Coriandrum 1071
Bifora 1074
Smyrnium 1077
Danaa 1080
Conium 1081
Grafia 1087
Pleurospermum 1089
Cachrys 1093
Prangos 1093
Bupleurum 1094
Trinia 1131
Apium (Helosciadium) 1139
Petroselinum 1154
Ridolfia 1161
Sison 1162
Cicuta 1163
Trachyspermum 1167
Cryptotaenia 1169
Ammi 1170
Ptychotis 1173
Ammoides 1175
Falcaria 1176
Hladnikia 1180
Carum 1181
Bunium 1188
Conopodium 1195
Pimpinella 1196
Aegopodium 1212
Sium 1216
Crithmum 1224
Seseli (Seselinia, Libanotis) 1226
Oenanthe (Phellandrium) 1249
Aethusa 1272
Athamanta 1276
Foeniculum 1284
Anethum 1290
Silaum 1295
Trochiscanthes 1299
Meum 1300
Cnidium 1303
Selinum 1309

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-170692-p0931-2
DFG

Ligusticum (Pachypleurum, Neogaya) . Seite 1313
Cenolophium 1326
Aciphylla 1328
Conioselinum 1328
Angelica (Archangelica, Ostericum) 1331
Levisticum 1349
Capnophyllum 1354
Ferula 1354
Ferulago 1357
Opopanax 1360
Peucedanum (Thysselinum, Tommasinia) . . 1363
Pastinaca 1404
Heracleum . . . . . Seite 1415
Zosimia 1456
Tordylium (Condylocarpus) 1457
Laser 1464
Siler 1467
Laserpitium 1472
Thapsia 1500
Daucus 1501
100. Familie Cornaceae 1538
Aucuba 1539
Cornus 1540

Einige Berichtigungen zu Band V/2.

Seite 698 Zeile 4 von oben. Statt pag. 692 und 717 ist 698 und 787 zu setzen.

Seite 830 Zeile 1 und 2. Milleschauer und Donnersberg bezeichnen den gleichen Standort.

Seite 830. Der Autor von Epilobium Duriaei heisst Gay.

Seite 866. Oenothera silaifolia Bieb. ist zu streichen (gemeint ist Oenanthe silaifolia).

Seite 894. Die Familie der Halorrhagidaceae muss die Nummer 96 (nicht 99) bekommen.

Seite 924 Zeile 2 von unten. Statt Milchsüchtigen ist Milzsüchtigen zu lesen.

Seite 947 letzte Zeile. Lies Habitus absoluti.

Seite 989. Eryngium campestre L. ist 1925 von H. Schwier bei Corbach in Waldeck vor Dingeringshausen (allerdings stark bedroht) festgestellt worden.

Seite 1009. Chaerophyllum hirsutum L. subsp. Cicutaria (Vill.) Briq. hat H. Schwier 1926 als vorgeschobener Posten des Harzgebietes bei Göttingen zwischen Waake und Ebergötzen beobachtet.

Seite 1043. Myrrhis odorata (L.) Scop. ist neuestens von D. A. Christiansen bei Osterholm (alter Herrensitz) auf der Insel Alsen in Schleswig und von J. Murr (1926) am Haller Salzberg in Nordtirol nachgewiesen worden.

Seite 1059. Torilis nodosa (L.) Gärtn. wurde bei Essen und Emmerich verschleppt beobachtet.

Seite 1076. Bifora radians Bieb. wurde 1923 bei Göttingen (östlich von Weende am Heinrichsberge), 1923 in Westfalen zwischen Haarbruck und Beverungen und in der Rheinprovinz (Rheinhafen von Neuss) nachgewiesen.

Seite 1109. Bupleurum longifolium L. hat Schwier 1925 in der Rhön auch am Buchtenberg bei Wenigentaft festgestellt.

Seite 1148. Apium nodiflorum (L.) Lag. subsp. eu-nodiflorum Thellung kommt auch in Westfalen (Dülmen) vor.

Seite 1170. Ammi Visnaga (L.) Lam. verschleppt in Freimann bei München, 1925 (leg. Weissenbeck!).

Seite 1188. Carum verticillatum (L.) Koch erscheint bei Heinsberg auch zwischen Haarem und Karken.

Seite 1192. Carum Bulbocastanum L. beobachtete H. Schwier (1925) in Waldeck (Gembeck bei Corbach).

Seite 1309. Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonkai ist nun auch für Deutschland nachgewiesen worden (vgl. pag. 1466, Fussnote 3).

Seite 1391. Peucedanum Cervaria (L.) Lapeyr. kommt auch in Westfalen südöstlich von Welda bei Warburg an der hessischen Grenze vor (H. Schwier, 1925).

Seite 1466 Zeile 12 von oben. Statt Mittelmeergebiet soll es Mittelwesergebiet heissen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-170692-p0932-8
DFG