

къ водному раствору соли избытка амміака, получается прозрачная, темно-синяя жидкость.

3 грм. мѣднаго купороса растворяють въ 20 к. ц. воды, прибавляютъ 20 капель разведенной сѣрной кислоты, насыщаютъ сѣроводородомъ и фильтруютъ. Прозрачный фильтратъ, послѣ прибавленія амміака, можетъ давать лишь слабо-зеленое окрашиваніе. По испареніи 1 к. ц. фильтрата не должно оставаться болѣе 0,5 mgr. огнестояннаго остатка.

Сохраняется въ хорошо закупоренной банкѣ.

Высшій приѣмъ, какъ рвотное: 0,5

140. Decocta.

Отвары.

Измельченныя вещества, назначенныя для приготовленія отваровъ, всыпаются въ фарфоровые или оловянные сосуды, обливаются надлежащимъ количествомъ холодной, перегнанной воды и, при помѣшиваніи, нагрѣваются $\frac{1}{2}$ часа въ кипящей водяной банѣ. Горячая жидкость процеживается чрезъ холстъ и остатокъ отжимается.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ прописи не обозначено количество вещества, назначаемаго для приготовленія отвара, на 10 ч. колатуры слѣдуетъ брать 1 ч. вещества, за исключеніемъ слѣдующихъ: *Bulbus Scillae*, *Flores Arnicae*, *Lichen Islandicus*, *Radix Senegae* и *Rhizoma Valerianae*, которые берутся по 1 ч. на 30 ч. колатуры.

Количество сильно дѣйствующихъ веществъ, означенныхъ въ спискѣ Б, должно быть обозначено врачомъ, въ противномъ случаѣ, для внутренняго употребленія, на 200 ч. колатуры берется 1 ч., а для наружнаго—1 ч. на 10 ч. колатуры.

Для приготовленія крѣпкаго отвара, *Decoctum concentratum*, на 10 ч. колатуры берутъ $1\frac{1}{2}$ ч., а для самаго крѣпкаго, *Decoctum concentratissimum*—2 ч. вещества на то же количество колатуры.

Для слабаго отвара, *Decoctum tenue*, берется 1 ч. вещества на 20 ч. колатуры.

Соли, экстракты, тинктуры и другія вещества примѣшиваются къ процеженнымъ уже отварамъ.

Въ случаѣ прописи отвара съ настоемъ, *Decocto-Infusum*, сна-

чала готовится отваръ изъ веществъ, не содержащихъ летучихъ составныхъ частей, а затѣмъ приготовленный горячій отваръ настаивается $\frac{1}{4}$ часа на веществахъ, содержащихъ летучія составныя части. Полученный настой процеживается чрезъ холстъ, остатокъ на холщевой цѣдилкѣ отжимается, полученная при отжимѣ жидкость процеживается и смѣшивается съ процеженнымъ настоемъ.

Всѣ отвары готовятся *ex tempore*.

141. Decoctum Amyli.

Крахмальный отваръ.

Amyli Triticici	2
Aquae destillatae frigidae	8
Aquae destillatae ebullientis circiter	90

Пшеничный крахмалъ смѣшивается съ холодною, перегнанною водою, затѣмъ прибавляется кипящая вода, все смѣшивается и нагревается до кипѣнія.

Получается 100 ч. густоватаго, непрозрачнаго отвара.

Приготавливается *ex tempore*.

142. Decoctum Chinae acidulatum.

Кислый хинный отваръ.

Corticis Chinae grosse pulverati	8
Aquae destillatae sufficientem quantitatem	
Acidi sulfurici diluti	1

Крупный порошокъ хинной коры, по прибавленіи воды и сѣрной кислоты, кипятить въ фарфоровой чашкѣ и процеживать.

Получается 60 частей отвара.

Мутная желтовато-бурая жидкость.

Приготавливается *ex tempore*.

143. Decoctum Quercus aluminatum.

Отваръ дубовой коры съ квасцами.

Corticis Quercus concisi	5
Aquae destillatae sufficientem quantitatem.	
Aluminis	1
Glycerini	7

Къ изготовленному горячему отвару дубовой коры прибавляют квасцы и глицеринъ и разводятъ водою до 70 ч.

Бурая жидкость, выдѣляющая по прошествіи нѣкотораго времени незначительный осадокъ.

Приготавливается ex tempore.

144. Decoctum Zittmanni fortius.

Крѣпкій отваръ Циттманна.

Radicis Sarsaparillae concisae et contusae	360
Aquae communis	26000

Настаиваютъ 24 часа и прибавляютъ смѣсь порошковъ:

Sacchari albi	24
Aluminis	24
Hydrargyri chlorati mitis	16
Cinnabaris praeparatae	4

Всыпавъ смѣсь порошковъ въ холщевый мѣшочекъ, завязываютъ его, кладутъ въ котель и кипятятъ въ водѣ съ сарсапарильнымъ корнемъ до тѣхъ поръ, пока не останется 9000 частей отвара. Подъ конецъ кипяченія прибавляютъ:

Fructuum Anisi vulgaris contusorum	16
Fructuum Feniculi contusorum	16
Foliorum Sennae	90
Radicis Glycyrrhizae concisae	48

Приготовленный отваръ процѣживаютъ и остатокъ на холщевой

цѣдилкѣ отжимають. Отжатый подъ прессомъ остатокъ служить для приготовления слабаго отвара Циттмана. Процеженный отваръ оставляють на нѣсколько часовъ отстояться, свѣтлую жидкость сливають съ осадка въ бутылъ и сохраняють въ прохладномъ мѣстѣ. Получается 8500 частей крѣпкаго отвара Циттманна.

Decoctum Zittmanni fortius sine Hydrargyro s. Decoctum Sarsaparillae compositum fortius готовится безъ каломеля и киновари, причеъ сахаръ и квасцы прямо прибавляють къ прокипяченному отвару.

Примѣчаніе. Означенное количество отвара Циттманна готовится только тогда, когда предвидится расходъ его на нѣсколько дней сряду. Отнюдь не должно безъ надобности готовить отваръ въ запасъ на продолжительное время, особенно лѣтомъ.

145. Decoctum Zittmanni mitius.

Слабый отваръ Циттманна.

Radiciſ Sarsaparillae concisae et contusae	180
(Residui specierum e decocto fortiore)	—
Aquae communis	26000

Кипятятъ до тѣхъ поръ, пока не останется 9000 отвара. Подъ конецъ кипяченія прибавляють:

Corticis Fructus Citri concisorum	12
Corticis Cinnamomi contusae	12
Fructuum Cardamomi contusorum	12
Radiciſ Glycyrrhizae concisae	12

Отваръ процеживаютъ и остатокъ на цѣдилкѣ выжимають подъ прессомъ. Полученную отжиманіемъ жидкость смѣшиваютъ съ отваромъ, оставляють на нѣсколько часовъ для отстаиванія и сливають съ осадка. Получается 8500 ч. слабаго отвара Циттманна.

Примѣчаніе. Все сказанное въ примѣчаніи о Decoctum Zittmanni fortius относится и къ Decoctum Zittmanni mitius.

146. Diuretinum.

Theobrominum Natrio-salicylicum.

Диуретинъ.

Теобромино салицило-натріевая соль.

Бѣлый, сладковато-соленого вкуса порошокъ, очень легко растворяющійся въ водѣ, образуя безцвѣтный, прозрачный растворъ щелочной реакціи, окрашивающійся, отъ прибавленія 2—3 капель раствора хлорнаго желѣза, въ фіолетовый цвѣтъ. Отъ прибавленія къ водному раствору диуретина соляной кислоты получается бѣлый осадокъ, вполне растворяющійся въ ѣдкомъ натрѣ и только отчасти въ амміакѣ.

2 грм. диуретина растворяютъ, при слабомъ нагреваніи, въ 10 к. п. воды, къ раствору прибавляютъ нормальнаго раствора соляной кислоты до тѣхъ поръ, пока синія лакмусовая бумага не начнетъ окрашиваться едва замѣтнымъ краснымъ цвѣтомъ, затѣмъ къ жидкости прибавляютъ 1 каплю разведеннаго воднаго раствора амміака (1:10), сильно взбалтываютъ и оставляютъ стоять три часа при обыкновенной температурѣ. Образовавшійся осадокъ собираютъ на фильтръ въ 8 см. діаметромъ, дважды промываютъ 10 к. п. холодной воды, высушиваютъ сначала на воздухѣ, а затѣмъ при 100°, охлаждаютъ подъ эксикаторомъ и взвѣшиваютъ. Всѣхъ осадка не долженъ быть менѣе 0,8 гр.

Сохраняется съ предосторожностью (списокъ Б) въ хорошо закупоренной банкѣ въ защищенномъ отъ свѣта мѣстѣ.

Высшій однократный приѣмъ 1,0

Высшій суточный приѣмъ 6,0

147. Elaeosacchara.

Маслосахары.

Приготавливаются тщательнымъ растираніемъ въ фарфоровой ступкѣ 2 грм. порошка сахара съ одною каплею эфирнаго масла. Для при-