



Vaccinium Myrtillus. L.

B O S C H
B E S S E N.DE VIII^{te} CLASSE.Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN IIde
Deels 4de St bl. 483.BLAAUW-BESSEN, KRAAKEL-BEZIËN,
POSTEL-BEZIËN, BLEEKEN, met
eenbloemige Steeltjes, zaagswij-
ze, getande, eijronde Bladen, en
een hoekigen Steng.

- a. De eenbladige, kleine, bijblij-
vende, effenrandige Bloedop.
b. De eenbladige, vierdeelige, kloks-
wijze Bloedop, met weeromge-
rolde Blaadjes.
c. De agt eenvoudige, in den Stoel
vastgehegte, Meeldraden.
d. Een afgezonderd Meeldraadje.
e. Het onderzittend Vrucht-begijn-
zel, met den enkelden Stijl, en
den stompen Stempel.
f. Een rijpe, klootswijze Vrucht.
g. De kleine Zaaden.

BLOEITIJD. In de maand Maj,
overvloedig in de boschen en op dor-
re woeste heiden, op de VELUWE, in 't
STICHT van UTRECHT, in FRIES-
LAND, OVERIJSSSEL, GRONINGEN, en
bijzonder naar den kant van BRA-
BANT, zomtjids een en een halve voet
hoog.

VACCINIUM
MYRTILLUS.CLASSIS VIII^{ta}.Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI Tom. IIIdi part.
2de pag. 620ma.VACCINIA, MIJRTILLUS GERMANI-
CA, VITIS IDEEA, pedunculis
uniformis, foliis ferratis, ovatis,
caule angulato.

- a. Perianthium monophyllum, par-
vum, persistens, integerrimum.
b. Corolla monopetala, quadrifida,
campanulata, laciniis revolutis.
c. Stamina octo simplicia, recep-
taculo inserta.
d. Stamen separatum.
e. Germen inferum, cum stijlo
simplici, & stigmatibus obtuso.

- f. Bacca matura, globosa.
g. Semina parva.

TEMP. FLOR. Mense Majo,
abundè in sijlvis & locis aridis
desolatis, altitudine aliquandò
sesquipedali.

GEbruik. Het Landvolk en de Herders gebruiken deeze Besen
veelal tot hun gewoon voedsel, het welk, wanneer zij 'er brood of
vleesch bij eeten, voor hun niet ongezond is; doch te veel hier van
is bezwaarende en opproppende voor de Maag, wegens de beken-
de samentrekkende hoedanigheid, waarom zij ook dikwerf met
de gedroogde Besen der Mijrthen (*Bacca Myrtilli*), gelijk door Po-
MET en LEMERI, in de Geneeskunde verward worden. Zij strekken
tot aas voor de Bosch- en Veldhoenderen, Faifanten, Patrijzen en
ander gevogelte.

In Vrankrijk worden zij gebruikt om den roode wijn te kleuren,
en de Schilders gebruiken dezelve om den schoonen blaauwen kleur,
die 'er met Aluin (*Alumen*) en Galnooten (*Galla*) wordt uitge-
strokken.

WEL.