

B E R G - T E U C R I U M

G A M A N D E R . M O N T A N U M .

De XIVde C L A S S E:

C L A S S I S XIIIa.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IXde St., bl. 288.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat.* Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
IIde pag. 894.

BERG-GAMANDER met endelingse
Bloemtroesjes; de Bladen Lancet-
vormig effenrandig, van onderen
Wollig.

TEUCRIUM Corijmbo terminali;
Foliis Lanceolatis integerrimis,
subtus tomentosus.

a. De eenbladige half vijfdeelige
Kelk of Bloemdop.

a. Perianthium monophyllum se-
mi-quinquedum.

b. De eenbladige Gaaperachtige
Bloem, geopend, met haare twee
langere, twee kortere Meeldraad-
jes, rondachtig geknopt.

b. Corolla monopetala ringens;
aperta, cum Staminiibus binis
longioribus, binis brevioribus,
& Antheris subrotundis.

c. Het vierdeelig Vruchtbeginzel,
met den Draadachtigen Stijl en
twee zeer dunne Stempeltjes.


c. Germen quadrifidum cum Stijlo
filiformi & duobus Stigmatibus
tenuissimis.

De BLOEITIJD is in Julij en
Augustus van dit Kruid, dat op
de Bergen van Switserland, Tirol
en elders, in de Zuidelijke deelen
van Europa, wild groeit, zelden
een Voet hoog. Het blijft over.

TEMP. FLOR. in Julio & Augusto.
Crescit sua sponte hac Herba in
Montibus Helveticis, Tijrolensibus,
alibique in Australioribus
Europæ, vix unquam altitudine
pedali reperta. Perennis est.

GEBRUIK. Van dit Gewas, dat ook *Cretische Berg-Poley* ge-
noemd wordt, en waarschijnlijk Kruidrig of aangenaam is van Reuk,
zijn mij anders geene hoedanigheden bekend. Bij sommigen wordt
het gehouden en gebruikt voor het *Marum Sijriacum*, dat onder den
naam van *Teucrium Marum* of Sijrische Gamander, op de LXste
Plaat in 't Eerste Deel is afgebeeld, en aldaar beschreeven.

WILDE



Teucrium montanum. L.

