



Sisymbrium nasturtium, L.

W A T E R -
K E R S.

De XVde CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IXde St., bl. 668.

WATER-KERS met afgeboogen Zaad-
huisjes en gevinde Bladen, de
Blaadjes bijna Hartvormig.

- a. De vierbladige gekleurde Kelk.
- b. De Bloemen in 't kruis vierbladig.
- c. De zes Meeldraadjes, vier langer, twee korter, rondom den Stamper.
- d. Een Bloemblaaije afzonderlijk.
- e. De afgeboogene kromme Haauwtjes of Zaadpeulen.
- f. Een derzelven geopend met de Zaadjes.

BLOEITIJD. Dit Gewas komt in laage Landen bij ons veel voor, zo in heldere Slooten en Duin-Wateren of Beeken, als in vogtige Landsdouwen; want het groeit met Vezelige Wortels in 't Water, verheffende zig met een getakte Steng daar boven. Men vindt het ook in andere deelen van Europa en in Noord-Amerika.

S I S I J M B R I U M
N A S T U R T I U M.

CLASSIS XIVa.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, Tom. IIde Part.
IIde. p. 980.

SISIJBRIUM Siliquis declinatis,
Foliis pinnatis, Foliolis subcordatis.

- a. Perianthium tetraphyllum coloratum.
- b. Corollæ tetrapetalæ Cruciformes.
- c. Stamina sex, quatuor longiora, duo breviora, Pistillum cingentia.
- d. Petalum separatum.
- e. Siliquæ declinatæ incurvæ.
- f. Una Siliqua aperta cum Seminibus.

TEMP. FLOR. Hæc Planta copiose prostat in nostra Regione, in Fossis puris, in Rivulis Dunarum, atque in Pratis udis. crescens sub aqua Radicibus fibrosis, & se inde extollens Caule ramoso. Etiam reperitur in aliis Regionibus Europæ & Americæ Borealis.

GEBRUIK. De Waterkers is niet zo scherp als de Lepelbladen, maar van dergelijk gebruik tegen het Blaauwschuit (*Scorbutus*), wordende dikwils in Meydranken, tot Bloedzuivering, voorgeschreeven. Het uitgeperste Sap is daar tegen ook zeer dienstig. Zij heeft den Smaak bijna van Tuinkers, en wordt, op Azijn gezet, wel tot versnapering gebruikt. Hier van kan men de naamsreden afleiden.