



SASSAFRAS-BOOM.

De IXde C L A S S E.
Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IIde St., bl. 360.

LAURIER met driekwabbigte en on-
verdeelde Bladen.

- a. De Mannelijke Bloem met zes
Blaadjes en negen Meeldraadjes, aan
welken van onderen Kliertjes zitten,
- b. Een zodanige Bloem met een
Stamper zonder Vruchtbeginzel.
- c. De negen Meeldraadjes.
- d. Een afgezonderd.
- e. Een afgescheiden Kliertje.
- f. De Stamper met twee Kliertjes.
- g. Tweeflagtige Bloemen, van onderen
gezien.
- h. Dezelve van boven, met zes Blaad-
jes, zes Meeldraadjes en den Stamper.
- i. Een zodanige met vijf Bloemblaad-
jes.
- k. De afgescheiden Stamper.
- l. Een Klier.
- m. Frische Bosfen.
- n. Derzelver Kelk.
- o. Dezelve gedroogd.
- p. De Kelk van onderen en boven.

- q. Eene drooge Bezie.
- r. De Noot daar uit.
- f. Deze geopend met de Kern.
- t. De ledige Schaal.
- u. De Kern.

BLOEITIJD. De Sassafras-Boom
groeit oversloedig in Noord-Amerika
en laat zig in deeze Gewesten ook
voortkweeken, verdragende onze Win-
terkoude. Hij is van verschillende
Vruchtmaakting ten opzigt van de Bloe-
men, doch niettemin, gelijk de vol-
gende, tot het Geslacht van gewoo-
nen Laurier, in 't I Deel, bl. 54
beschreeven, maar verkeerdelijk
't huis gebracht tot de X. Classe.

LAURUS SASSAFRAS.

C L A S S I S IXda.
Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. II di Part.
Imæ pag. 651.

LAURUS Foliis trilobis integrisque.

- a. Flos Masculus cum Petalis sex
& novem Staminibus, Glandu-
lis prope Basin affixis.
- b. Talis Flos cum Pistillo sine Ger-
mine.
- c. Stamina novem.
- d. Stamen separatum.
- e. Glandula separata.
- f. Pistillum cum duabus Glandulis.
- g. Flores Hermaphroditi a parte
inferiore.
- h. Idem desuper, cum Petalis sex,
Staminibus sex & Pistillo.
- i. Talis cum Petalis quinque.

- k. Pistillum separatum.
- l. Glandula.
- m. Baccæ recentes.
- n. Earum Calijx.
- o. Idem ficcus.
- p. Calijx ab inferiore & superiore
parte.
- q. Bacca ficcata.
- r. Ejus Nux.
- f. Eadem aperta cum Nucleo.
- t. Drupa vacua.
- u. Nucleus.

TEMP. FLOR. Hæc Arbor copiose
crefcit in America Boreali atque
in nostris Regionibus etiam facile
propagatur, frigus nostrum hiber-
num tolerans. Fructificatione dif-
fert respectu Florum ut in Tabula
attamen ut sequentes, relata est
ad Genus Lauri nobilis, qui in Parte
prima, pag. 54, descriptus, sed
perverse ad Classem Ximam rela-
tus est.

GEBRUIK. In Noord-Amerika, daar deeze Boomen wel zo groot
worden als onze Eiken, gebruikt men ze tot Paalen en Werkhout ;
doch de Wortels, Schors en Takken, daar de voornaamste Reuk
en Kragt in zit, dienen 'er, gelijk hier, tot Aftrekzel met Water of
Afkookzel, in Dranken, tot Geneskundige oogmerken.